

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部  
第五二冊






魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB66/106

## 四庫全書存目叢書·子部五二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 48 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

# 子部第五二冊目次

## 子部·醫家類

李氏醫鑑十卷續補二卷

〔清〕李文來輯  
中國中醫研究院圖書館藏清康熙三十五年李氏貽安堂家刻本

一

濟陰綱目十四卷

〔明〕武之望輯 〔清〕汪淇箋釋  
中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻本

一九七

保生碎事一卷

〔清〕汪淇輯  
中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻濟陰綱目附

四五八

成方切用二十六卷

〔清〕吳儀洛輯  
山東省圖書館藏清道光二十七年瓶花書屋刻本

四六四



# 李氏醫鑑十卷續補二卷

〔清〕李文來輯

中國中醫研究院圖書館藏清康熙三十五年李氏貽安堂家刻本

附《四庫全書總目·李氏醫鑑  
十卷續補二卷》提要

昌期李氏得汪訥菴本草備  
要醫方集解二書區以病名分  
條彙輯俾臨證求方一目瞭然  
書成汪氏及為鑒定四庫全  
書所載甚詳查成方切用金鑑  
三度兩書出入汪氏醫方亦可  
法是書增加恭攷研求藥物史  
臻完備為醫家必讀之書四  
庫收之坊間絕少此歷年不之  
不得者滋予植運於京師購  
得郵歸余笥中又添四庫醫  
書一種矣止兒長齡平生愛四

庫藥本今夏但化未獲一睹  
使我增無限傷感耳濟時揮  
淚識此兩孫其永保之  
民國十四年乙丑大雪後二日

序

嘗考良醫之功與良相等又云  
醫道易於種德信然但學醫未  
精而致害亦易生人命脉係於  
三指之下兩劑之中若無主見  
未有不殺人者故愚人不知重  
醫卽醫家亦不知自重畧習本  
草之粗解出應當世之深求是  
何異於矮人觀劇而於本末原  
委總未之悉也醫書自內經後



東垣丹溪諸先生所載幾於充  
棟其間寒熱虛實之辯論君臣  
佐使之調燮五臟六腑之病源  
亦甚微渺而難明也非具十分  
識力十分小心十分閱歷窮究

序二

更未易妥確而精詳予友瑤圃  
再叔昌期蓋苦心之士也夙患  
體弱博致群書審取名儒訥菴  
醫方集解本草備要彙成一帙  
名曰醫鑑求序於予余固不知

醫而嘆醫之難言也今觀其醫  
鑑自首至足由內及外分門別  
類之可稽一類數症一症數解  
淺深詳畧之各當既剖其病症  
之表裏又晰其草木之主治早

序三

作夜思匪朝伊夕其殆閱歷既  
久參考而出之以慎重者乎後  
之有心救世問津於醫者守此  
而知所扼要或不至於差謬以  
生人之道翻爲害人之具也如

是則醫家既知自重而延醫者  
其亦讀是編而憬然起悟乎予  
願公之海內可已



康熙乙亥嘉平上浣

賜進士第通政大夫通政使司

序

通政使加三級年家眷弟羅

秉倫拜題



李氏醫鑑序

李子昌期乃新安婺源之名族淵博理學之真儒也心仁而慈行方而潔幼攻舉子業見試防嚴專意經史不求仕進因以多病之身究心岐黃之術於立齋醫案諸書罔不殫心研窮而於本草備要醫方集解兩書尤三折肱焉既善二書之詳苦無分門之別挑燈五夜驚枕三冬集二美之全分諸門之萃顏曰李氏醫鑑噫誠度世之指南航海之寶筏也一日問序於余余經生也非越人烏知醫道哉

廿五

夫醫何可漫言哉天下之物可以生人殺人者惟兵與藥耳兵有奇有正必讀孫吳之書請五花八陣之圖虛實有法進退有方雖非百勝之師而必不致於敗績脉存浮沉遲數藥有君臣佐使必習岐黃之經熟五運六氣之理補瀉不謬溫涼咸宜雖非萬全之術必不至於有失今昌期集二書之要解參十全之良方今後之學者因病驗方開卷了然斷不致於有敗亡也况皆驗之於沉疴諸症者乎或曰醫者意也古方何可盡依也雖然以方殺人者十之



三以意授人者十之七以書方面酌今意隨時損益因正  
畫變鄭重思惟百鮮一失吾子昌期心醉仁術矣顏之曰  
醫鑑永爲初庵之功臣後學之矩範也暗室一燈善身壽  
世功與海嶽崇深矣

康熙丙子季春朔于湖同學弟甘韋柔安氏題於寶善堂



李氏醫鑑序

昔人云醫者之功與宰相等又云醫道好種德今之人多學  
醫其志固可嘉然吾謂醫亦有害何害乎爾脉理之未精用  
藥之不善也夫人既學醫則必讀書讀書則必明理醫家之  
書先聖先賢之所著其義固已大備而近來國手又各有名  
編學者一開卷而五臟六腑之症君臣佐使之宜傳經炮製  
之理莫不了然於胸中矣又安得尚有脉理未精用藥不精  
者殊不知醫書如天下之山水學者正如天下之觀山玩水  
者也使業醫者天資過人無書不覽融會貫通亦猶穆滿之  
醫鑑

序一

周行天下羣山之秀麗萬派之汪洋靡不畢知其餘則如居  
一方者知一方之奇勝而已居一國者知一國之奇勝而已  
卽有恣情山水奔走四方登臨覽眺者終未能窮滄溟抵崖  
崑折若木而淹蒙汜也如是則書未能徧觀亦安得無害思  
夫禹貢一書其書不過數篇而天下山之脉絡水之源流燥  
如指掌竊謂醫家之書苟有如此之簡要而會通者使學者  
讀之則敏者得辭勞而就逸鈍者得因題而知微庶幾可副  
其剖股之心而無害於天下然卒不可得甲戌春李子昌期  
以所著醫書見示名曰醫鑑予細玩之要不外先聖先賢及

諸國手之旨然而博者約之畧者詳之分者合之近似者辨  
別之誠簡要而會通予大喜曰欲使學者辭勞而就逸因題  
而知微可以副其割股之心而無害於天下者其在斯乎其  
在斯乎李子受業於予伯氏深知其爲人少時博洽羣書繼  
因體弱旁究醫書因而精通醫理今造門求醫者甚多彼自  
謂曰治舉子業者非徒取功名當以道濟天下治岐黃術者  
非徒覓利當以術濟天下然療一病不過濟一人卽療千萬  
病亦不過濟千萬人所濟者有限惟著書傳世則所濟者無  
窮因取醫方集解本章備要及諸名書分門別類會成斯編

醫鑑

序二

因貧劬劬無資舊醫者久同邑王子錫三立心種德恒憾不  
能廣濟天下適見是書曰此真醫家寶鑑輒壽之梓將不脛  
走天下天下岐黃家皆功侔良相矣是李非王無以成著書  
之功王非李無以遂廣濟之願二公之德益相與以有成也  
予樂爲之序

康熙丙子歲夏月歸溪弟江賓爲題



醫鑑敘

士君子讀書窮理豈惟是咕嚕文辭諧聲叶律學爲靡麗之  
文已哉蓋將以達五行之理通二氣之蘊而期有用於世也  
顧士之用於世者居變理之任調和萬物災異不生而疾疫  
不作信乎美矣若其平居草茅不得尺寸安所得一展其經  
綸參贊之奇哉予嘗論輔相造化洩所有餘而補所不足  
寓參贊之功者九流百家之中醫爲最故以世俗觀之直一  
技藝耳然人之死生於是乎在非達五行而通二氣者弗能  
精也獨惟世之業此者苟且以延旦夕之計問以陰陽寒暑

醫鑑序

一

之宜慨謝不知間有一二稍知此者則又矜爲獨得之秘曰  
某某吾異傳也某某吾奇方也私於已不欲公於世凡此皆  
利心爲之蔽也揆之天地生人之意不無遺議焉家叔祖昌  
期既已肆力詩書又浸淫於百家九流之說靡不條貫醫其  
一也數年來造其門而求活者指不勝屈然猶哀夫世之業  
此者汶汶而不知所趨又以前此傳是書者汗牛充棟浩衍  
而不可校於是取初庵二書分門別類因其內外條理而爲  
之治文甚約而旨極該使窮鄉僻壤各置一編倉公扁鵲如  
與共晨夕又何獨得之奇不傳之秘哉大哉仁人之用心此

真可以參贊造化之微矣或疑叔祖窮年矻矻不得一展其  
經濟疑若有所憾然太上云活一人卽爲陰德此書流傳千  
百世所活豈止千萬人哉其慶衍流長蓋於是乎卜之矣彼  
獨得自矜秘而不欲公於世者其亦知愧也天  
康熙丙子仲秋再姪若奇瑤氏書于務本堂



自序

語曰士生天地不爲良相便爲良醫蓋求寧求瘼者良相  
事也至若疾苦呻吟者唯良醫能望聞問切有以施治而  
安全之耳非謂醫道之易而無難也其理至精至微非賢  
聖之神明不能著其書非精深之學識不能習其業是以  
三年之中不乏三及第十載之內難出一良醫何世之人  
一覽藥性捷徑等書遂謂醫道在是輒欣然懸壺射利真  
管物命恬然罔忌善乎蘇文忠公有言曰學醫人費嚙人

命至重其可費乎甚矣醫道之難深可畏也

宋

何人斯敢

漫言哉

因稟氣其薄自襁褓至弱冠皆以藥餌爲命及

習拾帙時卽旁及汪石山先生藏書以及諸集凡遇高明

輒虛心聆誨日就月將漸識溫涼據案立方頗知向導昔

之倚醫士以爲命者漸轉而倚方書以爲命矣由是治及

妻孥昆季漸廣而徧及鄰里親朋亦往往倖効家中子兄

博洽淹雅倏隱杏園于

來

質疑領畧下以初庵汪先生本

草備要稱頌不置且謂此書固已超越古今但其主治註

釋議論驗案世就藥味條下詳晰不便考究記憶者爲分  
其病門則如虛實之分於虛實而又各歸其府更令耀目  
真心來 弟兄蒙屏諸將本草備要細微分析一載告  
竣庚午偶館金陵復賂醫方集解益知初庵先生博古窮  
今並岐而下所有名編無不入於目而富於胸可謂集醫  
家之大成堪垂不朽第其門部惟分補瀉表裏寒暑燥濕  
等類古方主治逐類隨之至一方之統治及加減而廣療  
諸症連類而及未嘗分疏病門亦猶備要之不能兼及若  
自序二

方圓之弗克齊畫縱橫之弗克並行理勢固然非缺陷也  
來 欲合二書而爲一集舌耕弗暇癸酉春堅謝學政鍵戶  
彙輯詳列病門精論羣以分之古方類以聚之本草主治  
註釋逐味分而附之提綱挈領不獨業醫者便於按圖稽  
考卽安居行旅咸可對卷療痊方之葉法師之鐵鑑洞見  
病因者其庶幾乎故顏之曰醫鑑月閱五而集成隱隱若  
有神助焉編錄方半之時宗弟其善見來 家居食貧功太  
嚴苦若深爲憫恤慰勞也者來 起而謝之曰吾人讀書懷

古德功言三者既不克立慚無以報君父而于濟世名編  
復不克尊信闡揚俾効之於天下縱持甘齒肥優游百歲  
曾與夢幻泡影枯木腐草奚異所以汲汲孜孜不憚貧苦  
者欲早以此書昭示當世使難者明而難者易良醫輩出  
疾苦呻吟者咸得轉危爲安羣躋壽域將見遡流窮源傳  
初庵先生之書於不朽頌初庵先生之功於不衰俾蠅得  
附驥尾於千載榮幸爲何如哉

昔

自序三

康熙丙子歲桂月發源理田呂期李之來題於安堂

翻刻誠語

子輿氏有曰。或勞心。或勞力。凡人必自竭心力而獲。始爲我有。方可久長。若竊人之有。以爲己有。不勞而獲。必有天殃。如坊間送訂名家。研精劬核。累月窮年。始得成集。功宏宇宙。裨益後人。卽有所得。亦適以償其勞已耳。何喪心無耻之徒。貪利翻刻。不恤攻苦。不顧舛訛。魚目混珠。多豕誤世。殘忍狠毒。甚於綠林。平素一見此刻。如刺入目。宋今是書。閉戶纂輯。殫精竭神。幾於謝世。赤手難刊。婆心莫慰。誠恐淹沒廢寢忘食。幸賴親友假資付梓。俾遂廣濟博施。

熱衷心力。亦可謂勞矣。境界亦可謂苦矣。倘有復蹈惡習。贗偽亂真。誓必遠覓根由。弁控。

當路。懲其辜。勞其板而後已。況是篇一字差訛。性命攸關。遺害不小。天譴人誅。勢必並致。勿萌妄念。俯慰苦衷。

詒安堂昌期氏勸誠



李氏醫鑑凡例

一 醫理極其淵微。非極高明弗輕著述。宋既庸陋。又不精醫。安敢妄與梨棗。畚錄訛菴先生本草備要。醫方集解二書。膾炙人口。因以支分縷晰。傳述表彰。易於考究。俾未見先生之原本者。由此而購閱之。以窺全豹。廣慰婆心。

一 本草備要。每味條後妙論。固已逐段歸幸於各門之前。而主治註釋。復一一採摘於方論之末。猶天孫集錦。萬派朝宗。雖由集聚。實費苦心。

李氏醫鑑

凡例

一

世人情惡繁瑣。故于藥味註解。難明者存之。顯易者節之。庶免望洋之阻。而有樂就之功。

一 醫書以論爲主。徒規規於方。不足貴也。坊本有詳於方。而畧於論者。間有論方得中。或博而不精。詳而不驗。卽精驗矣。而未及於藥性。卽具藥性。而未詳於主治註釋。茲則美備兼該。對症參詳。如數家珍。有得手應心之樂。而無疑慮徘徊之擾。

一 人身體以頭爲尊。先聖所以重元首也。是編故以頭冠諸部。漸及全體。體賴飲食滋養。土爲萬物之母。故由脾胃而

及飲食調養失宜則病叢生。因及感冒連類而及雜症諸疾男婦一治。惟經帶崩漏胎產不同。故別立門類。小兒首重驚癇。茲已詳載。餘症自有專科。因原本之畧而畧之。不敢尾續。此次列後之意也。由內及外。癰疽等毒。蛇蝎等。以食物諸傷。以及溺縊鬼擊卒死。一一詳救。不欲凶惡險。噓斃人於頃刻。亦聊以仰體天地好生之意也。

一雜症而外。四時感冒居多。真正傷寒甚少。痰厥食厥。中氣中濕。中食及類中風者多。真中風與中寒者少。因將發表和解攻裏祛寒諸類。合入傷寒與中風中寒。厥逆僵仆。口眼喎僻。角弓反張。

李氏醫鑑

凡例

二

反張。種種險狀。狀同症異。集為一帙。以便分別施治。其餘清暑利濕。潤燥瀉火等類。論方散入雜症。惟氣血特出其類者。蓋人身以氣血為主。而主治必以調和二者為先。故特立門部。方論并本草主治。廣彙註釋。與補養消導收瀉三論。未列病門。及用藥加減。彼此相濟。寒熱因用。病後調理等類。另集一卷。已裕六轡在手之勢。更摘本草經疏全部統治精論。彙成一卷。同附於後。俾情進斯業者。得其一二說。而又有一說之妙。猶六經之詳於解義。章旨開微。作文自中肯綮。門內可資印證。戶外可藉升堂。一覽知醫。不其

然乎

一傷寒變現危險等形。諸家與原本惟就其時日。方內因類而兼及之。茲于躁狂斑厥。以及種種令人驚恐諸態。主治方論。逐一分析門類。急遽之時。便於因門參治。而無棘手之虞。

一圈句法。批湯頭。稿本原自清楚。為刻家因忽幸忽畧。有無不一。惟在閱者會意。恕其小疵可耳。

一原本勿藥玄詮。却病養生之道。最為詳備。未登斯錄者。以刻費維艱。非敢遺珠。畧而不載也。

李氏醫鑑

凡例

三

一原本方論之中。并兼及於脈者。俱入于各門之內。間有未詳者。近世李士材先生診家正眼。誠為診視金針。故不復刊。

一是刻今數書而為一集。簿冊繁多。因慮刻費艱難。委曲用意。惟欲取巧成編。不謀廣幅博價。部本雖居中上。方論實備大全。既用克己之苦衷。亦仰 仁人之冰鑑。

李氏醫鑑		姓氏
顧日昭	煜	婺源
詹存古	法祖	婺源人 池州籍
王采三	泮	婺源
汪勿阮	誕保	婺源人 歙武籍
汪天玉	文璉	江寧
高太侯	聯	繁昌
汪卜周	鼎洛	婺源
施於民	有博	婺源
童永年	昌齡	德興
甘豹倫	韋	蕪湖
王汾仲	楫	黟縣
劉勉旃		蘇州
王右俊	廷英	婺源
程斯獻	琛	池州
汪蘭友	陞	婺源
汪景任	助	婺源
汪致遠	弼	江寧

李氏醫鑑		姓氏
兩尚	向書	
宗再	男峨	特俱池州籍
兄	中子	新一 文止 賁元
姪	廣尹	之諧 子任 之重
伊衡	元佐	天一 兆清
仙李	根大	蔚也 芳椿
仙杏	根深	瑞岡 芳奇
符石	祖兆	從郁 燦
王簡良	士循	婺源
程羽吉	世儀	婺源
汪淑黃	度	江寧
江芳遠	懋蘭	婺源
俞文微	士標	婺源
俞希韓	宗潮	婺源
游彤上	志霞	婺源
黃履德	成基	臨江
俞孔碩	俊寬	婺源
門人		





<p>李氏醫鑑</p> <p>卷之六</p> <p>吐酸吞酸</p> <p>咳嗽</p> <p>咳吐唾咯血</p>	<p>喉逆 噎嘔吐</p> <p>後傷寒末</p> <p>另詳</p>	<p>肺癰肺癰</p> <p>肺痿肺癰</p>	<p>卷之七</p> <p>種類多治法備</p> <p>瘡</p> <p>瘡傷寒時氣門更詳</p>	<p>李氏醫鑑</p> <p>目録</p> <p>小便</p> <p>泄瀉</p>	<p>大便</p> <p>腸風</p>	<p>驚悸怔忡健忘</p> <p>夢遺失精</p>	<p>經</p> <p>子</p>	<p>姙娠</p> <p>子</p>
---	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

<p>崩帶</p> <p>小兒</p>	<p>乳妳</p> <p>內外吹</p>	<p>卷之八</p> <p>外科</p>	<p>解毒咬傷</p> <p>救急良方</p>	<p>李氏醫鑑</p> <p>目録</p>	<p>補養丸</p> <p>理氣論</p>	<p>用藥加減約畧</p> <p>寒熱用正反主治論</p>	<p>治法提綱</p> <p>卷之十</p>	<p>治法提綱</p> <p>卷之十</p>
---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------



李氏醫鑑

卷之一

三

知母石寄生地之異者分各臘瀉火也用茯苓澤瀉者導  
濕也。用參耆補氣也。用歸芍養血也。海藏曰熱在至  
高之分當以輕劑抑之從緩治也。若急服之上熱未除中  
寒生矣。○眉稜骨痛眉骨者目系所過上抵于腦諸陽經  
挾外邪鬱成風熱毒上攻腦下注目睛而痛亦目系與肩  
後骨牽連而痛風寒上攻者亦然若脾家濕氣內鬱寒迫  
下焦痛留于項互引眉骨有痰者有抽掣者有重者有悶  
者各審明而治之。迷奇湯最效羌活防風各三錢酒一  
錢甘草三錢煎分三服風熱者祛風清上散酒一錢白  
芷一錢五吳茱萸防風柴胡各一錢川烏一錢二分荆芥  
八分甘草五分水煎服。○因痰者二陳加黃芩白芷因風  
寒者羌烏散羌活細辛川烏草烏各一錢俱用便浸。○宿  
生茶酒炒炙草各五分爲末戴履履分爲二症皆屬子肝  
一肝經傷頭痛并眉稜骨痛眼不可開晝靜夜劇宜導痰  
湯加川烏細辛一肝虛而痛方見光明即發宜生熟地黃  
九○陰經頭痛只用溫藥乾薑肉桂吳茱萸附子風濕熱  
痛上壅損目及偏正頭風年深不愈並宜清空膏頭旋眼  
黑者安神散羌活防風與升麻柴胡知母黃柏黃芩黃連

李氏醫鑑

卷之一

四

川芎茶調散

治諸風上攻正偏頭痛頭暈頭眩者風中于

木天麻湯腎厥頭痛玉真丸硫黃二兩石膏半夏硝石各  
一兩薑汁糊丸薑湯送下。○炎關元百壯寒甚者去石膏  
用鐘乳或黑錫丹隨蒙招尤日眩耳聾肝風虛動也。○  
散鈎藤陳皮半夏麥冬甘草茯苓石菖蒲人參甘菊防風傷  
食頭痛胸滿惡食吞酸噎膈香砂枳木山查麥芽神曲黃  
子或月紅九子三棱我本背皮陳皮乾薑胡椒光營  
紅爲衣傷酒頭痛乾葛知母解醒湯人參茯苓陳皮木香  
砂仁神曲豆蔻青皮乾葛知母解醒湯人參茯苓陳皮木香  
降氣散沉香木香青皮陳皮蘇子白芍細辛柴胡吳茱萸  
痛一味炒香附煎服偏頭痛總屬于痰左屬風者荆芥薄荷  
荷石屬血虛者川芎當歸右屬痰者石木半夏左屬熱者  
黃芩石膏○單搗細辛同指膽捕鼻草麻子五錢去殼大  
棗十五箇共搗爛塗紙上用筋一隻捲之去筋塞鼻中良  
久取下清涕即止。○生蘿蔔汁仰臥注鼻左痛注右右痛  
注左

腦作止無時也火升故痰  
盛痰熱上攻故頭暈頭眩

薄荷 錢 芎藭 荆芥 錢 羌活 白芷 甘草 錢 防風 錢

細辛 錢 每三錢食後茶調服一方加菊花 錢 僵蚕 錢 名

菊花茶調散治頭目風熱凡頭痛用羌活芎藭辛溫等藥

痛故用此助肝以升散之若服之由風木虛土寡于畏壅塞而成

而及甚者則宜用酸溫收而降之

白木附子湯 治風虛頭眩頭重苦極食不知味用此煖肌

補中益精氣

白木二 甘草一 附子一枚 每服五錢薑五片棗一枚  
煎 喻嘉言曰腎氣虛外風入之風扶腎中濁陰之氣厥  
逆上攻頭間重眩極苦難耐兼以脾虛不知食味此脾

腎兩虛風已入臟方中全不用風藥但用附子煖其水勝  
白木煖其土臟水土一爰則濁陰之氣盡趨于下而二症  
自止製方 本方加官桂川芎名芎木除濕湯 治寒濕  
之義利矣

頭痛眩運

羌活勝濕湯 治濕氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或一身

盡痛微熱皆俗 濕氣在表外傷于濕也濕之為邪著而不

留則為熱陰邪故但微熱而昏倦也東垣曰頭痛脊強

乃太陽之經氣不行也此湯主之切庵曰 此湯雖名勝濕實傷風頭痛通用之方

羌活 獨活 錢 川芎 藁本 防風 甘草 分 炙 五 蔓荊

子 分 三 如身重腰中沉沉然中有寒濕也加酒洗漢防已附

李氏醫鑑

卷之一

頭風濕熱

五

子

此足太陽藥也經曰風能勝濕如物之濕 羌活防藁芎蔓

皆風藥也濕氣在表六者辛溫升散又皆解表之藥使濕

從汗出則諸邪散矣 藥本專治太陽寒濕則防藁散太陽

能升厥陰清氣上治頭痛甘草助諸藥 風濕二活祛風勝濕兼通關節川芎

辛甘發散為陽氣味俱平發中有補也 半夏天麻白木湯 治脾胃內傷眼黑頭眩頭痛如裂身重

如山惡心煩悶四肢厥冷謂之足太陰痰厥頭痛 解見

半夏 麥芽 神曲 白木 錢 一 蒼朮 人參

黃耆 陳皮 茯苓 澤瀉 天麻 乾姜 黃

有二分 每服五錢

此足太陰藥也痰厥頭痛非半夏不能除 半夏燥痰

眼黑虛風內作非天麻不能定 天麻有風不 黃耆人參甘

溫可以瀉火亦可以補中 二木甘苦而溫可以除痰亦可

以益氣 健脾胃故益氣 茯苓澤瀉瀉熱導水陳皮調氣升陽

神曲消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊己運行 脾胃已土

乾姜辛熱以滌中寒黃柏苦寒酒洗以療少火在泉發躁

也

清空膏 治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及

李氏醫鑑

卷之一

頭風濕熱

九

腦苦痛不止 論解

黃芩 黃連 羌活 防風 柴胡 川芎 錢 五

甘草 為末每服三錢茶調如膏白湯送下如少陰頭

痛加細辛太陰頭痛脉緩有痰去羌活防風川芎甘草加

半夏如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡

一倍 散少陽 如自汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白

虎湯加白芷 太陰頭痛必有痰也少陰頭

此足太陽少陽藥也頭為六陽之會其象為天乃清空之

位也風寒濕熱干之則濁陰上壅而作貢矣羌防入太陽

柴胡入少陽皆辛輕上升祛風勝濕之藥川芎入厥陰爲通陰陽血氣之使甘草入太陰散寒而緩痛辛甘發散爲

陽也芩連苦寒以爲防之屬升之則能去濕熱于高巔之

上矣芩連用酒炒非獨制其寒欲其上升也丹溪曰東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂巔頂痛也

六味地黃丸 治頭暈目眩淫慾過度腎氣不能歸元此氣虛頭暈

補中益氣湯 加白芍細辛川芎蔓荊子名順氣和中湯治清陽不升頭

痛惡風脉弦微細

小柴胡湯 加青黛姜汁糊丸名清鎮丸治脉弦頭痛

李氏醫鑑 卷之一 頭諸方 十

小半夏湯 加茯苓治眩悸水停胸間上干于頭則眩凌于心則悸

三黃丸 治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡心膈煩躁

當歸龍薈丸 治頭運目眩

人參散 治頭痛目昏 逍遙散 治頭運

瓜蒂散 治頭額兩太陽痛今病人喻水一口以此散一字吹入鼻中出黃水即愈

防風通聖散 治頭目昏運

二陳湯 加白芍白芷治頭目昏運

宜養本酒 治頭目昏運

玉真丸 治腎厥頭痛

生硫黃二兩 生硝石 石膏 半夏各一兩 姜汁糊丸姜湯或米飲下每四十九

本草備要主治註釋

川芎 頭痛必用之藥加各引經藥大陽羌活陽明白芷少

經氣鬱滯亦致升麻 治頭痛寒熱陽明頭痛連辛夷治頭

頭痛頭風 升麻 治頭痛寒熱陽明頭痛連辛夷治頭

助通于清氣上生薑 治傷寒厚朴 治傷寒頭痛用荆芥治

寒頭痛羌活 治頭痛熱風少陰獨活細辛 治頭痛桂枝治

風頭痛無藥本 治正偏頭痛治寒鬱太陽頭痛連腦者必

汗能發 治產後傷風血虛頭痛又治黑芝麻 治頭痛或蒸或

白芷 治產後傷風血虛頭痛又治黑芝麻 治頭痛或蒸或

李氏醫鑑 卷之一 頭 八

殺羊角 治頭痛 澤蘭 殺精草 威靈仙 族覆花 虎

頭骨 殭蚕 地骨皮 治頭痛 釣鈞藤 治頭痛 貝母 治頭痛

藥治肝氣上 天麻 治頭痛 釣鈞藤 治頭痛 貝母 治頭痛

澤瀉 治頭痛 柴胡 治頭痛 甜瓜蒂 治頭痛 天南星 治頭痛

肝木用不能營助也 蝎 治頭痛 鉅 治頭痛 益母子 治頭痛

子 治頭痛 杏仁 治頭痛 防風 治頭痛 益母子 治頭痛

菖蒲 治頭痛 薄荷 治頭痛 蒼耳子 治頭痛 茵陳 治頭痛

治頭痛 雄黃 治頭痛 華髮 治頭痛 荊瀝 治頭痛 慈 治頭痛

仁 治頭痛 羌活 治頭痛 華髮 治頭痛 荊瀝 治頭痛 慈 治頭痛

附髮髮變白方藥

女貞實 地黃 何首烏 人參 麥冬 罕蓮草 南

燭子 牛膝 枸杞 山藥 沒石子 桑椹 黃柏

椒紅 蓮鬚 女貞實變白屢試屢驗陳藏器云拔去白髮用母丁香末姜汁調塗孔中重出即黑

覆盆子 能令鬚髮不白而兼能長髮 槐角 烏髮髮十月上已採漬牛胆中黑

石榴皮 浸水汁黑如墨烏髮 五倍子 能染白髮 扁栢汁 烏髮

熟地 青鹽 猪胆 沐髮去垢光澤 核桃 殼外青皮壓油烏髮

公英 擦牙烏髮 龜尿 染髮髮以鏡照之自見其形則淫發而尿出

附白禿

李氏醫鑑

卷之一

頭面

九

馬齒莧 煎成膏 山豆根 為末傅 白頭翁 治禿 百草霜 治禿

松樹葉 生毛

面 點好炮 酒刺

凡頭面諸疾皆由清陽不升濁陰逆上所致○東垣曰雷頭風症頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒涼重劑誅伐無過處清震湯治之

清震湯 治頭面疔瘡腫痛 并治雷頭風頭痛

荷葉 一錢 升麻 各五錢 蒼朮 各五錢 煎服立愈

四物湯 加酒炒黃芩治面赤腫

如聖湯 咽喉 加枝子大黃治面腫

雷頭風頭痛而成塊者是也或頭中如雷之鳴為風邪所客故也前清震湯主之 腫核宜刺出血亦有痰熱者熱生風也

雷頭風頭痛而成塊者是也或頭中如雷之鳴為風邪所客故也前清震湯主之 腫核宜刺出血亦有痰熱者熱生風也

方 半夏 皂角 姜汁製 大黃 酒浸透紙包熨再浸 白殭蚕

連翹 橘紅 桔梗 天麻 各五錢 片苓 七錢 薄荷葉 三錢 白芷

青礬石 各一錢 共為末蒸餅丸茶豆大臨臥茶吞二錢

喝僻而腫方 蟹治之 喝僻者厥陰風熱也 解二經之熱則

筋得養而氣自益 喝僻面腫俱除矣

口眼喎角僻喝 凡風中血脉則口角僻喝 三年雄雞冠

李氏醫鑑

卷之一

面

十

血塗頰上左塗右右塗左効 血鹹而走血透肌肉故治之

本草備要主治註釋

白附子 治面上百病能去頭面 白斂 治面上疔瘡 蔓荊子 治

而風 辛夷 治面點可作面脂消癰瘡 烏梅 燒灰存性研末 白果漿 治面

瘡 藥本 白芷 同作面脂能祛風又能治濕除 白及 除

上疔癰○癰 藥本和自芷 作面脂除 酒釀 查粉刺 鷄屎白 滅

痕 本驚子 除面點 殭蚕 滅痕 千金外臺洗面澡頭方盛用

豌豆麵 取其白膩去點 防風 荆芥 白芷 薄荷葉

連翹 川芎 牛蒡子 石膏 均治頭面腫 蘇子 枇杷葉



草治同

朱丹溪曰因食味之過鬱氣之積曰毒曰風曰熱此二端  
和變引換須分虛實實者易治虛者可慮夫初發于少陽  
一經不守禁戒延及陽明蓋胆經至主決斷有相火而且  
氣多血少楊登甫曰大抵皆頸痰所結莫不自限內用班  
蠶地胆爲主制度如法能使其根從小便出如粉片血塊  
爛肉此其驗也以木通滑石燈心等導之外用蓖麻子搗  
爛敷忌鐵器○又曰行積痰則結核自消瘰癧筋結病也  
屬少陽胆經忌補氣辛熱酸飲宜清熱散結和肝涼胆外  
有蝦蟆瘰癧在陽明結核按之癭或隱僻處勞瘵結核  
無核但腫瘰癧少陽經結核走痛癭僻處勞瘵結核連數箇  
耳邊或

三

治宜瀉火散結虛則補元氣實則瀉陽火補則十全散下

則玉燭化堅湯  
升麻錢  
乾葛五  
漏蘆足陽  
丹皮三錢

間留地黃生熟各三錢連翹一錢生黃耆一錢護白芍三錢桂枝三錢

柴胡入錢 黍粘消腫 羌活一錢 防風 獨活各錢半

昆布軟 廣木 人參 朴腹脹 連 陳皮 木香氣不順 大

黃  
秘  
加

大黃湯

大黃酒浸 皂角刺 甘草炙 煎服。仍以麝香加瓜蘂仁數

內釘孔中又用牯牛膝搗汁敷其上。一日一易。膿將盡

又用玄參地榆滑石寒水石大黃等爲末敷其瘡又用

白朮萊菔草用敷其瘡以大黃寒水石 骨木香棋郎末

收口 後又用竹茹亦能長肉白膏藥收後紅不退用此

蟻蟪窠數如已潰久不收口。須用香付燈燒鐵烙其腐肉。

處盡依前法治之

治耳接耳邊項上生塊核 五倍 白芷 爲末蜜調敷

假鼠糞以黃泥煨  
查樹葉汁敷

三

去癰癰毒  
皂角子  
兩  
大黑豆  
斤  
甘草  
兩  
冬青葉  
斤  
同煮汁

乾爲度常食不過二料

南省傳方

大黃錢三 麻黃錢三 當歸錢三 荊芥錢三 乳香錢三 土木

煎至一碗用無灰酒一碗水一碗晚膳後服

益暖出汗行三四次用飲湯止渣放水一碗煎半碗對酒

半碗服下發汗照前忌百日生冷花胡椒四日一劑四日

全愈

本草備要主治註釋

肝木作實

肝主風心主火。瞳子散大風火搖動之徵也。水不能制火。則清和之氣乖亂。而精液隨之走散矣。精液走則光華。故視物不清也。○綱目曰。心脉按目系。肝脉連目系。手少陽之脉終于目。外小背風熱從此道。上攻頭目。致偏頭痛。腫瞳子散大。視物昏花。而虛陰弱。故也。宜涼血養血。散火散火而除風熱。

熟地黃 兩 生地黃 一方兩半 柴胡 八錢 黃芩 酒炒 當歸 酒洗 五錢

天門冬 地骨皮 五味子 黃連 酒炒 甘草 炙 人參

枳殼 二錢 密丸 茶清下 日二服 忌食辛熱之物 助火寒涼

之物損胃使藥不上行

諸藥涼血瀉火養血滋腎升陽斂散益氣補中惟枳殼利

氣行滯 本草云枳實枳殼皆能

李氏醫鑑

卷之一

目驗

主

消風養血湯 治目赤腫痛 風熱傷血則赤風熱作實則腫

外向面者為外皆在內近鼻者為內皆上為外皆下為內皆目痛赤脈從上下者為太陽症宜溫之散之從下上者為陽明症宜寒之下之從外

走內者為少陽症宜和解之

荊芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁 去

皮 紅花 酒炒 川芎 五錢 當歸 酒洗 白芍 酒炒 草決明 石決明 甘

草 一錢

此足太陽厥陰藥也荊芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮

上升並能消風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養血去瘀兩決明皆除肝經風熱專治目疾瘀去血活則

腫消風散熱除則痛止又目為肝竅搜風養血皆以和肝

加甘草者亦緩肝而止痛也 保命集云目病在府則為表

養血安神暴發者為表

易療久病者在裏難治

洗肝散 治風毒上攻暴作赤腫目痛難開隱澀眵淚

凡目赤腫或大府秘結實有力者為有裏症宜微利之瀉青丸洗肝散之類是也 駝音賜眼脂

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 枝子 大黃 炙

甘草 等分為末每服二錢 無表症者除枝子大黃

補肝散 治肝虛目痛筋脉疼痛冷淚不止羞明怕日

李氏醫鑑

卷之一

主

及夜則痛甚點苦寒之藥反劇者 目白珠屬陽白珠痛者則晝甚黑珠屬陰黑珠

痛者則 夏枯草 五錢 香附 一兩 每服五錢 臘茶下 丹溪方夏枯

草香附各二兩加甘草五錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣有補養厥陰血脉之功夜痛及用苦寒藥反甚者夜與寒皆陰也夏枯草能治之者陽勝陰也香附行

氣散肝和中解鬱推陳致新故用以為佐

瀉青丸 治目赤腫痛 風熱發于目故腫痛有口赤羞

愈此痰飲為患 飲治而目自愈

二陳湯 加蒼木枳殼片子姜黃治痰攻眼腫

防風通聖散 治目赤睛痛

撥雲退翳丸 治風熱障翳 翳膜有氣血

挾濕陰虛火動七  
情六淫種種不同

當歸<sub>雨</sub> 川芎 地骨皮 白蒺藜 蜜蒙花 甘菊花

羌活 荆芥 木賊<sub>雨</sub> 花粉 蔓荊子 薄荷 枳實

甘草<sub>錢五</sub> 川椒<sub>七錢</sub> 黃連 蛇脫 蟬脫<sub>錢三</sub> 蜜丸每兩作

十九每服一九日三服者米泔下晴暗當歸湯下內障木  
香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荊薄荷以升陽散風當

歸川芎以和肝養血黃連地骨花粉清火熱枳實破滯氣

川椒溫下焦木賊二脫以退翳蜜蒙蒺藜甘菊目家專藥

李氏醫鑑卷之二 目

七

以潤肝補腎瀉火清金炙草補中以和諸藥也

加減駐景丸<sub>補肝</sub> 治肝腎氣虛兩目昏暗<sub>目為肝竅瞳子神光故肝腎虛暗也</sub>

枸杞子 五味子 車前子<sub>炒一兩</sub> 楮實 川椒<sub>炒一兩</sub> 熟地

黃 當歸<sub>雨</sub> 菟絲子<sub>八兩</sub> 蜜丸酒下本方除當歸五味楮

實川椒名駐景丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋腎菟絲楮實益精

強陰五味斂耗散而助金水<sub>滋腎水收斂人散大</sub> 當歸和氣血而益

肝脾川椒補火以退下焦虛寒車前利水而瀉肝腎邪熱

車前子清肝明目利小便而不走氣得此瀉邪則補藥更  
為得力張子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便能去  
肝經風熱

分志丸<sub>驚悸</sub> 治目不能遠視能近視<sub>王海藏曰能近視實其無火法</sub>

人參補心氣清蒲開心竅茯苓能交心氣于腎遠志能通  
腎氣于心砂砂色赤清肝鎮心心屬離火火旺則光能及  
也

地芝丸<sub>不能近視</sub> 治目能遠視不能近視

生地<sub>烱</sub> 天冬<sub>四兩</sub> 枳殼<sub>炒</sub> 菊花<sub>去皮</sub> 蜜丸茶清或酒下<sub>用茶者欲</sub>

火熱之下降用酒  
者欲藥力之上行

李氏醫鑑卷之二 目

人參益胃湯<sub>內障</sub> 治勞役飲食不節內障日病<sub>內障者睛裏之膜無異惟瞳人</sub>

之內有隱隱青白者  
黃耆 人參<sub>一兩</sub> 甘草<sub>炙八錢</sub> 白芍<sub>炒</sub> 黃柏<sub>酒炒四錢</sub> 蔓荊子<sub>二錢</sub>

每四錢日二服

此足太陽陽明藥也參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊

升清陽而通九竅白芍入厥陰而和榮血<sub>目得血而能視</sub> 黃柏除

濕熱而滋腎<sub>腎水足則目明</sub> 使精氣足而清陽升則藏府和而障

醫退矣<sub>要全善日治目不明氣虛而未脫可于參耆中微加連柏若氣已脫連柏等涼劑不可施矣</sub>

石膏羌活散<sub>目病一切</sub> 治久患雙目不明遠年近日內外氣障

風悍拳毛倒睫一切目疾

羌活 荆芥 白芷 藁本 細辛 川芎 蒼朮 甘

菊 蜜蒙花 萊子 木賊 黃芩 石膏 麻子 甘

草 等分爲末每服一二錢食後臨臥蜜水調下或茶清

米泔亦得

此足太陽陽明厥陰藥也厥文口羌活治腦熱頭風藥本  
治正偏頭痛白芷清頭目川芎療頭風荆芥治頭目中  
瘡毒藥治羞明怕日蒼朮明目煖水藏木賊退障翳麻子  
起拳毛細辛萊子起倒睫黃芩石膏洗心退熱甘菊降火  
除風甘草  
調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛 倒睫拳毛由日急皮縮之故也蓋  
伏熱內攻陰氣外行當去其內熱

李氏醫鑑

卷之一

九

併火邪使眼皮

黃連 甘草 人參 當歸 錢 葛根 防風 五 細辛 蔓

荆子 食後避風寒濕熱

本方除人參當歸黃連加黃芩名神効明日九 東 治前症

兼赤爛痒痛冷淚多眵

羊肝丸 治目疾內障 倪仲賢曰經曰心者五藏之專精

之精爲神水故肝木不平內扶心火爲勢妄行火炎不制  
神水受傷上爲內障此五藏病也諸脉皆屬于目相火者  
心包絡也主百脉上榮于目火盛則目赤赤者爲內障  
此虛陽病也勝於小腸二焦胆氣俱循于目其清氣亦上  
注爲目之精四府一衰則精氣盡散邪火乘之上爲內障  
此六府病也神水黑眼皆法于陰白眼赤脉皆法于陽陰

齊陽位故能爲視陰微不立陽盛即淫經曰壯火食氣壯  
火散氣上爲內障此弱陰病也四者皆爲陰弱不能配其  
也

夜明砂 淘 蟬脫 木賊 去 節 當歸 一兩 羊肝 四兩 煮以羊肝

去筋膜水煮搗爛和丸

此足厥陰藥也蚊食血之蟲夜明砂皆蚊眼也故能散目

中惡血而明日 蟬蟬食蚊而眼不 木賊輕揚而善磨木故

能平肝散熱而去障蟬性善蛻故能退翳當歸能入厥陰

養血而和肝用羊肝者羊性屬火取其氣血之屬能補氣

血引諸藥入肝以成功也

李氏醫鑑

卷之一

九

濟生羊肝丸黃連一兩羯羊肝一具去筋膜生用搗爛和

丸本方煮爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青盲

細目云但見目疾及障翳青盲皆治忌豬肉冷水○聖全

善曰滅哉河間之言曰目赤耳聾鼻不聞臭舌不知味手足

不能運用者皆由玄府閉塞而神氣出入升降之道路不

通利也故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥

入肝解肝中諸熱蓋肝主目肝熱則目之玄府通利而

明矣黃連之類解熱也木賊之類解濕也羌活之類  
解氣鬱也葛根之類解血鬱也木賊之類解積滯也羌活  
之類解經絡也磁石之類解頭目眩暈邪氣使下降也  
黃連下氣通中理亦同也葛根子蒸爲末酒調服或加入藥  
中○此丸此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法河間之信不  
誣矣至下東垣丹溪用參耆補氣血亦謂明者益目主氣  
血盛則玄府得利出入升降而明虛則玄府無以出入升  
降而昏此則必用參耆四物○經曰玄府  
等劑助氣血運行而明也○皆汗孔也

兔矢湯 治瘡疹入眼及昏暗障翳

兔矢 茶清調下或吞服須待瘡疹

此足厥陰陽明藥也兔者明月之精得金之氣其矢名明月砂能解毒殺蟲故能明目又可兼治瘡疹也

一百味草花膏 治目赤流淚或痛或痒豈不能視夜

惡燈光 血熱則目赤肝熱則多淚然微則痒熱甚則痛赤腫昏花皆不能視陽勝故夜惡火光

羯羊膽 蜂蜜 入蜜膽中蒸熟候乾細研為膏每含少

許或點目中又法臘月入蜜膽中紙籠套住懸屋簷下待

霜出埽取點眼

此足少陽厥陰藥也羊膽苦寒益膽瀉熱蜂蜜甘潤補中

李氏醫鑑

卷之一

目

三

緩肝曰二百味草花膏者以羊食百草蜜採百花也李時

肝開於目肝汁減則目暗目者肝之外候肝之精華也

故諸醫皆治目疾點服說云病有內外治各不同內疾既

發非服不除外疾既成非點不退內疾始盛流注不如塞

而後發不如去根不根不除而後去者本之有也若內障不

而外點反發其火動其血氣無益反損若外障已成雖服

藥不發不長而所結不除當內外夾攻方盡其妙

點眼方 治目中百病陽症者

黃連 人乳 浸點或煎點或加朴硝

此足厥陰藥也治目赤心主血肝藏血目受血而能視蓋

水入于經其血乃成又目之睛為乳汁下則為月水故知

乳汁即血也用以點目者皆下相宜者或謂陰目加黃連者清心肝之天也

百點膏 治翳遮瞳人如雲氣障隔

黃連 二錢以水一碗煎當歸 甘草 六分防風 八分羌活 八分

三同熬滴水不散去渣入蜜少許再煎少時要病人淨心

點之點至目微痛為度日五七點使藥力相續故曰百點

臨卧點尤妙

此足厥陰藥也黃連瀉火防風散風甘草和中當歸養血羌活仁清風散熱益水生光

四明膏 內障 生翳 內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食

失節

柴胡 麻黃 黃連 生地 五錢歸身 三錢甘草 訶子皮 濕

李氏醫鑑

卷之一

目

三

二錢以水二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同熬至滴

水不散去渣入蜜少許再煎點之

此足少陽厥陰藥也柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝

養血黃連清肝火甘草和中州瞳子散大故加訶子以收

之也

麻黃白水湯 治頂額如水目中溜火鼻不聞香

急濟仙方 治風熱赤眼

冬青子不拘多少搗汁重湯煎熬膏淨餅收固點効

普濟方 治一切眼疾

冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也

益氣聰明湯 治內障目昏五藏皆氣于脾胃以達于九

上并故目昏而耳鳴耳聾 竅煩勞傷中使冲和之氣不能也宜理脾胃養血安神

黃耆 人參 葛根 蔓荊子 白芍 黃柏二錢如有

月漸加夏倍之如脾 升麻 炙甘草 每四錢臨臥服五

更再服

此足太陽陽明少陰厥陰藥也十二經脉清陽之氣皆上 頭面而走空竅因飲食勞役脾胃受傷心火太盛則百 脉沸騰邪害空竅矣和補脾胃鼓舞氣上行頭目 中氣既足清陽上升則九竅通利耳聰而目明矣

明目地黃丸即滋陰 補腎丸 治腎虛目昏

熟地 二山藥 山萸 丹皮 歸尾 五味 柴胡各五

李氏醫鑑 卷之一 日 毒

茯神 澤瀉各二錢半 蜜九 硃砂為衣加柴胡者所以 升陽于上也

涼膈散見口 治目赤頭眩

龜鹿二仙膏 治目視不明

龍腦雞蘇丸見口 清心明目

滋腎丸腰膝 門 本方去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏

逍遙散 加丹皮枝子名八味逍遙散 治怒氣傷肝血少

目暗

當歸龍薈丸傷寒變 現門 治肝膽火盛目眩

目赤腫痛刺血方 屬血熱用三稜針刺破眼眦腫處將出

熱血立解遲則血貫瞳人口損矣

甘桔湯 加枝子大黃治目赤

明目流氣飲 治風熱眼目赤腫

枝子 黃芩 牛蒡子 白蒺藜 細辛 荊芥 蔓荊

子 蒼朮 防風 菊花 黑參 甘草 草決明 木

賊 川芎 大黃

有神夜光丸 治肝腎虛弱兩目昏暗不明

當歸 遠志 肉桂 牛膝 地骨皮 熟地 枸杞 枳

殼 兔絲子 煅礞石 菊花 等分為末煉蜜丸空心用

李氏醫鑑 卷之一 日 毒

淡湯下食後用酒下臨臥茶清下日三服

茯苓甘木湯肩背胸 協門 治心下有痰飲目眩痰飲阻其胸中 之陽水情不能

點翳膜

山川甲一錢 牙皂炒末一錢五分 細辛一錢 辰砂二錢 加麝少許

飛絲芒塵入目方

陳好墨 濃磨點之

本草備要主治註釋

龍膽草清赤熱勞肉滿肝火眼科多用之 決明子除風熱 然日疾初起宜發散忌用寒涼 治一切



主

इति

子 52—26

鼻

鼻為肺竅因心肺上病而滯寒流涕不利有寒有熱寒邪傷于皮毛氣不利而鼻塞宜先表散寒邪後補衛氣使心肺之氣交通○經曰天氣通于肺腸胃無痰火積熱則平常上升皆清氣也若內燥火焚風寒外束血氣壅滯則鼻生瘰肉而鼻塞不通也○氣清則鼻通氣熱則鼻塞濕熱盛甚蒸于肺門則生瘰肉而鼻塞不通也○經曰腦滲為涕又曰腦移熱于腦則辛額鼻淵額即山根原病式曰如以火燥金熱極則反化為水肝熱其則出泣心熱其則出汗肺熱其則出涎肺熱其則出涕腎熱其則出唾皆火熱盛極銷鑠以致之也○腦移熱于腦則多涕涕而風寒客于腦則塞○寒熱入腦故氣不宜通寒宜表熱宜清○腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利○鼻息乃肺氣盛熱壅清道則氣不宜通○血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅而衄○口鼻出血皆由上盛下虛有升無降血隨氣升法當

李氏醫鑑

卷之一

鼻

先順氣氣降則血歸經矣○陽熱拂鬱胃中越出于口鼻故吐血衄血○肺火盛則衄血吐行濁道衄行清道喉與咽二管不同經者循經之血走而不守隨氣而行火氣急迫故隨經直犯清道上腦而出于鼻為衄吐血之熱在府衄血之熱在經難病衄血為寒熱傷寒衄血為表熱注石山口鼻寒流涕感風寒治宜發散可使之安素有此病感寒便發此餅火邪治用羌活勝熱移腦辛額鼻淵通聖連薄驅散是專驅鼻道肉肺氣過盛瓜蒂吹之可使消淨面鼻赤紫多酒黃熱○辛額鼻痛也○經音

辛夷散

治鼻生瘰肉氣息不通不聞香臭

辛夷

白芷 升麻 藁本 防風 川芎 細辛 木

通 甘草

等分爲末每服三錢茶調下外用燒蒜爲末

加硃砂少許吹鼻中能消化

丹溪方

枯礬研如而脂綿裹塞鼻數日自消

蒼耳散

治鼻淵

白芷

薄荷 辛夷 蒼耳子 炒五錢 爲末食前茶葱湯

調下

凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白芷上行頭面通表表汗除濕散風辛夷通九竅散風熱能助胃中清陽上行頭腦蒼耳子疎風散濕上通腦頂外達皮膚薄荷泄肺疎肝清利頭目葱白升陽通氣茶清苦寒下行使清升濁降風熱散而腦液自固矣

羌活散

治鬱火邪鼻塞流涕感寒便發

羌活

枳殼 黃芩 蔓荊子 菊花 石膏 前胡

李氏醫鑑

卷之一

鼻

細辛

半夏 麻黃 茯苓 薄荷 川芎 防風

防風通聖散

治鼽鼻塞肉

黃連解毒湯

治三焦實火衄血

黃連

黃芩 黃柏 枝子 等分爲末

仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃連黃芩是瀉心包肝脾胃四經之伏火也或問心氣不足而吐血衄血何以不瀉心而反瀉胃心升溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩黃連黃柏瀉肝肺者陰之主肝者心之袂血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱即以苦補其心蓋一用而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐血衄意甚深遠濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

犀角地黄湯

詳論見  
變現門

治衄血初唐曰此衄  
血之的方也

六味地黃丸

治吐血由肝不攝血  
致血妄行

參蘇飲

感冒

合四物名茯苓補心湯 治吐血極効

四物湯

加黃芩酒  
炒

紅花 治酒鼓鼻并面赤紫

黃芩芍藥湯

治火升鼻衄

黃芩

酒炒白芍  
甘草二兩

煎服

龍腦雞蘇丸

見後  
口門

治衄血

蘇子降氣湯

吐血  
口門

加入參阿膠各一錢 治衄血

麻黃白朮湯

大便  
口門

治鼻不聞香臭

李氏醫鑑

卷之一 鼻

辛

酒鼓鼻并面赤紫方

乳香

硫黃 蘿蔔內  
煨輕粉 烏頭尖酥油敷

又方

鴨嘴 膽礬敷

婦人經脉逆行鼻衄方

經不下行上  
爲吐衄諸症

鬱金末

加韭汁薑汁童便服其血自清痰中帶血加竹

瀝

衄方

髮燒灰存性研細水服并吹灰入鼻止衄

又方

白芨末 新汲水調下一錢津調參山根上衄血

立止

賈仲 一味爲細末水調一錢治衄血有効

簡要濟衆治鼻衄不止服藥不應 用蒜一枚去皮細研如

泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左足心右鼻

血出貼右足心兩孔俱出皆貼之立瘥血止急以溫水洗

足足心此引火  
下行也○土泥作枕睡片時立止冬月用布袋托

一層

衄血不止 用紙數十層水浸濕安頭頂中心以火熨之紙

乾立止又用綿扎中指中節左孔出血扎左指右孔出血

扎右指兩孔出血則俱扎之 又方 青蒿搗汁服之并

李氏醫鑑

卷之一

辛

塞鼻中極驗 又方 百草霜搗水塗鼻則止墨亦可

本草備要主治註釋

細辛

治鼻  
翳

木通

治鼻  
翳

草薢

治鼻  
翳

蓖麻子

搗爛

塞鼻治

白礬

治鼻中  
翳

麝香

治鼻  
室

冰片

治鼻應龍

盧薈

吹鼻

府除

通草

治鼻  
塞

草决明

治鼻淵研

萱草根

治衄  
血

鬱金

荆芥

治鼻  
衄

白茅根

治肺火衄血甘和血寒

車前草

根葉搗汁飲

根葉搗汁飲

生地

丹皮

香附

白頭翁

韭汁

并墨

黑薑

滑石

代赭石

伏龍肝

槐花

竹茹

荷葉

大薊

並止  
衄血

卷一終

李氏醫鑑卷之二

口唇腮與後舌齒參看

脾司在口熱則甘甜治宜瀉火三黃無嫌謀慮不決脾熱口苦小柴胡湯龍膏丸與肺熱口辛宜甘桔湯腎熱口酸用滋陰方心熱口瘡是宜涼膈亦有陽虛理中獲效口臭之由熱熱于中脾氣不清引之上衝清胃化毒用之有功○脾熱則口甘生地白芍黃連瀉火神曲龍膏丸食積肝熱則口酸黃連龍膽瀉肝心熱則口苦柴胡龍膽瀉肝黃連瀉火肺熱則口辛黃連枝子瀉肺白芍瀉脾麥冬瀉心腎熱則口酸知母烏龍骨淡竹葉瀉胃熱則口淡茯苓白木半夏生薑燥脾勝濕口澀黃連瀉火葛根生津防風薄荷疎風木瓜茯苓行痰○丹溪曰脾有樹火溢入肺中濁氣上行發為口臭治以丁香是揚湯止沸耳惟香薷甚捷○口為脾竅火下則熱除○凡口瘡用涼藥不効者乃中氣不足虛火上炎宜用反治之法參朮甘草補土之虛于姜散火之標甚者加附子或喻官桂引火歸元○唇屬脾

李氏醫鑑

卷之二

一

大腸經燥則乾熱則裂風則癢寒則揭若腫裂如蚕繭名曰齒唇唇者肌肉之本也人中平滿者為反唇唇反者肉先死○風寒濕熱之氣上干○關音絕則日赤口瘡傷于陽明則腮腫○動也

龍腦雞蘇丸

治口臭口苦脾胃有熱則口臭肝胆有熱則口苦胆液溢則口苦

雞蘇葉

一名大葉薄荷一兩六錢生地六錢麥冬四錢蒲黃炒阿膠炒木通錢

柴胡二甘草

半錢黃耆人參一先將木通柴胡浸二日熬

汁地黃浸汁熬膏再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服二

十丸細嚼湯下一方有黃連

喻嘉言曰此丸兩解氣血兩分之熱宜常服之切庵曰此亦為熱而涉虛者設

涼膈散隔治心火上盛中焦燥實口瘡唇裂

連翹

四兩去心大黃酒浸芒硝甘草二枝子黑黃芩酒薄荷

為末每服三錢加竹葉生薑煎服上焦

導赤散

治小腸有火口糜舌瘡君火是五臟六腑之火之

于口舌為心苗若心火上炎黃連于口則口糜舌瘡

生地

木通甘草稍淡竹葉等分煎服

小腸為心火心為丁火心熱泄小腸釜底抽薪之義也易

老用導赤散合五苓散治口糜神効經曰膀胱移熱于小

腸腸腸不便上為口糜亦有理中湯加附子者因脾胃

虛衰之火被遏上炎故用參朮甘草補其上姜附散其寒

則火得所助散引退舍矣○綱目曰心氣熱則上竅宜導赤散腎氣虛則下竅宜地黃丸

錢乙瀉黃散

治唇口皸爛燥裂脾之華在唇動也

升麻皆陽明藥防風祛風而散脾火燥在唇口故從其性

而升發之也黃芩瀉中上之熱枳殼利中上之氣半夏能

燥能潤發表開鬱石斛清脾平胃退熱補虛

甘草和脾兼能瀉火亦火鬱發之義也

甘露飲治胃中濕熱口臭喉瘡齒齦宣露及吐衄齒

血胃之竅在口其脉上齒使鼻濕熱內盛故口臭口瘡陽

熱拂胃胃中越出于口鼻故吐血衄血齒齦少陰腎經

屬陽明胃二經有熱則齒齦宣露也

生地熟地天冬麥冬石斛茵陳黃芩枳殼枇杷葉甘草等分每服五錢一方加桂苓名桂

滋陰降火湯 治腎熱口膩

川芎 當歸 白芍 地黃 知母 黃柏 白木 甘

草 陳皮 麥冬 遠志 水煎服

清胃散 治脾氣不清 蘊熱口臭 或唇口煩腫痛

五福化毒丹 治唇舌腫破口臭生瘡煩渴

玄參 桔梗 各一 茯苓 二兩 人參 五錢 馬牙硝 枯 青黛 水飛

甘草 七錢 細末煉蜜九皂子大金薄為衣薄荷湯化下

一丸口臭生地黃汁化下

當歸龍薈丸 治謀慮不決 膽熱口苦

李氏醫鑑 卷之二

龍膽草 大枝子 黃連 黃芩 各一 盧薈 大黃 青

黛 各一 木香 二錢 麝香 五分 一方加柴胡青皮 各一 為末

神曲糊丸 每服二十九 姜湯下

龍腦瀉肝湯 治膽溢口苦

三黃丸 治口甘甜

人參敗毒散 治口瘡 腮腫 紫雪 傷寒 治口瘡

升陽益胃湯 治口苦 舌乾 陰火上升

黃芩加半夏生薑湯 治口苦

瀉黃湯 治脾胃伏火 口燥 唇乾 口瘡 口臭

小柴胡湯 治謀慮不決 膽熱口苦 丹溪方柴胡湯加麥

冬棗仁志肉地骨皮

如聖湯 治口舌諸瘡

本草備要主治註釋

花粉 治口燥 柴胡 治口 木通 治口燥 細辛 治口瘡 辛

瘡 薄荷 錫蘇 並治 香薷 煎湯含漱 菟絲子 治口苦燥

生內熱益陰 砂仁 散口 藿 蓬砂 治口 齒諸病與兒 百草霜

清熱故治之 羊乳 含漱治 茯苓 治口焦口為脾瘕 黃柏 治口瘡

諸瘡 之丁香 治口 乾柿餅霜 治口瘡 黃連 并 細辛 治口瘡 古方

李氏醫鑑 卷之二

陽相肥 五倍子 治口 乳香 治口 巴豆 治口 胡桐淚 口齒家

之妙 藥 為要

本草經疏口唇生瘡

麥冬 生地 甘草 白芍 烏梅 黃連 黃柏 黑

參 連翹 花粉 乾葛 石膏 龍膽草 大青 竹

葉

口糜同口瘡上藥

舌津液

并看雜症以及傷寒舌胎法

重舌木舌咽

舌為心苗，肝膽絡係心脈，係舌根，脾脈係舌旁，肝脈係舌下。因風寒所中，則舌捲縮而不言，七情所鬱，則舌腫滿而不得息。肝重則舌上湧，心熱則裂而痛，脾熱則滑胎是虛熱，心經熱則舌上生刺，如雲如雪，脾熱則舌強，舌強而伸縮者，厥陰絕也，死不治。足少陰腎脈，伏舌本，足太陰脾脈，循舌本，少陰心別脈，係舌本，三經虛則痰涎壅其脈道，舌不轉運而不能言，或三脈亡血，舌無血，營養而瘡，舌病者，中風不能轉運之類，而咽喉音聲如故，喉音者，勞嗽之類，而舌本則從轉運言語也。口中燥潤及舌胎淺深，須細詳察，舌為心苗，應南方火邪在表，則未生胎邪入裏，津液搏結，則生胎而滑，胎白者，丹田有熱，胸中有寒邪，在半表半裏也，熱入漸深，則燥而澀，熱聚于胃，則黃宜承氣及白虎湯，若熱病口乾舌黑，乃腎水刑于心，火炎益深，而病篤矣，然亦有胎黑屬寒者，舌無芒刺，口有津液也，又當用溫補之劑，尤宜細察細辨，凡有實熱者，舌胎必燥而焦，然假熱亦有黑舌，但不兼熱燥耳。假熱者，舌雖有

李氏醫鑑

卷之三

舌

五

白胎而必滑口，雖渴而不能飲水，縱飲不過一二口，甚者少頃亦吐出，面雖赤必嬌嫩，舌見熱硬黑形，用調胃承氣湯下之即愈。舌見純紅色者，熱蓄于內，也不問何經絡，宜用透頂清神散治之。三十六舌甚是詳悉，恐太繁冗，姑俟後刊。

黃連瀉心湯

治大人小兒心火妄動，結成重舌，木舌，紫舌。

脹腫堅硬，語言不利者，並宜服之。

黃連

山枝

荆芥

黃芩

連翹

木通

薄荷

勞子

各一錢，甘草五分，燈心二十根，食後服。

大人小兒重舌，乃心火妄動，結成以針刺患處，令出血，內服黃連瀉心湯，外以冰硼散搽之，又有紫舌，木舌，亦由心火而發，可用龍膽加冰片少許，勤搽，出涎自愈，又有痰氣結于舌上，成核作痛，腫強者，用線針點破出血，用水調散。

按之服黃連瀉心湯，外科正宗曰：針刺法治以上等腫，腫脹疼痛，使強難語，又兼舌根并兩齒合縫處，作腫，肉穿塞口，難開，俱用此法刺之，用粗線針扎在筋頭上，在患處點刺出血，紅紫毒輕，紫黑毒重，患重者數十點，皆可。血盡，惡湯洗之，甚者金鎖匙輕者水硼散搽患處，上流去熱，內服解毒清血散，清涼飲，二散俱見咽喉門。

金沸草散

治風寒傷心脾，令人寒熱，齒浮，舌腫。

荆芥

兩

前胡

旋覆花

麻黃

兩半

升麻柴胡湯

治心脾虛熱上攻，舌上生瘡，舌本強，兩頰腫痛。

痛

升麻

柴胡

白芍

枝子

木通

杏仁

大青黃

芩

石

膏

煨二

李氏醫鑑

卷之二

舌

六

黃連解毒湯

治脾開胎結，心熱舌瘡，肝壅出血。

黃連

黃芩

黃柏

枝子

各等分

每服一兩，水二鍾，煎至一鍾服。

一鍾服

導赤散

見前

治口糜舌腫

心火

涼膈散

治同上

天王補心丹

驚悸

治口舌生瘡

六味地黃丸

治舌燥咽痛

舌出血如泉方

五倍子

白膠香

牡蠣粉

白胎語澀方

薄荷汁

白蜜

薑片搗敷

案

一婦人，舌脹滿口，以蒲黃頓換，此曉乃愈。宋慶宗舌腫滿口，用蒲黃干姜末搽之，愈。蓋舌為心苗，心包相

火乃其因使得干  
是陰陽相濟也

本草備要主治註釋

舌脹不消 以醋酢和釜底墨厚敷舌之上下脫則更敷須臾則消 薄荷 洗含漱瘡

木通 治舌 蓖麻子 取油作紙煨爛 百草霜 治舌 羊乳 含漱

治舌 茯苓 治舌 冰片 治舌出 吳茱萸 為末醋調貼足心移夜舌瘡便愈能引熱

行 下 天南星 治舌 餘藥俱與口症參用

本草經疏舌破忌宜 忌補斂 升 熱 溫燥

舌破屬心火 宜 降火清熱○苦寒以折之○辛寒以散之○甘寒以緩之○酸寒以潤之

黃連 犀角 石膏 丹砂 丹皮 滑石 生甘草

李氏醫鑑

卷之二

舌

七

麥冬 竹葉 童便 便結燥加芒硝大黃

齒

齒雖屬腎為骨之餘而上頤屬足陽明下頤屬手陽明  
明風熱上攻則動搖腫痛散陽明之風熱則齒自堅矣若  
牙齦宜露者則為腎虛又當補腎○足陽明胃脈循鼻而  
入上齒中俠口環唇循頰車上耳前主上牙齦喜寒飲而  
惡熱手陽明太陽脈上頸貫頰入下齒俠口主下牙齦喜  
熱飲而惡寒足陽明別絡腦故腦痛陽明之脈營于面故  
面熱二經熱盛故唇口齒頰病而腫痛也齒為骨屬腎牙  
宣牙齦出血或齒縫出血也亦名齒衄乃腎病若血多而  
湧出不止為陽明熱盛以陽明多氣多血也○齒齦少陰  
腎齦屬陽明胃二經有熱則齒齦齒縫出血或為祖脫齒  
齦宜露也○大腸壅滯齒乃為之浮大腸虛乃為之宜齦  
甚則齒動齦脫作痛不已寒邪風邪客于頤則腦痛項筋  
急祖露疼痛齒缺少而色變痒痛○齒乃骨餘腎經  
所主下齦大腸上齦屬胃味厚蘊積濕熱上攻為腫為痛  
或血或蟲降火去風涼血驅風清胃去熱調胃下通合飲  
指擦種種不同○薛新甫曰濕熱盛而牙痛者承氣湯輕

李氏醫鑑

卷之二

齒

人

者清胃散大腸熱而齦腫痛者清中益氣湯思慮傷脾而  
痛者歸脾湯胃經虛熱而痛者六味丸腎經虛寒而痛者  
還少丹重則入味九其屬風熱者獨活散而  
爛散風寒入腦者羌活附子湯當臨時制宜

羌活散

麻黃 去根 羌活 一錢 防風 二錢 細辛 五分 升麻 五分 柴胡 五分

歸 蒼朮 五分 白芷 三錢 桂枝 三錢 黃連 三錢 羊骨灰 三錢 先以湯漱

口淨擦之

清胃散 見口 治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱

其牙喜寒惡熱或牙齦潰爛或牙宣出血

金沸草散 見舌 治牙痛 一婦人牙痛治療不効口頰皆腫以此湯大劑灌漱而愈



在口  
在口  
在口

甘露飲見口 治齒齦宜露牙縫出血

六味地黃丸 治虛火牙痛

牙疼方 土蔞炭 牛青鹽 三漿水二碗煎熱服

又方 川烏頭 艾 俱微炒 葱三根 真川椒 二十粒 濃煎

含少許于痛處少頃漱之出濃涎再含漱二三次即安

治風氣走注痛 藁本 剪草 細辛 煎熱含漱

治骨槽風 皂角 一個 杏仁 收在皂子 位燒存性 每兩入青鹽 一錢 搗擦

治風

治風神牙 神音仲 以北蜚一枚去核入巴豆一粒合成文

李氏醫鑑 卷之二 九

武火災如炭放地上良久研細以紙撚入神中十次 以上

方

本草備要主治註釋

牛昔莽草葉 煎湯熱含治牙 細辛 治齒齦音匿也 胡桐淚

治齒齦初庵口口齒 海桐皮 治牙虫而 松脂 治齒齦有

家多用之為要藥 即從丁香 治風 脂出 治牙 山奈 治牙 茵芋葉 治牙 甚

白芷 治陽明風 蓬砂 治齒 升麻 薄荷 蛇床子 華

菱 穀精草 白礬 殭蚕 五倍子 皆治 砂仁 散齒 草

菴 治腦寒 杜牛膝汁 漱止 山豆根 含之 喉汁治 白頭翁 治

痛骨 水片 治骨痛齒 石膏 治陽明經 蒲公英 擦牙烏髮髮

束短口苦寒入腎 槐實 固胡椒 治牙浮熱作痛 苦參 擦牙

腎經必用之藥 川芎 止血中 骨碎補 治牙痛炒黑為末 大戟 咬于痛處治

蔓荊子 散陽明風 羊脛骨 燒灰擦 牙良

本草經疏 齒浮真牙搖動及下齦軟或齒齦 屬腎虛

忌 溫熱 辛燥 補命門相火又忌當歸川芎

宜 益陰 涼血 固腎 諸藥畧同腎虛應以地黃黃

柏五味子為君桑甚牛膝沙苑菟絲鹿茸天冬為臣龍骨

牡蠣為使 又口真牙浮動及黑爛局 腎虛有火忌宜同腎虛

李氏醫鑑 卷之二 九

齒痛 宜清熱涼血 苦寒 辛寒 甘寒 鹹寒

麥冬 生地 赤芍 丹皮 竹葉 知母 黃連 黃

芩 黃柏 玄參 石膏 薄荷 甘草 童便

上下齦屬胃與大腸火宜 石膏 熟大黃 麥冬 黃芩

黃連 赤芍 生地 生甘草 青黛 細辛 西瓜

皮灰 薄荷 枇杷葉 蘇子 木通

耳附凍耳

耳為腎竅舌為心竅故心亦寄竅于耳十二經中除足太陽經外餘十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調陰陽不和或煩勞陰虛或衛氣不下循經脈或得于風邪或經藏積熱或大怒氣逆或濕飲痞膈或聚而不散流出膿血或風熱搏結成核塞耳皆令暴聾宜通耳調氣安腎之劑○外科正宗曰耳病乃三焦肝風妄動而成大人有虛火實火之分小兒有胎熱胎風之別虛火耳內蟬鳴或兼重聽出水作痒外無癰腫此屬虛火妄動之症也四物湯加丹皮石菖蒲及腎氣丸主之實火者耳根耳竅俱腫甚則寒熱交作疼痛無時宜柴胡清肝湯主之又有耳挺結于竅內氣脈不通疼痛不止以枝子酒湯湯為治外用黃線藥插入挺內繞旁化盡乃愈小兒胎熱或洗面水灌竅中亦致作痛生膿初起月間不必搽藥治耳不聽以細線收治之則安矣

腎熱湯 治腎熱耳流膿血不聞人聲

磁石 煅紅梓 牡蠣 鹽水煮 白朮 炒五 麥冬 白芍 四 甘草 兩

一 生地汁 葱白 升 大棗 枚 分三服

磁石體重辛 鹹色黑補腎祛熱通耳明目故以為君牡蠣

鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘寒補肺清金

肺為腎母又聲屬金肺虛則 白芍酸寒平肝和血 肝病

少氣不能報息而耳致聾 逆則耳

聾不聰又曰耳 皆能生水而制火退熱而斂陰木甘棗補

脾之品益土氣正所以制腎邪也皆固本之藥使精氣充

足邪熱自退耳竅自通加葱白者以引腎氣上通于耳也

聰耳蘆薈丸 治肝膽有火耳內蟬鳴漸至重聽不聞

聲息

蘆薈 大黃 酒蒸 青黛 柴胡 各五 龍膽草 酒 當歸 山

枝 青皮 黃芩 各一 木香 二 南星 三 麝香 五 神曲 糊

為丸菜豆大每服二十一丸日服三次漸加

柴胡清肝湯

川芎 川歸 白芍 生地 柴胡 黃芩 山枝 花

粉 防風 勞子 連翹 甘草節 各一

犀角飲子 治風熱壅聚耳出腥膿等症

李氏醫鑑 卷之二 耳

犀角 赤小豆 石菖蒲 木通 玄參 赤芍 甘菊

各一 甘草 錢五 每服四錢水一鍾姜五片煎溫服

蔓荊散 治風熱壅塞氣滯不通因熱聚膿耳出腥膿

蔓荊子 麥冬 桑白皮 甘草 升麻 木通 菊花

赤茯苓 前胡 赤芍

復聰湯 治耳鳴耳聾等症

半夏 陳皮 茯苓 甘草 木通 瞿麥 扁蓄 黃

柏

防風通聖散 涼膈散 並治風熱壅塞耳疾諸症

2-35

半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣初學曰  
仲夏亦脾胃藥能燥能潤以能行水故燥以味辛故潤也  
人率以為燥而疑之則誤矣

麥門冬七升 半夏一升 人參三兩 甘草二兩 大棗十二枚 粳米三合

地黃飲子三消 治咽乾面赤

黃芩湯煩躁 治心中煩躁不生津液

當歸龍薈丸傷寒變 治咽噤不利

活血潤燥生津湯 治內燥津液枯少火炎水乾故津液枯少

當歸 白芍 熟地一錢 天冬 麥冬 桔梗八分 桃仁研紅

花五分 用各有所專能  
分能合更互相濟

李氏醫鑑 卷之三 咽喉

利膈湯 治脾肺火熱虛煩上壅咽痛生瘡

薄荷 荆芥 防風 桔梗 甘草 牛蒡子炒 人參

等分為末每服二錢或加蠶蚕其氣清化能散相火逆結之痰

甘桔湯 治少陰咽痛喉癰亦治喉中介介如梗狀

甘草二兩 桔梗一兩 或等分王好古加法失音加訶子聲不出

加半夏酒毒加葛根

宋仁宗 加荆芥防風連翹名如

本方除桔梗名甘草湯治同本方加防風名甘桔防風湯

治同本方加連翹薄荷竹葉枝子黃芩亦名桔梗湯治上

焦雍熱喉痺熱腫

防風通聖散感冒 治咽噤不利

稀涎散 治喉痺不能進食

皂角末一兩 明礬五錢 每用一錢溫水調灌或加熬蘆少麝香

胡探喉令微吐稀涎再用藥治老年氣虛人禁用 本方加雄黃熬

蘆名如聖散為末搐鼻治纏喉急癰牙關緊閉

玉屑無憂散 治纏喉風痺咽喉腫痛嚥物有碍或風涎壅

滯及骨屑硬塞

玄參 黃連 荆芥 貫仲 山豆根 茯苓 甘草

李氏醫鑑 卷之三 咽喉

砂仁 滑石五錢 硼砂 寒水石三錢 為末每一錢先抄入口

徐以清水咽下砂仁硼砂並能清骨硬

雄黃解毒丸 治纏喉急痺風痺

雄黃一兩 醇金一錢 巴豆十四粒 醋糊為丸每服五分津嚥下

或用巴豆油煎紙捲火吹息帶烟刺入喉中出

紫血惡涎即愈此以熱攻熱熱則流通之義也

吳鶴皋曰纏喉急痺緩治則死雄黃能破結氣醇金能散

惡血巴豆能下稠涎丹溪生平不用厲劑此蓋不得已而

用者  
仲景苦酒湯 治少陰病咽塞生瘡痛不能言語聲不出者  
用半夏十四枚 雞子一枚 去黃內入半夏苦酒令滿置刀

環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不瘥更作此方有神効

普濟方咽塞生瘡乾嘔頭痛食不下法同上無半夏

普濟方乳蛾 治咽塞生瘡喉痺乳蛾

白丁香 以砂糖和作三九以一九綿裹含嚥即時遂愈甚者不過三九極有奇効

又方 燈草以鹹鹵浸透入雞子殼中封固煨存性研細加

梁上倒掛塵及青魚膽明礬銅青點咽喉生乳蛾有神効

清咽太平丸 治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉

李氏醫鑑 卷之二 咽喉 七

不利 諸火上逆故

本草備要主治註釋 末後多應驗方

芥草葉 煎湯熱含漱喉 牛膝 治喉 欬冬花 南星 貝母

薄荷 荆芥 半夏 皆治 玄參 本腎藥而治上焦火 細辛

白梅 貝母 葱白 喉痺 雞蘇 黃芩 並治 龍膽草 治咽

大青草 蛇床子 葵藿子 甜瓜蒂 皂莢 冰片

木通 治喉痺咽 燈草 燒灰吹喉 砂仁 散咽喉 牛蒡子 利

山豆根 治喉癰 射干 治喉痺咽痛為要藥古方 穀精草

治陽明風 馬勃 治喉痺 蓬砂 治喉痺含之噴汁初覺喉中

之 膽礬 醋調嚥吐痰 白礬 百草霜 喉痺 青魚膽 喉痺

喉痺 將死者以烏魚膽點入即愈 礬石 治喉痺咽喉

人商陸 治喉痺 喉卒腫食飲不通 黃柏 搗末苦酒 胡

制淚 治喉痺 柿乾與霜 治喉 五倍子 喉痺 紫苑 能開

延 〇 吞脫紙 燒存性蜜丸黃大 杏仁 治喉痺火炎乘

仁潤利而下行 冰片 治積聚喉痺 〇 咽喉不利 風熱 白藥

兩 黑牽牛 錢 同炒香去牽牛一半為末防風末 兩 和勻每

一錢水調服 〇 喉痺咽痛以醋探吐之 〇 咽喉腫痛百

藥煎 去黑 蓬砂甘草白礬 分 為細末每服一錢 食後米飲調

李氏醫鑑 卷之二 咽喉 七

細細緩緩叩嚥 〇 咽喉腫痛白藥末 一 龍腦香 二 分 生蜜

和丸大實大每含嚥一丸 〇 膽礬明礬等分 為細末點患

處喉蛾立愈神効果驗 厚也

附別本方

硫黃不二散 治毒發於咽喉肉腐爛疼痛湯水難入

硫黃一錢 花一錢 為細末凉水一大酒杯調服立効

開關散 治喉痺腫痛

蜂房灰 白蠟 蚕等分為末吹入喉內或用乳香煎服 五

又方 白蠟 蚕 白礬 半生半燒等分為末每以一錢用作

瀝加薑汁調灌得吐頑痰立効小兒加薄荷 一方用白  
梅和九綿裹含之

神奇極驗方

大路旁小便處或缸邊或石上溺黃刮起陰陽瓦焙乾用  
壁土喜喜巢五七將紋銀一塊喜巢包裹鉗夾在燈火上

燒少頃去銀存灰溺黃末錢一水片麝香各分一喜喜灰和勻

用磁餅藏固喉痺喉蛾等症立愈

諸骨哽及穀芒誤吞諸物

穀賊尸咽喉中此因誤吞穀芒戟刺癢痛用脂麻炒研白

李氏醫鑑

卷之二

咽喉

兼

湯調下一方白飴頻食効 諸骨哽威靈仙砂仁砂糖醋

煮服立効 蓬砂含化虎骨為末水骨哽喉中六七日不

得出取鯉魚鱗皮燒作屑以化服之即出未出再服 青

魚膽療骨螻蛄俗名治骨哽 貫仲化骨橄欖嚼汁嚥

覓核研末急流水調服如無急 千金方食髮成痕喉中如

流水用飴順嚥小頃服下亦効 砂仁化銅錢鐵磁石研末

有虫上下者白馬尿飲之佳 誤吞 針鐵誤吞銅鐵羊脰骨錢三為末米飲下羊頭骨積善堂方

言一女子誤吞一針入腹諸醫不能治一人教令煮蠶豆

同其煮食之針自大便出今人有誤吞金銀物者用之

本草備要止渴生津主治註釋

人參生津天冬治虛麥冬治虛乾葛生津木通化津

烏梅生津枝子治津桑葉生津枸杞生津棗仁生津花粉

瓜蔓生津 附外科正宗治法看法以及論方

瓜蔓生津

附外科正宗治法看法以及論方

夫喉痺雖屬於肺然所致有不同者自由虛火寒火之分  
緊喉慢喉之別又咽為心肝腎呼吸之門飲食聲音吐  
納之道此關係一身害人迅速故曰走馬看咽喉不待少  
頃也假如虛火者色淡微腫脈亦微細小便清白大便自  
利此因思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易致上  
炎此恙先從咽嚥乾燥飲食妨碍咳吐痰涎呼吸不利斑

李氏醫鑑

卷之二

咽喉

兼

生苦蘆壘若蝦皮有毛草常刺喉中又如硬物墜于咽  
下嘔吐酸水喉出甜涎甚則舌上白胎唇生蟬石聲音嘶  
啞喘急多痰以上等症皆出于虛火元氣不足中來治此  
不可誤投涼藥上痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母枳椇  
味勞子玄參牛後痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母枳椇  
玄參加服不効者必加姜附以為引導亦為佐治之法也  
定火者過飲酒醉後食膏粱疊疊重食飽食辛烈多致積  
熱于中久則火動痰生發為咽腫其者風痰上壅咽門閉  
塞少頃湯水不入聲不出此為咽閉緊喉風也用藥不  
及事先用針刺喉間發泄毒血隨用桐油錢雞翎探吐稠  
涎務使痰毒盡出盡則咽門得鬆湯藥可入諸聲得出乃止內  
服清熱利咽湯疎利餘毒如牙關緊閉難入必當尖刺少  
齒出血其閉自開如針刺探吐無痰聲如蟬鏡鼻掀痰喘  
真死候也又有喉癰喉痺乳蛾上腭癰等症喉門半塞半  
開其病雖內而屬標當用金鎖匙吐出血涎利咽湯推  
蕩積熱膿腫痛者開之損而痛者益之其患自安凡喉痺  
不刺血喉風不刺痰癰不放膿喉痺乳蛾不刺灸針烙此  
皆非法又有喉火勞瘦便閉痛者無法可治○少商穴有

手掌外側去爪甲角二分是穴稜針刺血

### 咽喉看法

初起紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之症相兼者輕已成腫痛咽喉半閉半開咯血痰涎飲食稍進者順咽喉腫閉牙關緊閉言語不清痰壅氣急聲小者險咽喉閉痰涎壅塞口噤不開探吐不出聲喘者死時發之後毒結咽間腫痛腐爛吐納不堪聲啞者重久嗽痰火虛陽上攻咳傷咽喉但見聲嘶面紅者死

### 治法

初起腫痛寒熱交作頭眩拘急者邪在表也宜發散初起腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而有力量者宜發表攻裏腫痛痰涎壅塞面紅口乾邪在上也宜探吐之痰涎壅塞氣急口噤先刺少商後行吐法已成脹痛咽喉塗塞湯水不入膿已成也宜急刺之腫痛微紅脈虛無力午後甚者屬陰虛宜滋陰

### 李氏醫鑑

卷之二

喉咽

主

除火腫痛色白略吐多涎上牛其者屬陽虛宜補中益氣

### 清咽利膈湯

治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛及乳蛾喉痺喉癰重舌木舌或胸膈不利煩躁飲冷大便秘結等症

連翹 黃芩 甘草 桔梗 荊芥 防風 山枝 薄荷

荷 金銀花 黃連 芩子 玄參

錢各一 大黃朴硝各二錢

玄參解毒湯 治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘腫不消

消

玄參 山枝 甘草 黃芩 桔梗 葛根 生地 荊

芥各一 加淡竹葉燈心各二十件

理中湯 治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐噤

妨碍及脾胃不健等症

治喉烏龍散

治咽喉腫痛喉風喉癰乳蛾等症並効惟纏

喉喉風牙關緊閉者不可與虛火久病咽痛者不可與

猪牙皂角 七條去皮弦 為粗末水一鍾煎五分入乳三匙冷服

即時非吐即瀉

金鎖匙

治喉痺纏喉風痰壅塞口噤不開湯水難入

焰硝

一兩 五錢 硼砂 五錢

片腦 一字

白礬 一錢

雄黃 二錢

各另研為末

和勻以筒吹患處痰涎即出如痛腫仍不消急針患處去

### 李氏醫鑑

卷之二

四美

主

惡血服煎藥

桐油錢

治喉風喉痺其症先兩日胸膈氣急呼吸短促

然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

先用溫湯半碗加入桐油三四匙攪勻用硬雞翎蘸油探

入喉中連探四五次其痰湧出再探再吐以人甦聲高為

度後服清咽利膈之劑

神効吹喉散 治纏喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等症

薄荷

殭蚕

青黛

朴硝

白礬

火硝

黃連

硼

砂各五

上藥各為細末臘月初一日取雄猪膽七八个

剉出膽汁小生和上藥拌勻復灌膽殼以線扎

頭贈外用青缸紙包裹將地掘一孔闊深一尺上用竹竿懸空橫釣上上用板鋪用土蓋蓋候至立春口取出掛風處陰乾去脂皮青紙磁罐密收每藥一兩加水片三分同研極細吹神効

冰硼散 治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

水片五分 玄明粉 硼砂各五 研極細吹搽患上甚者日五六次最効

治喉瘡喉痺等症經驗方

五倍子一個入明礬半滿入銀罐內濕紙蓋封其口緩火燒存性連倍子研極細加入兒茶硼砂青黛甘草各為細末入水片一分吹極効

經驗方 治喉口腫痛不能進水

李氏醫鑑 卷之二 咽喉

用鼓提草搗汁和乳灌入鼻中立愈

又方 射干 山豆根 甘草 銀花 蘇薄荷葉 共研

細末用土牛膝根搗汁和丸如彈子大泡水含漱去涎

又方 杜牛膝根汁 糯米九煎汁和入嚥下立愈

喉中瘡胞經驗方 用手指甲括屑吹入瘡胞立消

方侍郎咽喉腫痛方

百藥煎去黑皮 硼砂 甘草 生白礬 等分為細末每服

一錢食後米飲調細細呷嚥

聲音

肺屬金聲之所從出也有物質之則金不鳴燥濕除痰則金清而聲自開矣有久病聲嘶而啞者是肺氣已絕而損也難治○又有聲啞屬肺熱甚

清音喻化丸 治肺氣受傷聲音雌啞或久咳嗽傷聲致啞亦宜

訶子 真阿膠 天門冬鹽水炮炒 知母同上各五錢 麥門冬 白

茯苓 黃柏蜜炒 當歸 生地 熟地各一兩 人參三錢 烏梅

人乳 牛乳 梨汁各一碗共熬稠膏 共為細末和入前藥和煉

蜜搗成丸如鷄頭實大每用一丸仰臥喻化日用三丸如

李氏醫鑑 卷之二 聲音

改作小丸每服一錢訶子煎湯或蘿蔔湯送下

甘桔湯 加訶子治失音加半夏治聲不出

出聲音方 訶子炮去核 木通各一兩 甘遂五錢 咬咀用水三升煎

至升半入生地汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作

半料

六味地黃丸 治失音

訶子清音湯中風

本草備要主治註釋

薄荷治失音 木通治失音能清肺金 通草治失音淡通竅 馬勃治失音清



肺病 癰毒 蟬蛻 通治中 桔梗 半夏 發聲 荊芥 細辛  
 俱治 河子 開音肺 石菖蒲 出聲 荊瀝 竹瀝 並治中  
 失音 河子 則音開 音 荊瀝 竹瀝 風失音  
 本草經疏 暴瘖忌宜 瘖不語也  
 忌補 欬 升發 閉氣 辛燥 溫熱  
 宜降氣 發音聲 苦 甘寒 辛涼 鹹寒  
 蘇子 枇杷葉 貝母 桔梗 百部 竹瀝 梨汁  
 大冬 麥冬 甘草 薄荷 玄參 桑白皮 童便

儲氣

六腑氣儲血儲痰儲火儲濕儲食儲也六者之中以氣爲  
 主氣行則諸散矣吞酸嘔吐由于痰火飲食不消由氣不  
 運行丹溪曰氣升則食自降六腑不言風寒者風寒儲則  
 爲熱也儲者結聚而不得發越當升者不得升當降者不  
 得降當變化者不得變化則所以傳化失常而病見矣氣  
 者動則氣喘寸口沉滑熱儲者昏替便赤脉沉數血儲者  
 四肢無力能食食儲者噎酸腹飽不能食寸口緊盛經曰  
 木儲之令其條達也土儲之令其疏泄也金儲之令其  
 之乃吐之令其條達也發之乃汗之令其疏泄也奪之乃  
 下之令其無壅滯也泄之乃滲泄解表利小便也折之謂  
 制其衝逆也目門濟生羊肝丸後河間論解氣血諸儲  
 藥味甚詳宜參看 經曰儲爲燥淫燥乃陽明秋金之位  
 金屬于肺又儲病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五藏  
 六腑之主四藏一有不平則中氣不得其和而先儲矣越  
 鞠丸兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之

李氏醫鑑

卷之二

論

丙蒼木雄壯辛烈固胃強脾能徑入諸經疎泄陽明之濕  
 通行敏瀟香附寬中快氣之藥下氣最速一升一降故解  
 散而平川芎足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海爲  
 通陰陽血氣之使不但開中焦而已胃主行氣于三陽脾  
 主行氣于二陰脾胃既布木穀之氣得行則陰陽藏府不  
 受燥金之儲皆由胃氣而得通利矣 或問丹溪曰脉訣  
 云熱則生氣冷則生氣吾子引仲景之言而斥其非然則  
 諸氣諸飲嘔吐吞酸反胃諸病將無寒在耶曰五藏各有  
 火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口食  
 寒物非若諸大病自內傷所以氣病寒者無一二入身  
 以氣爲主氣盛則強虛則衰逆則病絕則死矣經曰怒則  
 氣上恐則氣下喜則氣和憂則氣閉驚則氣亂思則氣結  
 勞則氣耗此七情之氣也否附 音音茂月  
 爲君隨症而加升降消滯之藥 不明也

越鞠丸

統治六儲胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消

香附 醋炒 蒼朮 酒浸 川芎 神曲 枝子 黑等分 麴糊爲丸

如濕鬱加茯苓白芷火鬱加青礬炭鬱加南星半夏瓜蒌

海石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香枳榔食鬱加山楂砂

仁痰寒加萊菔莢又或春加防風夏加苦參冬加吳茱萸

所謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之也

解之謂也香附開氣鬱者木煨濕鬱川芎調血鬱枝

子解火鬱神曲消食鬱皆理氣藥也氣暢而鬱舒矣

七氣湯 治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急

或咳或嘔或攻衝作痛 七氣者寒熱喜怒憂思也七情

降故有痞滿喘咳衝痛 之病令人氣結痰聚陰陽不得升

等症也音惠怒恨也

半夏 姜汁炒 厚朴 姜汁炒 茯苓 四錢 紫蘇 二錢 加姜棗煎

李氏醫鑑 卷之二 胃 三

氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為

先氣行痰去則結鬱解而諸症自平矣

白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯治七情鬱結陰陽反戾

吐利交作

四七湯 治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或

膨脹喘急

人參 官桂 半夏 甘草 五分 加薑蔥心腹痛加延胡索

延胡索能行血中

氣滯氣中血滯

李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠九主之而

此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖

膨而不用木香枳殼用人參以壯主之藏官桂以制謀慮

四七者以四味治七情也經云寒則氣收

宜辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱氣也

妙香散 治鬱結 則成鬱結

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急 此方降中兼

升高中帶補

人參 烏藥 沉香 枳殼 各磨濃汁七分合煎

健脾丸 治脾氣鬱滯飲食不消

名 舒鬱健脾丸 治脾氣鬱滯飲食不消

木香枳殼郎九 散鬱破結

保和丸合越鞠丸 扶脾開鬱

蘇子降氣湯 散鬱和中

李氏醫鑑 卷之二 胃 三

正氣天香散 治一切諸氣氣上湊心胸攻築脇

肋刺痛

本草備要主治註釋

葛黃 理血中之氣下氣破血 川芎 助清陽開諸鬱氣升則

使 澤蘭 辛散鬱 蘭花葉 解鬱 艾葉 溫中 鬱金 散肝 乾葛 散

升麻 升氣 蘇子 溫中 青黛 散五藏 益智仁 能開鬱鬱結

草寇 開香附 解六 木香 能升降諸氣治 甘松 開諸鬱子道

貝母 辛散肺鬱心火降則肺 夏枯草 散結氣有 益母子 順

卷蘭子 行血散結 散中有補 三義 散一切  
 開白薇 散結 葱 通上下陰 氣結  
 志肉 並散 沉香 檀香 並治 醋 厚朴 訶子 同陳皮 則下  
 威靈仙 行氣 連翹 散氣 半夏  
 琥珀 散結 氣

肩背胸膈 兼腹與少腹

經云西風生牛秋病在肺膈在肩背又云肺病者喘咳逆  
 氣肩背痛汗出又云肺氣有餘則肩背痛風寒汗出虛則  
 肩背痛而寒少氣不足以息又云少陰同入然淫所勝病  
 肩背痛此論又云邪在腎則肩背痛是腎氣逆上也○肩  
 背痛不可回視此小腸氣鬱以風寒散之○當肩背一片  
 冷痛是有積也當消之○膀胱腎間冷氣攻衝背脊亦致  
 作痛○凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中滿者或燥糞或  
 宿食青陽出上竅故上滿者乃氣也而非物濁陰出下竅  
 故下滿者是物也而非氣但是熱積惟冷結膀胱少腹滿  
 一症為寒有手足厥冷為可辨○痰滿亦有在上焦者○  
 胸膈逆滿由中氣不足作脹者宜補之而脹自除經所謂  
 勞因塞用也俗醫泥于作飽不敢用參不知少用反滋壅  
 多服則宜通補之正所以導之也○訶庵曰脹滿症多不  
 同清補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導  
 痰滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱  
 者行氣蓄血者行血不宜專用行散藥然亦有服參者而

李氏

卷之二

肩背胸膈

辛

反甚者以挾火挾食不能藥作脾虛氣弱治也○膈者肝  
 膽二經往來之道其火上冲則胃脘痛橫行則兩脇痛官  
 桂枝枝能橫行兩脇以開之而痛方止大抵痰入肝則脇  
 病痛青皮同枳殼肉桂川芎治左脇痛○戴氏曰房勞之  
 人胸膈多有隱痛此腎虛不能納氣氣虛不能生血之故  
 氣與血循水也盛則流通暢達弱則鮮有不阻滯壅塞者  
 所以作痛宜破固紙之類補腎歸之類補血若尋常  
 脇痛治則殆矣○李士材曰肝合于左脇故膈多屬于肝  
 然經筋所過挾邪而痛者自有多端不可執也且左右者  
 陰陽之道路也故肝主陰血而屬于左脇肺主陽氣而屬  
 于右脇左脇多怒傷或留血作痛右脇多痰積或氣鬱作  
 痛其間七情六淫之思飲食勞動之傷皆足以致之氣  
 聚血聚雖無關于血也○肩背風熱乘肺而痛者宜荊  
 芥防風牛蒡枳殼桔梗花柳黃芩○如短氣小便自遺乾  
 補中益氣湯扶濕熱者當歸枯痛湯用羌活防風升麻乾  
 葛人參白朮當歸甘草澤瀉肉桂知母黃芩茵陳苦參蒼  
 朮○痰飲者導痰湯腎氣逆上者沉香肉桂茯苓牛膝小

荷香川椒青鹽 傷寒少陽陽明合用小柴胡湯不大便者加枳殼若不因傷寒而胸膈痞滿熱結便秘細辛川芎防風乾葛甘草益母草為胸膈的劑所以諸方皆用之胸膈而氣喘分氣紫蘇飲紫蘇桑皮五味桔梗草果腹皮茯苓陳皮甘草生薑食鹽煎服 怒傷肝氣柴胡疎肝散 柴胡陳皮川芎香附白芍枳殼甘草煎服 悲傷肝氣宜推氣散 薑黃枳殼桂心甘草為末薑黃湯送下○死血痛者日輕夜重或午後熱脈短澀桃仁承氣湯加白芥子紫甲青皮如跌傷胸膈亦宜上方 痰飲脈沉弦滑導痰湯加白芥子甚者控涎湯下之 食積胸膈痛必有一條扛起香砂枳殼白木神曲厚朴山查麥芽 結痰癖而痛者黃九 雄黃一兩巴豆五錢去皮心研如泥入白麵二兩水九梧桐子大滾漿煮十二丸入冷漿湯沉冷即用冷漿下一丸一日十二時盡十二丸微利為度不必盡劑○李士材驗案 一人受暑胸膈痞滿黃發泡清肝破氣之劑俱不效用大瓜蒌一個搗爛加粉草紅花少許藥入而痛隨○音應腋下一脇右日壯

李氏醫鑑

卷之二

胃脘痛

三

瓜蒌薤白白酒湯

治胸痺喘息咳嗽胸背痛短氣胸中者

分按喘是而咳嗽諸陽受氣于胸中轉行于背氣痺不行故胸背為痛而短氣

瓜蒌 薤白 三白酒

此上焦膈中藥也 膈中兩乳中膈

使之官喜樂出焉○喻嘉言曰胸中陽氣如離照當空曠然無外設地氣一上則室塞有加故知胸痺者陰氣上逆

之候也仲景微則薤白白酒以益其陽甚則用附子干姜以清其陰世醫不知胸痺為何病習用草蔻木香訶子三

其胸中之陽亦相懸矣○本方加半夏名瓜蒌薤白半夏湯治胸痺不得臥心痛徹背不得臥故

加半夏 本方除白酒加枳

實厚朴桂枝名枳實薤白桂枝湯 治胸痺氣結在胸膈

滿脇下逆搶心

水香順氣湯

治陰陽壅滯氣不宜通胸膈痞悶腹脹

六便不利 胸膈痞悶者脾胃受傷中氣不運不能升降濁便不利者陽不

升陰不降也

水香 草薢 益智仁 蒼朮 厚朴 青皮 陳皮

半夏 茯苓 澤瀉 升麻 柴胡 當歸 五公此皆氣

故重川芎歸以濡其血 共成溫脾消脹之功也

肥氣丸 治肝積在左脇下有頭足令人發咳痰瘕

不已

息賁丸

治肺積在右脇下令人洒淅寒熱喘咳

李氏醫鑑

卷之二

肺癰

肺癰 連減半

大黃附子湯

治脇下偏痛發熱脈弦緊此寒也以溫藥下

溫藥下其寒後 人罕識其指

大黃 細辛 附子 各二兩 附子一枚

左金丸 又名朱 治肝火燥盛左脇作痛

黃連 吳茱萸 水丸

肝火燥盛者肝之子是也肝火之子是也肝火之子是也

肝火燥盛者肝之子是也肝火之子是也肝火之子是也

肝火燥盛者肝之子是也肝火之子是也肝火之子是也

治同本方用黃連一味吳茱萸浸一宿為丸名抑青丸大

瀉肝火治左脇痛

順氣導痰湯 治痰結胸滿喘咳上氣

橘紅 茯苓 半夏 枳實 木香

香附 二陳加胆星枳實各導痰湯治頑痰膠固

溫中化痰湯 二陳除甘草加干姜姜汁糊丸 治胸膈寒

痰不快 龍膽瀉肝湯 治脇痛 脇者肝胆之部

七氣湯 治胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛

正氣天香散 治一切諸氣氣上凌心心胸攻築脇肋刺

李氏醫鑑 卷之二 胃脘痛

逍遙散 治胸脇痛 越鞠丸 治胸膈痞悶

當歸龍薈丸 治兩脇痛引少腹

桂苓甘木湯 治心下有痰飲胸脇支滿 痰飲積于厥陰心

茯苓 桂枝 白朮 甘草

干姜湯 治寒症胸腹脹滿 白朮 合入干姜良姜 煮食

茱萸湯 治腹脇冷寒脹滿 吳茱萸 和米粥食之

川椒茶 治同前 細茶 川椒 同煎

丁香熟水 治同前 用丁香 搥碎入壺傾上滾水其

香儼然大能快脾利氣定痛碎寒

本草備要主治註釋

白朮 蒼朮 蘇梗 麥芽 甘草得茯苓則不滋滿而

下氣 桔梗 治胸膈刺痛白全 治胸膈半夏 下逆氣 川芎 治

胸膈 白芍 治胸膈 黃芩 治胸膈 枳實 治胸膈 厚朴 治

胸膈 牛蒡子 治胸膈 薤白 治胸膈 桂心 治胸膈 地骨皮 治胸膈 枳

殼實 治胸膈 無積血心下不痞滿濁氣在上則 厚朴與

枳實大黃同用 實則清與橘皮蒼朮 同用則 枳實 大腹皮

丁香 均治 烏藥 能疏胸腹 吳茱萸 亦治胸膈 東垣曰濁陰

不可 花柳 葛子 能除 陳皮 利胸膈 青皮 治左脇 薑皮 治

李氏醫鑑 卷之二 胃脘痛

滿 百合 治心下 薤白 治胸膈 柴胡 治胸膈 薑子 治胸膈 鱉甲 治

胸膈 桂枝 治胸膈 風屬肝桂 青皮同枳殼肉桂川

芎 治胸膈 梔子 治心膈 牡蠣 治胸膈 引之

李士材曰：經脈者，天之氣也。行於三焦。

李氏醫譜

卷之二

心腹

111111

君上中瀉水也。平胃散治腹痛自利者。取蒼朮爲君。瀉土

合二陳加藿香名除濕湯治身濕復痛尤重者服之更手

爲本方一兩加桑白皮一兩名對金炊子治脾胃虛弱

脹身重飲食不進肢痠情腫本方除舊米叩水香薷藿三

姜茯苓名厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及火不客

寒犯胃時作疼痛。散以辛熱佐以苦甘滲以

本氏醫書

卷二

心腹

1111

四七湯 治虛冷上氣心腹絞痛或膨脹喘急

人參 官桂 半夏錢一 甘草五 姜煎心腹痛加延胡索

能行血中氣  
滯氣中血滯

連附六一湯 治胃脘痛寒因熱用也

黃連附子湯 治心熱 單黃連煎服

治傷濕熱之物不得施化痞悶不安腹

腹痛積滯泄瀉

香檳郎丸痢門 治胸腹積滯痞滿結痛一便不通

五積散 表裏門  
治胸滿惡食嘔吐腹痛

脉黃白木湯大便 治膽有動氣少腹急痛

木香順氣湯方論見 治腹脇脹滿

逍遙散 治心腹膨脹

香蘇飲 加延胡索酒一 治心中卒痛

腎着丸腰腎 治傷濕身重腹痛病在下焦

小建中湯虛損 治腹中急痛并裏急腹痛

五苓散 加非汁和丸空心茴香湯下 治腎氣上攻心痛

蠲痛散 治心腹上下及胃脘并婦人血氣痛至効

荔枝核五錢 香附醋炒 爲末每服二錢鹽湯或米飲下

李氏醫鑑 卷之二 三

古方 治心腹痛

白芍錢四 甘草錢二 又用等分名芍藥甘草湯治同初起口腹

不從逆于肉裏白芍能行營氣甘草能飲逆

氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也

本草備要主治註釋

蕪荑 治心腹冷積癥痛和麝炒 桔梗 治腹痛腸鳴由

治陰毒 紫草 治心腹邪氣 蒲黃 祛心腹熱 同五靈脂 治心

氣一切 諸金 莢木 丹參 腹皆治心 藜本 治心腹中急痛

爲黃連 得黃芩厚朴 治腹 草薢 治客寒 木香 治九種

良姜 治胃脘 罌粟殼茯苓 治心腹 桂心 治腹內冷痛九種

訶子 治腹脹 威靈仙 治心腹 山查 治腹 甘松 治心腹卒

麥 治腹痛腸鳴 鵝虱 治蛇蟻心腹痛 山豆根 治腹 藟子 止

痛 白芥子 治痛氣行 薑 治寒 斤 治心下 地漿 治腹內熱

入腹 夜明砂 治血氣 香附 治一切 海螵蛸 治環 蜜 治心

以去急 厚朴 治冷 訶子得陳皮砂仁 治冷氣 丁香 治冷

乳香 治心 麝仁 治心腹 沉香 治心 吳茱萸 治陰毒 花椒 治

腹中痛又治 胡椒 治陰毒 核桃 治心腹 荔枝核 散毒氣巴

戟天 治小腹痛 胡荽 通小 茴香 治腹 生地 止心腹 赤芍

艾葉 川芎 當歸 腹皆止心 仙茅 溫胃治心腹冷 牛膝 治

李氏醫鑑 卷之二 心腹

腹痛 莖 除胃中熱瘀血 罌粟殼 治心 白芷 治腹內冷痛九種

此州之

李氏醫鑑卷之三

身痛 四肢肩背并諸痛麻木

論載前門

時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心則迷成癰癩入肺則寒痰為喘咳背脊入肝則筋痛乾咳寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癢癢癰腫無不三因方並以控涎丹主之殊有奇効風則生先受之濕則下先受之殆至兩相搏激注經絡流關節入肌骨無處不到則無處不病風勝則筋不固故汗出而惡風濕勝則水瀦不行故小便不利而微腫濕之為害甚而不終差于太陽則頭項腰脊痛着于太陰則肩背痛着于陰陽之經則一身盡痛惟着故痛而且重也羌活勝濕湯主之○羌活勝濕湯治風濕痺痛兩手罷軟腰膝痠痛則非其治宜導痰湯加木香姜黃各五分輕者茯苓為重者控涎丹外有血虛不能營筋而致臂痛宜獨活四物湯各半貼和服通身熱熱疼痛拘急足冷皆伏熱濕血血屬于心宜木通以通心氣則經絡流行也十疳散

李氏醫鑑

卷之三

身痛

一

十疳散

木氣血不足或有濕痰死血在胃中也○胸膈痛者氣鬱周身痛或關節痛遇陰寒即發者濕鬱也能食而四肢無力者血鬱也

甘附子湯

治風濕相搏一身煩痛汗出惡風小便不利

或身微腫

白朮

附子一枚

每服五錢姜五片棗一枚

茯苓丸

治痰停中脘兩臂疼痛

飲伏于內痰帶中脘脾主四肢脾濕而氣

不下故上行攻停

其脈沉細者是也

半夏曲

茯苓

枳壳

五錢

風化硝

二錢半

如一時未

竹葉中

小特盛

水置當風處即乾如苦硝制

取亦可

○論嘉言曰痰藥雖多此方甚効

控涎丹一名妙應

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛走身不定或手足冷痺氣脈不通此乃痰涎在胸膈上

下誤認癰瘰非也

甘遂心大戟皮白芥子

等分為末糊丸臨臥姜湯下五

七丸至十九丸痰猛加九粒此乃治痰之本也痰之本水也能泄藏府水濕甘遂能行經隧水濕直達水氣所結之處以攻決為用白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也

滋燥養榮湯

治火燥肺金血虛外燥皮膚皺揭筋急

瓜枯或大便風秘

肺主皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而金燥故外見皮毛枯槁肌膚燥癢內

李氏醫鑑

卷之三

身痛

二

有筋急便秘之症

當歸酒洗

二錢

生地

熟地

白芍

炒黃芩

秦艽

一錢

防風

五分

甘草

五分

加味二陳湯

治酒家手臂重痛麻木

陳皮

半夏

蒼朮

枳壳

片子

姜黃

羌活勝濕湯

治濕氣在表頭痛頭重腰痛背痛或

一身盡痛微熱昏倦

當歸拈痛湯

治濕熱相搏肢節煩痛肩背沉重或

身疼痛

當歸拈痛湯

治濕熱相搏肢節煩痛肩背沉重或

身疼痛

身疼痛



麻黃加木湯 治濕家身體煩痛宜發

麻黃 杏仁 甘遂 石膏 加白木

六君子湯 加麥冬 竹瀝 治四肢不舉脾主四肢加柴胡 芍藥

芍藥

十味人參散 治身體倦怠

五苓散 治身痛身重濕勝所致 合人參敗毒散各五積交加

散 治寒濕身體重痛

桂枝湯除甘草加黃耆三兩 治血痺身體不仁如風痺狀

六君子湯 加竹瀝 薑汁 治半身不遂在右者屬氣虛

李氏醫鑑 卷之三 身痛

升陽益胃湯脾胃 治體腫節痛濕盛而陰邪勝也

腎着湯腰腎 治傷濕身腫腹痛腰冷病在下焦

松節散 治一切筋變疼痛

扶神心木名黃松 第一兩 乳香一錢石 每服二錢木瓜酒下乳香能舒筋

筋木瓜

麻黃白木湯大便 治身體面俱腫色黃麻木身重如山喘促

無力吐痰腫沫發熱時躁躁二振寒

十棗湯攻裏 加減名三花神佑九翻胃 治壯實人風痰癰

熱肢體麻痺走注疼痛濕熱腫滿氣血壅滯不得宜通服

二九後轉加痛悶此痰涎壅塞 再加二九快利則止加事  
黃大瀉氣血之濕加輕粉無礙  
不入以去痰積虛人不可輕用

本草備要主治註釋

丹參 治身痛 南星 治身痛 菴蘭子 治腰膝骨痛 天麻 通血脈

血不通身拘攣此 茵芋 上羌活 利關節 百節之痛若 防風 治

痛項強周 荊芥 治身痛 通血脈 細辛 治身痛 蒼耳子 治身痛

下行足膝外逆皮膚癢痛 薤白 治身痛 薤白 治身痛 薤白 治身痛

通身癢癢作浴湯佳善發汗 薤白 治身痛 薤白 治身痛 薤白 治身痛

片子者能克入手 防已 能行十二經通勝理利九竅治水 附子 治身痛

木瓜 舒利乳香 能伸 白鮮皮 通關節治痰入 附子 治身痛

解 筋風濕 蛇床子 治腰痠體痛祛風燥 土茯苓 治身痛

氣阻滯筋 慈石 治腰痠體痛祛風燥 土茯苓 治身痛

虎骨 治風濕骨痛定痛頭風用頭骨手足風 原蠶砂 治身痛

節不隨皮膚頑痺腰脚冷痛各從其類也 扁柏葉 治身痛

炒熱烈患處亦良用治風炒黃浸酒 扁柏葉 治身痛

痛書靜夜劇名白虎 牛蒡子 利腰膝凝滯之氣散 香附 治身痛

十二經八脈氣分生則上行胸膈外 仙茅 治身痛

桑葉 治身痛 枳實 治身痛 枳實 治身痛 枳實 治身痛

皮 拘攣 嬰粟殼 治身痛 嬰粟殼 治身痛 嬰粟殼 治身痛

拘攣

王

爲

也

六

行

而以上湯為百勝非東  
垣其過人之識不及此

黃耆錢 蒼朮錢 白朮錢 陳皮 澤瀉五 人參 升麻三

茯苓 當歸 生地 麥冬 甘草 神麴 黃柏酒

猪苓 柴胡 黃連分 五味子九 每服五錢

黃豚丸 痞氣丸痞滿 除吳茱白朮砂仁人參乾姜川椒黃

芥茵陳加石菖蒲丁香附子苦楝延胡獨活全蝎淡鹽湯

下治腎積發於小腹上至心下若豚狀上下無時令人喘

咳骨痠

龍膽瀉肝湯兄耳 治筋痠陰汗肝主筋熱 一方除當歸

李氏醫鑑 卷之三 痲痺 七

生地木通澤瀉車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦

名龍膽瀉肝湯治筋痠急口苦爪枯

黃青丸 治筋痠不起肝主筋熱 則縱故痠

龍膽草 山枝炒 大黃酒 川芎 當歸酒 防風 等分蜜

九竹葉湯下

補肝湯 治陰汗如水陰冷如水脚痠無力

清暑益氣湯除白朮青皮麥冬五味加茯苓猪苓羌活防

風連翹知母柴胡

腎着湯腰腎門 治胞痺膀胱熱痛滴於小便上為清涕

風寒濕邪客于胞中氣不能化故水道不通足太陽上額

傳信方腰腎 治風壓頭痺腰膝疼痛

獨活湯風 治中風身輕痛項背拘急手足冷痺腰膝沉

重舉動難舉

黃耆蜜 當歸酒 赤芍酒 羌活 防風 片子姜黃酒 甘草

加姜黃煎

獨活寄生湯風寒 治肝腎虛熱風濕內攻腰膝作痛冷痺

無力屈伸不便腎水藏也虛則寒濕之氣寒之故腰膝作

重能伸屈而痛不能伸者病在骨

李氏醫鑑 卷之三 痲痺 八

獨活 桑寄生如無真者以續斷代之 秦艽 防風 細辛 當歸

白芍酒 川芎酒 熟地 杜仲姜汁 牛膝 人參 茯

苓 甘艸 桂心 等分每服四錢 本方除獨活寄生

加羌活續斷名羌活續斷湯治同

上中下通用痛風方丹 痛風有寒有濕有熱有痰有血之

不同此為通治初起曰此即內經所謂行痺痛痺也經曰

黃柏酒 蒼朮酒 南星酒 神曲酒 川芎 桃仁去皮 龍膽

艸酒 防己酒 白芷 羌活 威靈仙酒 桂枝酒 三錢紅

花二錢 麵糊丸

升溪曰大法痛風用杏木南星川芎當歸白芷酒芍在上者加羌活靈仙杜枝在下者加牛膝防已木通黃柏薄桂能橫行手骨領南星

三痺湯 風寒 治氣血凝滯手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃耆 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 生

地 杜仲 川牛膝 川續斷 桂心 細辛 秦艽

川獨活 防風 等分加姜棗煎

喻嘉言曰此方參耆四物一派補藥內加防風秦艽以勝風濕桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡治三氣裝虛而熱之藥多而養血補氣固本之藥少惟此方專以補氣為主而以治三氣之藥從之散藥得補藥以行其勢輔正驅邪尤易于見功故喻氏取之

李氏醫鑑

卷之三

九

史國公藥酒方

治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂

痿痺不仁

語言蹇澀風中舌本也半身不遂邪併于虛也手足拘攣風燥其筋而血不濡也痿痺不仁風

而兼濕頑

羌活 防風

白木 土當歸 酒洗 川牛膝 酒洗 川草薢 杜仲

姜汁炒 松節 虎脛骨 炙 鱉甲 炙 晚蚕砂 炒 秦艽 蒼

耳子 四兩 枸杞 五兩 茄根 八兩 爲粗末絹袋盛浸無灰酒

三十斤煮熱退火毒服每日數次常令醺醺不斷

此足厥陰藥也防風羌活蒼耳秦艽凡治筋骨拘攣垂痺麻痺既以祛風兼以燥濕松節能除骨節間之風茄根散血消腫能療寒痺亦散寒之品當歸杜仲牛膝補陰潤燥養血當筋白木健腰脾主四肢虎脛祛風而壯骨蠶甲亦厥陰

血分之藥能益陰血而去肝風

防已黃耆湯

治諸風諸濕麻木身痛

松節散 治一切筋攣疼痛

黃松節 仰夜神心 乳香 一錢石器炒研每服二錢木瓜酒下

本草備要主治註釋

夏枯草 治瘰癧 蒼耳子 治痛 茜草 除風 姜黃 除風寒 薏仁 治

痺要 土茯苓 利筋骨 治 麥冬 治痿痺手足 虎骨 治風痺拘攣

羚羊角 祛風舒筋 蔓荊子 治拘攣 天麻 治四肢 仙茅 治痺

能行 秦艽 養血舒筋 理肢節 白藓皮 通關節利風 草薢 治痺

李氏醫鑑

卷之三

十

治風寒濕 何首烏 養血祛風 麻黃 治麻木 淫羊藿 治四肢

痺堅筋骨 原蚕砂 治風濕爲疾肢節不隨 沉香 治冷風 車前子 治濕

浮麥 散血止痛 姜汁和黃明膠 熨貼風 百沸湯

患風冷氣痺人以湯淋脚至膝用物厚 桑木火 拔引風寒

取桑木片扎成小把燃火吹息 桑葉 足去風痺 茵芋 治拘

攣患處內服祛風寒濕藥甚良 桑葉 足去風痺 茵芋 治拘

痛古方有 麻黃附子 治風 硫黃 治寒 天雄 治風寒濕痺 王

不留行 去瘰癧 陽起石 治接腰 急流木 風痺之 阿膠

風病 蠶魚 鯢魚 川山甲 今痺風 海桐皮 治風

仁 治瘰癧 山黃肉 治風寒濕痺 地骨皮 治風濕 海桐皮 治風

痺 枳實 去風 辛散 石南葉 風痺 皂莢 熱膏貼一 吳萸 治血 丹

參 治諸痿痺手足 石斛 治風痺 蘭葉 治諸痺 東垣 艾實 主

痺 五加皮 療筋骨之拘攣 腎得其養則安水去 治濕熱痿痺腰

瓜黃栢麥冬生地苡仁石斛虎脰骨山藥 已下不能行動

同二木草薢石菖蒲苡仁白茯苓甘菊花防風羌活獨活

白蘚皮石斛 治風寒 加皮 一味 讓酒飲之 治 勃脰 治痺 熱

李氏醫鑑 卷之三 寒庫

筋者胃之府 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒 筋者不能舒

陰虛者服多者死蓋恐陽而陰消也自此說行而世之治  
百無一生良可悲也蓋起房勞傷陰虛火上升咳嗽  
肺之品補腎之劑使陰虛火上升火降隨以參耆救  
者固不足為補陽反使陽火旺而金益受傷此不知先後之  
投參耆以補陽反使陽火旺而金益受傷此不知先後之  
着者也凡陽勝者不必為陽只補其陰以配陽使水火  
均平自無偏勝之患矣人之一身陽常有餘陰常不足  
人身水火原自均平偏者病也火偏多者精水虛火不  
去火水偏多者精火配水不必去水譬之天平此重則欲  
輕一邊重者只補足輕者之一邊決不鑿去法馬今之欲  
先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰  
而後瀉其陽當衛  
通行此其要也

滋腎丸 又名通關 治腎虛蒸熱脚膝無力陰痿陰汗衝脈

李氏醫鑑 卷之三 腰膝腎 主

上衝而喘及下焦邪熱口不渴而小便秘腎中有水有大  
治故虛熱肝腎虛而濕熱壅于下焦故脚膝無力陰痿陰  
汗衝脈起于二陰之交直衝而上至胸水不制火故氣逆

黃栢 酒炒 二兩 知母 酒炒 二兩 桂 一錢 蜜丸

水不勝火法當壯水以制陽光黃栢苦寒微辛為膀胱相  
火補腎水不足入腎經血分如母辛苦寒滑上清肺金而  
降火下潤腎燥而滋陰入腎經氣分故二味每相須而行  
為補水之良劑肉桂辛熱假之反佐為少陰引經寒因熱  
也用

本方去桂加黃連名黃栢滋腎丸治上熱下冷水衰心煩  
上熱下冷陽 單黃栢一味名大補丸治腎膀胱虛熱氣虛  
極似陰也

四君子湯下血虛 腰股痛而足心熱為末姜汁酒調服名  
潛行散治痛風腰以下濕熱流注

六味地黃丸 加杜仲 妙牛膝 酒各二兩 治腎虛腰膝痠痛

鄭相國方 治腰脚痠痛

被固紙 十兩 酒 核桃肉 二十兩 蜜調如粉每晨酒服一大

匙不能飲者熱水調忌 羊血 久服利益甚多 不獨下強腰

本方加杜仲 一斤 生薑炒蒜 兩 名青娥丸治腎虛腰痛再加

牛膝 酒 黃栢 酒 川茸 酒 蜜丸治同本方加杜仲胡

蘆巴小茴香華蘼名喝起丸治小腸氣痛引腰

李氏醫鑑 卷之三 腰膝腎 主

黃栢補腎丸 一木一大補下焦腰脚虛痛俱愈腎命相  
通氣精而惡燥胡桃狀類柏類皮汁青黑故入北方佐破  
潤滋潤燥而調血使精氣內  
充血脈通利諸疾自除矣

傳信方 治風濕頑痺腰膝疼痛

海桐皮 薤白 各一兩 牛膝 川芎 羌活 地骨皮 五

加皮 各一兩 甘草 五錢 生地 兩 酒二斗浸 此方不得曾減早

天眞丹 補下焦陽虛 中晚飲常令醺醺

牽牛 妙黑 佐沉香 杜仲 因紙 肉桂 深伴補瀉

十全大補湯 加防風為君再加羌活附子杜仲牛膝名

大防風湯 治鶴膝風 五積交加散 治腰脚痠痛

仙茅大益丸 助命火益陽通明耳目補虛勞治失溺無子

心腹冷氣不能食 胃弱不能行 煖筋 相火盛者忌服

唐麥羅門始進此方官時服之効効竹刀去皮切細  
水泔浸去赤汁止等思飲乾蜜丸酒服禁食牛乳生  
肉許真若書云甘能養肉中能養骨能養氣能養精  
酸能養膚和苦酒服之必効也傳云十斤乳石不及一斤  
仙

本草備要主治註釋

五加皮 堅骨益精 黃柏 補腎水不足堅腎潤燥非真能補  
急食苦以堅之也相火退而腎固則無狂蕩之患矣 五加

皮同續斷杜仲牛膝莢肉巴戟固紙 治腎虛寒濕 蛇牀子

李氏醫鑑

卷之三

腰膝腎

主

久服令人駐顏令 孫真人金櫻子煎 去刺核煎似稀糖每  
人有子強陽補腎 服一匙暖酒調服活

血駐顏其功 水陸丹 益氣補真金櫻子去 芡實 甘瀉固腎  
不可備述 利核和芡實粉為丸 清精補脾

去濕治腰膝痛痺 炙子野口人之食芡必枚啣而 沉香入  
細嚼之使華液流通轉相灌溉其功過于乳石也 沉香入

腎命門 桑其 補水 華 益精史信國云若欲與陽先滋  
精壯陽 補水 華 益精史信國云若欲與陽先滋

白頭翁 苦堅 早蓮草 補腎益精 決明子 益腎 黑大豆 補  
焦 功効甚速 益腎 黑大豆 補

益陽起石 補右腎命門 鐘乳 益強陰 石硫黃 大熱純陽補命  
精陽起石 補右腎命門 鐘乳 益強陰 石硫黃 大熱純陽補命

阿膠 滋陰 鹿茸 生精補髓 鹿角 滋補鹿一名班龍西蜀道士  
治海竭九轉靈丹都漫說惟有鹿茸能補上 龜板 滋陰益腎

珠能補玉堂閣下穴蓋指鹿茸與鹿角也 龜板 滋陰益腎  
龜鹿二仙膏 一陰一陽 肉苁蓉 補命門相火不 桑螵蛸

其功甚妙 肉苁蓉 補命門相火不 桑螵蛸

五味子 滋陰 天冬 潤燥 麥冬 強陰 熟地 填精 何首烏 添精

今人 骨碎補 益母子 補知母 而滋陰 苦參 補陰 瑣陽 益

有子 巴戟 強陰 胡盧巴 壯元陽 菟絲子 強陰 益精 去 覆盆子

益腎 固精 起陽 接續 肌肉 治腎冷 多孕 李士材曰 沙苑蒺

藜 補腎 淫羊藿 補命門 益精 益智仁 精 香附 益水 浸炒 蒲

香 補命門 地膚子 益精 石葦 氣 車前子 二歲 益精 腎有

水府而固精 藏精 盛則有 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

子 及五子衍宗丸用之 栢子仁 潤腎 肉桂 氣厚 純陽 入

肝補腎 補命門 相火之不足 兩腎中間 先天氣乃真火

也人非此火不能生 無此真陽之火則無以蒸精而

李氏醫鑑

卷之三

腰膝腎

主

化精微 脾胃 山黃 補腎 固精 枸杞 益腎 生 苦堅腎

或熬膏 女貞子 補腎 蓮肉 清精 蓮藕 益血 杜仲 補腎 強骨

痛 牛蒡子 利腰膝 莖子 補腎 龍骨 益腎 固精 鱉甲海

螺蛳 均治腰痛 桂心 暖腰 瑣陽 珍為要品 芡實 去腰膝 秦

皮 益腎 氣 海桐皮 治腰痛 石南藥 苦養腎 補內傷 陰寒

牛膝 治腰痛 肉苁蓉 治腰痛 破固紙 治腰痛 山茱萸 暖

鹿 補腎 浸酒 補腰 椿實 壯腎 經主 補虛勞 蒲公英 東垣

寒入腎 腎經 菴蘭子 治陽痿 腰膝 蛇 陽

必用之藥 菴蘭子 治陽痿 腰膝 蛇 陽





烏藥 木香 茴香 良姜 青蘆 枳殼 二川棟子

巴豆 七十 先以巴豆微打碎同川棟子 去麩及巴豆同

餘藥為末酒下一錢 而實者宜之不可施于虛証

山功散 治寒濕水疝陰囊腫脹大小便不利 見前大小便

不利濕鬱為 熱而脈秘也

黑牽牛 兩 茴香 炒 荔枝為末每一錢姜汁調下或加水香

牽牛 辛烈能通右腎命門走精隧行水泄濕兼通大腸風

秘而香辛熱溫散能煖丹出祛小腸冷氣同入下焦以泄

痛邪荔枝似聖丸故治癰 癰疽腫有連類象形之義

補核丸 治四種癰疔 癰疽卵癰水癰氣 癰皆寒濕為病

李氏醫鑑 卷之三 疔 疔

橘核 川棟子 海藻 海帶 昆布 桃仁 延胡索

厚朴 枳實 木通 桂心 木香 錢 酒糊丸益湯或

酒下 通核木香入厥陰氣分而行氣桃仁延胡入厥陰血

行所以去濕官桂平用厥陰命門之火所以祛寒厚朴

枳實並能行結水而破宿血昆布藻帶鹹潤下而軟堅寒

行水以泄熱丹溪曰癰疔不痛非堅斷房事與厚味不

可若者未神曲山查白芷川芎枳實半夏皆要藥又宜隨

時月寒熱加減有熱加枝子 堅硬加朴枳秋冬加吳茱萸

疝氣方 治疝氣疼痛

吳茱萸 枳殼 枝子 唐菖子 俱炒 荔枝枝 等分

為水空心長流水下二錢

經驗方 治陰疝

大小茴 各一 為末 猪胞 連尿入藥扎定酒煮爛為丸

每服五十丸

四逆湯 治寒 加 當歸 治男婦寒疝臍下冷引腰膝而痛

吳茱萸湯 治寒 加附子 治寒疝腰痛牽引舉九尺脉沉遲

喝起丸 治小腸氣 五積散 治冷秘寒疝

甘艸黑豆湯 治筋疝 前

甘艸 稍二 黑豆 升

逍遙散 治疝氣 責脉丸 治男子七疝

龍胆瀉肝湯 治陰腫陰痛 東垣無黃芩 龍膽瀉肝湯治

前陰熱痒臊臭 詳論見淋門

五苓散 治熱 加川棟子 治木疝

分清湯 治寒疝二便不通

羌活勝濕湯 治濕熱 除川芎加黃耆當歸 升陽除濕湯 治木疝

腫大陰汗不絕

左金丸 治肝火燥盛筋疝痞結 肝木過盛剋制脾

常歸生薑羊肉湯 治寒疝腹痛

經驗方 治囊風瘡痛痒 川椒七粒 慈頭七根 煎水

薰洗

本艸備要主治註釋

苗香

治小腸冷氣

胡盧巴

同苗香巴戟川烏棟實

海藻

治陰

疝痛

防風

苡仁

葶藶

射干

白頭翁

同治

偏墜

五寶脂

均治

治風

要藥

宜加之

五加皮

治陰

濕并

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

疝氣

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

疝氣

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

疝氣

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

疝氣

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

疝氣

苦棟子

治痛

吳茱萸

治陰

乾漆

治瘰

皂莢

治瘰

李氏醫鑑

卷之三

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

案

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

為末敷之 其珠人中白黃柏青黛礪砂和水片少加雞  
內黃金賦粉 鷄脆內黃皮 不落水 焙存性枯礬一錢研細  
搽 治陰疝 燈神效其傳

李氏醫鑑

卷之三

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

&lt;

脚

脚氣 脚眼腫痛 脚氣白外感得者山嵐瘴氣或濕熱之地自內而得者

生於茶酒油麵濕熱之毒有濕熱之毒又生熱濕性下流故注于足濕熱分爭濕勝則腳腫熱勝則趾熱有兼頭痛諸症者狀類傷寒亦有六經傳變但腫痛為異耳此病忌用補劑及淋洗以濕熱得補則痛也然亦不宜大瀉治之喜通而惡寒若脚氣冲心喘急不止嘔吐不休者死水凌火故也先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脉弛長痛腫者名濕脚氣宜利濕疎風腫痛者名乾脚氣即熱也宜養血潤燥風寒之異濕勝而為病或成水泡瘡或成赤腫亦有或如筋氣攻上引下均可用後當歸拈痛湯損益為治足傷寒濕為脚氣防已為主藥濕加苳仁蒼朮木瓜通熱如芥根風加羌活麻黃加竹瀝南星痛加香附木香活如芥根風加羌活麻黃加竹瀝南星痛加香附木香連臂加威靈仙桂枝連脇加胆艸又有足眼痛者

李氏醫鑑

卷之三

三

不與脚氣同論 千金云有陰陽之分陰脚氣腫而不紅陽脚氣腫而紅者也 士材曰脚氣之名前古未聞起于後漢其病麻痺痛者經所謂痺厥也其冲心者經所謂厥通也其痿軟不收者經所謂痿厥也東垣曰脚氣實由水濕然亦有二焉一則南方卑濕經口清濕養虛則病起于上此自外而感者也北方常食牛乳又飲酒太過脾胃有傷不能運化水濕下流此自內而致者也楊大受云脚氣為瘴症治宜宣通不使壅也壅既成者疔去惡血然後服藥○南方脚氣外感寒濕北方脚氣內傷濕熱此前人所未發者 脚氣為瘴疾皆當疎下然太過則損脾不及則拘下矣初發時一身盡痛便溺阻滯先以羌活獨活湯導之羌活獨活防已大黃當歸枳實芍藥白朮澤瀉茯苓半飲食不消心下痞悶開胃導氣先以陳皮白朮澤瀉茯苓半夏神曲麥芽枳實青皮干姜 氣九已上治心火氣逆上也丹香為末姜湯下已上治胃氣逆下導氣 下降甚捷 脚氣膝浮用甘松煎湯淋洗

當歸拈痛湯 治脚氣腫痛脚膝生瘡膿水不絕脉沉實緊

數動滑者

茵陳 苦參 妙知母 妙當歸 猪苓 澤瀉 空心服一

方加人參 羌活 防風 升麻 葛根 蒼朮 白朮

甘艸 黃芩

原文曰羌活透關節防風散留濕為君升麻味清引而上行苦以發之白朮甘溫和平蒼朮辛溫雄壯健脾胃燥濕為臣濕熱相合肢節煩痛苦參苦杏仁茵陳苦寒以泄之酒炒以為因用血壅不流則為痛當歸辛溫以散之參艸甘溫補養正氣使苦寒不傷脾胃治濕不利小便非其治也苓澤甘溫鹹平導其流飲為佐上下分消其濕使壅滯得以宣通也

李氏醫鑑

卷之三

三

金匱風引湯 巢氏用治脚氣

大黃 干姜 龍骨 枝子 兩甘艸 牡蠣 滑石

寒水石 赤石脂 紫石英 枳實 枳殼 三指服煎

防已 治脚氣足腫痛憎寒壯熱

防已 木通 枳殼 生地 白朮 蒼朮 益

黃柏 甘艸稍 犀角 食前服熱加黃芩時令熱加石

膏肥人有痰加姜汁竹瀝或南星大便秘加桃仁紅花小

便赤澀或加牛膝苳仁

烏藥順氣散 中風 加牛膝五加皮獨活治脚氣

四物湯 加羌活天麻 蜜丸名神應養真丹治血虛脚氣

紫雪 傷寒發 治脚氣

控涎丹 治脚氣

補肝湯 治脚痿無力

六味地黃丸 治足跟作痛 五積散 治脚氣腫痛

人參敗毒散 治濕毒流注腫痛脚氣 氣下流

則腫

本艸備要主治註釋

胡盧巴 治寒濕 苡仁 龍胆艸 川烏 棟實 三奈

李氏醫鑑 卷之三

寒濕 苗香 治乾 大腹皮 治水 木瓜 舒筋去濕

冬 黃柏 石菖蒲 木通 治脚 仙茅 治冷痺 澤瀉 治脚

五加皮 治小兒脚 狗脊 石斛 治脚 蓖麻子 氣風腫不

仁或煎湯 百沸湯 治脚氣 髮脚氣 互易 原蚕砂 上茄根

魚洗 吳茱萸 香附 地骨皮 萆薢 赤小豆

食治脚氣 白芥子 治痺木 巴戟 夏枯艸 白蚯蚓

日脚氣必 海藻 治脚氣 枇杷葉 治脚氣 香薷 治脚氣

滑石 治脚 樟腦 治脚 瘡甲方 治脚 松葉 治脚

調傳 脚凍瘡方 白薇黃柏 茄根 松葉

案

有一宦遊京師病腿痛發熱不能履地眾以肥瘰治

又案 一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不効孫琳曰

此乃腎虛非脚氣也川杜仲一兩半酒半水煎成三

補遺 桑枝煎治風氣脚氣

桑枝 升 細剉炒香水三升熬至二升一日服盡

脚

李氏醫鑑卷之四

李氏醫鑑

男 元冬周佐 元峯景燦

元夏雲生 元昂廷暉錄次

姪 元旭子昭 元晶承曜

友人錫三王世龍恭訂

元晨西平

脾胃

李東垣曰胃乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之源脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此本病也右關脈緩而弱本脾也或本李氏醫鑑

脈中兼見弦脈症中或見四肢清開淋瀝便難轉筋一二症此肝之脾胃病也當加風藥以瀉之脈中兼見洪大症中或見肌熱而赤煩熱肉消一二症此心之脾胃病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮滑症中或見短氣氣上喘咳痰涎皮溢一二症此肺之脾胃病也當加瀉肺及補氣之藥脈中兼見沉細症中或見善欠善恐一二症此腎之脾胃病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之藥所以言此者欲人知百病皆從脾胃生也處方者當從此法加附令藥人之一身無非藏府而藏府以脾胃為主然脾胃之化物寔由于水火二氣非脾胃之能也○補命火以強脾○經曰四時百病胃氣為本又曰得穀者昌絕穀者亡脾胃一虛百病不生○土為萬物之母脾土受傷則失其健運之職故飲食不消漸寒則嘔吐熱則濡泄飲食既少眾藏無以稟氣則虛靡日甚諸病叢生矣

補脾胃瀉陰火升陽湯 治飲食傷胃勞倦傷脾火邪乘之

而生大熱右關脈緩弱或弦或浮數右關緩弱脾虛也然東垣曰濕熱相合陽氣日虛不能上升脾胃之氣下流用腎是有秋冬而無春夏也惟瀉陰火伸陽氣用味薄藥升發則陰不病陽氣生矣

黃耆 蒼朮 甘艸 羌活 升麻 柴胡 黃連 酒

五黃芩 妙 人參 錢七 石膏 少許長夏微 每服三錢或五錢

此足太陰陽明少陽藥也柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮黃芪甘艸益氣除濕以補脾胃黃連黃芩

石膏涼心清胃以瀉陰火

調中益氣湯 補中益氣除歸 木加水香蒼朮 治脾胃不調胸滿肢倦食

少短氣口不知味及食入反出

李氏醫鑑 卷之四 單胃

參朮益胃湯 補中益氣加蒼朮倍分 半夏黃芩益智各三分 治內傷勞倦燥熱

短氣口渴無味大便溏黃 補中益氣去白朮加 草薢神曲半夏黃芩 治飲食勞倦所傷滿

升陽順氣湯 補中益氣去白朮加 草薢神曲半夏黃芩 治飲食勞倦所傷滿

保和丸 飲食 加白朮白芍去 半夏半子連翹 名小保和丸助脾進食

健脾丸 去山查麥芽加 名益氣健脾丸治脾虛食少本方 去

查麥芽陳皮加當歸川 名養營健脾丸治脾陰不足飲食

不為肌膚 血充然 本方 去人參山查麥芽加 名清火健脾

九治脾虛有火本方 去人參山查麥芽加 名和中健脾

九治胃虛飢不欲食再人參名妙應九治胃虛不能食藏府

或結或瀉本方去山查加半夏青皮砂仁草蔻干姜炙甘草茯苓澤瀉蒸餅丸名寬中

進食九補脾胃進飲食

胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃食泄注下完穀不化又治

風虛能食牙關緊閉手足瘕瘕肉瞤而腫名曰胃風瘕瘕手足抽掣動也

人參 白朮土炒茯苓 當歸酒洗芍藥酒炒桂枝炒等

分加粟米百餘粒煎

胃風者胃虛而風邪乘之也風屬肝木能剋脾土故用參

木茯苓以補脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調骨白

芍藥肝而能和脾肉桂散風而能平木故能止泄瀉而療

風濕也川芎肉桂入血而祛風此方名治風而寔非治

風乃補血和血益胃之藥

東垣胃氣湯升麻白芷一錢麻黃二分黃節不去葛根各一錢柴胡各一錢

活藥本蒼朮荊草薤黃栢當歸炙草各五分加姜棗煎亦

治胃風症嘉言曰風入胃中何以反能食蓋風能生熱即

其熱以熱必隨風而解耳又曰必加竹瀝花粉石膏散

生地梨汁甘寒之藥入升麻葛根甘州為劑始為克當

問二藥補散不同而所治共一症何歟嘉言曰按風成爲

寒熱乃風入胃中而釀管衛之偏勝此方乃驅胃風使從

外解之藥若夫久風爲食泄則風已入裏又當用人參爲

君桂枝白朮爲臣茯苓甘草爲佐而祛風於內此表裏之

權衡內經之要旨也

升陽益胃湯 治脾胃虛弱怠惰嗜卧時值秋燥冷行濕熱

方退體重節痛口苦舌乾心不思食食不知味大便不調

小便頻數兼見肺病瀝漸惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也

陽受氣於胸中經曰陽氣者若天與日清陽失位則濁陰

上干脾虛不運而怠惰嗜卧也體重節痛瀝盛而陰邪勝

也口苦舌乾陰火上炎也不嗜食不知味胃氣虛衰也大

便不調濕勝也小便頻數膀胱有熱也瀝漸惡寒陽虛也

陽氣不舒也

黃芪二兩人參 甘州炙半夏一兩白芍炒羌活 獨活

防風五錢以其秋旺陳皮四錢白朮土炒茯苓小便利不

澤瀉勿用柴胡三錢黃連二錢每三錢姜棗煎又補中益氣

李氏醫鑑 卷之四 脾胃

湯加炒麴黃芪亦名益胃升陽湯

六君子助陽益胃補脾胃之上藥也加黃者以補肺而固

衛芍藥以飲陰而調營羌活獨活防風柴胡以除濕而升

清陽茯苓澤瀉以瀉濕熱而降陽陰少佐黃連以退陰火

補中有散發中有收使氣足陽升自正旺而邪服矣東

垣曰此治肺之脾胃虛也何故秋旺用參木芍藥之類反

補脾爲脾胃虛則肺俱受病故因時而補易爲力也又曰

余病脾胃久衰一日體重肢節疼痛大便泄下小便便秘

因寒濕客邪自外入裏而甚暴若用淡滲以利之病縱即

已其降之又降復益其陰而重竭其陽也治以升陽之藥

是其宜耳羌活獨活柴胡升麻各一錢防風炙甘草各五

分一劑而愈大法寒濕之勝風以平之又曰下者舉之藥

經曰頭有疾取之足謂陽病取陰也足有疾取之上是

陰病取陽也中東有疾取之中者脾胃也旁有疾取之

也脾取風木也東方春也胃中穀氣者便是風化也胃中

濕勝而成泄瀉宜助甲肝風勝以克

又足升陽助清氣上行之一法也

麥冬白朮散 治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 山藥 扁豆 苡仁 炒蓮

肉 炒 陳皮 砂仁 桔梗 爲末每三錢聚湯或米飲

調服

治脾胃者補其虛除其滯行其滯調其氣而已人參白朮  
茯苓甘草山藥苡仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也然茯苓山  
藥苡仁理脾而兼能滲濕砂仁陳皮調氣行滯之品也然  
合參朮苓桂枝而用又能補中且入補藥則補精梗苦甘  
入肺能載諸藥上浮又能通天氣於地道使氣 肺和則天  
得升降而益和且以保肺防燥藥之上借也 氣下降

枳朮丸 兄飲 消痞除痰健脾進食一消

李東垣曰白朮甘溫健脾胃之元氣其苦味除胃中之濕  
後用枳實開胃通于枳實壯伐之藥一倍枳實苦寒泄胃

中 痞悶化胃中所傷是先補其虛而後化其傷則不峻矣

荷葉中空色青形仰象震在人爲少陽胆生化之根蒂也  
飲食入胃營氣上行即少陽甲胆之氣也胃氣元氣穀氣  
甲胆上升之氣一也食藥感此氣化胃氣何由不上升乎  
燒飯與白朮協力滋養發氣補 本方加 陳皮 名橘皮半枳  
令胃厚不至再傷其利廣矣

水丸健脾本方加一兩名木香枳朮丸 再加 名香砂枳朮

丸消飲食強脾胃如加干姜五錢兼治氣寒 再加人 名木

香人參干姜枳朮丸開胃進食

二神丸 見泄 許學士曰有全不進食者服補脾藥皆不効

治益腎氣壯其元氣衰則不能 化食如鼎釜之下無火物不能熟也

中滿分消湯 見瘰 原文曰或多食寒涼及脾胃久虛

異功散 四君子加陳皮調理脾胃再加半夏名六君子治

氣虛有痰脾虛鼓脹 因塞用 再加 砂仁 名香砂六君子湯

治虛寒胃痛

健脾丸 治脾虛氣弱飲食不消

人參 白朮 二兩 陳皮 麥芽 炒一 山查 兩 枳實 兩 神麴

糊丸米飲下 脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故 不嗜食脾虛則不能運化故有積滯

本草備要主治註釋

犀角 解一切毒時珍曰五藏六府皆稟氣于胃風邪熱毒  
足明胃藥也故能入胃 石膏 清胃 知母 清胃 大麻仁 治胃  
解諸毒清胃中大熱 脾胃

李氏醫鑑 卷之四 脾胃

華薛 治清胃家濕熱 秦艽 去腸胃 玄明粉 去胃中 白蘚皮

入脾胃 故能去濁分清 秦艽 之熱 玄明粉 之實熱 白蘚皮

除濕 肉桂 乃命火不足 丁香 治胃 藜蘆 治胃 良姜 散寒

干姜 除胃 花柳 緩胃 胡椒 緩胃 快膈 肉豆蔻 緩胃 白豆蔻 緩胃

脾神 健脾胃 治 藜蘆 益胃 除 蒜 健脾胃 白芥子 溫中 醋 開

神曲 紫蘇 開胃 益 黃耆 壯脾 甘艸 補脾胃 白朮 燥脾 蒼

木 同土能升 黃精 益脾 石斛 平胃 石菖蒲 開胃 半夏 和胃

我米 粳米 和糯米 補穀芽 助胃氣 白扁豆 脾藥也 苡

仁 胃也 薏苡 山藥 補脾 白芍 安胃 滑石 補脾 蘆甘石

溫 茯苓 柏子仁 助 棗仁 脾 枳殼 同胃 厚朴 平胃 黃連

胡連 皆厚 謁子 開 辛夷 入肺胃氣分能助 檀香 行進飲食

沉香 入脾 枳實 和 圓眼 脾 進子 厚 助脾 荷葉 助脾 茨

實 補 土 茯苓 健 使君子 健 大棗 助脾 升 木香 脾 防

風 能 行 健 脾 胃 非 引 用 不 少 荊 芥 助 脾 益 智 仁 治 寒 砂 仁

和 胃 藿 香 荷 香 胃 脾 開 胃 食 後 宜 食 蕪 荑 和 麵 炒 黃 芩

胃 中 有 虫 鯽 魚 氣 以 生 故 其 味 甘 其 氣 溫 無 毒 且 以 能 入

食 即 作 痛 孟 詵 云 調 中 益 五 藏 表 其 益 脾 和 胃 之 神 曲 開

功 也 調 胃 實 腸 與 諸 藥 諸 魚 之 中 惟 此 可 常 食 神 曲 開

健 脾 消 食 止 泄 同 山 查 麥 芽 穀 芽 砂 仁 黑 芝 蔴 一 味 九 蒸

陳 皮 草 果 薑 香 白 朮 乾 葛 蓮 肉 等 用 効 山 蒼 木 乳 并 蒸 晒 三 次 作

丸 能 健 脾 燥 濕 益 氣 延 年

飲食 中食 不思食

食填太陰 抑過肝胆之氣 不得上升 兩實相搏 故痛連胸  
膈 陽氣不舒 故手足逆冷 下焦隔絕 故尺脈不至 訶菴曰  
中食之症 有忽然逆厥 口不能言 肢不能舉者 名曰食厥  
若作中風中氣治之 不可立待 宜先以宣吐之 再行消食  
或曰食填太陰 胸中痞滿 兩寸脈當用事 今反尺脈不吐者 死  
其理安在 脾陽不生 獨陰不長 大之用在于地 下則萬  
物生 長地之用在于天 上則萬物收藏 此乃天地交而萬  
物通也 故陽火之根本于地下 陰水之源本于天上 五藏  
主有形之物 物者陰也 陰者水也 食塞于上 是絕五藏之  
源 源絕則水不下流 八脈之絕 此其理也 元戎曰 治濕之  
病 亦能作痺 症口眼歪邪 半身不遂 舌強不正 渾似中  
風 當瀉濕毒不可 作風治之 而汗也

燒盒探吐法 治傷食痛連胸膈痞悶不通手足厥冷尺脈

全無 單用燒盒熱水調飲此法大勝用藥凡有此疾宜先  
用之三飲三吐訶菴曰 醃潤下而軟堅 能破積聚 又  
能宣通 使不化之食從上而出  
則寒者通矣 亦本醫達之也

順氣消食化痰丸 治酒食生痰胸膈膨悶五更咳嗽 過飲

更咳 由胃有食積 至此時火氣流入肺中 故咳嗽 則脾

半夏 製 胆星 青皮 陳皮 白 芩 子 用 蘇 子 者 妙 山 查 炒

麥芽 神曲 葛根 杏仁 去皮 香附 製 薑 汁 和 蒸 餅

糊丸 一方半 夏南星各一斤 白礬皂角生薑各一斤 同

煮至南星無白點為度 去皂角 切同曬乾 用

痰由濕生 牛夏南星所以燥濕 痰由氣升 蘇子杏仁  
所以降氣 痰由氣滯 青皮陳皮香附所以導滯 痰因酒  
食 葛根神曲所以消酒 查牙所以化食 濕去食消  
則痰不生 氣順則痰散 止痰滯 既去 諸悶自除也



枳朮丸 健脾進食

白朮<sup>二兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 為末荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶

加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神曲

工安道口勞倦飲食雖俱為內傷然勞倦傷誠不足矣飲食傷又當于不足之中分其有餘大飢餓不飲食者胃氣空虛此為不足而傷也飲食自倍腸胃乃傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不足故補益惟其有餘故消導亦有物滯氣傷消補兼行者亦有物滯氣不傷但須消導者亦有不必消導但須補益者枳朮丸之類雖曰消導固有補益之意若所滯之物非枳朮丸之力所能去者備急丸煮黃九瓜蒂散等藥古東垣亦未嘗委之而勿用也

本方加半夏一兩治脾濕停痰及傷冷食本方加橘皮一兩治飲食不消氣滯痞悶本方加神曲麥芽各一兩各藥

藥枳朮丸治內傷飲食或泄瀉本方加酒炒黃連黃芩大黃炒神曲橘紅各一兩各三黃枳朮丸治傷肉食濕麵辛熱味厚之物填塞悶亂不快本方加茯苓五錢乾姜七錢

名消飲丸治停飲胸滿嘔逆本方作湯名枳朮湯治水飲心下堅大如盤也心下上焦陽分也屬氣分之水

保和丸傷食治食積停飲腹滿泄瀉積滯惡食傷于飲食

滯于腸胃故有泄瀉惡食等症傷而未甚不欲攻以厲劑惟以平和之品消而化之故曰保和東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其濕傷食者有形之物也輕則消化或損其氣重則方可吐下脈經云大腸有宿食寒食發熱有時如瘧則消導重則下之當求之傷食門

山查<sup>三兩</sup> 神曲<sup>炒</sup> 茯苓 半夏<sup>一兩</sup> 陳皮 芩子<sup>微炒</sup> 連翹<sup>五錢</sup>

麴糊丸麥芽湯下或加入藥亦可積久必鬱為熱連翹

此內傷而氣未病者但當消導不須補益大安丸加白朮治飲食不消

氣虛邪微

葛花解酲湯 專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭痛小便不利酒大熱有毒又水所釀成故熱而

利兼濕熱積于腸胃故見諸症

葛花 豆蔻 仁<sup>一錢</sup> 木香<sup>一分</sup> 青皮 陳皮 人參 白

朮<sup>炒</sup> 茯苓<sup>四分</sup> 干姜 猪苓 澤瀉<sup>三分</sup>

過飲無度濕熱之毒積于腸胃葛花獨入陽明令濕熱從肌肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為君諸味解酒而

李氏醫鑑 卷之四 飲食

兼花食調氣溫中除痰瀉熱乃內外分消之劑飲多則中氣飽故又加參朮以補其氣也人參補氣又能解酒東

垣曰酒大熱有毒無形之物也傷之只當發汗次利小便上下分消其濕氣或用酒藏丸大熱之藥下之或用大黃

牽牛下之是無形元氣受傷反損有形陰血陰血愈虛陽

氣太旺元氣消而虛損之病成矣或曰葛花解酒而

發散不及根根枳椇一名雞距一名水蜜經霜黃赤而味

甘其果入酒酒化為水門外植此木者屋內釀酒多不佳

敬脾進食殺神丸

殺芽<sup>四兩</sup> 為末入姜汁盪少許和作餅焙乾入炙甘草砂仁

白朮<sup>各一兩</sup> 為末白湯點服或丸服

越鞠丸<sup>見前</sup> 治飲食不消

六一散 解酒食毒

縮脾飲

見胃

治暑月酒食所傷

二陳湯

加

片于薑黃

治酒家手臂重痛麻木

李氏醫鑑

卷之四

飲食

十一

感冒 寒熱內外傷辨

瘟疫暑暈約畧

表發表論

內經曰：卑下之地，春氣常在，故東南卑濕之區，氣氣柔潤。易傷風寒，然稱感冒，受邪府淺之名也。由鼻而入，在于上部，客于皮膚，故無六經形症，惟發熱頭痛而已。胸膈嘔氣，惡食而兼內傷也。東垣內傷外感辨，傷于飲食，勞役七情，六慾內傷，傷于風寒暑濕，為外感內傷發熱時熱時止。外感發熱，熱甚不休，內傷惡寒，得暖便解。外感惡寒，雖厚衣烈火不除，內傷惡風，不畏甚風，反畏隙風。外感惡風，見風便惡，內傷頭痛，午痛午止。外感頭痛，連痛無休，直待表邪傳裏，方罷。內傷有濕，或不作渴，或心火乘肺，亦作燥渴。外感須二三日外，未熱傳裏，口方作渴。內傷則熱傷氣，四肢沉困無力，倦怠嗜臥。外感則風傷筋，寒傷骨，一身筋骨疼痛。內傷則短氣不足，以息。外感則喘壅氣盛，有餘。內傷則手心熱，外感則手背熱。天氣通于肺，鼻者肺之外候，復感傷寒，則鼻塞傷風，則流涕。然能飲食，口知味，腹中便如常，地氣通于脾，口者脾之外候，內傷則腹中不和，口不知味，小便便黃赤，大便或閉或瀉，左人迎脈主表，外感

李氏醫鑑

卷之四

感冒

十一

則人迎大于氣口，右氣口脈主裏，內傷則氣口大于人迎。內傷症屬不足，宜溫宜補，宜和。外感症屬有餘，宜汗宜吐。宜下。若內傷之症，誤作外感，妄發其表，重虛元氣，禍如反掌。故立補中益氣湯為主之。又有內傷外感兼病者，若內傷重者，宜補養為先，外感重者，宜發散為急。此湯惟上焦痰喘，中焦濕熱，傷食膈滿者，不宜服。李士材曰：虛人感冒，不任發散者，此方可以代之。東垣曰：肌熱者，表熱也，服此湯一二服，得微汗則已。非正發汗，乃陰陽氣和，自然汗出也。準繩曰：凡四時傷寒，通宜補散。故丹溪治傷寒多用補中益氣湯。氣虛者，四君子加發散藥。血虛者，四物湯加發散藥。東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻，藥本蒼木。海藏治濕無汗者，用神木湯。見時氣門有汗者，用白木湯。治剛痺神木湯加羌活防風升麻。治柔痺白木湯加蒼木桂心。治中風脈弦細者，用黃耆湯。此皆仲景所謂辛甘不人。仲景論傷寒傷風，此亦感也。故宜發表以解散之。此麻黃桂枝之義也。感于寒冷之月，即時發病，故用辛熱以勝寒。如春溫之月，則當發以辛涼之藥。夏暑之月，則當變以

補不必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中  
益氣爲主如內傷兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者  
加黃連兼濕者加羌活定萬世無疆之利此東垣特發陽  
虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今  
人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而難則曰傷寒之  
法已窮予嘗于陰虛發熱者見其大熱而赤口渴煩躁與  
六味地黃湯一大劑卽愈如下部惡寒足冷上部渴煩躁  
極或飲而反吐卽加肉桂五味甚則加附子冷飲以此法  
人多矣此丹誤發明陰虛發熱之外尚遺未盡之旨也  
凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯卽百沸湯或酸棗  
水探吐探吐汗出卽已訖菴曰感冒風寒而以熱湯探浴  
亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之  
三拗湯 治感冒風寒咳嗽鼻塞  
麻黃湯 發中有收杏仁留尖取其發  
連皮取其澁甘升生用橘中有發也  
四逆湯 祛寒 加當歸 木通 治感寒手足厥冷脉細欲死

潮熱無虛症 有宗石豆厚木刀月廿卯香門照印君不坐

黃芪湯 黃芪 防風 白朮 等分 潔古用代桂枝湯治

春夏發熱有汗脈微弱惡風寒者惡風其加桂枝又用川

芎藭木羌活等分名川芎湯以代麻黃湯治秋冬發熱無

汗惡風寒者惡寒加麻黃

連理湯 治傷暑瀉而作渴 初覺口苦外感盛暑內傷生冷非此不可

人參 干姜 甘艸 白朮 白茯苓 黃連

防風通聖散 治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所

傷氣血佛鬱表裏三焦俱寔憎寒壯熱頭目昏運目赤腫

痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠粘咳嗽上氣太

李氏醫鑑 卷之四 感冒

便秘結小便赤澀 憎寒壯熱邪在表也頭眩目赤風熱上攻也

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白

芍 白朮 山枝 炒大黃 酒黃芩 錢黃芩 石膏 桔梗

兩 廿 兩 滑石 兩 加生薑 葱白 煎白利去硝黃白汗去麻

黃加桂枝涎嗽加姜製半夏 此足太陽陽明表裏血氣

藥也防風荆芥薄荷麻黃輕浮升散解表散寒使風熱從

汗出而散之於上 大黃芒硝破結通幽枝子滑石降火利

水使風熱從便出而泄之於下風淫於內肺胃受邪桔梗

石膏清肺瀉胃風之爲患肝木受之川芎歸芍和血補肝

黃芩清中上之火連翹散氣聚血凝甘艸緩峻而平 重川

利水瀉火之意 白朮健脾而燥濕上下分消表裏交治 甘

汗不傷表下不傷裏也 本方再加人參補氣熟地益血

黃連黃柏除熱羌活獨活天麻細辛全蝎祛風蜜九彈子

大每服一丸茶酒任下名祛風至寶丹 喻嘉言曰此中風

也 本方除大黃芒硝名雙解散 麻黃防風荆芥薄荷川芎

膏滑石以解裏復有當歸芍藥以和 血枯梗甘艸白朮以調氣故口雙解

九味羌活湯 治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項

痛脊強嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣

李氏醫鑑 卷之四 感冒

神木散 見傷寒表門 治內傷生冷外感寒邪而無汗者 本方

除蒼朮加白朮姜片不用葱治前症有汗者 白朮二湯

海藏所製以代桂枝麻黃二湯者也嘉言曰此海藏得

意之方蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也

人參敗毒散 論詳前 治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗

鼻塞聲重風痰咳嗽及感冒時行疫癘等症

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳壳 桔

梗 茯苓 甘草 每服一兩加生薑三片薄荷少許煎日

乾舌燥加黃芩 風寒在表則惡寒發熱頭痛項

惡鼓湯 治傷寒初覺頭痛身熱脈洪便當服此 非其傷寒

葱白一握煎服取汗出如無汗加乾葛三兩

邪初在表宜先服此以解散之免用麻黃湯者之多所顧忌用代麻黃者之多所紛更也本方去淡豉加生姜治同名連翹

十神湯 治風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽鼻塞聲重

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘艸 陳

皮 香附 赤芍 等分加姜葱白煎諸藥以散表邪而加芍藥和陰氣於發汗之中加甘艸和陽氣于疎利之隊也升麻葛根若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發病矣慎之

參蘇飲 治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰塞中焦眩暈

李氏醫鑑 卷之四 感冒 一七

噴煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止發熱頭痛外感也咳嗽痰壅嘔逆泄瀉內傷也已汗而熱不止陰虛也

人參 紫蘇 乾葛 前胡 半夏 茯苓 七錢 橘紅

甘艸 枳壳 桔梗 杏仁 錢 每五錢加姜棗煎外感

多者去棗加葱白肺中有火去人參加杏仁桑白皮瀉肺此手足太陰藥也風寒宜解表故用蘇葛前胡勞傷宜補中故用人參甘艸橘梗除痰止咳枳壳利膈寬腸木香行氣散滯使內外俱和邪散矣元戎謂此方治一切發熱行發諸有風藥解表有氣藥和中則外感風寒內傷痰飲並可本方去人參前胡加川芎柴胡姜棗煎名芎蘇飲用也

治傷風寒外有發熱惡寒內有咳嗽吐痰氣湧此或肺有實熱故去

參加芍藥通陰陽血氣之使

五積散 治外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身

痛項背拘急胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來

藿香正氣散 治外感風寒內傷飲食嘔逆痞滿痰

熱內凝

藿香 前胡 大腹皮 陳皮 桔梗 紫蘇 甘艸

茯苓 半夏曲 白芷 白木 厚朴一方加木瓜傷食者加

消食

本草備要主治註釋

李氏醫鑑 卷之四 感冒 大

葛根 開腠發汗解肌退熱若太陽初病不可便服升葛

胡為足少陽胆表藥若病在太陽服之太早則引賊入門

宜升麻 引邪入散手陽明風邪同葛根能發陽明之汗

引陽明之清氣上行故補中益氣湯用為佐使

而散散肌表八風之邪利周身百節之痛獨活 羌活 雄

為却亂反正之主藥小無不入大無不通獨活 羌活 搜

入足少陰氣分以理伏風防風散上焦風邪頭痛脊強

同細辛治本經傷風頭痛防風散上焦風邪頭痛脊強

芥行血脈助脾消食白芷 通竅表汗細辛 散風邪益肝

前胡 解風寒散邪熱猪苓 開腠發汗解肌去營中寒

川禁毛孔夏紫蘇 發汗解肌薄荷 氣而抑肺盛木賊 解

去

張

是藥其少火也。安其衛生耶。又曰古人用辛散必用酸收。故桂枝湯中亦用芍藥。猶兵家之節制也。  
本方除人參獨活。加葱白。名火鬱湯。治同。火鬱者。內熱外寒。脈沉而數。火鬱無從散。故外寒。沉為在裏。沉而數。知為內熱也。

瀉白散 治肺火皮膚蒸熱。酒漸寒熱。日晡尤甚。喘嗽氣急。

桑白皮 地骨皮 錢一分 粳米 易老加黃連。肺主西方。李時珍曰。此瀉肺諸方之準繩也。瀉白散瀉肺經氣分之火。黃芩一物。湯丹溪清金丸。瀉肺經血分之火。清金丸即黃芩炒。

三補丸 治濕痰夜熱 黃連黃芩枝子等分。用粥

瀉黃散 見三 治脾胃伏火以及諸熱。諸熱詳前

李氏醫錄 卷之四 諸熱

白朮除濕湯 治午後發熱。背惡風。四肢沉困。小便色黃。又

治汗後發熱。午後發熱。熱在陰分。陽陷陰中也。背為陽。腹重濕勝而脾不運也。小便黃。濕兼熱也。汗後而熱不退。陽虛也。

人參 赤茯苓 甘艸 柴胡 白朮 生地 地骨皮

知母 澤瀉 錢七 每服五錢。如有刺痛。加當歸 錢七 小便利。減

芩澤一半。陽陷陰中。熱在血分。故以生地滋其少陰。而以

知母地骨瀉血中之伏火也。柴胡升陽以解其肌。陽陷陰中。故以

柴胡提

出其陽。芩瀉利濕。兼清其熱。參朮甘艸益氣助脾。氣足陽

升。虛熱自退。脾運而濕亦除矣。方名除濕。而治在退熱。欲熱從濕中而下降也。

人參清肌散 治午前潮熱。氣虛無汗。熱發午前。陽虛而陰

故無汗。經曰。陽氣有餘。為身熱。無汗。陰氣有餘。為多汗。身

寒。陰陽有餘。則無汗。而身熱。陽虛。則有汗。而身寒。有餘。即

生外熱。陰虛。則生內寒。昔人謂之為實。非真陰真陽盛也。

人參 白朮 茯苓 甘艸 半夏 當歸 赤芍

柴胡 乾葛 加姜棗煎

四君子以補陽虛。歸芍以調陰血。半夏和胃而行痰。柴葛

升陽而退熱。蓋以甘溫瀉火。甘溫能退大熱。酸寒活血。汗即

解肌。有汗宜實表。無汗宜解肌。此之無汗。不同於傷寒。故但解其肌熱。而不必發出其汗也。 前藥各加黃芩 錢五 每服三錢。加姜

李氏醫錄 卷之四 諸熱

棗煎。名人參散。許叔微 治邪熱客於經絡。痰嗽煩熱。此邪熱

淺在經絡。未深入藏府。雖用柴葛之輕。全藉參朮之力。以

達其邪。又恐邪入痰。隨用茯苓半夏。兼動其痰。合之當歸

赤芍。黃芩。并治其血中之熱。止用三錢。為劑。蓋方成

知約。庶敢用柴葛耳。此叔微一極苦心。特為發之。

四君子湯 加山藥 名六神散。治小兒表熱。去後又發熱者

世醫到此。盡不能曉。或再用涼藥。或再解表。或謂不治。此

表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。所以再熱。非熱症也。宜

用此湯。加粳米和其胃氣。則收陽歸內。而身涼矣。熱甚者

如升麻知母名銀白湯 四君子 加木香 藿香 乾葛 名七味白朮散

六君子 加柴胡黃芩白芍 名十味人參散治虛熱潮熱身體倦怠

東垣治肺熱身如燎不可近煩躁引飲而晝盛者用一味

黃芩湯以瀉肺經氣盛之火片芩 兩煎服 李士材曰余胃

吐痰腹食通脹諸藥益劇偶思東垣

治肺熱煩渴依方而服次日全愈

參蘇飲 感冒

治一切發熱皆效合四物名茯苓補心湯治

虛熱尤効

本草備要主治註釋 傷寒及時氣天行諸熱見本門

人參得黃耆甘艸 退大熱東垣曰參黃甘艸退熱之聖藥

元氣而虛 五味子 麥冬 菊花 貝母 白芍 生地

李氏醫鑑 卷之四 諸熱

陰虛生內熱 丹皮 除發熱退無 地骨皮 治有汗之骨蒸

潮人所知也退外潮人所不知病或風寒散而未盡作

潮熱往來非柴胡所能治用地骨皮走表又走裏之藥消

其清游之邪服之無有不愈 大小蘗 退熱 乾葛 解肌退熱

者故治表裏無定之風邪 柴胡 退熱 不 地膚子 除虛

秦艸 治虛勞煩熱 前胡 除寒熱 柴胡 退熱 地膚子 除虛

熱利小便此金龍胆艸 治骨間寒 木通 除煩退熱汗 通艸

退抽薪之意也 龍胆艸 治骨間寒 木通 除煩退熱汗 通艸

熱香薷 散皮膚滑石 肌石 體重熱 茯苓 退熱脾虛野

驚甲 補陰 地骨皮 同青蒿 退熱 豬苓 退大熱大熱利小

花柳 退枝子皮 退表 竹瀝 退熱 胡荽 散四 穀芽 開胃和中

則中自溫氣 使君子 收飲 菟絲子 治脾虛腎燥而生內 脾

自下熱自除

荷 治小兒驚 雞蘇 退邪 紫蘇 解肌 黃芩 除寒熱 胡黃連 治五

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛

熱 青黛 治小兒疳 白芍 補勞 生地 治血虛



五

萬諸經之火火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小  
 水而下降矣若火宜木通相火宜澤瀉利水雖同所用各  
 別心熱則火自生煩肝熱則木自生風風火相搏膠痰  
 上壅遂致中風不語有以瀉為瀉者大黃芩硝荅連枝  
 栝之類是也有以散為瀉者羌防柴葛升陽散火之類是  
 也有以滋為瀉者地黃天冬元參知母之類壯水之主以  
 制陽光是也有以補為瀉者參耆甘艸瀉火之聖藥是也  
 時珍曰枸杞地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退  
 世人多用苦寒以平連降上焦知栝降下焦致傷元氣惜  
 哉又曰知母佐黃栝滋陰降火有金水相生之義黃栝無  
 知母猶水母之無蝦也蓋黃栝能制命門膀胱陰中之火  
 知母能清肺金滋腎水之化源丹溪曰君火者人火也心  
 火也可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火天火  
 也龍雷之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏  
 之惟黃栝之屬可以降之切菴曰火有虛火實火燥火濕  
 火鬱火相火之異虛火宜補寔火宜瀉燥火宜滋潤鬱火  
 宜升發濕火由濕鬱為熱多病肝脾經所謂諸腹脹大皆  
 屬於脾請病附脾行獨丁火是也宜利濕清熱而兼補脾



壯水之主以引陽光。心屬君火，是五藏六府火之主。故諸經之熱皆應于心。醫賈曰：有陽火，有陰火，有水中之火，有土中之火，有金中之火，有木中之火。陽火者，天上日月之火，生于寅而死于酉；陰火者，燈燭之火，生于酉而死于寅。此對待之火也。水中火者，雷靈火也。即龍雷之火，無形而有聲，不焚草木，得雨而益熾。見于季春而伏于季秋。原夫龍雷之見者，以五月一陰生，水底冷，而天上熱，龍為陽物，故隨陽而上升。至冬一陽來復，故龍亦隨陽下伏。雷亦收斂入身，腎中相火亦猶是也。平日不能伸，慾以至命門火衰，腎中陰盛，龍火無藏身之位，故遊于上而不歸。是以上焦煩熱，咳嗽等症，善治者以溫腎之藥，八味丸從其性而引之，歸原使行。秋冬陽伏之令，而龍歸大海，此至理也。奈何今之治陰虛火衰者，以知柏為君，而愈寒其腎，益速其斃。良可悲哉。若有陰虛火旺者，此腎水乾枯而火偏盛，宜補水以配火，亦不宜苦寒之品，以滅火。壯水之主，以制陽光，正謂此也。如燈燭火亦陰火也，須以膏油養之。六味丸不得雜一滴寒水，得水即滅矣。獨有天上火入于人身，

氏醫鑑 卷之四

如河間所論六氣暑熱之病及傷暑中暑之疾，可以凉水沃之，可以苦寒解之。其餘爐中火者，乃灰土中無焰之火，得水則熄。見濕則滅，須以灰培實，以溫燼補中益氣歸脾六君子理中建中人身脾土中火，以甘溫養其火，而火自退。經曰：勞者溫之，損者溫之。甘能除大熱，溫能除大熱，此之謂也。空中之火，附于木中，以常有坎水滋養，故火不外見。惟乾柴生火，燎原不可止，遇力窮方止。人身肝火內熾，鬱悶煩燥，須以辛涼之品發達之，逍遙散經曰：木鬱則達之。火鬱則發之，使之得遂，其炎上之性，若以寒涼下之，則愈鬱矣。熱藥投之，則愈熾矣。金中火者，凡山中有金銀之礦，或五金埋瘞之處，夜必有火光。此金鬱土中而不得越，故有光耀發見于外。人身皮毛空竅中自覺針刺蚊咬及踈頂如火炎者，此肺金氣虛，火乘虛而現。肺主皮毛，故也。補中益氣合生脈散經曰：東方木實，因西方金虛也。補北方之水，即所以濟南方之火。雖曰治金中之火，而通治五行之火，無餘蘊矣。人火可以濕伏，可以水滅，可以直折黃連之屬，可以制之。相火者，龍火也。雷火也，得濕則熄。遇水則熄，不知其性，而以水折之，以濕攻之，適足以去其

燭燭天物窮方止矣。其性者以火逐之。則灼灼自消。惟  
太陽一照。火自消滅。此得水則熾。得火則滅之一驗也。桂  
耶。與火同氣。直入腎中。按其窩宅。安得不引之。而歸原  
耶。人皆曰滅火。而予獨以桂附溫補。天其之火。以治陰  
精與寒。同焚也。

黃連解毒湯 治一切大熱。表裏俱盛。狂躁煩心。口燥咽乾。

大熱乾嘔。錯語不眠。吐血衄血。熱甚發斑。毒即火。

黃連 黃芩 黃柏 枝子 等分。本方去枝子。名栢皮。

湯治三焦實熱。用粥丸。各三補丸。治三焦有火。二便閉結。

及濕痰夜熱。經曰壯火食氣。少火生氣。故少火宜升。壯火  
壯火降。而少火升。氣得升。而血得養。三焦皆受益矣。

李氏醫鑑 卷之四

涼膈散 治心火上盛。中焦躁實諸症。

紫雪 傷寒變 治一切火熱 治諸火方 散入各門

本艸備要主治註釋

茯苓 入肺瀉熱 肉桂 補命門相火。兩腎中間先天  
地骨

皮 降肺中 桑白皮 瀉肺 黃柏 瀉膀胱 槐花 瀉大腸 苦棟子

引心包相 川椒 入右腎命 竹瀝 降火 竹茹 清肺金 淡竹葉 寒

天竹黃 清心 梨 清肺 枇杷葉 清肺和 蓮子 能交水火

安靖上下 黃芩 清心 降火 甘肅 清心 人參 瀉肺火。得升。降上焦

焦渴腎火。得冬。瀉火而生。玄參 能壯水。以制火。最牛膝

能引火 菊花 能益金水。二藏 天冬 降火 麥冬 滋腎水 桔梗

之火 貝母 瀉心 瓜蒌仁 清上焦 天花粉 寒降 夏枯草 經肝

白芍 瀉肝 赤芍 瀉肝 丹皮 瀉血中 紫艸 入心包 凌霄花 去

血中 白茅根 除伏 蘆根 寒降 連翹 苦入心。故人。手少陰。厥

柴胡 平肝胆 三 前胡 下氣降 升麻 升發 木賊 火散 知母

上清肺金而瀉 黃芩 瀉中焦 黃連 入心瀉火瀉 龍胆艸 肝

胆而瀉火相火。寄于肝胆。有瀉 青黛 瀉肝散五 大黃 瀉一

熱血中 木通 降心 澤瀉 瀉腎經 燈心 降心火 瞿麥 降心 山

豆根 瀉心火。以 射干 瀉實 石膏 清熱 滑石 降心 犀角 瀉肝

李氏醫鑑 卷之四 天

童便 能引肺火下行 秋石 為滋陰降 浮石 寒降 香附 得黃

降火 黑鉛 燒酒 醋 釀成鉛水 降火 神方 然 硃砂 火安君主

之火 之

潤燥

諸方收  
人各門

經曰諸清枯潤乾勁破揚皆屬於燥乃肺與大腸陽明燥  
金之氣也金為生水之源寒水生化之源絕不能潤肺周  
身營養百骸故枯槁而不潤澤也或因汗下亡津或因房  
勞虛竭或因服金石或酒厚味皆能助火而損  
真陰也燥在外則皮膚乾癢在內則津少煩渴在上則咽  
焦鼻乾在下則腸結便秘在肝則筋脈無力在肺則細  
澀而微皆陰血為大所傷也治宜甘寒滋潤之劑甘能生  
血寒能勝熱潤能去燥使金旺而木生則火平而燥退矣  
燥乃陽明秋金之化經曰金木者生之成終始又曰木  
位之下金氣承之蓋物之化從于生物之成從于殺造化  
之道生殺之氣猶權衡之不可輕重也生之重殺之輕則  
傷其分布之政不惟生氣不得升而收氣亦不得降經曰  
逆秋氣則太陰不收肺氣焦清蓋肺為生水之源上焦  
開發如霧露氣是之謂氣氣即水也火旺尅金則肺病  
而津液日枯又曰脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀  
胱脾虛則土弱不能生金肺無所資遂不能生水故外則  
皮毛枯槁內則二便閉結而為燥症宜滋肺和脾壯水養  
血

李氏醫錄

卷之四

潤燥

李

本艸備要主治註釋

玄明粉 潤燥 白石英 潤燥 食益 潤燥 阿膠 潤燥 栢子仁 潤燥 郁  
李仁 潤燥 治大腸氣滯 黃栢 潤燥 補腎 槐實 潤燥 肝 桃仁 潤燥 治血 牛  
蒡子 潤燥 治陽痿 肉苁蓉 潤燥 滋陰 知母 潤燥 下焦 細辛 潤燥 腎 燥水  
腎燥細辛之辛能行水氣以潤之腎燥者心亦燥停心下則  
大腸干水故燥也經口腎苦燥急食以潤之 甘蔗 潤燥  
利 枳椇子 潤燥 柿乾 潤燥 杏仁 潤燥 上焦 桃仁 潤燥 血 大棗 潤燥 心  
胡桃 潤燥 肺 竹茹 潤燥 肺 金 竹瀝 潤燥 肺 杜仲 潤燥 肝 蜜蒙花 潤燥 肝 胡麻

潤五牛乳 潤腸 龜板 潤燥 黃精 潤心 葳蕤 潤心 天冬  
滋腎 麥冬 潤肺 欬冬花 潤肺 紫苑 潤肺 百部 潤肺 半夏 潤肺 花粉  
潤肺 瓜蒌 潤肺 貝母 潤肺 當歸 潤肺 川芎 潤肺 補肝 紅花 潤肺 葶根  
燥大黃 芒硝 玄明粉 俱潤

李氏醫錄

卷之四

潤燥

李

濕熱

中濕似中風 頭重身痛 肢節不能轉側

有在天之濕雨露是也 在地者本乎氣故先中表之榮  
衛有在地之濕泥水是也 在地者本乎形故先傷肌肉筋  
骨血脉有飲食之濕酒水乳酪是也 胃為水穀之海故傷  
于脾胃有汗液之濕謂汗出沾衣未乾解汗者是也 有太  
陰脾土所化之濕不從外入者也 陽盛則火勝化為濕熱  
陰盛則水勝化為寒濕其症發熱惡寒身重自汗筋骨疼  
痛小便便澀大便溏泄腰膝不能轉側胸膈肉如泥按之  
不起 熱上壅則下不通下不通則熱上壅又濕鬱則  
為熱熱蒸更為濕濕熱亦熱氣壅塞水液不行久而成濕  
寒濕久留亦變為熱 經曰因于濕首如裹濕氣蒸于上  
故頭重又曰濕傷筋故大筋緩短小筋弛長緩短為拘攣  
長為痿濕勝則濡泄故大便溏泄大便溏泄如泥濕氣從  
下受之故附腫諸濕腫滿皆屬脾土故腹脹肉如泥濕氣  
入腎腎主水水流濕各從其類故腰膝痛 濕為陰邪經  
曰地之濕氣感則害皮肉筋脈濕者土之氣土者火之子  
故濕每能生熱熱亦能生濕如夏熱則萬物潤澤也 濕

李氏醫鑑

卷之四

三

羌活勝濕湯

見頭

通治濕症如身重腰痛沉然經中有

寒也加酒防已 五附子 五 陽微汗出惡風故用黃耆炙  
而為表散 鶴皋曰脾弱傷濕者 陳平胃之類主之今  
濕流關節非前藥所宜矣無礙不入惟風為能故凡關節  
之病非風藥不能到也 小方除濁活變劑用芍甘坤加升

麻杏木名羌活除濕湯  
治風濕相搏一身盡痛

腎着湯

治傷濕身重腹痛腰冷不渴小便白利飲食

如故病屬下焦

腎主水濕性下流必舍于其所合而歸于  
故腰身重足若卸也此由身 宜明用治胞痺膀胱熱痛  
勞汗出衣裏冷濕久入得之

清於小便上為清涕

風寒濕邪客于胞中氣  
不能化故水道不通

乾姜 炮 茯苓 兩 甘艸 炙 白朮 炒 三

有寒者加附子經心錄

加肉桂澤瀉為杜仲牛膝治同

此腎病而皆用脾藥蓋土  
正所以制水也喻嘉言曰

腰冷如坐水中非腎之精氣冷也故飲食如故便利不渴  
且與腸胃之府無預况腎藏乎故但用甘溫從陽淡滲行  
水之藥足矣勿過曰此乃  
外感之濕邪非腎虛也

李氏醫鑑

卷之四

三

五苓散加羌活名元戎五苓散治中焦積熱本方加 石膏滑  
石 桂苓甘露飲以清六府之熱本方加蒼木名蒼桂五苓

散治寒熱

猪苓湯

利濕湯熱

通治諸濕熱口渴溺赤

吳鶴皋曰以  
猪苓茯苓澤

黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩

黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩

統治三焦積熱等症

黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩

治中外諸熱

黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩 黃連 兩 黃芩 兩

淡豉 麻黃

甘桔湯

加芥通咽名如聖湯治上焦風熱 宋仁 小方

加連通薄荷竹 各桔梗湯治上焦風熱

藿香正氣散 治上焦壅熱

藿香治上焦壅熱能理脾肺之  
正氣正氣通暢則邪逆自除

本草備要主治註釋

石菖蒲治上焦 半夏治中焦 艾治下焦 秦艽治風 茵芋治風 防風治風 木瓜治風

藥本治下焦 羌活治風 獨活治風 白芷治風 細辛治風 木瓜治風

厚朴治下焦 木賊治風 浮萍治風 蒼耳子治風 木通治風 黃連治風 苦參治風

龍胆草治下焦 甘遂治風 附子治風 大戟治風 防已治風

澤瀉治下焦 車前子治風 附子治風 大戟治風 防已治風

李氏醫鑑 卷之四

牀子 白菟 艸菟 金銀花 扁豆 赤小豆 胡麻

苡仁 蒜俱去 干姜燥脾 白礬 兒茶 海螵蛸祛風

牡蠣 原蠶砂 茯苓去濕 松節燥血中 栝子仁 桑葉

猪苓 黃柏 五加皮 海桐皮 蕪荑 皂莢 花

椒 蒼木 白朮俱去 黃芩 商陸 白蘚皮 甜瓜蒂

椿樗皮 榆白皮 木瓜俱去 滑石治熱除濕之要

竅不獨小便上開腠理而發表是除上中之濕熱下利便  
溺而行水是除中下之濕熱去則三焦寧而表裏和濕  
去則關門通而陰陽利矣河間云元（燥可去濕於白皮  
故通治上下表裏諸病蓋是此意）赤小豆之類是也  
滑石為至燥之劑蓋皆以行水之藥為燥而不以燥熱之  
藥為燥也五苓湯濕勝故用桂枝水痞苓瀉熱勝故用滑石

葦莖治陽明 青箱除風 達砂去上焦 辛夷治風 蕤仁散熱

槐花風熱 竹茹去上焦 淡竹葉除上焦 甘菊去風 荊芥散熱

白芷 細辛 麻黃 槐花 穀精俱除 風熱

李氏醫鑑 卷之四

舌

噎膈

戴云噎膈有四血虛氣虛有熱有痰血虛脉必數而無力氣虛必緩而其力氣血俱虛則口中多出沫但見大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛四物氣虛四君熱以解寒痰以二陳三因有五噎氣憂勞思食也氣噎者心忤上下不通噎噦不做胸背痛憂噎者遇天陰手足厥冷不能自溫勞噎者氣上膈脇下支滿胸中填塞思噎者心忤悸善忘目視眩瞠食噎者食無多少胸中苦寒痛不得喘息五膈憂思怒喜恐也憂膈者胸中氣結津液不通羸瘦短氣思膈者胸膈逆滿噎塞不通嘔則酸心飲食不消大便不利怒膈者胸膈逆滿噎塞不通嘔則筋急惡聞食臭喜膈者五心煩熱口舌生瘡四肢倦重身常發熱胸膈引背食少恐膈者心腹脹滿咳嗽氣逆腹中者令雷鳴逆脾痛不能食經論三陽結謂之膈大腸小腸膀胱結熱也小腸結熱則血脉燥大腸結熱則後不通膀胱結熱則津液涸三陽結熱則前後閉反而上行此所以噎食不下縱下而復出也宜先潤養因而治下或涎痰

李氏醫鑑

卷之四

噎膈翻胃

藝

上阻用苦酸微瀉涌之。噎膈多由氣血兩虛胃冷胃弱而或飲可下而食不可下。稿在吸門卽喉間之脈會食下胃脘痛須臾吐出稿在賁門胃之上口也。此上焦名噎食。下良入吐出稿在幽門胃之下口也。此中焦名膈朝食暮吐。稿在關門在大小腸之交分別清濁之處小腸下口也。此下焦名翻胃。又有痰飲食積瘀血壅塞胃口者如寒痰胃冷則宜姜附參朮胃弱宜常滋潤宜四物牛羊乳血瘀者如薑汁。胃稿胃冷脾不磨食故氣逆而成反胃氣血不足其本也。曰痰飲曰瘀血曰食積其標也。胃稿者滋血生液胃冷者溫中調氣。曰反胃噎膈天便燥結宜牛羊乳時時嚙之兼服四物湯不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也。胡菴曰膈噎不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛羊乳加薑汁或姜汁或陳酒爲佳。丹溪禁用香燥藥所言補血益陰潤燥和胃調中却無其方。可急食醫胃口氣滯膈塞未必成噎也。服青反相克寬快之藥不已則噎成矣。李士材曰悲思過度憂怒不節則氣機凝阻清濁相干違其運行之常乃成噎塞。張繼祥曰噎塞是神思間病當靜觀內養以寧。

此

其心心君泰然則五火退聽營衛安和矣○噎者飲食入咽咽碍不通梗清難下。噎症必兼寒症故東垣云堵塞咽喉陽氣不得上出者名曰寒五藏之所生陰也血也陰氣不得下降者曰噎六腑之所生陽也氣也夫咽寒于胸膈之間令諸經不行口開日脫氣聞欲絕當先用辛甘氣味升陽之藥引胃氣以治其寒益智艸豈遣人麥黃者當歸來胡升麻之類是也加通寒藥以治其標不香青皮陳皮麥冬之類是也寒月陰盛加吳茱萸以瀉陰寒之氣暑月陽盛加青皮陳皮益智黃柏散寒氣泄陰火之上通不日清濁相干亂于胸中是爲人悅氣不宜通最爲急症不急治之諸變生矣噎與羣皆由陰中伏陽而作也冬三月陰氣在外陽氣內藏外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏固密之大要也吳茱萸主之吳茱萸陳皮益智艸豆蔻黃者升麻姜蘇澤瀉黃黃當歸人參甘艸木香青皮半夏麥芽蒸餅爲丸湯送三錢夏三月陽氣在外陰氣在內啞病值此時天助正氣而挫其邪氣不治自愈或不愈者陰氣極甚正氣不伸耳以四君子湯送利膈丸木香兵郎各七錢五分大黃厚朴各二兩人參當歸各

有以聖金

卷之四

噎膈反胃

美

香甘積實各一兩采爲丸每飲食入胃便吐涎沫如藥  
子白蘞脾主涎脾虛不能約束津液故涎沫自出非人參  
白朮蓋胃不能攝也 古人指噎塞爲津液枯乾故水液  
可行更爲便瀉爲在上焦懸竊疑之若果津液何以食緣  
下咽涎隨上湧乎故夫膈噎之間受通之氣不得表裏者  
皆冲脉上行之氣所作也惟氣通故水液不能居潤下之  
常道也夫噎令耳若以爲津枯而用滋潤之劑豈不反益  
其相火貴深原其故擬主一方至于隨症加減在圓機者  
通變也七情傷中當多用辛味以橫行而散半夏白豆蔻  
蓋智生姜炙皮之類少用苦味以直行而泄本香烏藥之  
劑然中氣即傷徒與散泄邪未養除正反受困必調養中  
宮以全生生之本人參黃耆白朮甘神之類喉中如有物  
食不下者迷氣也俗名梅核加昆布訶子膈間作痛多是  
瘀血歸尾桃仁韭汁童便甚者加酒浸大黃微利之 噎  
而於不出者竹茹五味子生姜扶寒脉沉遲者肉桂附子  
扶熱脉洪數者黃連木通噎而自沫大出聲如羊屎爲不  
治之症如飲食難下痰涎聚住不得入者雖人而涎沫隨  
出者先以東復丹擦去其痰更以半夏枯礬皂角少許白

李氏醫鑑

卷之四

嘔隔反胃

李

茯苓枳殼竹瀝白明粉姜汁為丸如大便燥結塊如羊屎  
自製潤腸利膈丸當歸枳殼木香俱即人參大黃滴木為  
丸并服牛乳人乳梨汁松仁脈緊而乳緊則為寒乳則為  
虛虛寒相搏脈為陰結而逆其人則嘔吐噎膈皆屬干  
胃但以氣血多少為異耳○嘔者陽明也陽明多血多氣  
故有聲有物氣血俱病也氣逆者散之故以生薑為主吐  
者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也以橘紅  
主之噎膈白少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也  
以半夏主之三者皆因脾虛或寒氣客胃飲食所傷以丁  
香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類分其經絡察其虛實不  
可混也○邪在上脘之陽則氣停而水積故飲之清濁濕  
亂則為痰為飲為涎為唾變而為嘔邪在下脘之陰則血  
滯而穀不消故食之清濁不分則為噎塞為痞滿為痛為  
脹變而為吐邪在中脘之氣交者盡有二脘之病○嘔從  
氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必雨注也○  
吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱出象萬物之于地  
○嘔吐則氣血俱病法飲食之氣交飲食皆出○然上脘  
非不吐食也設陽中之陰亦病則食入即吐非若中脘之

李氏醫鑑

卷之四

嘔隔反胃

李

弱嘔粥藥到口即吐先以生薑湯下養正丹俟藥可進則  
以二陳加枳實砂仁桔梗厚朴姜汁服之虛者加人參本  
因中寒用熱藥太過以致嘔逆二陳加白芷薤白沉香因七  
情而得者理中加木香沉香烏藥○陰虛而龍雷之火亢  
逆宜姜汁炒熟地加按即黃柏沉香導之使下○脾胃久  
傷含原空虛因而嘔吐宜焦米神曲陳皮人參姜棗和之  
則自止○氣者身熱骨痛食入則先嘔而後瀉此上焦傷  
風閉其腠理經氣失道邪氣內鬱麥冬湯主之麥冬蘆根  
竹茹人參陳皮白木茯苓甘神歲時生薑○走哺者下焦  
虛熱便不通氣逆嘔吐人參湯主之○人參白木陳皮茯苓  
石香交諸苓歲時知母蘆根汁○食已暴吐脈浮而洪  
此上焦火逆也宜桔梗枳殼陳皮厚朴木香枳白芍補之○下  
焦火逆也宜橘紅煎湯入甘蘆藥生薑汁細細呷之○惡  
心心中大欲吐不吐多屬胃虛宜半夏茯苓陳皮白木  
生薑○仲景云欲吐者不可下又用大黃治食已即吐何  
也曰欲吐者病在上因而越之可也逆之使下則必憤鬱

胃火發微胃寒脾弱不能消穀朝食則暮吐暮食則朝吐或飲食入胃既下而復出者此胃之虛也宜理中湯為主甚者加附子若脈微者非熱不殺穀乃火性上炎多升少降應與異功散加黃連沉香當歸生地此症至口吐白沫者如羊大便為危急必與養氣以培其陽蓋血以滋其陰則金無畏火之炎皆有生木之漸脾胃健運飲食消然破氣過多中氣因而不運當異功散加香砂使氣旺則能健運之今終治反胃久不愈者或補兼施小黃龍丸漸次加之開胃白透宜久服不致損胃或補兼施小黃龍丸漸歸生地人參甘肅大黃水九然服通利之劑過多血液耗竭轉加閉結宜用杏仁去皮尖炒四兩松仁四兩猪脂蒸淨其痰涎然後用蘇合九半夏曲二兩桔梗一兩牙皂炙玄明粉白茯苓枳殼各一錢竹瀝薑汁為丸火煨至能生土其脈沉遲宜八味九減熱地加沉香砂仁瘀血阻滯者代抵當湯作九如芥子大每服三錢去枕仰臥細細李氏醫鑑卷之四 噎膈反胃 癰

麻仁散子 治噎膈血少閉結  
 芝蔴 去壳真蘇子 二味細研水淘取汁數碗再入白米半星者立時通潤 多少得宜者成粥飲服之大便秘結如赤治老人氣秘

橘皮麻仁丸 治同上  
 橘皮 杏仁 麻仁 各三兩 郁李仁 五錢 右以橘皮為末三

仁俱搗將棗煮取肉同烏和丸每服四五十九粒實湯下  
 人參利膈丸 治噎膈翻胃

人參 當歸 甘艸 枳實 藿香 各一木香 棋郎 各  
 大黃 厚朴 姜汁 酒水九每服五十九粒溫水下  
 三白酒 治噎膈翻胃 養血 依痰

火酒 白糖 白蘿下 生梨 各一 將梨下搗汁併糖  
 入酒內封固罈口三日後徐徐飲之

延真膏 養胃寬中治噎膈翻胃有奇功 補中  
 人參 四兩 白朮 白茯苓 山藥 枸杞 蓮肉 各二兩 何首烏  
 三兩 用竹 山萸肉 二兩 肉蓯蓉 五兩 當歸 二兩 生地 熟  
 刀刮去皮 麥冬 各六兩 俱 去心 二兩 甘艸 汁浸一  
 地 天冬 麥冬 用浸一宿 志肉 夜已上共搗如泥取在  
 李氏醫鑑 卷之四 噎膈反胃 癰

右藥末藥汁加白蜜 一斤 和勻入罈內以箬皮封固入鍋  
 內水煮一宿成膏每服半酒鐘 注石山曰翻胃與噎膈相  
 酒勝于 他方

韭汁牛乳飲 治胃腕有死血乾燥枯稿食下作痛翻胃便  
 秘 韭萊汁 別木連 牛乳等分時時呷之有痰阻者加羊  
 汁本方去牛乳加陳酒治血膈 韭汁端 清瘀血

韭汁辛溫益胃消痰牛乳甘溫潤燥養血瘀去則胃無阻  
 血潤則大腸通而食得下矣

四物湯 加橘紅 紅花 酒 桃仁 留 蟬 防 其 治噎膈翻胃



秘結

秘方 治噎膈

童便 牛羊乳 韭汁 竹瀝

蜜姜 燉去 甘蔗汁 解毒

氣虛加四君子 血虛加四物

胡荽升 治反胃氣結

烏骨雞 一隻 胡荽入雞腹縫之熱食漸盡再一隻妙甚

効

十漿湯 攻裏 除大棗加大黃 黑丑 輕粉 名三花神

佑九 治壯寔人積痰翻胃 服法見

李氏醫鑑 卷之四

代類旋覆湯 治逆 周揚俊曰 此湯予每借之以治反

七氣湯 治七情鬱結痞滿噎塞

人參養胃湯 五膈寬中散 三一承氣湯 均治噎

木艸備要主治註釋

韭汁 治噎 姜汁 治噎 童便 降 人乳 牛乳 羊乳 潤燥 蘆根 止

茅根汁 治噎 甘蔗汁 治噎 麥汁 治噎 或加燒酒 米醋 白蜜

和諸汁頓服亦佳 確砂 治噎 韭汁 姜汁 牛乳 各一杯

細細緩緩溫服 姜汁 下氣 治噎 確砂 治噎 白豆蔻

草蔻 治噎 逆反胃 肺胃 白芥子 治反 吳茱 治胃 冷 桂心

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

治噎 訶子 治噎 蓬砂 治噎 百神霜 治噎 白水牛 喉 除南

清微痛右脈其清開脈沉此瘀血在胃脘之氣鬱而  
成痰厥寒食道也以韭汁半盞細細冷呷盡斤而愈  
有人血耗便若羊屎病反胃半午脈澀而不勻不大便  
者八九日先與甘蔗汁煎六君子湯加附子大黃與之  
何便潤令  
以乳服之

### 附外科正宗方

五膈綱胃散 治五膈食不下嘔呃痰多咽喉噎塞胸膈滿  
痛

人參七分 桔梗一分 沉香一分 半夏二錢 白朮一錢 甘  
多八分 白豆蔻五分 枳頭糠二錢 草澄茄五分 枇杷葉一錢 木香  
二分不加姜 陳老倉米一煎至一鍾 食前一服食後一  
見火

### 李氏醫鑑

卷之四

五

服臨卧一服

五膈散 治胸膈痞悶諸氣倍聚脇肋脹滿痰逆惡心不進  
飲食

枳殼七分 青皮七分 大腹子七分 半夏曲五分 木香二錢 南星二錢  
炮一錢 麥芽一錢 干姜一錢 草果仁七分 白朮一錢 加姜  
二分 七片空心少服食後多服

瓜蒌實丸 治胸膈痞滿胸脇作疼喘急煩悶五膈五噎翻  
胃服之皆効

瓜蒌仁易 枳殼 半夏姜汁煮 桔梗米泔浸 共為細

禾用濃姜汁煮神曲糊丸每服五七十丸食後姜湯下日  
三服

### 東坡家藏仙方

單用藍錠白湯化下收次効凡用藥內必用藍錠或青黛  
亦佳此病多用熟藥反燥津液恐未合

太倉丸 治翻胃及飲食不進脾胃弱者尤宜服之

白豆蔻 砂仁各二兩 陳倉米一升用黃土炒 為細末用生

姜自然汁合和為丸每服一百丸食後姜湯下

又方 用真阿膠錢五 取大路邊行人拋下乾糞炒存性作末

### 李氏醫鑑

卷之四

五膈反胃

五

五錢同阿膠末和勻五更初以姜片蘸食能起死回生

又方 以手巾裹枳頭糠時時拭齒治卒噎膈或括下枳頭  
糠口內含之或煎湯細細呷嚥下効

李氏醫鑑卷之五

暑

音調

暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也

暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也... 暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也... 暑為陽邪心屬離火故暑入心從其類也...

為症不一彼為寒邪傷形此則暑熱傷氣... 為症不一彼為寒邪傷形此則暑熱傷氣... 為症不一彼為寒邪傷形此則暑熱傷氣...

濕皆地之氣氣濕所以中足經暑乃天之氣係清邪

所以中足少陰心經其症多與傷寒相似... 所以中足少陰心經其症多與傷寒相似... 所以中足少陰心經其症多與傷寒相似...

則為邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治... 則為邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治... 則為邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂症輕易治...

四味香薷飲

治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重自汗

肢倦或煩渴或吐瀉暑為陽邪故蒸熱暑必兼濕故自汗... 肢倦或煩渴或吐瀉暑為陽邪故蒸熱暑必兼濕故自汗... 肢倦或煩渴或吐瀉暑為陽邪故蒸熱暑必兼濕故自汗...

本方除扁豆名黃連香帶飲治中暑熱盛口渴心煩下

鮮血本方除黃連名三物香帶飲治傷暑嘔逆泄瀉再加

茯苓甘艸名五物香帶飲治中暑再加木瓜名六味香

帶飲治中暑濕盛熱盛則加黃連以清心火濕再加人參

黃耆白朮陳皮名十味香帶飲治暑濕內傷頭重吐利身

倦神昏此方感而兼內傷之症故用香帶三物香帶飲加

羌活防風治中暑兼中風僵仆搐搦或再加黃耆白芍

得病手足搐搦如三物香帶飲加乾葛名香帶葛根湯治

暑月傷風咳嗽治傷暑泄瀉本方加茯苓治瘧瘧不寒

李氏醫鑑卷之五

日神清當責之暑邪暑先本方用香帶扁豆厚朴木瓜甘

艸加香附陳皮蒼朮名三香散蓋合香帶飲香治外感內

傷身熱腹脹

清暑益氣湯治長夏濕熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿

氣促身熱心煩口渴惡食自汗身重肢體痠痛小便赤澀

大便溏黃而脈虛者治傷暑人脾土受傷故肢體困倦暑

在上則生腫脹故胸滿惡食暑先入心汗為心液故自汗

濕盛故身痛身重寒傷形表邪外盛故脈大而而餘暑傷

氣元氣耗傷故脈虛而不足

黃耆 人參 白朮 蒼朮 神麴 青皮 陳皮 白甘

神麥冬 五味 當歸 黃柏 澤瀉 升麻 葛根

姜棗煎東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃耆開脾理止汗

以人參補之陽旺自能生陰血也黃耆開脾和血又加黃

柏以救腎水蓋甘寒瀉火火滅則心氣得平而安也心火

乘脾故用炙甘草瀉火而補脾少用熟地滋陰也中滿者去之

若腹中急痛急痛者却宜多用炙甘草去人參為清濁相干

故以橘皮理之長夏濕勝故加三木澤瀉上下分消其濕

熱也濕勝則食不化妙藥辛甘青皮辛溫消食快氣五味

麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺氣救庚金也腎實曰

有傷暑吐衄者暑傷心虛不能生血不宜過用寒涼以

瀉心宜用黃耆益氣加丹皮生地犀角之類蓋暑傷心

亦傷氣其脈必虛以參耆補氣使能攝血斯無弊也

本方除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯治暑傷元氣佳

夏倦怠胸滿自汗時作頭痛時痛時止本方除白朮黃

李氏醫鑑卷之五

麥冬五味加茯苓枳殼柴胡羌活防風連翹知母各補肝

湯治陰汗如水陰冷如水脚痿無力

生脈散治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肺虛而咳肺主

熱傷肺故氣短金為火制不能生水故口渴氣少故倦怠

肺主皮毛虛故汗出虛火乘肺故欬嗽東垣曰津液大腸

所土三代之時為庚金受囚若亡津液汗大泄濕熱亢甚

燥金受囚風木無制故風濕相搏骨節煩痛一身盡痛也

人參 麥冬 五味子 七

肺主氣肺氣旺則四藏之氣皆旺虛故脈絕氣短也心主

脈肺朝百脈百脈皆朝于肺補肺清心則氣充而脈復故

生脈也人有將死脈絕者服此能復生之功其大

月炎暑火旺壯金當以保肺為主清晨服此能益氣而祛

暑也東垣曰夏月加黃耆

甘州服之令人氣力湧出

消暑丸 治伏暑煩渴發熱頭痛脾胃不利

半夏一斤醋五 茯苓 甘艸半斤 姜汁糊丸勿見生水熱

湯下有痰生薑湯下長夏炎熱濕土司令故暑必兼濕症

氣不得通化此方不治其暑而治其濕用半夏茯苓行水

之藥少佐甘艸以和其中半夏用醋煮者能開胃散水

飲熱解毒也使暑濕二氣俱從小便下降則脾胃和而煩

渴自止矣局方取此名為消暑丸意甚深遠傷暑而發熱

頭痛者服此尤良

五苓散見濕 治暑毒入心發熱大渴小便不利及暑濕

搏自汗身重渴者去桂加黃連朱丹溪謂伯仁每疑暑病

氣汗為心液汗多必致亡陽惟用香薷飲五苓散利水之

藥使暑氣從小腸膀胱下降則病易愈而元氣無損矣

本方合黃連香薷飲名香薷湯治傷暑泄瀉加姜薑煎水

方合平胃散名胃苓湯治中暑傷濕停飲夾食腹痛泄瀉

桂苓丸 治胃暑煩渴引飲過多腹脹便赤兩桂茯苓

桂苓甘露飲 治中暑受濕引飲過多頭痛煩渴濕熱便閉

滑石四兩 石膏寒水石 甘艸各二兩 白朮茯苓 澤瀉各一 猪苓

肉桂各五錢 每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加人

參乾葛各一兩 藿香五錢 木香一分 各桂苓甘露飲每服三錢

治伏暑煩渴脈虛水逆渴欲飲水水入即吐名水逆

人參白虎湯見火 本方加人參三兩 治太陽中暈身熱汗出

惡寒足冷脈微而渴身熱惡寒在表足冷脈微又不可表 本方加人參

白虎加蒼朮湯治濕溫脈沉細者沉細屬濕先受暑後受

症照冷腹痛頭眩身痛多汗而渴而東垣曰動而傷暑火

熱傷氣辛苦之人多得之宜入參白虎湯而傷暑濕勝

身重安樂之人多得之宜白虎湯而傷暑濕勝

加柴胡黃芩半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴

竹葉石膏湯方見大門 治傷暑發渴脈虛

理中湯加黃連 連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷

六一散 治傷寒中暑表裏俱熱煩躁口渴小便不通瀉

熱瘧霍亂吐瀉解酒食毒暑熱皆陽邪在表則發熱在裏

在下則便閉或熱瀉則瀉痢霍亂發症在上則瀉

滑石六兩 甘艸二兩 冷水或燈心湯下丹溪曰瀉瀉瀉

本方加辰砂少許清 名益元散加薄荷少許清 名雞蘇散

加青黛少許清 名碧玉散治同

獨聖散 治太陽中暈身重痛而脈微弱夏月傷冷水水漬

出之陽反中入內故身熱重痛以瓜蒂搗去胸中之水則皮中之水自行

乾霍亂吐方 治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹中太

痛者 燒盆 熱重便三飲而三吐之 吐瀉不得邪結

中焦醎能軟堅可破積痰宿食炒之則苦故能涌吐重便

本人身下降之氣引火下行乃其舊路味又醎寒故瀉火

甚速。此由脾上鬱極而不得發以宣涌于上。潮沙于下。則  
中通矣。方極簡易而有回生之功。不可忽視。二味非調陰之不通也。陰既不通。血亦不  
行。兼用行血藥也。

二氣丹 治伏暑傷冷。二氣交錯中脘痞結。或嘔或瀉。霍亂  
越 硝石 硫黃等分。末。石器炒成砂。再研。糯米糊丸。  
梧子大。每服四十九。井水下。

霍香正氣散 感胃 治傷冷傷濕中暑霍亂吐瀉。宜增減用之。虛弱人

六和湯 治和六氣 治夏月飲食不調。內傷生冷。外傷暑氣。寒熱

李氏醫鑑 卷之五 七  
交作。霍亂吐瀉。及伏暑煩悶。倦怠嗜卧。口渴便赤。六和者。和風寒暑濕燥火之六氣。夏月感之為多。故用諸藥。匡正脾胃。以拒諸邪。

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜 人  
參 白朮 赤茯苓 甘艸 加姜棗煎。傷暑加香薷。傷

冷加紫蘇。一方無白朮。一方有蒼朮。

七氣湯 治七氣湯 治陰陽反戾。吐利交作。寒熱眩暈。痞滿噎

塞。  
縮脾飲 理脾清暑 清暑氣。除煩渴。止吐瀉。霍亂。及暑月酒食所

傷。

砂仁 草菓 根去 烏梅 甘艸 炙四兩 扁豆 炒 乾葛 二兩

理中湯 治霍亂若陰寒所致者。宜此湯。

大劑散 溫中散 治胃暑伏熱。引飲過多。脾胃受濕。水穀不分。

清濁相干。陰陽氣逆。霍亂吐瀉。藏府不調。

乾姜 桂 杏仁 去皮 甘艸 等分。先將甘艸用白砂炒。

次入姜杏炒過去。砂合桂為末。每服二錢。夏月過于飲冷。仲越故氣逆而霍亂吐瀉也。脾胃喜燥而惡濕。喜溫而惡寒。桂散寒燥濕。杏仁利氣調脾。皆辛甘發散之藥。升伏

陽于陰中。亦從治之法也。如傷暑無寒症者。不可執泥。中傷暑熱。陽外陰內。故多用暖劑。如大劑散香薷飲之類。

大非辛熱。逆發故亦治之。然有陰陽二症。寒熱不同。治當審慎。此方非治暑。乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳。

李氏醫鑑 卷之五 七  
霍亂絞腸沙 以針刺其手指近甲處二分。半許出血。即安。

仍先自兩臂將下。令惡血。終于指頭後刺之。刺音七

諸積聚  
易門  
伏梁  
瘕氣

積聚病。或有不名。各異積者。跡也。有形。可據。五穀所生。痛有常處。聚者。注也。流注上下六府所成。或聚或散。或散者。散也。亦猶積也。腹中有塊。按之應手。或散者。散也。亦猶聚也。雖云堅硬。或時無有塊。按之應手。或散者。散也。亦猶聚也。雖云欲知其物。何所依附。腸胃迴滯。曲折之處。暫爲棲駐。久成窠口。而脂津液蒸薰。藏府觸動。其根故爲痛矣。雖塊積聚。患在心腹。多見于男子。癥瘕之疾。患在臍下。多見于女人。婦人有塊。多是死血凝于血海。驗症可決。治之之法。養正自除。驟川下藥。徒損其氣。化痰開鬱。和中行氣。積久成形。謂之積。腸陰聚散無常。謂之聚。屬陽。積多是血。或痰。或食。聚多是氣。或痰。或堅而不移者。名積。推移不定者。名聚。潁古曰。養正積自除。劉菴曰。壯人無積。虛人則有之。皆由脾胃怯弱。氣血兩衰。四時有感。皆能成積。若遂以磨堅破結之藥治之。病似去而人已衰矣。故善治者。當先補虛。使血氣周流。積自消如滿座皆君子。則小人自無容地而退矣。不問何病。先調其中。使善飲食。是其本也。血凝氣聚。

卷之五

按之堅硬曰癥難鞭硬而聚散無常曰瘕尚未至癥也皆血病瘕小腹積聚腹內積聚也其病多見于男子積聚之原則一其在藏者終始不芟其在府者發痛轉移隨氣結束爲聚癥係于氣瘕係于血日久成積現在中爲痰積在右爲食積在左爲血積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息奔在右脇脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上至心下皆不宜需用下藥恐損其氣宜于破血行氣藥中加脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死東垣五積方用三菽菥蓂各兼人參黃助成攻奔豚瘕疝腎積爲奔豚風寒濕客于腎家所致癥瘕亦然五積外貼攻劑亦不可少

陳皮 半夏 茯苓 甘艸 厚朴 槀郎 杏仁 附子 吳萸 桂 川芎 川歸 枳壳

治積聚癥瘕

青皮 陳皮 藿香 甘艸 香附 益智 肉桂 三

阿魏二錢半 青皮 義術 茴香 胡椒各一兩 丁皮 白芷

砂仁 肉桂 川芎 各五錢 醋阿魏打糊爲丸 硃砂爲衣

淡益姜湯下。

三聖膏

未化石灰半斤爲丸。瓦器炒微紅。提出候熱稍減。入大礬

水之庄

積聚徵候

兩再炒熟提出入桂心末五錢再畧炒人米醋熬成

字攤貼處

琥珀膏

大黃二兩 朴硝一兩 麝香一錢 用蒜搗膏攤貼外以油紙覆縛

千金硝石丸

大黃兩 硝石兩 人參 甘艸各三兩 用三年苦酒三升漬

器中以竹片作準每入一升作一刻先入大黃末不住手

擣微沸盡一刻下餘藥又盡一刻微熬爲丸梧桐子大

每服三十丸服後下糞如雞肝米泔赤黑等物用粥飲調

理

痞氣丸見症 本方除吳茱萸白朮茯苓澤瀉茵陳花柳砂

仁加石菖蒲茯苓神丹參紅豆名伏梁丸治心積起膈上至

心本方除吳茱萸砂仁桂朮黃芩澤瀉加柴胡莪朮皂角昆

布甘艸名肥氣丸治肝積在左脇下有頭 本方除吳茱萸白

朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬白菴陳皮青皮

三稜名息責丸淡姜湯下治肺積在右脇下令人酒漸寒

本方除吳茱萸白朮砂仁人參干姜川椒黃芩茵陳加菖蒲

丁香附子苦棟延胡獨活金蠅名奔豚丸淡薑湯下治腎

于小腹上至心下若豚狀上下無時令人喘咳骨疼此

恒五積方也雖有破滯劑堅之藥多藉人參贊助成功

丹皮散 治血瘕瘕者瘀血凝聚而成也伏于隱僻之

丹皮 桂心 歸尾 延胡分三 牛膝 赤芍 莪朮分六

後分四 水酒各半煎諸藥調理氣血氣血

五積散感冒 能散寒積食積氣積血積痰積故名五積

玉屑無憂散治酒瘕

本草備要主治註釋

三稜莪朮聚 威靈仙治積聚 丹參澤蘭凌霄花莪

朮大黃葶藶大戟痰藜貫仲神曲礞砂陽起石麝香通板

桂心枳郎車前並治 附子木香治癰 海螵蛸治癰

堅牡蠣治癰 琥珀治癰 枳實治癰 沉香治癰 皂莢治癰 花柳

結治癰 兩頭吞之名曰內炙必効 牽牛 木香 丁香治癰

非治癰 夏枯治癰 馬齒治癰 蠅治癰 蛭治癰 蝮治癰

瘕瘕牛膝行則結散 獨活治癰 客于腎家所致黃連治癰 砂

仁治癰 丁香治癰 大棗治癰 脾土以平胃氣也石菖蒲治癰 白

馬尿治癰 飲治伏梁



痞滿 結胸 難病與傷寒辯論

初卷曰痞滿因陰伏陽氣血不運而成處心下位中央  
與寒痞滿皆土病也與脹滿有輕重之分痞惟內覺滿悶  
脹滿則外有脹急之形也前人皆指誤下所致蓋傷寒之  
病由于誤下則裏氣虛表邪乘虛入于心下若雜病亦有  
中氣虛衰不能運化精微而成痞者有飲食積滯不能施  
化而成痞者有濕熱太甚上米心下而成痞者古方用苓  
連枳實之苦以泄之厚朴半夏生薑之辛以散之參白  
朮之甘苦溫以補之茯苓澤瀉之淡以滲之惟宜上下分  
消其氣果有內實之症庶可畧施疎導世人苦于痞寒喜  
用利藥暫時通快藥盡滋甚皆不察下多亡陰之意也東  
垣曰酒積熱利下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰陰者脾  
胃水穀之陰也胸中之氣因虛下陷于心之分野故致心  
下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則病益甚  
其而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹非其治也初  
日脾無積血心下不痞故須兼血藥傷寒心下滿輒而  
痛者為結胸為實輒滿而不痛者為痞為虛經曰傷寒  
李氏醫鑑 卷之五 痞滿結胸

人下後復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表乃可  
攻痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯病發于陽而  
反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上院故大陷胸湯  
九皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸  
在氣分只用小陷胸湯經曰心下痞按之濡關脈浮者  
大黃黃連瀉心湯大抵諸痞皆熱故攻之多寒則此加附  
子恐三黃重損其陽非補虛也或下後復汗或下後陽虛  
故惡寒汗出嘉言曰此邪熱既盛與陽復虛之症故于  
三黃加附子汁共成傾瀉之功諸痞心下痞皆治傷寒痞  
滿在心胸不在胃也若難病痞滿有寒熱虛實之不同保  
命集云脾不能行氣下四藏結而不散則為痞傷寒之  
痞從外而之內故宜苦泄難病之痞從內而之外故宜辛  
散初卷曰有用寒藥而治熱痞大黃黃連瀉心湯也亦有陰  
陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之類也有陰  
盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥少者半夏生薑甘草細辛  
之類也經曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解口  
渴而煩躁小便不利者五苓散主之此有停飲故也經  
曰太陰所致為積飲痞滿皆陰勝陽也受病之藏心與脾

也因而鬱結而為痞者有火與濕也蓋心陽火也主血脾陰  
上也主濕凡傷其陽則火拂鬱而無凝傷其陰則土壅塞  
而濕滯陽陽之分施治之法不可同也凡治痞症宜理  
脾胃而導血藥世有用氣藥治痞而不効者蓋未明此理  
也用大黃黃連瀉心湯導瀉脾胃之濕  
熱非瀉心也胃之上院在心故曰瀉心

痞氣丸 治痞積在於胃脘大如盤久不愈令人四肢不收

黃連 厚朴 錢吳茱萸 錢白朮 黃芩 茵陳 干姜 地

砂仁 人參 茯苓 澤瀉 川烏 川椒 桂 巴

豆霜 分蜜丸燈草湯下

枳實消痞丸 治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦 脾虛不

滿惡食脾主四肢虛故懶倦右關  
屬脾脈弦者脾虛而木來侮之也

李氏醫鑑 卷之五 痞滿結胸

枳實 黃連 厚朴 姜汁炒 半夏曲 麥芽 炒 人參

白朮 炒 茯苓 錢 干姜 錢 蒸餅糊丸

枳實苦酸行氣破血脾無積血心下不痞黃連苦寒瀉熱  
開鬱並治痞之君藥干姜去瘀血而通關開五藏六府四  
肢關節利華夏皆所以散而瀉之也麥芽本平補健運  
而痞自化既以助散瀉之力又以固本使不傷真氣也

平胃散 治脾胃有停濕痰飲痞隔宿食不消 脾濕太過木邪

之脾虛不能健運故  
有痰食壅滯

蒼朮 厚朴 橘紅 甘草 加姜煎煎

枳木湯 治水飲心下堅大如盤邊如旋盤 陽分也

枳木丸 治消痞除痰健脾胃進食 消痞除痰消也 痞悶加

子 52—90

腎者腎之關也。門不利故水聚而從其類也。故水聚下  
而腫大。上為喘。不得臥。此標本俱病。故肺為喘  
而腎為水腫。肺為逆不得臥。腎為水腫。而用純補之  
藥。不益。脈滿。平曰。肺氣既虛。不可復行其氣。腎水既耗。不  
可復利其水。純補之劑。初覺不快。過時藥力得行。漸有條  
理矣。此即塞因塞用之義也。丹溪曰。治水腫。宜清心火。  
補脾土。火退則肺氣下降。而水道通。脾旺則運化行。而清  
濁分。其清者復回為氣。為血。為津液。濁者為汗。為溺。而分  
消矣。劉宗素曰。治水以寒脾為先。不特陰水為然。陰水者  
少陰腎中之真陽衰微。不能封閉。而泛溢無制耳。經曰。三  
焦者。決瀆之官。水道出焉。上焦不治。水溢高原。中焦不治。  
水停中脘。下焦不治。水蓄膀胱。又曰。三焦病者。腹氣滿。  
腹大。不得小便。窘急。溢則水留。則為腫。下焦少陽經氣。  
當相火之化。相火有其經。無其府。游行于五者之間。故  
曰。少陽為游。其經脈上布膈中。絡心包。下出委陽。絡膀胱。  
此皆非上焦天施。下焦地生。與手厥陰相表裏。以行諸經。  
者。手厥陰受邪。則下焦之火氣鬱矣。鬱則水精不得四  
行。而水聚矣。火鬱之久。必發。則以衝脈之屬大者。同逆而  
下。而為少陽。下足。滲三陰。滲諸絡。由是水從失。溢上積。于  
肺。而為喘。喘不得臥。散于陰絡。而為胸腫。隨五藏之虛者。  
入而聚之。為五藏之脹。皆相火之為。其水而生病者也。非  
相火則水不溢。而止為積水。劉宗素曰。諸腹脹大。皆由于  
熱。諸病附腫。皆屬于火。傳而為水。其是之謂歟。丹溪曰。  
脾具坤靜之德。而有乾健之運。故能使心肺之陽降。肝腎  
之陰升。而成天地之泰。是為平人。今也七情內傷。六淫外  
感。飲食失節。房勞致損。脾土之陰受傷。轉運之官失職。故  
陽升陰降。而成天地不交之否。清濁相混。以致壅塞。而  
為熱。熱留為濕。濕熱相生。遂成脹滿。經曰。鼓脹是也。以其  
外雖堅滿。中空。無物。有似于鼓。以其膠固難治。又名曰。蠱。  
若蟲之侵蝕。而有蠱之義。宜補其脾。又須養肺。金以制  
木。使脾無賊邪之患。滋腎陰。以制火。使肺得清化之令。却  
鹹味。斷妄想。無有不安。醫者急于取効。病者苦于服藥。害  
其利。藥以求通快。不知真得一日半。

李氏醫鑑 卷之五 腫滿發脹 十七

越婢湯 治風水惡風一身悉腫脈浮不渴自汗出無

大熱者 經曰肝腎并沉為石水并浮為風水水在皮膚故

熱者熱未 甚也

麻黃 兩 石膏 兩 生薑 兩 甘草 兩 大棗 十二 惡風者加附

子此足太陽藥也風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉

肺石膏之甘寒以清胃 肺主通調水道 甘艸佐之使風水

從毛孔中出又以姜棗為使調和榮衛不使其太發散耗

津液也 胃為十二經之主脾治水穀為卑藏若婢經曰脾

行津液外臺一名 越婢湯即此義也

李氏醫鑑 卷之五 腫滿發脹 十八

五皮飲 皮南 治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫 脾虛不

故傳化失常腎水泛溢反漬脾土壅塞經絡故

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮 一方

五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後脾肺氣虛而致

腫滿 五加祛風勝濕地骨皮退熱補虛生薑辛散助陽以水

之中猶寓調補之意皆用皮

麥門冬湯 上焦 治水溢高原肢體皆腫

麥門冬 五十枚 梗米 五十

吳鶴皋曰肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸于脾脾

之令以致水溢高原淫于皮膚而為水腫者此其源也  
導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源梗水行則  
培乎生金之母此治病必求其本也或問此症何以辟  
之曰肢體皆腫少腹不急初起便有喘滿此其候也

防已黃耆湯風木 治風水脈浮身重汗出惡風解見 及諸

風諸濕麻木身痛

防已 黃耆兩 白朮七錢 甘草五錢 每服五錢加姜棗

煎腹痛加白芍喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱

腫加黃芩寒多掣痛加姜桂濕盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛

加陳皮枳殼蘇葉

本方白朮姜棗加茯苓為桂枝名防已茯苓湯金 治水

腫皮膚四肢重痛而動名皮水防已行經絡茯苓善滲泄

初菴曰五水脈浮惡風骨節疼痛名風水脈浮附腫按之

沒指其腹如鼓不惡風不渴名皮水當發其汗又云惡寒

不渴名風水不惡寒而渴名皮水假令皮水不渴亦當發

汗脈沉遲自喘名正水脈沉腹滿不喘水積胞中堅滿如

石名石水脈沉遲發熱胸

滿身腫汗如柏汁名黃汗

中滿分消丸熱脹 治中滿鼓脹水脹熱脹諸病有聲鼓之

不通利為氣脹血不通利為血脹但氣分心下堅大而病

發于上血分血結胞門而病發于下氣血不通則水亦不

通而尿少尿少則水積而為水脹濕熱相生則為熱脹

金匱曰病有血分水分何也師曰經水而斷後病水名曰

血分此為難治先病水後經水斷名曰水分

此病易治水去其經當自下水分即氣分也

厚朴炒 枳實炒 黃連炒 黃芩炒 半夏姜製 陳皮 知母

砂仁 澤瀉三錢 茯苓 砂仁 乾姜 姜黃 人參 白朮

甘草 猪苓 蒸餅九焙熟服 寒因熱用東垣立中

消渴治寒脹二 者詳而用之

此足太陰陽明藥也厚朴枳實行氣而且散滿二藥兼能

破宿血苓連瀉熱而消痞姜黃砂仁煖胃而快脾干姜益

陽而燥濕陳皮理氣而和中半夏行水而消痰知母治陽

明獨勝之火潤腎滋陰苓瀉瀉脾腎妄行之水并清降濁

少加參朮苓以補脾胃使氣運則脹消也初菴曰此方

乃合六君四苓瀉心二陳平胃而為一方者但分兩有多

寡則所治有 主客之異矣

中滿分消湯中滿 治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥冷

食入反出腹中寒心中痞下虛陰躁奔豚不收原文曰或

李氏醫鑑 卷之五 腫滿蠱脹 辛

及脾胃久虛之人胃中寒則脹 滿或藏寒生滿病此湯主之

川烏 干姜 畢澄茄 生姜 黃連 人參 當歸

澤瀉 青皮 麻黃 柴胡 吳茱萸 艸薏仁 厚朴

黃耆 黃柏 益智仁 木香 半夏 茯苓 升麻

熱服 李東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者發汗也

潔淨府者利小便也中滿者瀉之于內謂脾胃有病令上

下分消其濕下焦如瀉氣血自然分化如或大

實大瀉大小便不利者從權以寒熱藥下之

大橘皮湯 治濕熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉及

水腫等症 小便併入大腸故小 便不利而大便滑泄



白木土 茯苓 甘艸 厚朴 姜 太腹子 草豆蔻 木香

木瓜 附子 黑姜 加姜棗煎

脾虛故以白木苓草補之脾寒故以姜附草蔻溫之脾濕故以大腹茯苓利之脾滯故以木香厚朴導之然土之不足由于木之有餘木瓜酸溫能于土中瀉木兼能行水與木香同為平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣經曰濕勝則地泥瀉水正所以實土也

伐木丸

蒼朮 二斤米 黃酒麴 四兩 絳礬 一斤醋并晒干入餅

本艸備要主治註釋

香薷 一斤 加白木末 兩 丸如桐子大 米飲送下 治通身水

李氏醫鑑

卷之五

腫滿壅脹

腫煩著神功 商陸 治水腫脹滿取白花搗貼臍腹尿白

治蠱脹素問心腹脹且食不能暮食名為蠱脹治之以雞屎澀一劑知二劑已王太僕註云本艸雞屎並不治蠱脹但能利小便蓋此病皆生于濕熱濕熱脹滿則小便不利雞屎能通利下泄則濕熱從小便而出其病自愈故曰治

乾雞屎不利小便非治也普濟方治且食不能暮食用臘月或為末服二錢亦得積善堂經驗方治一切腹肚四肢腫脹不拘鼓脹氣脹水脹等用乾雞屎一升炒黃以酒焙三碗煮一碗濾汁飲之少頃腹中氣大轉動 葶藶 經疏云去利下即日脚下一皮破消也宋晝隔日再作 葶藶 皮填入雞

猪肚內線縫砂器煮糜食 知母 消浮腫小便 五味子 紫

艸 麻黃 治水 赤小豆 下氣 金銀花 主寒熱 蛤粉 消浮腫

旋覆花 治大腹水腫 昆布 治水 澤蘭 同 蘭花葉 利 白茅根

清火 威靈仙 治浮腫 苦參 逐水 大黃 治水腫 牽牛 治水腫 甘遂 大

戟 有以甘遂木敷腫處濃煎 澤瀉 通艸 苡仁 生姜

均消腫 姜皮 和脾行水 甜瓜蒂 治皮膚腫 滑石 陽起石

治水 鯉魚 烏魚 鯽魚 桑白皮 桑葚 均利水 猪苓

腫 枳榔 大腹皮 巴豆 防己 木瓜 茯苓 冬

葵子 郁李仁 枳實 黃芩 黃柏 木香 香附

木通 車前子 瞿麥 楮實 並治花柳 治水腫子能

金砂 肺滿 芫花 治腹滿 白頭蚯蚓 腹 大蒜 敷臍能達

皂礬 服亦名絳礬入而分代用木燥 茯苓皮 專能行水治

李氏醫鑑

卷之五

腫滿壅脹

榆白皮 治肺白合 治浮腫 益母 坤丹并並 續隨子 治水腫

毒傷人不得過用服後瀉多以致同粥食仰 王不留行 研止去壳取白色者研細紙包臍去油取霜用 熟食之效 珍珠 甘味亦能益脾氣寒能除熱堅 蓖麻子 治水腫浮腫研服當下 黃水壯人只可五粒

佳附八味丸 加車前牛膝名腎氣丸 治蠱脹

疸黃汗

疸有五黃疸殺疸酒疸汗疸女勞疸此蓋蓄血發黃不  
專於濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱例治當  
用四物知柏壯其本矣不培其氣隨症而加利濕之藥  
脾胃有濕熱則發黃黃之黃色也其甚者身如橘色汗  
出染衣正黃如柏亦有寒濕發黃者身黃而色暗大抵  
治以茵陳為主陽黃加大黃枝子陰黃加附子干姜各隨  
寒熱治之古法以茵陳同生姜揚爛于胸前四肢口口擦  
之○脈沉渴飲水小便不利背發黃脈沉乃陽明有熱  
喜自汗汗出入水熱鬱身腫發熱不渴名黃疸脈數乃  
失飢發熱大食傷胃食則腹滿名殺疸數為熱熱則大食  
面目悉如金色名黃疸陽明病脈遲者食難用飽飽則發  
煩頭眩者必小便難欲作殺疸脈沉弦或緊細因飲酒百  
脈熱當風入木懷懷心煩足熱名酒疸其脈浮欲嘔者先  
吐之乾弦者先下之脈浮緊乃大熱交接入水腎氣虛流  
濕于脾脾熱日嘔熱小腹急足下熱大便黑時時名女勞  
李氏醫鑑

卷之五

疸黃

疸腹如水狀不治脈寸尺近掌無脈口鼻冷不治其病身  
熱一身盡痛發黃便澀因內熱入水濕熱內鬱衝發胃  
氣痛雖有五皆濕熱也治諸黃但利其小便愈  
治以收濕利小便清熱或汗之五苓茵陳連類

小半夏湯 治黃胆 半夏 升一 生姜 升半

猪膏髮煎 治諸黃令病從小便出

猪脂 二酒 升五 加亂髮煎髮消藥成

猪苓湯 治濕熱黃疸口渴溺赤 註見 濕門

猪苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠 各一

小建中湯 祛寒 治虛勞黃疸 小便利而色白者是無熱也  
不可除熱當作虛寒治之

理中湯 祛寒 加茵陳 治陰黃 逍遙散 治黃疸

木香侯郎九 治肝濕黃疸

枝子淡豉湯加大黃 治酒疸發黃心中懊憹或熱痛

茵陳枝子湯

茵陳 一兩 去莖 大黃 兩半 山枝 明者 豆豉煎湯下

五苓散 熱加 參 渴加 粉 便滯加 葶 素熱加 黃

茵陳蒿湯 治黃疸寒熱不食頭眩心胸痞

滑石石膏丸 治女勞疸 滑石石膏 研末粥飲下

名公經驗方

耳朶艸 即天 煎酒空心服三早 木香 錢 磨酒服三早

李氏醫鑑 卷之五 疸黃

人參 一錢 磨酒服三早 俱用耳朶艸

附五水 五水在五藏皮膚 黃汗

五水者風水皮水正水石水黃汗石水者水積胞  
中堅滿如石黃汗者汗如柏汁久不止必致癰腫

本艸備要主治註釋

茵陳 治發黃驅濕熱 白蘚皮 諸黃 花粉 茜艸 紫艸

白茅根 秦艸 黃芩 苦參 龍胆艸 大青艸 大

黃 扁畜 甜瓜蒂 但治 木通 治肝疸好眠心為肝醋

鯉魚 白礬 芒硝 葶藶 白茯苓 車前子 但治 黃

花根 治酒疸身 滑石 水腫 連錢艸 一名蝦蟇艸一名九

許飲之良首宿酒疸非黃連枝子前連錢艸服法虛者加

人參竹瀝者加紅曲橘紅殺麥蘖山查療血加琥珀升皮紅曲紅花桃仁桂枝胡索蕭黃五靈脂並元氣壯實者服前

藥寒血不行加熟黃連莖晒乾食之可治諸黃經疏曰方音所載五靈脂酒食大飽後過飽女勞失治而成

然其症必由濕熱及飲食停滯又有瘀血發黃一症方音未載分別一快則藥不對症多致不效慎之慎之

枝子加黃耆湯小建中治黃汗發熱兩脰自冷身痛身重腰上有汗腰下無汗小便不利此陽通而陰不通上下痞

通陰陽通管衛和則正汗此陽通而陰不通上下痞用黃耆以固陽壯枝以

症黃

三消

三消之病其症有三一消也渴而多飲為消熱謂之上消心移熱于肺為消熱是也皆製口渴更如龍多食苦飢為胃熱謂之中消消成消中是也口乾多食尿赤渴而小便數有膏為腎熱而水消謂之下消是也煩渴引飲耳輪乾焦經曰二陽結消之消二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血熱則消發苦飢是血中伏火血不足也木傳能食者必發煩渴不能食者必傳中滿鼓脹皆不治之症氣分渴者喜飲冷水宜寒冷滲劑以清其熱血分渴者喜飲熱水宜甘溫酸劑以滋其陰上輕中重下危如上下中平則不傳下腎消小便甜者為重水生于甘而死于酸小便便本酸而反此是生氣泄脾氣陷下入腎中為土剋水也腎消者腎水衰竭龍雷之火不安其位上于肺消渴引飲飲入于胃下無火化直入膀胱故飲一溲一也用桂附辛熱引真火歸元地黃純陰壯真水滋腎下消要劑

李氏醫鑑

卷之五

天

消渴方 治渴症胃熱善消水穀

黃連 天花粉 生地汁 藕汁 牛乳 將黃連花粉

為末調服或加姜汁蜂蜜為膏噲化

地黃飲子 治消渴煩躁咽乾面赤咽乾腎火上炎也面赤陽明胃熱也煩屬心躁

人參 黃耆蜜炙 生地 熟地 天冬 麥冬 枇杷葉蜜炙

石斛 澤瀉 枳壳甘草等分每服三錢

喻嘉言曰此方生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳壳疎導

二府瀉膀胱之火使小腑清利則心火下降大府流暢則

寬大腸之氣



肺經潤澤宿垢既除其渴自止矣人參白虎湯治渴症

分歸熱竹葉黃耆湯氣血躁熱宜辨症而用之

竹葉黃耆湯 治氣血躁熱

淡竹葉 生地各二錢 當歸 川芎 白芍 麥冬 黃芩

人參 黃耆 甘艸 半夏 石膏一錢

白茯苓 治腎消兩腿漸細腰脚無力此因中消之後

腎脂令腎枯燥致此疾初起白腎消印下消乃上消中消之傳變飲一漫二漫如膏油肺主氣肺無病則氣能宣束津液其精微者榮養筋骨血脉餘者為涕肺病一則津液無氣管攝而精微者亦隨漫下如膏油也

茯苓 黃連 花粉 華薺 熱地 覆盆子 人參

李氏醫鑑 卷之五 三消

玄參 兩 石斛 蛇牀子七錢 雞胗脰三十具青皮 蜜丸

磁石湯送下嘉言曰友人病消渴後渴少止反加燥急足

黃連犀角治心母乃倒乎予曰腎者胃之關也胃之下傳于腎則關門大開心之陽火得以直降于腎心火灼腎燥不能需子用犀角黃連對治其下降之陽火寧為倒乎服之果効再服六味地黃丸加犀角而肌澤病起矣東坡

集云渴類臣病消渴口飲水數斗飯亦倍進小便頻數服消渴藥日甚張敬取麝香當門子以酒濡濕作十許丸

疎拘子煎湯服之遂愈問其故曰消渴中皆脾弱腎敗土不制水而成今道臣脾脈極熱腎脈不衰當由酒果過度積熱在脾所以多食多飲多渴不得不多非消渴也

也凡用藥須用

當門子尤妙 瀉黃散 治脾胃伏火煩渴易飢熱在肌內脾熱故煩渴易飢病名中滿

防風兩 藿香七錢 山枝炒黑 石膏五錢 甘艸二錢 為末微炒香粉

錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳 石斛一錢 半夏一錢 甘艸七錢

治前症

加味腎氣丸腫滿 治消渴飲一漫一

消渴殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切 空心服雖困頓不妨取下虫三

乃止消渴一症有有虫耗其津液而成者蓋飲醇食炙積成胃熱而熱又生濕濕熱生虫理固有之臨症宜諦審也

三黃丸見頭 治消渴羸瘦由于火

蓮子清心飲見淋 治火盛冠金口苦咽乾漸成消渴

李氏醫鑑 卷之五 三消

伏菟丸遺濁 治強中消渴渴症下消者名強中

龍腦雞蘇丸口 治消渴 六味地黃丸 治消渴

七味白朮散四君子加木香藿香乾 治消渴不能食

調胃承氣湯攻裏 治渴症中消善食而漫

大黃甘艸湯 治上中下三焦消渴

甘艸二錢 黑豆半升 大黃

五苓散表裏 治脉浮小便不利微熱消渴功端滋燥導飲

生津故亦為消症良方

本州備要主治註釋

蘭葉

為清湯良藥經曰數食肥甘傳

澤瀉湯

治猪苓湯

黃柏

地骨皮 荆瀝 竹瀝 葶藶

並治

知母

萊豆

天冬 欬冬花 露水 羊乳 人乳 蛤蜊

蛤粉

蛤粉

並治

桑甚

代茶止

胡黃連

治三

子

則湯止

碗豆

煮食治

枇杷葉

治清

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

烏骨雞湯

氏醫錄

卷之五

三消

三

蟲

關尹子曰人之一身內包饒婦外蒸燠萬物有依人身以爲命者是吾身一小天地也饒婦爲人所常有之虫倘寒浸火通則不安其位亦能爲病若飲食不慎血氣虛衰又能變生諸虫不可名狀如癰疽瘰癧勞瘵傳尸之類至子殺身滅門虫之爲患若斯其酷也是以先賢以法殺之苟人不殺虫出且必殺人矣吳鵠早曰古方殺虫如雷先賢仲乾濟燥座百部鉛灰之類皆其所常用者也加附子干姜者壯正氣也加苦參黃連者出得苦而伏也加烏梅河子者出得酸而軟也加藥蘆瓜蒂者欲其帶虫吐出也加荒花黑丑者欲其虫瀉下也用雄黃川椒蛇牀樟腦水銀振即者治瘡疥之虫也用胡桐淚黃芩子垂子蟾酥者治鱗齒之虫也用川槿皮海桐皮者治風蟻之虫也用青桐子覆盆葉者治九竅腐蝕之虫也用敗鼓心楊符板虎黃龍瓜鵲骨者驅勞瘵之虫也

烏梅丸 治傷寒厥陰症寒厥吐衄亦治咳嘔吐長出久痢

李氏醫鑑

卷之五

三

烏梅

細辛

桂枝

人參

附子

黃柏

連

乾姜

十川椒

當歸

苦酒

醋

浸烏梅

一宿去核蒸熟和

藥

集效丸

治蠱蝕腹痛

作止有時或嘔起往來

自作止者虫

則止也氣嘔往來

者虫不安于胃也

大黃

炒

鶴虱

枳實

訶子皮

蘇合

木香 乾姜

炮

附子

蜜丸

食前

烏梅湯

下婦人醋湯下

雄即丸

治腹痛

胃痛乾痛有時

乾痛者不吐不瀉而但痛

也有時者淡食而飢則痛

厚味而飽則

否此爲虫也

厚味而飽則

否此爲虫也

否此爲虫也

否此爲虫也

否此爲虫也

否此爲虫也

雄黃 砒郎 白礬 等分飯丸每五分食遠服

化蟲丸

治腸胃諸蟲為患 腸胃之中無物不容所以發生

虫之物或濕熱蒸鬱而成亦因

物必先腐而後虫生之義也

鶴虱

胡粉

苦棟根

東引未

出土者 砒郎一 蕪荑 使君子 錢五

枯礬

五分

為末亦可麵糊作丸量人大小服之二歲兒

可五分數藥皆殺虫之品也單用尚可

理中安蛇丸

治胃寒吐蛇

蛇得甘則動得酸則止 得辛則伏故加椒梅

白朮

人參

干姜

茯苓

川椒 烏梅

使君子丸

治蟲脹腹痛及食勞發黃喜食茶米炭土等物

李氏醫鑑

卷之五

三

飲食停滯濕熱蒸鬱則生諸虫至脹滿嘔痛或

發黃身腫喜食生米茶葉土炭者虫之所嗜也

使君子

去壳

南星

製砒郎

一合炒

如喜食生米用麥芽一

炒喜食炭土用炭土炒取藥

吐蛇方

中藥

川椒

砒郎

黃連

烏梅

安蟲散

治蟲動心痛

胡粉

炒

砒郎

川棟子

去核

鶴虱

各二

本艸備要主治註釋

石菖蒲

生地

砒郎

連翹

苦參

牽牛

艾葉

並殺

黃連

黃栢

安核桃

櫪

百

部殺

槐花

貫衆

水片

並殺

鶴虱

厚朴

並殺

杏

仁 白果 杜牛膝 皂莢 皂角 刺 大風子 吳萸

扁柏

五靈脂

並殺

馬齒莧

殺諸虫及

去寸白虫

烏藥

治小兒蛇虫

腹中虫

李氏醫鑑

卷之五

三

三

三

三

三

三

哮喘

表邪盛陽氣不得宣發故逆而作喘哮喘由風寒客于背俞復感于寒而作針經曰胃絡不和喘出于陽明之上逆與元耗失喘出于腎氣之上逆又曰水濕泛溢為喘滿胸有膠固之痰喘有非時之喘則令人哮喘由寒束于表陽氣併于胸中不得泄越故胸熱氣逆而喘喘外感之有餘也氣促為喘肺虛而不足也肺為心之故喘感風寒而喘嗽者當求散寒氣逆而喘嗽者當清降宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龙半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味以上出醫方集解丹溪曰實喘氣實肺盛呼吸不利肺窠壅滯有寸脈沉實宜瀉肺虛喘由腎虛呼吸氣短兩脇脹滿左寸脈大而虛宜補腎邪喘由肺感寒邪伏于肺經則身熱而喘不利右寸脈沉而聚亦有六部俱伏者發散則身熱而喘定三四狀虛實肺實者肺必脹上氣喘逆咽中塞如與喘狀自汗虛者必咽乾無津少氣不足以息也江石山曰喘之為病肺氣壅塞氣逆逆浮喘爭亂激喘促連聲不能

李氏醫鑑

卷之五

哮喘

哮喘

布息有痰有火陰虛氣虛四者之間各宜別區痰火壅盛五虎先投降氣九寶去桂為優喘痰甚者擁而夜坐千緡求之一服能臥加以導痰合之尤可陰虛腎虛氣逆上奔安腎八味溫補下元肺氣虛弱人參五味久喘不除人參理肺其哮喘者氣促有聲如木鋸聲似水雞聲或因食酸滲傷肺窠積聚痰涎幸不易治紫金青金或白果湯亦參有法在

五虎湯

細茶 杏仁 甘艸 石膏 麻黃

干緡湯

南星 甘艸 半夏 生薑 皂莢 丹溪方有陳皮茯苓枳殼

人參理肺湯

人參 杏仁 當歸 黨參 木香

白果定喘湯

白果 三十一枚 煨黃 半夏 麻黃 三錢 蘇子 二錢 黃芩 一錢 五分

甘艸 杏仁

錢一 錢半 桑白皮 二錢 款冬花 三錢 加姜煎

紫金丹

精猪肉 二斤 細切 白芷 一兩 分作六分 抵湯煮包烘乾

青金丸

雞子 淘淨蒸熟曬乾為末 姜汁 浸蒸餅丸如雞子大 大人服廿九小兒十粒 茶下

丹溪主方

治喘年深時有作止雄猪肚 治如食法人吞

仁

四五兩 線縫三碗煮乾取出先食肚

虛方

治氣虛 參 藥 麥冬 地骨皮

治陰虛有痰

四物 連 枳壳 半夏

瀉白散

治陰氣在下陽氣在上欬喘逆氣急

神秘方

治水氣逆行乘肺肺水而浮使氣不得通流脉沉

李氏醫鑑

卷之五 哮喘

大令人不得卧卧則喘

紫蘇 陳皮 桑白皮 人參 生薑 五錢 茯苓 五錢 木香 五錢 茯苓 五錢

治哮喘積丹

雞子 畧敲勿損膜浸尿器缸桶內四五日夜吃

四磨湯

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食 氣結憂愁不已

三子養親湯

治老人氣實痰盛喘滿懶食 痰不自動因

分濃磨煎三四沸溫服

恐傷其氣也大實者仍宜枳壳

三子養親湯

治老人氣實痰盛喘滿懶食 痰不自動因

餘便是火氣上湧

故喘痰火塞胸故懶食士材曰治病先

攻其甚者若氣塞而喘

則氣反為本痰反為標矣是在智者

神而明也若氣

虛者非所宜矣

七氣湯 治胸滿喘急 蘇子降氣湯

四七湯 治膨脹喘急 五苓散 治水寒射肺而喘

滋腎丸 治衝脉上衝而喘 衝脉起于二陰之交直衝

逆上

麻黃湯 治哮喘 散寒利肺初菴曰哮喘雖服

麻黃白木湯 治喘促無力吐痰沫 短氣喘促為

本艸備要主治註釋

天冬 治喘 馬兜鈴 治肺熱 欬冬 治氣喘肺

前胡 治喘 麻黃 治痰喘 葶子 定痰 杏仁 治煩熱 山豆根 治

李氏醫鑑 卷之五 哮喘

葶子 治肺氣 紫蘇 井子辛溫寬中 阿膠 定喘痰入肺則寒

食鹽 治喘 龍骨 治喘 鯉魚 治喘 蛤蚧 治喘 桑白皮 治

雙子 治喘 訶子 治喘 榆白皮 治喘 皂莢 治喘 花柳子 治

白果 治喘 五味子 治喘 葶藶子 主肺壅上氣喘促痰氣

或糯米拌炒熟去米

喘逆 喘逆吐 呃 音隘 不 喘 一 咳 初 入 呃 音 咳

初者方書云呃字或作飲逆或作噦氣仲景書中亦作

今從諸書改逆此喘有因痰阻氣滯不得升降者有因

下焦者有因血瘀者有因胃氣失下與腸明內實失下者

此皆屬實有因傷寒吐下後中氣大虛者有病久大下

胃虛而陰火上衝者此皆屬虛時珍曰常視虛實陰陽或

泄或或降氣或溫或補或吐或下可也古方單用柿蒂取

其苦溫降氣濟生方加丁香生薑取其開鬱散痰蓋從治

之法亦常有收效者矣朱氏但執以寒治熱矯枉之過矣

○有聲有物為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐其症或

因寒因熱因食因痰氣逆上冲而然 邪在半表半裏則

亦多嘔吐痰入肺則亦乾嘔胃寒則吐胃熱亦吐 呃在

中焦氣不運其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足

其聲長大不食亦然 經曰諸逆衝上皆屬于火火氣上

炎則為卒呃不止呃者噦也其聲濁惡而長樹枯者葉落

病深者聲噦病者見此是為危症 汪石山曰呃為氣逆

李氏醫鑑 卷之五 呃逆

大補陰丸 治欬逆虛熱 水不制火木火勢衝逆而

丁香柿蒂湯 治久病呃逆因於寒者

丁香 柿蒂 二錢 人參 一錢 生薑 五片 一方加陳皮半夏茯苓甘

柿蒂苦澁而降氣人參所以輔真氣使得展布也大呃亦

可用者蓋從治之法也。以熱或熱者曰從治。以寒或寒者曰逆治。此即古人所謂寒者熱之，熱者寒之之意。陰氣因胃為養，土為木之相火，沖清道而上作呃逆。切菴曰：古人治陰呃，每用桂附干姜吳茱萸丁香香附香薷辛熱藥，多有收效者。治陽呃，用橘紅竹茹湯，呃逆本由陰氣已虛，陽火暴甚，直沖而上，出于胃入于肺，而作聲東垣用涼藥者，所以瀉熱降火也。若陰症呃逆，以陰氣先消，陽火亦竭，浮于胸中，亦欲散也，故不用寒藥，而反以溫藥養胃，留其陽氣，胃氣一和，陽生則陰長之說也。或問治陽呃者，何以不用知柏吳鶴皋曰：此少陽虛，非寒邪也，故用柿蒂竹茹之味薄者，主之。若知栝味厚，則益盛其中氣，不益盛乎。

本方除人參生薑亦名丁香柿蒂湯，治同。本方除參姜加竹茹橘紅，名橘紅竹茹湯。寶鑑去人參加青皮陳皮，三因去人參，加良姜甘艸，名丁香散，治同。

李氏醫鑑

卷之五

呃逆

元

橘皮竹茹湯

治久病虛羸呃逆不止。胃寒胃熱停痰積飲皆作呃，此為虛火上炎，皆作呃，此為虛火上炎。

通而乾嘔亦治吐利後胃虛呃逆。胃火上冲肝脾之火助之，肺金之氣不得下降故也。

橘紅 竹茹 人參 甘艸 半夏 麥冬 赤茯苓

枇杷葉 加姜煎煎胃寒去竹茹麥冬加丁香寔火去入

參 金匱橘皮竹茹湯橘皮二升竹茹升人參兩甘艸兩生

姜大棗三十枚治噦逆吐利後胃虛

炙甘草湯

治呃逆麥門冬湯降火止呃逆

訓菴曰：昔有人病後患呃逆不止，聲聞鄰家，或令取刀豆于燒存性為末，白湯調服二錢，即止。此即下氣歸元之驗也。

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞鞭膈間有水眩悸

上逆則水停膈間則病上。半夏生薑半茯苓兩

半夏生薑行水氣而散逆氣，能止嘔吐，茯苓寧心氣而泄

腎邪，能利小便，火因水而下，行則悸眩止而病消矣。本方

除茯苓，名小半夏湯，治支飲嘔吐不渴。嘔家本渴，渴者為欲解今反不渴，心

下有支飲故也。小半夏湯主之。嘔吐津液去必渴，不可因渴而遂以為熱。

東垣曰：辛藥生薑之類治嘔吐，但治上焦氣逆，表實之病

而巳，勿作表實用辛藥，薄之故服小半夏湯不愈者，服大半夏湯立愈。此仲景心法也。

二陳湯加黃連枝子，膈上熱痰，令人嘔吐，單用陳皮生薑，名

橘皮湯，治乾嘔噦及手足厥者，單用半夏生薑汁，名生薑汁

李氏醫鑑 卷之五 呃逆 元

夏湯治似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，心中憤憤然無奈

何者，本方去陳皮甘艸，再加生薑治水氣嘔惡

黃芩湯和解加半夏升生薑二治胆府發欬嘔苦水如胆汁

十聚湯小青龍湯主水氣乾嘔，桂枝湯主太陽汗出乾嘔

姜附湯主少陰下利，乾嘔吳茱萸湯主厥陰吐涎沫作嘔

氣逆也。半夏生薑以散逆氣，千金曰：生薑嘔家聖藥是散

其逆氣也。嘔家用半夏以去其水，水去則嘔止，是下其痰

也。

逍遙散 治嘔吐

六一散 姜湯下治嘔吐

五苓散 治嘔逆 濕勝則脾不運水 停心下則嘔逆

猪苓散 治嘔吐思飲水者

本神備要主治註釋

五味子 止嘔 半夏 止嘔 柴胡 止嘔 前胡 止嘔 麥冬 治胃火上

益智仁 治嘔 附子 治嘔 滑石 治嘔 干姜 治嘔 茯苓 治嘔 薤白 治嘔

香薷 治嘔 枝子 止嘔 枳殼 止嘔 厚朴 治嘔 訶子 治嘔 槐實 治嘔

吳茱萸 止嘔 花柳 治嘔 淡竹葉 治嘔 甘草 治嘔

威竹茹 治嘔 枇杷葉 治嘔 白茅根 治嘔

李氏醫鑑卷之五終

李氏醫鑑卷之六

李氏醫鑑卷之六

吐酸吞酸 嘈雜 醋心

吞酸一症大抵宿食停于胃脘平胃散加木香砂仁神曲  
山查若停飲所致者木半夏茯苓陳皮最効俗名醋心是  
也亦有吐酸者宜降火清痰加吳茱萸作引導  
吐由于痰火東垣曰病後日諸嘔吐酸皆屬  
焦受客來外邪也以雜病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸  
其心火令牙酸不能相對以木香熱劑療之必減若以病  
機作熱攻之誤矣或問吞酸素問以爲熱東垣以爲寒何  
也丹溪曰吐酸與吞酸不同吐酸吐酸水如醋平時產  
液隨上升之氣鬱而成積濕中生熱故酸水化而作酸味  
非熱而何其有鬱之久伏于腸胃之間咯不得上嚥不得  
則未得風寒則內熱愈鬱而酸愈劇心腹表溫痰涎理  
開或得香熱湯丸津液得行亦可暫解非寒而何素問  
吳茱萸製炒隨時令送爲佐使若木茯苓爲輔湯浸蒸餅  
李氏醫鑑卷之六 吐酸吞酸

左金丸 治肝火燥盛左脇作痛吞酸吐酸 肝火上

本方加炒蒼朮陳皮亦名茱萸丸治同 黃連 醋心

三聖丸 治痰火嘈雜心懸如饑

陳皮半夏黃連 姜湯下

茱萸六一散 治濕熱吞酸 滑石 茱萸

二陳湯 加黃連枝子 嘈雜

平胃散 加麥芽 宿食 酸受氣

枳桔湯 治嘔氣吐酸或欬

保和丸 治痞滿吐酸

秘傳枳木二陳湯 統治吐酸吞酸嘔雜噯氣懊憹不寧等

症 枳實 白朮 陳皮 半夏 茯苓 甘草 香附

青皮 檳榔 白朮 吳茱萸 黃連

越鞠丸 治吞酸嘔吐 逍遙散 治吞酸嘔雜

旋覆花湯 治婦人下脘吐涎冷氣嘈雜汪洋脇脹吐水

肉桂 旋覆花 白芍 人參 赤茯苓 細辛 桔梗

半夏 陳皮

紅丸子并吞酸噯腐方 門見頭

李氏醫鑑

卷之六

吐酸吞酸

二

痰 附 五飲 稀為飲 稠為痰

痰之源不一有因熱而生痰者有因痰而生熱者有因氣而生者有因風而生者有因寒而生者有因濕而生者有因暑而生者有因驚而生者有因食而成者有因傷冷物而成者有因酒而成者有因脾虛而成者有因肺虛而成者有因內經有飲字而無痰字至仲景始立五飲之名而痰飲居其一脈安常曰善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣準繩云痰之由生于脾氣不足不能致精于肺而於以成者也治痰宜先補脾脾復健運之常而痰自化矣脾無濕不生痰故脾為生痰之源肺為貯痰之器時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到故曰治痰以順氣為先腎虛不能制水水泛為痰是無火之痰痰清而稀陰虛火動火結為痰是有火之痰痰稠而濁痰症初起發熱頭痛類外感表症久則潮咳夜重又類陰火內傷走注肢節疼痛又類風症但脈色如故脈滑不勻為異脾虛不健健運則生痰飲稠者為痰稀者為飲水濕其本也得火則結為痰隨氣升降在肺則咳在胃則嘔在頭則眩在心則悸在背則冷在脇則脹其變不可勝窮也

李氏醫鑑

卷之六

痰飲

三

法治痰以順氣為主宜以半夏南星燥之潔古云陳皮橘紅枳壳利其氣而痰自下二陳治痰世醫執之內有半夏若風寒濕食則相宜至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病腎主津液燥則凝而為痰得潤則化則嗽止所謂治痰之本也丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除寒痰二陳佐以干姜芥子熱痰佐以黃芩瓜蒌濕痰佐以蒼朮茯苓風痰佐以南星前胡痞痰佐以枳實白朮痰在上加引上藥痰在下加引下藥惟燥痰非半夏所司宜貝母瓜蒌痰者痰因火盛也痰即有形之火火即無形之痰痰隨火而升降火引痰而橫行變生諸症不可紀極火借氣于五臟痰借液于五味氣有餘即為火液有餘即為痰故治痰者必降其火治火者先順其氣也五飲皆因內傷水漿外感濕氣鬱而為飲流于肺則為支飲令人喘咳寒熱吐沫背寒流于脾則為懸飲令人胸滿嘔吐寒熱眩暈流于腸胃也流于心則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩暈流于腸胃則為痰飲令人腸鳴吐水胸脇支滿或泄瀉忽肥忽瘦流



在者  
若山能  
吐之左  
上者常  
下能破  
其解而

于經絡則為痰飲令人沉重注痛或作水腫完花大戟日  
遂逐水去濕直達水飲窠囊之處徐徐用之取効甚捷痰  
入心則迷成顛癲喘咳等症並以控涎丹主之亦有奇効  
此乃治痰之本也痰之本水也濕也得氣與火則結為痰大  
戟能泄肺水濕甘遂能行經絡水濕自能散皮裏膜  
外痰氣升溪日痰在脇下及皮裏膜外非自能散皮裏膜

二陳湯 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心煩悶心悸

半夏 二錢 陳皮 白茯苓 甘草 五分 加薑煎 痰能制半夏之  
其陳久則無燥散 治痰通用二陳風痰加 皂角竹瀝 寒痰

加半夏 火痰加 石青 濕痰加 蒼朮 燥痰加 瓜蒌 食痰加 山  
麥芽 老痰加 石芒硝 氣痰加 香附 脇痰加 白芥子 四肢

痰加 竹 痰加 竹 痰加 竹 痰加 竹 痰加 竹 痰加 竹 痰加 竹

李氏醫鑑 卷之六 痰飲 四

或曰有痰而濕宜去半夏代以貝母瓜蒌鶴鼻曰渴而喜  
飲水者易之渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏也此濕為  
本熱為標濕極而兼勝已之化非真象也初菴曰貝母寒  
潤主肺家燥痰半夏溫燥上脾家濕痰雖俱化痰而寒溫  
燥潤各異脫或快施貽害匪淺用者慎之 有血不足陰  
火上逆肺受火傷虛清之令不得下行由是津液渾濁生  
痰不生血者名燥痰常用潤劑如地黃門冬枸杞之類滋  
陰降火而痰自清若投二陳立見危殆有痰飲流八四肢  
肩背痠痛手足罷軟誤以為風則非其治宜導痰湯加木  
香薑黃大凡痰飲變生諸症當以治飲為先飲清則諸症  
自愈如頭風肩痠骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又  
如眼赤羞明與之涼藥不瘳俾以痰劑獲愈如此之類不  
一而足有人坐處吐痰滿地不甚稠粘只是沫多此氣虛  
不能攝涎不可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

本方加 人參 名六君子湯治氣虛有痰本方加 黃 治熱痰

本方 加黃連枝 膈上熱痰本方 加砂仁 痰利氣本方 加南

子生姜治 痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

痰利氣本方 星根

名導痰湯治頑痰膠固非二陳所能除者 夏加枳實以助半  
壁之功

礞石滾痰丸 怪病 治實熱老痰怪症百病 風木太過起制  
成痰壅塞上中二焦迴腸胃曲折之愈謂之老痰變  
生百病不可測識非尋常藥餌所能療也此丸主之

青礞石 一兩 沉香 五錢 大黃 酒 黃芩 八兩 右將礞石打碎用焰

硝一兩同入瓦罐盪泥固濟晒乾火煅石色如金為度研

末和薑水丸量人虛實服之姜湯送下服後仰臥少頃

不可飲水行動

礞石剝悍之性能攻陳積伏歷之痰大黃蕩熱去實以開

李氏醫鑑 卷之六 痰飲 五

下行之路黃芩瀉肺涼心以平上僭之火沉香能升降諸

氣上至天而下至泉以導諸藥為使也然乃峻劑非實體

者不可輕投 王隱君曰痰症古今未詳方書雖有五飲諸

運耳鳴或口眼蠕動脅癢耳輪痛癢或四肢遊風腫硬似

疼非疼或為齒齦痛牙齦浮而痛癢或受氣吞酸心下

嘈雜或痛或成或咽嗝不利咯之不出嘔之不下其痰似

墨有如被絮挑膠蛻肉之狀或心下如停水鐵心氣冷痛

或夢寐奇怪之狀或足腕痠軟腰背骨節卒痛或四肢筋

骨疼痛難以名狀並無常處以致手足麻木痛狀若風濕或  
脊上一條如線之寒起者或渾身骨痛如以芒刺者或胸  
腹間如有二氣交紐噎息煩悶如有烟火上衝頭面烘熱  
或為失志癲癇或中風癱瘓或勞瘵在再之疾或風毒脚  
氣或心下怔忡如畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水壅  
汁甚為肺癰腸毒便膿穿破內外為病百端皆痰所致其  
狀不同難以盡述蓋津液既凝為痰不復周潤三焦故口

燥咽乾大便閉結面如枯骨毛髮焦落人則因此月水不通若能逐去敗痰自然服領有効余用滾痰丸以愈諸疾不可勝數特相傳于世云

本方加玄明粉一兩硃砂為衣治同本方減大黃黃芩各六兩加橘紅半夏各二兩甘草一兩竹瀝姜汁為丸名竹瀝達痰丸治同力稍和緩

神木丸

蒼朮一兩大棗五十枚黑油麻半兩水二盞研濾汁和丸丹溪

曰實脾土燥脾濕是治痰之本

清氣化痰丸 治熱痰 註在前

半夏製膽星半兩橘紅 枳實炒杏仁去皮瓜蒌仁油黃芩

酒炒此治痰火之通劑也氣能發火火能發痰半夏南星以燥濕氣黃芩瓜蒌以平熱氣陳皮以順氣杏仁以降逆氣只實以破積氣茯苓以行水氣水濕火熱皆生痰之本也蓋氣之元而為火猶民之反而為賊賊平則還為良民而復其業矣火退則還為正氣而安其位矣故化痰必以清氣為先也

三仙丸 痰治中脘氣滯痰涎不利 切卷曰氣滯不通為痰痰走注攻刺亦曰氣痰

南星麴 半夏麴四兩香附二兩糊丸薑湯下 此方與局方

茯苓丸皆行痰而兼用氣藥即嚴氏氣順則痰自下之意然紫蘇枳殼陳皮厚朴脾胃氣藥也香附肝氣藥也隨氣道而用不可不分又曰嚴氏以人之七情鬱結氣滯生痰氣道通利痰自降下又有原有積痰其氣因痰而結滯者必先逐去痰結則氣自行豈可尚生一說

七氣湯門 治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急或咳或嘔或攻衝作痛

許學士神木散 治水飲結成癖囊

蒼朮一兩芝麻五錢棗五十取肉搗丸 水飲結成癖囊非蒼朮之加芝麻者潤其燥也用藥肉者補土以制水也

十棗湯攻裏 本方各五錢加黃柏三兩酒炒大黃兩 粥丸名

小胃丹丹 治胸膈腸胃熱痰濕痰

澤瀉湯 治心下支飲常苦眩冒 澤瀉五兩白朮二兩

潤下丸 治膈中痰飲

橘紅八兩甘草二兩蒸餅糊丸 或將橘紅鹽水煮爛晒散姜湯下濕勝加星夏火盛加苓連此二方治一切痰氣極効時珍曰世醫徒知半夏南星之屬何足語此哉然虛人禁用丹溪曰治痰用利氣藥過多則脾虛痰易生而反多又曰胃氣亦賴痰以養不可攻盡攻盡則虛而愈劇

化痰健脾丸 治內傷挾痰

人參 白朮兩陳皮 枳殼 半夏 胆星 蛤粉

茯苓 神麴糊丸

秘方治痰火 用枸骨葉煮飲治痰火甚驗 蓋痰未有不因平肺煎熬津液而成此藥直入足少陰經補養陰氣則痰火自消如釜底抽薪之意也

六味地黃丸 治水泛 張仲景曰氣虛有痰宜腎氣丸補而逐

人參 清痰水氣旺  
則痰行水消

本草備要主治註釋

蒼朮 實脾土燥脾濕 前胡 治風痰性陰而時功治下氣

火火則熱地 滋腎水化痰 石菖蒲 開竅除痰乾生地 除痰欬花

生痰 熟地 之妙品也 白前 下天南星 治痰 貝母 潤心肺

紫苑 治痰 桔梗 治痰 天南星 治痰 貝母 潤心肺

天花粉 潤燥 澤蘭 除痰 蘭花葉 清痰 威靈仙 治濕痰 天麻

氣 細辛 破痰 紫蘇 井子 清痰 知母 痰 黃芩 升痰 日痰 因火動 葶藶 除痰 芫花 治痰 澤瀉 治痰 蛤粉 丹痰 云治

當先降火 麥芽 除痰 芒硝 治痰 砂仁 祛痰 華菱 祛痰 甘草 治痰 犀角

李氏醫鑑 卷之六

八

利射干 行太陰厥 神曲 化痰 葶 逐停 生薑 干姜 黑姜 俱治

甜瓜蒂 吐風熱 浮石 除痰 蓬砂 祛上焦熱 慈石 為利痰 兒

茶 化痰 五靈脂 化痰 牛黃 利痰 礞石 化痰 雄黃 化痰 白

礞石 化痰 阿膠 化痰 牡蠣 化痰 珍珠 化痰 僵蚕 化痰 雄黃 化痰 白

能散相火 五倍子 善收頑痰 人中黃 清痰 茯苓 治痰 中痰

逆結之痰 枳殼 枳實 治痰 厚朴 治痰 訶子 化痰 枳 枳 枳 枳

致 人中白 化痰 半夏 化痰 瓜蒌仁 寒潤下能清上焦 胡椒 下

痰 竹瀝 潤燥行痰 荊瀝 化痰 延胡 通氣 化痰 妙品

痰 云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝 淡竹葉 清痰 天竹黃 清痰 烏梅

並宜姜汁助送則不凝滯

白梅 治痰 山查 柿并霜 並化痰 海藻 治痰 枇杷葉

姜汁 炙降氣 旋覆花 治痰 天冬 清痰 白朮 清痰 山

助元清腎 痰 麥冬 清心降火 天冬 滋陰 白朮 清痰 山

藥 化痰 涎 蚶殼 製法見 瘰癧 後 鬱金末 加薑汁姜汁

治痰中 帶血

李氏醫鑑

卷之六

痰飲

九

咳嗽

有聲無痰曰咳。痰傷于肺。氣有痰。無聲曰嗽。蓋動于脾。溫也。言有痰。曰咳。嗽或因火。因風。因寒。因濕。因虛。因食。積。宜分治。主治大法。治嗽當以治痰為先。而治風。治寒。治濕。治虛。治食。以肺氣為主。宜以半夏。南星。燥其痰。枳實。橘紅。利其氣。肺虛。加溫飲之。味肺實。加涼瀉之。凡感風寒。而咳嗽者。皆長散痰。氣逆而咳。嗽者。當清痰。宜陳皮。蘇子。降氣湯。水煎。逆而咳。嗽者。宜小。青龍。半夏。復。寒。湯。氣虛。病久。而咳。嗽者。宜人參。五。味。午。前。嗽。多。屬。胃。火。宜。知。母。石。膏。冬。連。知。母。午。後。嗽。及。日。暫。夜。重。者。多。屬。陰。虛。宜。麥。冬。五。味。知。母。四。物。五。更。咳。嗽。者。由。胃。有。食。積。至。此。時。火。氣。流。入。肺。中。宜。順。氣。消。食。化。痰。黃。昏。咳。嗽。乃。火。浮。入。肺。中。不。宜。用。涼。藥。宜。五。倍。五。味。飲。而。降。之。此。二。味。能。降。火。止。嗽。咳。嗽。不。得。眠。者。左。不。得。眠。者。肝。肺。宜。清。肝。右。不。得。眠。者。肺。脾。宜。清。肺。咳。嗽。脈。浮。為。客。邪。宜。發。散。脈。實。為。內。熱。宜。清。利。脈。濡。散。為。肺。虛。宜。溫。補。久。嗽。難。解。外。以。致。肺。胃。俱。虛。飲。食。不。進。宜。溫。中。助。胃。兼。治。嗽。藥。仁。赤。血。指。曰。肺。出。氣。也。腎。納。氣。也。肺。為。氣。主。

李氏醫鑑

卷之六

咳嗽

十

腎為氣本。凡咳嗽。暴重。自覺氣從臍下逆起者。此腎虛不。能納氣。歸元。當用地黃丸。安腎。九。步。從。事。于。此。此。虛。則。補。子。之。義。也。腎。實。口。五。行。推。腎。肺。二。藏。母。病。而。子。受。邪。何。則。肺。主。氣。肺。有。熱。氣。得。熱。而。上。蒸。不。能。下。生。于。腎。而。腎。受。傷。矣。腎。傷。則。肺。益。病。蓋。母。藏。子。宮。子。隱。母。胎。凡。人。肺。金。之。氣。夜。臥。則。歸。藏。于。腎。水。之。中。因。肺。受。心。火。之。邪。欲。下。避。水。中。而。腎。水。乾。枯。火。無。可。容。之。地。因。是。復。上。而。為。病。矣。久。嗽。肺。必。虛。肺。虛。不。能。生。腎。水。不。制。火。虛。火。上。炎。而。咳。嗽。也。李。士。材。曰。百。合。固。金。湯。此。方。殊。有。卓。見。然。上。為。金。母。清。金。之。後。意。宜。顧。母。否。則。金。終。不。可。足。也。肺。受。火。傷。則。氣。逆。而。為。咳。脾。有。停。濕。則。生。痰。而。作。嗽。病。有。五。藏。六。府。之。殊。而。其。要。皆。小。于。肺。以。肺。為。五。藏。華。蓋。下。通。膀。胱。外。達。皮。毛。為。氣。之。主。而。出。聲。也。素。問。曰。肺。之。能。令。人。欬。何。也。曰。五。藏。六。府。皆。令。人。欬。非。獨。肺。也。皮。毛。者。肺。之。合。也。皮。毛。先。受。邪。氣。邪。氣。以。從。其。合。也。五。藏。各。以。其。時。受。病。非。其。時。各。傳。以。與。之。有。自。外。得。者。肺。主。皮。毛。風。寒。暑。濕。之。邪。自。皮。毛。入。內。傳。藏。府。而。為。欬。也。有。自。內。發。者。七。情。飢。飽。內。有。所。傷。則。邪。氣。上。逆。肺。為。氣。出。入。之。道。故。五。藏。之。邪。上。蒸。于。肺。而。為。欬。也。然。

咳嗽

風寒暑濕。有不為欬者。蓋所感者重。不留于皮。毛。徑。傳。藏。府。而。成。傷。寒。濕。熱。諸。病。七。情。亦。有。不。留。于。皮。毛。而。傳。藏。府。者。本。藏。未。傳。入。肺。所。以。傷。寒。中。有。以。有。嗽。為。輕。而。七。情。飢。飽。之。嗽。必。久。而。後。發。也。有。一。咳。而。痰。即。出。者。脾。濕。勝。而。痰。滑。也。宜。半。夏。南。星。皂。角。之。屬。燥。其。脾。若。利。氣。之。則。所。當。忌。也。有。連。咳。數。聲。而。痰。不。出。者。肺。燥。勝。而。痰。滑。也。宜。以。乾。紫。蘇。杏。仁。之。屬。利。其。肺。若。燥。脾。之。類。所。當。忌。也。久。嗽。有。痰。者。燥。脾。化。痰。無。痰。者。清。金。降。火。蓋。外。感。久。則。鬱。熱。內。傷。久。則。火。炎。俱。要。開。胃。潤。燥。其。七。情。氣。逆。者。順。氣。為。先。停。水。宿。食。者。分。導。為。要。氣。血。虛。者。補。之。欬。之。不。宜。妄。用。清。劑。從。正。曰。久。病。咳。嗽。遲。潮。于。上。形。癰。不。可。攻。者。以。硃。砂。水。銀。沉。香。黃。丹。寒。水。石。蛤。粉。之。類。以。墜。之。醫。貫。曰。咳。嗽。吐。血。未。必。虛。也。服。四。物。知。母。黃。柏。之。類。不。已。則。癰。成。矣。凡。陰。虛。勞。嗽。通。用。款。冬。紫。苑。百。部。百。合。沙。參。生。地。麥。冬。五。味。知。母。柏。苓。攻。內。熱。骨。蒸。加。丹。皮。地。骨。皮。而。復。瀉。者。乃。肺。移。熱。于。大。腸。蓋。府。俱。病。咳。而。發。熱。不。止。為。陰。虛。火。炎。皆。難。治。有。乾。咳。者。極。為。難。治。此。係。火。鬱。之。症。乃。痰。鬱。其。火。邪。在。肺。中。用。道。遙。散。以。開。之。下。用。補。陰。之。劑。可。愈。桔。梗。治。乾。咳。火。鬱。○。咳。嗽。成。

李氏醫鑑

卷之六

咳嗽

十

風者。鼻。塞。聲。重。傷。冷。者。懷。清。祛。寒。痰。熱。為。焦。煩。受。濕。為。癰。白。唾。之。稀。稠。從。可。知。也。清。稀。為。虛。水。泛。為。痰。是。無。火。之。痰。稠。而。濁。或。帶。黃。乃。陰。虛。是。有。火。之。痰。清。肺。飲。治。痰。濕。氣。逆。而。咳。嗽。杏。仁。去。皮。貝。母。茯。苓。一。桔。梗。甘。草。五。味。子。橘。紅。五。加。薑。煎。食。遠。服。若。春。時。傷。風。咳。嗽。鼻。流。清。涕。宜。清。解。加。分。加。薑。煎。夏。多。火。熱。宜。清。降。加。桑。白。皮。麥。冬。黃。紫。蘇。炒。芥。夏。多。火。熱。宜。清。降。加。桑。白。皮。麥。冬。黃。桂。枝。干。姜。生。火。嗽。加。青。蘆。瓜。食。積。痰。加。香。附。山。濕。痰。除。貝。姜。半。夏。防。風。火。嗽。加。蔓。菁。石。查。枳。實。濕。痰。除。貝。半。夏。燥。痰。加。瓜。蔓。如。午。前。嗽。屬。胃。火。宜。清。胃。加。石。膏。午。後。南。星。燥。痰。加。母。天。冬。

嗽屬陰虛宜滋陰降火加竹瀝地知栢二冬黃昏嗽為火

浮于肺不可用涼藥宜五倍五味河勞嗽見血多是肺受

熱邪宜加母芍阿膠天冬知久嗽肺虛如肺熱去人參用

沙參可也

此手太陰之藥治嗽之通劑也杏仁解肌表寒降氣潤燥  
貝母清火散結潤肺化痰五味飲肺而寧嗽痰除濕而  
理脾橘紅行氣甘草和中桔梗清肺

金沸草散 治肺經傷風頭目昏痛咳嗽多痰風盛則氣壅

故昏

旋覆花即金前胡 細辛 荊芥錢赤茯苓六分半夏五分甘

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽 主

草分三加姜棗煎局方加麻黃赤芍無茯苓細辛如滿悶

加枳壳桔梗有熱加柴胡黃芩頭痛加川芎

百合固金湯 治肺傷咽痛喘咳痰血肺金受傷則腎水之

上炎故咽痛火上薰肺故

生地二錢熟地三錢麥冬半錢百合 白芍炒當歸 貝母 生

甘草一錢玄參 桔梗八分

諸藥皆以甘寒培元清本不

欲以苦寒傷生發之氣也

補肺湯 治肺虛咳嗽此治肺虛咳嗽苦

人參 黃耆蜜五味子炒紫苑錢桑白皮蜜熟地二錢入蜜

少許和服方內用熟地者補水以制相火其痰自除且亦

生而嗽

補肺阿膠散 治肺虛有火嗽無津液而氣哽者火盛則津

氣

阿膠蛤粉炒馬兜鈴焙甘草炙牛蒡子炒香杏仁去皮尖

糯米

此手太陰藥也馬兜鈴清熱降火象肺故牛蒡子利膈滑痰

潤肺解熱阿膠清肺滋腎益血補陰火退而嗽寧李時珍

故治火嗽阿膠散用兜鈴非取其補肺取其清熱降氣而肺自安也

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽 主

所以補之也若喘一于補

小柴胡湯 加桔梗治春嗽本方加青黛姜治熱嗽

黃芩加半夏生薑湯 治胆府發欬嘔苦水如胆汁胃氣逆

黃芩三兩白芍 甘草二兩大棗十二枚半夏半升生薑二兩

逍遙散 治咳嗽潮熱口渴便秘骨蒸潮熱肝血虛也肝火

往來寒熱火盛燥金不

瓊玉膏 治乾咳嗽有聲無痰謂之乾咳脾中有濕則生痰

本于肺火盛

地黃四兩茯苓十二兩人參六兩白蜜二兩先將地黃蒸汁去渣

入蜜煉稠再將參苓細末和入磁罐封水煮半日白湯化服  
服麗仙加沉香琥珀五錢自云奇妙琥珀降肺寧心沉香升降諸氣

瀉白散方見諸熱門 治肺火皮膚蒸熱瀝漸寒熱喘氣急

桑白皮甘益元氣之不足辛瀉肺氣之有餘除痰止咳性善行水瀉火故能除痰痰除則嗽止地骨皮寒瀉肺中之伏火甘草糯米補益脾胃以補肺並能瀉熱從小便出瀉白散瀉肺經氣分之火黃芩一物湯片後清金九瀉肺經血分之火清金九即 本方加青皮陳皮名 加減瀉白散黃芩炒為末水丸 本方加青皮陳皮名 加減瀉白散

治咳嗽嘔吐喘急本方加知母黃芩桔梗 加減瀉白散治咳而氣喘煩熱口渴胸膈不利

桑白皮等汁十味煎 治氣嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾

李氏醫鑑 卷之六

涕稠粘喘息氣上唇口焦乾亦有吐血者漸覺瘦悴小便赤少色敗毛聳此亦成蒸尸

桑白皮升一 地骨皮煎取汁三升 生地汁升五 生麥冬汁升二 生

葛根汁竹瀝三升 生薑汁 白蜜 棗膏升一 牛酥合三 以麥

冬生地葛根竹瀝姜汁和煎減半再納桑皮地骨汁和煎

三分減一再入酥蜜棗膏攪勿停手煎如飴饒夜臥時取

一胡桃大含之稍加至錫子大或晝日丸服亦可

百花膏治咳嗽不已痰中有血虛人尤宜

百合 欬冬花 等分蜜丸龍眼大食後臨臥姜湯下或

喻化加紫苑百部烏梅名加味百花膏治同煎服亦可

欬冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣並為理嗽要藥

紫苑湯久 治肺傷氣極勞熱久嗽吐血氣極六極之一也肺主氣

元氣虛則陰火盛壯火食氣故成氣極火炎肺系故久嗽不已則通血上行

紫苑 阿膠 知母 貝母 桔梗 人參 茯苓 甘

草分五 五味子十二粒 食後服一方加

勞而久嗽肺虛可知即有熱症皆虛火也海藏以保肺為君故用紫苑阿膠潤肺而虛有痰止咳以清火為臣故用知母貝母潤燥清痰以參苓為佐者扶土所以生金以甘桔為使者載藥上行脾肺五味滋腎家不足之水收肺寧之金

李氏醫鑑 卷之六 咳

生脉散 加黃耆甘草桂枝 治脉虛欬則心痛喉中介介或

腫本方加陳皮炙甘草 五味子湯蒸餅為丸治肺虛少氣咳嗽

白汗

蘇子降氣湯見吐血門 治虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛咳嗽

三子養親湯 治老人痰嗽喘滿懶食

龍腦雞蘇丸見口門 治肺有鬱熱咳嗽吐血謂卷曰此為熱而肺虛者設故

少佐參者也嘉言曰氣血二分之熱兩解此丸宜常服之

治久嗽方 白蜜一斤 生薑二斤 先秤銅銚知斤兩訖納蜜姜

汁微火焚令姜汁盡惟有蜜在則止每含如棗大丸日三

服時宜日陰分嗽者多屬陰虛治用知

高歸龍薈丸 傷寒變 治肝移熱于肺而咳嗽

五苓散 治水寒射肺咳嗽 防風通聖散 風目 治咳嗽上

蔡氏扶麻湯 虛勞 治或寒或熱成勞咳嗽聲不出體虛

自汗四肢倦怠 此方表裏交治氣血

唐鄭相國方 治虛寒咳嗽

破固紙 十兩酒 胡桃肉 二十兩 蜜調如飴每晨酒服一

大匙不能飲者熱水調忌 羊血 久服利益甚多不獨療嗽

而已

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽

六味地黃丸 治發熱咳嗽 腎虛則移熱于肺而咳嗽按之

本方加五味 三 名都氣丸治勞嗽 益肺之元

人參散 諸熱 治痰嗽煩熱 甘桔湯 喉痺 治乾咳無痰 火

順氣消食化痰丸 飲食 治五更咳嗽

二陳湯加 枳實瓜蒌 治食積痰嗽發熱 本方加 南星枳

名順氣導痰湯 治痰結胸滿喘咳上氣

茯苓甘草湯 治膀胱府咳則遺尿

茯苓 桂枝 二 甘草 一 姜二片

五苓散 各 三 澤瀉 五 桂 二 治冬時寒嗽如瘧狀

息賁丸 瘵癰 治肺積在右脇下令人灑淅寒熱喘咳發肺癰

連減半 秋冬黃

治久嗽方 欬冬花 一兩 蜜拌調入茶壺中以麵固其蓋勿

按 通有痰疾嗽對上論以胡桃三枚姜三片臥時嚼服

治嗽止 洪輔幼子病痰喘發 觀音大士令服人參胡

桃湯服之而愈明日制去皮喘復作仍連皮用信宿而瘳

蓋皮能飲肺也 一婦病肺熱久嗽身如火炙肌瘦成羸

以枇杷葉款冬紫苑杏仁桑皮木通等分熟大黃減半

先櫻桃大食後夜臥各含一粒未終劑而愈李于休方屢

治屢効如靈丹

李氏醫鑑 卷之六 咳嗽

本草備要主治註釋

細辛 治咳嗽 前胡 治咳 紫蘇并子 治痰 薄荷 治痰 知母 定

黃芩 治火嗽 麻黃 治嗽逆上氣風寒鬱于肺 經曰諸氣順則肺平

茯苓 治咳 砂仁 治咳 牛蒡子 治咳 山豆根 治熱 罌粟壳 治

一 蘿菔 治咳 百合 治咳 宜飲百合之汁飲勝于五味之酸收

餘粒 治咳 浮石 治咳 蓬砂 治咳 白石英 治嗽逆上 胆礬 伏

龍肝 治咳 白毛烏骨鴨 治咳 露水 治咳 阿膠 治嗽 獺肝 治咳

止 龜板 治久 牡蠣 治秋石 茯苓 治咳 肉桂 治咳逆結氣

不歸元能引 地骨皮 治咳 白前 治逆滿 訶子 治咳逆結氣

出血便血有寒熱二症傷寒便血爲傳經熱邪瘀血在



上焦清熱下焦利便如狂○摘玄云試血法吐水而  
者肝心虛也沉者肝血也半浮沉者心血也各隨所見以  
未日服之佳

清咽太平丸 治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉不清

肺屬金肅清之藏也木火焚灼肺金受刑故咯血早間寅  
卯本旺生火之時兩頰肺肝之部也十二經脈惟足太陽  
在表不願咽咽餘皆上循喉嚨盡能作病而  
君相二火為尤甚諸火上逆故咽喉不清

薄荷 十川芎 防風 犀角 柿霜 甘草 兩桔梗 兩蜜

丸

麻黃人參芍藥湯 治吐血外感寒邪內虛蘊熱

此大虛弱客居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒  
胃虛與補藥愈後繼居曠室臥於炕炕而吐血東垣謂  
此大虛弱客居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒

過渡熱火邪不得舒伸故血出干口當補表之陽氣為裏之  
虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與  
之連成動血却與麻黃湯立愈

桂枝 五分 補麻黃 去外黃耆 實表 甘草 炙補 白芍 安太陰  
人參 補元氣 麥冬 保肺氣 五味子 五粒 安當歸 和血養熱  
而實表 各三分 肺氣 當歸 血五分 熱

服綱目曰觀此一方足以為萬世之模範矣蓋取仲景麻

黃湯與補劑各半服之但凡虛人服仲景方者當以此為

則也

三黃瀉心湯 治心下痞熱心氣不足吐血衄血

衄何以不補心而反瀉心升漢曰少陰不足亢陽無輔致  
陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足特肝各

受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救用肺者陰之上所  
者心之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣  
宗與曰以苦瀉其熱就以其苦補其心蓋一舉而兩得之矣  
吳鶴皋曰治病必求其本陽熱上竅出血則熱為本血為  
標能去其熱則血不治而自歸經矣 士材曰古人用大  
黃治虛勞吐血意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血  
不去則新血不生也 誠菴曰此乃傷寒外感陽熱而吐  
血故用三黃寒瀉之劑若虛寒內傷吐衄而誤服此則殺  
人矣 楊仁齋曰血遇熱則宜流故止血多用涼藥然亦  
有氣虛虛寒管氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是矣  
法當溫中使血自歸經宜理中湯加木

香七氣湯 加川芎或甘草干姜湯甚效

黃連 黃芩 大黃 本方加石膏淡豉麻黃名三黃

石膏湯 表裏 本方水丸名三黃金花丸治吐血衄本方加火

黃名枝子金花丸去 枝子加 大金花丸治暑同 傷暑吐衄

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

者皆傷心虛不能生血不宜過用寒涼以瀉心宜清若  
益氣加丹皮生地犀角之類蓋若傷心亦傷氣其脈必虛  
斯無弊也

蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

喘嗽嘔血或大便秘利 肺為氣主肺虛火盛故氣高痰湧  
或喘或嗽甚則嘔血也火炎津枯

欲便 蘇子 半夏 前胡 厚朴 梔子 當歸 甘草

不利 肉桂 分 加姜棗一方無桂有沉香 沉香能升降諸氣  
溫而不燥切卷曰

咳血方 治咳嗽痰血

青黛 瓜蒌仁 去海石 山枝 訶子肉等分為末蜜丸

冷化嗽甚加杏仁

還元水 飲自已渴 治咳血吐血陰虛久嗽火蒸如燎

童便 取十二歲無病童子不茹葷辛清微如水者去頭尾

冬則用湯溫之或加藕汁阿膠有痰加姜汁 童便酸寒降火滋陰潤肺

散寒功効如神

獨聖散 治多年咳血紅痰白痰為末每服三錢臨臥糯米

湯下

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

栝葉湯 治吐血不止氣血虛寒

栝葉十姜各 三兩 艾 三把 馬糞汁 一合煎服 馬屑午為雞假之以降心火

四物湯用生熟二地加黃耆丹皮升麻柴胡名三黃補血湯

治亡血血虛六脉俱大按之空虛 諸藥涼血補氣升陽陽生則陰自長也

龍腦錫蘇丸 見口 治吐血咳嗽

犀角地黃湯 涼血變現門 治陰虛火動吐血咯血因怒致血

加味 見傷寒變現門 醫貫曰此湯乃陰虛之症借

節菴加味犀角地黃湯 見傷寒變現 治同

參蘇飲 感月 合四物名供冬補心湯尤能治虛熱吐血

痰中帶血方 鬱金末加薑汁姜汁竹瀝童便服極効

本草備要主治註釋 統治諸血另詳理血門末

澤蘭 一名孩兒菊治吐血 艾葉 大小薊 地榆頭 並治

鬱金 並治吐血 荊芥 雞蘇 黃芩 俱治 青黛 治吐血

虛火炎 者忌用 車前草 香附 治吐血 白芍 此主之故知太陰藥也

薏仁 治咳血膿血以 葱 韭 干姜炮黑 止吐血 滑石

代赭石 青鹽 伏龍肝 阿膠 並治吐血 犀角 治吐血 骨

蛤蚧 治咯血氣血 童便 輪迴酒 止吐血 扁栝葉 酒

嫩枝 地骨皮 桑白皮 治肺熱吐血 棕 燒炭不可太過

李氏醫鑑 卷之六 咳吐血

茹 淡竹葉 乾柿 治咯血 藕節 荷葉蒂 蒜 搗汁服主

白膠 療吐血 瓜蒌子 炒香酒服止吐血 天冬 麥冬 款冬花 治咳吐血

紫苑 善干達下使氣化及于州都小便自利人所不知士

材曰辛而不燥潤而不寒補而不滯非多用獨用不能速効誠金玉君子

肺癰肺癰 過飲唾涕腥臭似癰瘻方

肺者五臟之華蓋也處于胸中主氣候在皮毛勞傷血氣  
肺虛而風邪乘之內感于肺汗出惡風咳嗽短氣鼻塞  
項強胸膈脹滿久不瘳則成肺癰傷皮毛熱傷血脈  
風熱相搏氣血稽留結于肺則成肺癰多唾涎沫而無  
膿者肺癰也口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫咳吐膿  
血胸中隱痛者肺癰也痰為正氣虛癰為邪氣實肺癰如  
咳久聲啞聲嘶咯血此屬陰虛火熱甚也吐涎沫而不  
不渴必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必眩  
多涎唾用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故  
液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故  
肺癰有寒熱之異有從火熱傷肺而得之者有從肺氣虛  
寒而得之者○治癰宜養血補氣保肺清火治癰宜滋陰  
豁痰開提升散癰為邪實癰為正虛癰重而癰稍輕癰  
癰癰不可誤治肺癰者熱之所過血為之凝滯高結癰  
吐如米粥始萌  
可救服成難治

李氏醫鑑

卷之六

肺癰肺癰

音

秦艽扶羸湯

勞瘵

治肺癰

紫菀湯

治肺癰變肺癰

紫菀

洗淨

阿膠

知母

貝母

錢

桔梗

人參

茯苓

甘草

分五

五味子

粒十二

食後服

一方加蓮肉

炙甘草湯

治肺癰咳唾多心中溫溫液液者

肺氣虛則成

之上俱者悉從燥熱

化為涎沫故濁唾多

甘草

炙四

生薑

桂枝

三兩

人參

阿膠

蛤粉炒

生地

一斤

冬心麻仁

斤半

大棗

十二

水酒各半煎內阿膠烱化服

聖濟經云津液散為枯五藏痿弱營衛涸流濕劑所以潤

之嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也千金翼用之  
取在于益肺氣之虛潤肺金之燥至于桂枝辛熱似有不  
宜不知桂枝能通營衛致津液則肺氣能轉輸涎沫以漸  
而下尤  
為要

甘桔湯

治肺癰吐膿

甘草

兩

桔梗

兩

或等分

失音加

訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加貝母咳渴加五

酒毒

乾

少氣加人

參

吐膿加

紫菀

肺癰加

阿膠

咳而胸滿振

特出濁唾腥臭為肺癰此湯上之

嘉言曰此上提之法

又當引之從胃入腸此法不中用矣五藏之尊心雖為王

而肺居其上為華蓋下覆四藏合天地之德通達風氣性

愛溫而惡寒惡寒亦惡熱心火更炎上蒸其肺金被火傷

李氏醫鑑

卷之六

肺癰肺癰

重

則葉萎倚着于肝肝發瘵則嗽因心肺虛弱不能傳陽于

下焦遂至正陽俱躋變成嗽矣肺主皮毛遇寒則慄而栗

是肺嗽因痿倚着于肝而成病由木能扣金

名甘草湯治同本方加防風名桔梗防風湯治同又方桔

梗桑白皮貝母瓜蒌當歸枳殼苡仁防已一方防風各五

分黃耆杏仁百合甘草各三加萎煎亦名桔梗湯治肺

癰吐膿噎乾多渴如大便閉加大黃小便赤加水通

皂莢丸

治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不臥

聚于肺表之裏之溫之曾不少應堅而不可攻者令服此丸庶幾無堅不入其成洗滌之功不可以藥之微賤

而少之也

千金方用桂枝湯去白芍加皂角名桂枝去芍藥加皂角湯

治肺痿吐沫

本香板耶九

治肺痿喘嗽

見支

治肺痿咯血紅痰

桑白皮等汁十味煎

治久嗽成肺癰唾悉成膿出無

多

息實九

治喘嗽肺癰

加減瀉白散 治過飲傷肺氣出腥臭唾涕稠粘嗑喉不利

李氏醫鑑

卷之六

肺痿肺癰

矣

口苦乾燥

桑白皮 地骨皮 黃芩 知母 麥冬 五味 桔梗

原文曰桑皮地骨味苦微寒降肺中伏火而補氣為君黃芩知母苦寒治氣出腥臭清肺利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥冬苦寒治唾涕粘稠口苦乾燥為佐桔梗辛溫輕浮治痰逆利咽膈為使也

本草備要主治註釋

天冬 治肺痿 麥冬 治肺痿 欬冬花 治肺痿 紫苑 治喘吐 旋

覆花 治吐如 桔梗 治肺 白前 治肺氣 馬兜鈴 能清熱降肺

則肺 白及 治肺 貝母 治肺痿 升麻 治肺痿 雞蘇 治

痰 痰 治肺 山豆根 去大腸肺之風熱 苡仁 治肺痿肺癰 咳吐血以

猪肺龍苡 仁末服 白石英 治肺痿 阿膠 治肺痿 蛤蚧 治肺 竹茹 治

子 子 子

肺痿肺癰



在血位入生委密同煎荷無行血之品何以收十全之功  
理○魯命集云瘧夜發者乃邪氣深遠而入血分爲陰經  
有邪宜加桃仁于桂麻湯中發散血中之風寒○晝發屬  
陽在表屬陰○瘧久不愈爲瘧瘵多成癰于左脇之下名  
曰瘵母乃用之積也瘵屬少陽則經脈與肝相表裏久瘵  
屬在血分血亦所主也當以鱉甲爲君隨症虛實而施  
佐使之藥○時珍曰常山蜀漆切炭截瘵須在  
發散表邪及夜發必提出陽分之後方可用之

四獸飲 三因和四獸 治五藏氣虛七情兼併結聚痰飲與  
衛氣相搏發爲瘧疾亦治瘧瘵 六君子 加烏梅神果

麻黃杏仁石膏甘艸湯 麻黃湯 除桂枝 治溫瘧先熱後寒  
人參敗毒散 治風瘧鬼瘧

桂枝羌活湯 治瘧發在處暑前頭項痛脈浮有汗惡風

李氏醫鑑 卷之七

桂枝 羌活 防風 甘艸 等分每服五錢迎其發而

服之如吐加曲 半夏 無汗 桂枝易 麻黃防風湯 二湯機要

表通用之劑 此足太陽藥也瘧分六經故微仲景傷寒  
例以防風羌活散太陽之邪而以桂枝麻黃分主有汗

汗也 河間曰瘧發寒熱大作此太陽陽明合病汗出不  
止知熱也陽盛陰虛之症不治必傳入陰經桂枝芍藥

湯主之桂枝三錢芍藥黃耆知母石膏各一兩如寒熱  
大者桂枝黃芩湯和之小柴胡湯加桂枝知母石膏外邪

已罷內邪未已大柴  
胡大承氣等下之

常山散 治吐瘧痰

兒角 白礬 常山 甘艸 爲末溫水調下五分探吐

小柴胡合平胃散名柴平湯 治濕瘧身重身痛 本方

夏加常山 名柴胡飲子治瘧疾 喻嘉言曰于和法中本方

白芍大黃 治勞瘵 遇勞 本方 去半夏人參姜棗加治瘧發小

加花粉 治勞瘵 遇勞 本方 桂枝乾姜牡蠣花粉 柴

胡湯本陰陽兩停之方可從寒熱以爲進退此方加  
姜桂則進而從陽其加茶連以退而從陰可以類推

夏加常山 名柴胡飲子治瘧疾 喻嘉言曰于和法中本方

白芍大黃 治勞瘵 遇勞 本方 去半夏人參姜棗加治瘧發小

加花粉 治勞瘵 遇勞 本方 桂枝乾姜牡蠣花粉 柴

胡湯本陰陽兩停之方可從寒熱以爲進退此方加  
姜桂則進而從陽其加茶連以退而從陰可以類推

三解湯 治時行瘧之通劑 少或但寒不熱

柴胡 麻黃 去澤瀉 各三 病有三在表在裏及在半

邪正分爭併于表則在表併于裏則在裏未有併則在  
半表半裏麻黃之辛能散表邪由汗而泄澤瀉之瀉能引

裏邪由溺而泄柴胡升陽居表裏之間而和解之此但可  
以治實瘧虛者當辨其氣血而加補劑書發屬氣虛夜發

屬血  
滑脾飲 治瘧疾熱多寒少口苦噎乾小便赤澀脈弦數

李氏醫鑑 卷之七

陽勝也口苦噎乾肝胆火也熱盛故便赤瘧邪居  
于半表半裏屬少陽甲胆之分肝胆屬木故脈弦

青皮 厚朴 炒 柴胡 黃芩 炒 半夏 炒 茯苓 白朮 炒

甘艸 草果加姜棗煎一方加檳榔大渴加 麥冬 瘧不止

加酒炒常山 錢 烏梅 二個常山切剉煎截

瘧爲肝胆之邪然多因脾胃受傷而起脾胃屬土土重感于  
濕濕生熱熱生痰故見前症脾胃既受病木又尅之故用青

皮柴胡以破滯而伐肝半夏厚朴以行痰而平胃茯苓用  
以滲濕黃芩用以清熱艸果辛熱能散太陰之積寒除痰

而散痞且清膏粱之痰蓋先去其害  
脾者而以白朮甘艸調而補之也

不換金正氣散 治瘧疫濕瘧平胃散加 藿香 再加 人參 茯苓

生薑 名參養胃湯 見 治飲食傷脾發爲瘧瘵 老瘵

烏梅 名參養胃湯 見 治飲食傷脾發爲瘧瘵 老瘵

子 52-118

常山飲 瘧久不已者用此截之

初起不宜禁藥即邪氣未盡發生他症久發則截之

常山 燒酒炒 艸果 檳榔 知母 貝母 烏梅 姜片

張一牛酒半水煎露一宿日未出時而東空溫服渣用

酒浸煎待瘧將發時先服一方

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下氣

破積能消食行痰陰陽不心則瘧作知母滋陰能治陽明

獨勝之火艸果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結

瀉熱除痰烏梅酸飲滴收生津退熱

劑也 趙以德曰常究本艸知母艸果常山甘艸烏梅檳榔

李氏醫鑑 卷之七 瘧

明治獨勝之熱使退就太陰艸果溫燥治足太陰獨勝之

寒使退就陽明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常

山土寒熱瘧吐胸中痰結是為臣藥甘艸和諸藥烏梅去

痰檳榔除痰破滯氣是為佐藥川山甲穴山而居遇水

而入則是出入陰陽貫穿經絡于營分以破暑

截之邪為使藥也惟脾胃有鬱疾者用之收効

截瘧七寶飲 治瘧瘧久發不止寸口脉弦滑浮大者

若為瘧浮為在表大為陽 不問鬼瘧食瘧並皆治之

常山 艸果 檳榔 青皮 厚朴 陳皮 甘艸

等分用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿于當發之早

而東溫服 藥正發時不可服藥 此皆溫散行痰之品加

肥寒治也用之亦効者值病入陰陽相傾脾氣鬱結濁液

凝痰閉塞中脘因得燥熱亦以暫開所以氣通而疾止若

手氣虛弱內有鬱火之人復 用燥熱愈却愈虛答將誰執

驚甲飲 治瘧久不愈腹中結塊名曰瘧塊

驚甲 醋 白木 黃耆 川芎 白芍 枳殼 艸果 厚

朴 陳皮 甘艸 等分姜片棗一烏梅少煎久瘧必由

補脾氣黃耆補肺氣使氣足運脾方能磨積也川芎補肝

而行血中氣帶白芍助脾而散肝經火邪二藥並和厥陰

營氣營血調則陰陽和檳榔下氣而攻積艸果煖胃而祛

寒厚朴破血而散滯陳皮理氣而消痰甘艸和中而補土

驚甲 醋 平屬陰色青入肝能益陰 補虛消熱散結故為瘧瘧之君藥也

木香 檳榔 九 治食瘧 五積散 治寒瘧惡熱無汗

李氏醫鑑 卷之七 瘧

桂枝白虎湯 治溫瘧但熱無寒骨節疼痛時嘔

茵陳九 治黃病瘧瘧 六一散 治熱瘧但熱五苓散

治痰飲濕瘧 合小柴胡湯名柴苓湯 治瘧疾熱多寒少

保和丸 治食瘧下痢 桃仁承氣湯 治瘧疾實熱夜

發熱入血分則夜發 稀涎散 加藜蘆常山甘艸各常

山散吐痰瘧

經驗方 常山 檳榔 葛蒲 酒煎露一宿空心服

經驗方 統治諸瘧並瘧瘧廣內尤効

柴胡 五錢 黃芩 二錢 陳皮 八分 半夏 一錢 茯苓 一錢 猪苓 澤瀉 各一錢 白朮 一錢 蒼朮 一錢 甘草 七錢 加姜 三錢 口渴加 石膏 花柳 惡

寒 加桂 惡熱加 黃連 乾葛 輕者一二服重者三五服必効

張知開 治熱時疫 火年餘 骨立 醫用 附諸藥 治熱 孫琳 治小柴胡湯 三服 脫然 琳以此名 勞瘵 熱從 隨出 加以 剛刺 氣血 愈 瘵 有皮 膚在 藏 府 在 骨 髓 者 非 柴 胡 不 可 若 得 銀 柴 胡 只 須 一 服 南 方 者 力 減 故 三 服 乃 効 也

肥氣丸 治肝積在左脇下有頭足令人發咳痰瘧不

本艸備要主治註釋

常山 專治諸瘧 土材 口常山 發吐 惟生用 多用為 然與甘 艸 同用 亦必吐 若酒浸 炒透 但用 錢許 每見 奇功 未

李氏醫鑑 卷之七

七

見其或吐也世人泥于老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起抑何愚耶

鱉甲 治溫瘧瘧母瘧必由于暑邪類多陰虛之人邪入陰

熱而散結故為治瘧之聖藥

猪苓 治瘧瘧多由暑濕必兼濕

葳蕤 治寒熱 牛膝 治久 白薇 治溫瘧寒熱瘧瘧寒熱作

半夏 治瘧 何首烏 治惡瘧 草薢 治瘧瘧寒熱瘧瘧寒熱作

其一陰一陽 艸果 治太陰陽明之寒知 青皮 散邪入脾除

瘧瘧家必用之品故清脾飲 乾葛 治溫 麻黃 胡黃連

以之為君治久瘧用醋炒 乾葛 治溫 麻黃 胡黃連

翁 治溫瘧 芫花 治瘧 菴陳 板榔 大腹皮 烏梅 良

姜 治瘧 青蒿 治久 射干 治瘧母同驚甲煎之 附子 治寒

板 治瘧瘧或得數年中 白豆蔻 治瘧 雄黃 治瘧 杜牛膝

附本艸經疏治瘧約畧

瘧必由于中氣虛破氣則傷中氣邪不得解甚則中滿不

思食作泄惡寒口乾惟傷食宜消 誤下則邪陷于內

李氏醫鑑 卷之七

八

硬石膏 自一兩知母 自四錢至竹葉 白一片至 麥門冬 自

錢至三錢 梗米 自一小撮 病人素虛或作勞者加人參 自三

兩 有痰加橘紅 三竹瀝 一大湯者加枯薑根 三錢至 不渴

者用清暑益氣湯兼飲食停滯者加枳實青皮艸果一二

劑食消即止勿多服多服則損中氣 其藥俱宜黃昏煎以

更溫服蓋瘧乃暑邪為病暑得露則散○瘧病多扶掖以

故熱瘧須用貝母為君自三錢至八錢竹瀝竹茹花粉橘

紅白茯苓稱是以佐之其者可加薑天荷如寒多不渴者

用半夏白朮橘皮為君多入生薑皮○瘧病多扶掖以



度滯下若愈癰亦隨止即不止其熱必輕 凡勞瘵病人陰不足或作勞或房勞病發于陰或間日一發或三日一發此則為病深須以醫甲午勝何首烏為君橋皮為佐發于夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以姜皮熱甚勿入大劑與之便瘥 凡瘥疾多熱久不解者其人必本陰虛法當益陰除熱非驚甲午勝不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛非人參白朮黃耆不能除 暑熱濕之邪內伏口藥不效者用獨雄九立愈 病人虛者以人參姜皮各兩許濃煎露一宿五更溫服有痰者宜加木橋皮各四錢貧人或用人參一兩或用麻黃一兩同姜皮煎服其多用其力可代人參 足小陰經屬腎其症寒熱俱甚腰痠脊強口渴寒從下起小便短赤宜先服人參白朮湯加桂枝以祛暑邪後用驚用四五錢牛膝兩許熱甚者加知母麥冬各四五錢寒甚者加桂枝錢許嘔則兼加姜皮三四錢如熱甚而嘔者去桂枝姜皮加竹茹三錢人參橋皮各三四錢用牛膝桂枝者肝腎同一治故也

李氏醫鑑

卷之七

癰

九

二木柴葛湯 諸瘧必用神方

白朮 蒼朮 柴胡 陳皮 各七分  
甘草 四分 水鍾半 姜五片  
煎八分服一日一發及午前發者邪在陽分加 枯芩 伏苓 其口渴加 石膏 知母 麥冬 間日或三四日發或午後及夜發者邪在陰分加四物湯酒炒 黃耆 提起陽分方以截之脉虛神倦加人參 傷食者加 神曲 麥芽 瘵多加 生薑 要止截加 枳殼 常山 烏梅 瘵食者必惡食加山查傷肉食者加黃連紅曲傷谷食者加枳實神果各七分為麵食者加李子杏仁積消即已

滯下 俗名

附脫肛 脫肛詳論并方

喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼以解表次用苦寒以清裏裏裏安後重宜下腹痛宜和宜宜除濕脈弦宜去風風濕內結宜汗身冷自汗宜溫溫宜和宜宜赤熱白寒者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分○下痢後重者氣滯也通作濕熱處治但有新久虛實之分○小便後重者氣滯也通作濕熱處治但有新久虛實之分○物必上行而後下降經曰地氣上為雲天氣下為雨天地不交則萬物不通也○丹溪曰氣升則水自降○裏急後重則虛詳論見後黃芩芍藥湯後○原病式曰或言下痢白為寒者非也寒則不能消穀何由反化為膿也燥鬱為白為肺金也世謂皆兼下濕濕熱甚于腸胃之內致氣液不得宣通使煩渴不止也下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤誤寒熱與氣液能俱甚于腸胃而同為痢乎各隨五藏之部而見其色其本則一出于熱但分淺深而已或曰何故服辛熱之藥亦有愈者曰為能開發鬱結使氣液宣通

李氏醫鑑

卷之七

滯下

十

流濕間燥氣和而已莫若用辛涼苦寒之藥微加辛熱佐之如錢氏香連丸之類是也○大法治痢以甘芍和中止腹痛熱痛加芍連寒痛加姜桂以木香檳榔行氣除後重氣分如枳殼滑石寬腸血分加當歸桃仁和血以秦艽子祛風黃芩黃連清熱毒以白朮陳皮調胃扶苓澤瀉參濕枳實人黃破積驅吐加石黃姜汁氣虛加參木黃耆血虛加芍歸阿膠黑姜相藥痢已後重不解去枳榔換條芩加升麻提之○丹溪曰初下痢腹痛不可用參木然氣虛胃虛者可用初得之亦可加大承氣調胃承氣下之看其氣血病然後加減用藥皆治葉先生滯下後甚過追正合承氣症但氣口虛形雖瘦而黃白此必平昔過食傷胃氣弱忍二三日辛苦遂與參木陳芍藥十餘帖至三日後胃氣稍充與承氣二帖而安荷不先補完胃氣之傷而遽行承氣能免後患乎此後下先補倒之變者○保命集曰厥逆瀉痢不止脈沉遲手足厥逆瀉血稠粘此為難治宜麻黃湯小續命湯汗之為有表邪雖于內當散表邪則藏府自安矣始痢宜下久痢宜補然亦有先補而後下者正此之謂是也○痢症便膿血或赤或白或赤白相雜或

下紫黑血塊或如豆汁或如魚凍或如屋漏或下純黃積或下純血類多裏急後重數登閣而不得便小便短赤不利或發熱或口渴其則嘔惡不思食此皆暑濕之邪與飲食積滯膠固腸胃而作必先祛暑滯濕安胃為上傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血按脈血則行血藥雖因症而設要皆以補養胃氣為急故其症以嘔口痢為最重胃氣一絕則不可治矣故口安穀則昌絕穀則亡不可輕用大黃朴硝巴豆牽牛以致洞泄腸胃而斃亦不可妄投謂子乘穀收瀝等味致變他症

宜清熱消積 開胃氣 升 則小便

黃連 黃芩 白芍 紅麴 山查 橘紅 升麻

葛根 甘艸 滑石 蓮肉 扁豆 烏梅 如胃弱加

人參 蓮子 橘紅 升麻 如腹痛以黃連 白

李氏醫鑑 卷之七 瀉下

七

芍藥 甘草 黃芩 升麻 煎服如裏急同上藥

加當歸 如後重甚加枳榔 一錢 枳殼 一錢 木香 一錢 如

口渴 去木香 如小便赤澀短少或不利亦倍之赤多 倍烏

查神 白多加 惡心欲嘔即嘔口痢多用 人參 蓮肉 扁

色升麻 佐之久痢不止加 肉蔻 一錢 人參 三錢 砂仁 一

復有毒痢一症或痧毒內陷下膿血各藥不効者加金銀花

為君地榆丹砂犀角汁次之凡產後滯下積滯雖多腹痛

雖極但用人參白芍當歸紅麴升麻益母艸炙甘草滑石

末足矣若惡露未盡兼用乳香沒藥 各七分 炒砂仁 一錢 久

之自愈血虛可加阿膠 錢 凡胎前滯下宜用黃連黃芩白

芍藥甘艸橘紅紅麴枳殼蓮肉畧用升麻未滿 用滑石

芍藥甘艸湯 加黃芩名黃芩芍藥湯 治熱痢腹痛後重

身熱膿血稠粘脈洪數本方加白朮 治脾濕水瀉身重

困弱 保命集曰瀉痢不止或暴下者皆太陰受病不可離

白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附更詳外

症治之如身因倦加白朮白汗逆冷氣急微加桂附以溫

之如裏急後重膿血稠粘雖在盛冬于溫藥內亦加大黃

初庵曰裏急後重有因火熱者火燥而性急也有因氣滯

者大腸氣壅不得宣通也有因積滯者腸胃有物結壅也

有氣虛者中氣陷下不能升也有血虛者津枯腸燥虛坐

努責是也當分症論治脈洪大而下 瀉下

芍藥湯 治下痢膿血稠粘腹痛後重 下痢皆屬濕熱赤膿

稠粘氣血兩傷也腹痛後重氣血皆滯 傷血白為傷氣膿血

也行血則膿血自愈調氣則後重自除

白芍 歸尾 黃芩 黃連 大黃 木香 枳榔 甘

艸 二錢 桂 半錢 每服五錢利不減加大黃 下痢由濕熱鬱積

故大便重急小便赤澀辛以散之苦以燥之寒以 于腸胃不得宣通

清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為反佐也 本方除

桂甘艸加枳殼名導滯湯 一作導 治前症兼渴者 此方今

蒼朮地榆湯 治脾經受濕痢疾下血

蒼朮 三兩 地榆 炒黑 每一兩煎 蒼朮燥濕強脾升陽而

香連丸 治下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 二十兩 吳茱萸 十兩 木香 四兩 八錢 醋糊九米飲下

方等分蜜丸一方加甘艸八兩黃連用蜜水拌蒸曬九

痢為飲食不節寒暑所傷濕熱蒸鬱而成黃連苦燥瀉寒

勝熱直折心脾之火故以為君用吳茱萸同炒者取其能利

大腸壅氣且以殺大寒之性也痢乃脾病傳于大腸水香

通利三焦泄肺以平肝使不克土氣行而滯亦去也一寒

因熱用也痢初起忌用為黃連厚腸胃瀉腸也

白頭翁湯 治傷寒熱痢下重欲飲水者 此傷寒轉痢之症

黃連 白頭翁 各一斤 甘草 半斤 芍藥 一斤 水煎服之

李氏醫鑑 卷之七 下痢 十三

白頭翁 秦皮 黃連 黃柏 三兩

成無已曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛故以純苦

之劑堅之徐忠可曰此主熱利下重乃熱傷氣氣下陷而

重也陷下則傷陰陰傷則血熱雖後重而下用調氣之藥

病不在氣耳周揚俊曰邪傳厥陰少陽其表也藏府相連

于法禁下故但謀去其

濕濕除而利自止矣

真人養藏湯 治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛 此門為大

腸受熱受寒皆致脫肛○大腸者傳導之官腎者強作之

官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主

故脫肛小兒血氣未壯老

香導氣丸

黃連阿膠丸 治冷熱不調下利赤白裏急後重臍腹痠痛

口燥煩渴小便不利 濕熱瀉于腸胃故腹痛口渴而便秘

黃連 兩 茯苓 兩 阿膠 兩 為末水熬阿膠為丸空心米湯

下延年除茯苓加乾姜 名駐車丸治同 黃連瀉火燥濕開

熱阿膠補陰益血潤燥利腸以和其裏急後重能使肺氣

下降通于膀胱清熱利水止渴除煩為清熱之平劑黃連

本除濕 蘇東 治赤白痢 薑茶 各三錢煎服 或微炒煎此

平淺而 忽之也 本方加白梅 名梅蜜飲治熱痢 除不加木 治冷痢

李氏醫鑑 卷之七 帶下 治痢

蜜善 槐花散 治血痢腹不痛不裏急後重

槐花 炒 荆芥 炒 青皮 等分為末每服三錢米飲下

六一散 加紅曲 名清六九治赤痢 紅曲能調 加乾姜 名溫

六九治白痢 乾姜能收 濕熱之氣

羌活勝濕湯 濕熱 除川芎加蒼朮升麻麥 升麻除濕湯治脾

虛瀉痢 芽神曲猪苓澤瀉名

左金丸 治肝火燥盛噤口痢湯藥入口即吐

黃連 六兩 姜 吳茱萸 一兩 水丸 本方加糯米一撮瀉痢

但得三匙下咽即不復

吐 ○本方如白芍等 名戊巳丸治熱痢熱瀉 熱瀉者黃

胃土已為脾土加白芍 伐肝瀉木使不封土也 ○保和丸 治食滯下痢

人參樗皮散 治久痢膿血不止 久痢不止 氣虛也

人參 樗根 白皮粗末等分 為末米飲或酒調下 勿用

九味羌活湯 治毒痢

茵陳丸 治赤白痢 感應丸 治寒積瀉痢

胃風湯 治血痢而挾濕者寔可倚伏

膠艾湯 四物加阿膠艾葉甘艸治男婦血虛下痢

桃仁承氣湯 治痢疾畜血急痛 烏梅丸 治久痢

李氏醫鑑 卷之七 帶下 治痢

參苓白朮散 加石菖蒲 治噤口痢 訓庵曰噤口雖屬脾虛

香失之溫山藥失之閉惟服 此散胸次一開自然思食

平胃散 加川續斷 二錢 每服二錢止血痢

噤口痢要方 人參同黃連煎湯呷之但得下咽便好 黃連

要藥時珍曰治痢用香連先水大散用黃 連乾姜 姜黃散用黃連生姜

案 梁莊公血痢用烏梅胡黃連竈心土等分 為末茶調服

而愈 ○曾魯公血痢百餘日 固醫不能療應之用益梅

肉一枚研爛合服茶

人醋服一啜而安

丹溪曰一人面白脈弦數獨胃脈沉滑因飲白酒作痢下

淡水膿血腹痛後重小便不利參朮為君滑石甘艸枳榔

木香為佐下保和丸三十粒次日症盡獨小便未利

與六一散而安此消積兼施首 ○冠宗真云癰毒十六七

疏飲無度多食通竅奇毒在藏日夜三四十溲大便與膿  
血雜下大腸連肛門痛不堪忍用止血痢藥不効又以助  
風藥則益其益腸風則有血無膿如此半年氣血漸耗食  
減肌瘦服藥則腹愈痛血愈下服冷藥則注瀉食減服  
溫平藥則若不知如此期年垂命待盡或教服人參散一  
服却二服戒三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸  
風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用枳椇白  
皮一兩人參一兩為末米飲調服忌油膩濕麵青菜菓子  
甜物雞豬魚  
羊蒜薤等物

本艸備要主治註釋

木香 治後重瘕閉同枳椇治痢疾行血則膿血 枳實 除後

白頭翁 治苦之刺堅之仲景治熱痢有白頭翁湯加連柏

秦藟子 治泄痢下重下者氣滯也 赤石脂 治大小腸下後

李氏醫鑑 卷之七 痢下

而瀉無以固之其他諸藥輕浮不能達下惟赤石脂體重

之加干 白芍 牛膝 瀉痢不 艾葉 治冷 附子 干姜 使

姜梗米 白芍 牛膝 瀉痢不 艾葉 治冷 附子 干姜 使

君子 良姜 地漿水 治泄痢冷熱赤白以新汲 雄黃 治

痢石硫磺 治冷 大蒜同黃丹 治痢 桔梗 升溪日痢疾腹痛乃

宜桔梗 胡椒 蕪荑 以上並治冷痢蕪荑 雞蘇 治血 薄荷

治血痢血病在凝 五靈脂 羚羊角 扁柏 枝子

並治 棕燒黑能止久血痢 荆芥 苦參 乾葛 血痢止 木賊

血痢 與髮灰同用更良 大黃 治下痢 澤瀉 車前子 治

痢 赤白 大青艸 治熱 大黃 赤白 澤瀉 車前子 治

痢 知母 治下 黃芩 得白芍 治下 胡黃連 治瀉 羅下 搗

汁治噤口痢夏月食其菜數斤秋不患痢冬月以 芥子 調  
菜攤屋瓦上任意霜雪打至春收之煎湯飲治痢 芥子 下  
痢後 枳椇 同 砂仁 治赤 華菱 治氣痢牛 玄明粉 治痢 訶  
重 止用大黃玄明粉以推蕩之而瀉痢反止蓋 山豆根 治下  
宿垢不爭疾終不除經所謂通因通用是也

木鱉子 赤小豆 治瀉 淡豆豉 治血痢又口 綠豆 薏仁

並治 神曲 同 紅曲 治赤 五谷虫 治毒 淮藥 滑石 白

礬 皂礬 石灰 百艸霜 鷄肫皮 並止 禹餘糧 治下

厚朴 烏藥 並治 瘕痢 青蒿 治久 龍骨 海螵蛸 五倍

子 墨栗壳 金櫻子 核代賴石 龜板 治久 槐花 治赤

黃蠟 療下 蠟匱丸 巴豆丸 論載洩瀉門 椿樗皮 治久 若

李氏醫鑑 卷之七 痢下

未盡勿遽用勉強 石蓮子 治痢 沉香 治痢 烏骨雞 治痢

固瀉必受他症 益甘飲 阿膠 治痢 傷暑 伏暑 芒硝 治疫 地榆 止久

小便

李東垣曰氣口大于人迎四倍名曰關關則不得小便人迎大于氣口四倍名曰格格則吐逆關者其氣之格者甚矣之氣是關無出之由格無入之理也小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱不能生水是絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若熱在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之藥藥治之○若為水之上源罪氣散積上歸于肺始能通調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便一經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也○若欲便清先分肝火心火小便頻數便時痛不可忍者此必先大瀉其熱不通也此疾本因貪酒色或以過食辛熱草賦之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與淋症清而痛者不同宜用草解一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通

李氏醫鑑

卷之七

小便

九

便數而痛自減也○丹溪曰便不通屬氣虛血虛是熱痰閉皆宜吐之以升其氣氣升則水自降氣虛用參木升麻等先服後吐或就參著藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芍歸湯探吐之痰多二陳湯先服後吐或加香附木通寔熱當利之或入正散蓋大便動則小便自通矣○或口以吐法通小便其理安在曰取其氣化而已經謂三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣三焦之氣一有不化則不得如決瀆而出矣豈獨下焦膀胱氣塞而已哉又曰譬如滴水之器上數若閉則下數無自以通必上竅開而下竅始出也○小便不通則若欲死者急以甘草煎五錢煎湯垂服至下即通此急救之良訣也○熱在上焦氣分便秘宜用淡滲之藥瀉火清金滋水之化源○熱在下焦血分便秘而渴乃真水不足膀胱枯涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通○丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥低膀胱熱宜瀉膀胱此正

治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾熱不能運而精不上升故肺不能生水則燥脾此隔三之治○瀉膀胱知柏之類清肺車前茯苓之類燥脾二木之類○有痼小便閉者衆不能盡張子和易以急流之水煎煎藥一飲而溲○轉勝之症肝系轉反屈曲不舒水道乃閉小便急痛亦不易治強忍小便乃致于是孕婦有此當舉胎胎○壅脹門加味腎氣丸後有利小便精論

甘澤飲 治上焦肺熱小便秘瀉

甘艸 澤瀉 茯苓 通艸 車前子 瞿麥 木通

扁蓄 枝子 琥珀

五苓散 表裏 治口渴渴小便不利木方去桂名四苓散 無惡寒症不可用 桂五苓為渴而小便不利者若不渴則本方加辰砂名茯苓甘艸湯是矣若但渴則四苓足矣

李氏醫鑑 卷之七 小便

辰砂五苓散並治小便不利木方合益元散加琥珀名茯苓琥珀湯治便數而欠頻而短少

三黃丸 治下焦熱口不渴而小便秘

滋腎丸 一名通 治三焦積熱胸膈煩躁小便赤澀

黃柏 知母 各一兩 桂一錢 研 每服百丸

水香檳榔九 治二便不通 猪苓湯 治口渴渴赤

八正散 治濕熱下注咽乾口渴小腹急滿小便不通或

因熱為腫 治濕熱下注小便急澀則小便當行矣而卒不行者乃熱澀之也

車前子 細 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘艸 枳

枝子 黑大黃加燈艸煎一方加木香 取其辛能利氣

此手是太陽手少陽之合也不通則肺熱而心火肺  
為氣化之源心為小腸之合也車前清肺熱而通膀胱  
利絡下陰器膀胱津液之府也置麥冬通降火通淋此皆  
利而兼潤者也滑不利則乾乾則結子大黃苦寒下行  
能緩痛也雖治下焦而不偏于治下必三焦通利水始下  
行也○膀胱藏水三焦出水故治小便  
不利刺灸法但取三焦穴不治膀胱

草薢分清飲 治小便頻數 腎氣虛則不能

六味地黃丸 加杜仲 牛膝 治小便頻數 腎氣虛則不能

便頻數 益智辛熱 治小便頻數 腎氣虛則不能

涼膈散 治心火上盛中焦燥寔小便秘

李氏醫鑑 卷之七 小便

補中益氣湯 治中氣不足以致小便利 經所謂氣化

桑螵蛸散 治小便數而欠 數頻數也欠便短也溺雖出于

則便數小腸 能安神寬補心氣療健志

人參 茯苓 一用 志肉 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨 蝦

龜板 酥炙一方用 當歸等分為末臨臥服二錢人參湯下

腎着湯 治膀胱熱痛溺于小便上為清溺 風寒濕邪客

能化故水道不通足太易經上額絡胸太陽

經氣不得下行入胃而流下則為清溺

東垣曰王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石癰裂  
出水夜不得眠飲食不下治諸利小便藥通服不効請  
余診治歸而至且不寐問記案云無陽則陰無以生  
無陰則陽無以化又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣

化則能出矣此病癰秘是無陰則陽無以化也此因膏  
梁積熱損傷腎水又逆上而為嘔噦內閉外格之症  
悉具死在旦夕矣遂以北方大苦之劑與滋腎丸每服  
百粒少時前陰如刀刺火燒溺如瀑泉腫脹遂消此症  
一在生焦氣分而渴一在下焦而不利若膀胱虛陰  
無以化又當用人味腎氣丸一人素多酒色二便不  
通下極脹痛用利藥不効是濕熱之氣壅塞精道病在  
二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也  
用棟子茴香穿山甲  
倍用辛牛煎服愈

本州備要主治註釋

蘆根 治小便數中空能入心肺清上焦熱熱清

而桑螵蛸 縮小便能通故能縮腎與膀胱相表裏腎得所

又能 茯苓 小便結者能通多者 山黃 縮小便 金櫻 治小便

李氏醫鑑 卷之七 小便

左烏藥同益智仁等分為丸 治虛便數者取其 花椒 治瀉

芡實 治小便 石斛 治遺精 杜仲 治小便 菟絲子 同續斷

便 葶子 治遺 固紙 縮小便 天冬 麥冬 白芍 牽牛 燈

心 通艸 木通 白茅根 浮萍 澤瀉 車前艸子

黃柏 知母 扁蓄 地膚子 香薷 並利小便 使君子

治便 華薢 能去濁 石膏 治小便 滑石 同蘿下 桑白皮

猪苓 苦楝子 梨 瞿麥 防已 二陰不通者非此不

經之 蛤粉 升溪日 郁李仁 治癰 秦艽 牛乳點服 髮利二 赤

所致 蛤粉 利小便 郁李仁 治癰 秦艽 牛乳點服 髮利二 赤

小豆 利小便 石熱 磨汁飲之 狗脊 治失溺 牛膝 治失 紫苑 便

及瀉血者服  
一兩立効  
車前艸  
根葉搗汁  
飲治尿血  
苦根  
治尿  
楮樹皮  
利小便  
加  
味腎氣丸  
腫滿  
治小便不利  
方後  
論其精  
可參看

李氏醫鑑

卷之七

小便

三

大便秘結

李東垣曰腎開竅于二陰經曰大便難者取足少陰大腎  
五液津液足則大便如常若飢飽勞役損傷胃氣及食  
辛熱味厚之物而助火邪火伏血中耗散真陰津液虧少  
故大便燥結少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以  
苦潤之陽結者散之陰結者溫之傷食者以苦泄之血燥  
者以桃仁酒製大黃通之風燥者以麻仁加大黃利之氣  
滯者以郁李仁枳實通之角仁潤之不可概用牽牛巴豆之  
類下之損其津液燥結愈甚或成不救經曰脾氣散精  
上歸于肺通調水道下輸膀胱脾虛則土弱不能生金肺  
無所資遂不能生水故外則皮毛枯槁內則二便閉結宜  
滋肺和脾壯水養血又曰肺為生木之源火旺剋金則  
肺病而津液枯故二便難則以滋陰降火為先大腸為  
傳導之官變化出焉秘結不通由于風燥熱燥陽結陰結  
氣結氣虛津竭血竭陽結宜散陰結宜溫熱補潤滋潤治各  
不同風結即風秘由風搏肺藏傳于大腸或素有風病  
者亦多秘氣秘由氣秘不升降血秘由亡血血虛津液不

李氏醫鑑

卷之七

大便秘結

三

足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣橫于腸胃凝陰固結津  
液不通非燥熱也仲景曰脈浮而數能食不大便者此  
為定名曰陽結脈沉而遲不能食身體重不大便反難名曰  
陰結東垣曰寒秘熱秘即陽結也宜散之虛秘冷秘即  
陰結也宜溫之丹溪曰古方通大便皆用降氣昂劑益  
肺氣不降則難傳送用枳壳沉香訶子杏仁等是也又老  
人虛人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻仁潤膠等  
是也如妄以峻藥通之則津液走氣血耗損精通而即秘  
矣必變生他症綱目曰大便秘滿不知氣不降也便  
以爲塞而行大黃如此害人甚速風秘者風生燥也氣  
秘者氣滯也故大便秘不通燥則  
血滯津液不行或偏身虛癢

潤腸丸 治腸胃有伏火大便秘滿全不思食風結血結

大黃酒

歸尾

五錢

桃仁

研

大蘇仁

一兩

蜜丸

一方有

防風風濕加秦艽皂角子

性

本方加防風皂角仁蜜丸



各活血潤燥丸治同。是角得則潤燥 本方去羌活加升

熱各潤燥湯治同。加升麻者能 升始能降也

通幽湯 治幽門不通上衝吸門塞不開氣不得下大便

艱難名曰下脫不通治在幽門。下脫即幽門胃之下口也

上也幽門上衝吸門吸門即含氣喉上掩飲食者也衝

其吸人之氣不得下歸肝腎為陰火相拒故腸噎不通濁

陰不得下降而大便乾燥不行胃之濕與陰火俱在其中

則腹脹作矣治在幽門使吸門通利則其陰火潤其燥血

生其新血則幽門通吸門亦不受邪屬也

得開脹滿俱去矣是濁陰得下歸地也

歸身 升麻 桃仁 紅花 甘艸 錢 生地 熟地 五

或加 五分 本方 加黃 麻仁 各當歸潤腸湯治同 諸藥滋陰養

李氏醫鑑 卷之七 大便秘結 重

明矣加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升

則濁陰不降所謂地氣上為雲天氣下為雨也

麻仁蘇子粥 治虛人老人風秘

大麻仁 蘇子 研 等分洗淨合研再用水研取汁煮粥暖

滑腸潤燥利便除風和血下氣行而不峻緩

而能通故老人產婦氣血不足者所宜用也

升陽除濕防風湯 治大便秘塞或裏急後重數至圉而不

能便或有敗膿或血慎勿利之利則必至重病反鬱結而

除白 青皮 陳皮 黃連 酒 黃柏 同 甘艸 升麻 二 柴胡

降矣 桂枝 人參 黃耆 蒼朮 白朮 厚朴 猪苓 三

澤瀉 吳黃 白豆蔻 炒 麩 分 麻黃 六分 杏仁 四粒

蘇子降氣湯 治大便不利 火炎津枯有升無降故失便

而愈不通或暫通復秘因而下血者亦

當順氣順則自通當求溫緩之劑

木香順氣湯 治陰陽壅滯氣不宜通胸膈痞悶腹脇脹

滿大便不通 大便不通者清陽

不升濁陰不降也

天王補心丹 治大便燥而閉或時澀者 由心火不能

牛疏丸 治老人虛秘冷秘 半夏 硫黃 等分生薑汁糊

李氏醫鑑 卷之七 大便秘結 重

木香 檳榔丸 治大便不通

元戎四物湯 四物加 桃仁 治藏結便秘

三黃丸 治三焦積熱心膈煩躁大便秘結

當歸龍薈丸 治腸胃燥澀

涼膈散 治心火上盛中焦燥定大便秘

潤燥通秘方 治心火上盛中焦燥定大便秘

蜜煎 治便秘 煎蜜成膠乘熱納穀

搜風順氣丸 治風秘氣秘便溺阻隔

滋燥養榮湯 治火燥肺金血虛外燥皮膚波揭及血虛

風燥老人虛人便秘或大便風秘

案

李時珍曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不食醫皆議補脾治風清利頭目服藥雖愈全不進食其家憂惶予辨前藥皆誤此是老人風秘藏府壅滯聚于胸中則腹脹惡心不思飲食上至于頭則頭痛不消也今作麻仁潤腸而氣泄下結糞如椒者十餘枚漸得通利不藥而愈○一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥滯服硝黃藥則若閉知如此三焦氣滯有升無降津液皆多澀日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下滋腸胃非血燥也潤藥多滯硝黃入血而不能入氣故無効用牽牛為末散之角青丸緩服便通一人素多酒色病二便不通服藥無効角青丸緩服便通藥不効予思此乃濕熱之邪在腸胃也連服二劑陰之問故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用棟實茴香牽牛山甲諸藥倍牽牛三服而平

李氏醫鑑 卷之七

大便秘結

七

本艸備要主治註釋

東垣曰桃仁杏仁俱治大便閉當分氣血其便難屬陽虛夜便艱難為陰血虛虛人便閉不可過泄泄脈浮為氣中杏仁陳皮肺沉屬黃耆同陳皮白蜜能通虛人腸閉血用桃仁陳皮功元參 天冬 半夏 益母艸 俱通 紅花 紫艸 則功也 閉得此涼之則 凌霄花 威靈仙 治大小 秦艸 知母 血行而毒出 牽牛 冬葵子 下 榆白皮 俱利 細辛 治便 葶藶 利 木通 防已 濕熱流入十二經致二 木鱉子 利大 大麻仁 腸滑 石硫磺 性雖熱疏利大腸 鹽通二 枸杞 利大 地骨皮 利二 瑣陽 又治老人虛秘 肉苁蓉 潤大腸 杏仁 通大腸 桃仁 通血 瓜蒌子 利

泄瀉 腸鳴 脫肛 膿血

機要論泄瀉有屬風屬濕屬火此因于外感者也三因言七情感動氣不平亦致泄瀉此因于內傷者也外則當調六氣內則當調五臟又有因飲食而泄者法當消導因風食泄者當散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止○凡水瀉濕也腹痛腸鳴而泄火也痛則為邪瀉而痛者食也完穀不化氣虛也在傷寒下利則為邪熱不殺穀也久瀉名脾瀉腎虛而命火衰也脾虛瀉宜白朮丸治瀉丸散優于湯劑○清氣在下則生食泄瀉根能升陽明清氣故為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥○腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸氣脾胃虛弱泄瀉之聖藥致飲食減少腹脹腸鳴嘔泄瀉如鼎釜之下無火物終不熟故補命門相火即所以補脾胃○腎瀉者五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰利水後陰利瀉腎屬水水旺于子腎之陽虛不能運化關門元氣不足不能分別水穀不瀉清陽下陷不能運化關門元氣不足不能分別水穀不瀉

李氏醫鑑 卷之七

泄瀉 膿血

夫

火衰不能上生脾土故也○劉河間曰瀉而水穀變色者為熱不變色而澄澈清冷者為寒若肚門燥瀉小便赤黃米穀雖不變色而澄澈清冷者為寒若肚門燥瀉小便赤黃則痛此與傷食不同傷食腹痛得瀉則減今瀉而痛不止故責之土敗木賊也水瀉腹不痛者濕也痛甚而瀉而痛減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或少者痰也完穀不化者氣虛也○濕在藏廣則濡泄小便反瀉腹或脹滿

訶子散 治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作膿血

日夜無度 泄瀉為氣脫 脫肛為形脫 御米殼 去蒂蜜 訶子 煨去核 干姜 炮六 橘紅 五分 空心服河 間訶子散訶子 一兩半 木香 錢五 甘艸 錢二 黃連 錢二 為末每服 生半煨

二錢用白米湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此止

之如不止加一兩竭其餘邪火止痢厚腸甘白芍

湖也甘緩酸收和中止痛加訶子瀉以收脫加白木

以應脾厚利除濕散滿平胃調中故更藉以去餘邪也

升陽除濕防風湯 治胃虛泄瀉腸鳴

蒼朮 防風 茯苓 白朮 白芍 益智仁 半夏

各五錢 姜棗煎

四神丸 治腎瀉脾瀉 註見

破固紙 四兩酒浸 五味子 三兩 肉豆蔻 二兩 吳茱萸 一兩

炮 用大棗百枚生姜八兩切片同煮棗爛去姜取棗肉搗丸

李氏醫鑑 卷之七 泄瀉 三

每服二錢 臨臥鹽湯下 若至旦服之至夜藥力已盡

破固紙辛苦大溫能補相火以通君火火旺乃能生土故

以為君肉蔻辛溫能行氣消食煖胃固腸五味酸能補腎

酸能瀉精吳萸辛熱除濕燥脾能入少陰厥陰氣分而補

火生姜煖胃故大補下焦元陽使火旺土強則能制水而

不妄行矣本方單用固紙肉豆蔻名二神丸治同 火乃土

固紙補腎為藥水肉豆蔻厚腸胃為戊土戊土化火同為

補土母之藥○許學士曰有全不進食者服補脾藥皆不

効予授二神丸頓能進食此病不可全作脾治蓋腎氣怯

弱真元衰削是以不能化食如鼎釜之下無火物不熟也

兩本香 五錢 黃連 九亦名四神丸治同 前香亦煖腎之藥木香

肝和脾不使木盛尅土也○薛氏醫案云脾胃虛寒下

者補中黃連湯加木香肉桂命門火衰脾上虛寒者宜入味九

胃氣虛俱虛者十全大補湯送四神丸大便滑利小便後

瀉或收體虛者加減腎氣丸

大順散 治暑伏熱脾胃受濕水穀不分清濁相干

感應丸 治新舊冷積瀉痢等症

木香 肉豆蔻 丁香 半兩 干姜 炮 百艸霜 一兩 杏仁 一百粒

黃蠟六兩溶化重絹濾去滓好酒一千砂鍋內煮數沸候

李氏醫鑑 卷之七 泄瀉 三

消冷蠟浮用清油一銚內熬熟取蠟同化成汁就銚內

和前藥木乘熱攪勻丸如豆大每服三十丸空心姜湯下

肉蔻通食下氣和中丁香煖胃助陽宣氣木香

升陽補氣和脾疏肝杏仁降氣最寒潤腸消積能逐

銅冷而散痞通關巴豆善破沉寒而奪門宣濕寒積深

銅非此莫攻○神前和中溫散亦能消積治痢為佐也

巴豆不令人畏其毒自能消化

茯苓白朮湯 等分治脾虛不能制火濕盛泄瀉

六一散 治泄瀉熱瀉 戊巳丸 治熱瀉 黃黃肚瀉

五苓散合小柴胡名柴苓湯 治泄瀉發熱口渴

青州白丸子 治痰盛泄瀉 肥人滑泄多屬之痰

健脾丸 脾胃去人參和黃連麥牙加香附木香 荷葉燒飯

九名理氣健脾丸 治脾胃虛弱久瀉

香砂六君子湯 脾胃 治虛寒胃痛或腹痛泄瀉

參蘇飲 加白木 治傷風泄瀉 逍遙散 治食泄

痛瀉要方 治痛瀉不止

白木 土炒 白芍 炒二 陳皮 炒兩 防風 一兩 或煎或丸久瀉加

升麻

天眞丸 補血 治一切亡血過多形稿肢麻飲食不進腸胃滑

泄津液枯竭久服生血益氣煖胃駐顏

李氏醫鑑 卷之七 聖

精羊肉 七斤去筋膜脂皮 肉從蓉 山藥 黃耆 兩 人參 三兩 白木 二兩 為

乾入水二斗煮爛再入後藥 黃耆 五兩 人參 三兩 白木 二兩 為

末糯米飯作餅焙乾和九溫酒下如難丸用蒸餅杵丸

喻嘉言曰此方可謂長于用補矣人參補氣羊肉補形從

蓉山藥為男子之佳珍合之當歸養營黃耆益衛天冬保

肺白木健脾而其製

胃風湯 脾胃 治風冷乘虛客于腸胃食泄注下完後不化

埋中湯加 陳皮各補中湯 治泄瀉瀉不已者加同子惡食

食不化加砂仁

四逆湯加 官社良 名環水散 治虛寒水瀉冷汗脈微甚者

嘔吐此為急病 漿水者瀉利漿水澄微

香砂六君子湯 脾胃 治虛寒腹痛泄瀉

麻黃湯 小續命湯 並 治厥陰經下利不止脈沉而遲手足

厥逆膿血稠粘 機要曰此有表邪

四君子加 木香藿 各七味白木散 治脾虛肌熱泄瀉虛熱

作渴

案 朱德宗食水太過病脾疾國醫不効召楊介進大聖中

丸上日服之屢矣介曰疾因食水臣請以藥此藥是

李氏醫鑑 卷之七 聖

時珍曰 婦年六十餘患瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服

當以熱下之則愈服巴豆丸五十粒服二日遂愈自是

每用治瀉痢愈者近有人巴豆丸去痢令紫黑可以止

本神備要主治註釋

多氏方瀉痢不止用大黃元明粉以推瀉之而瀉痢 四時

反止益前而後不爭疾終不除經所謂通因通用也

暴瀉痢 物遮開升陽之藥無連於此此証處方也

研木人指腎腰熱止久為久 白芍 泄瀉不 升麻 木香

赤小豆 五倍子 代赭石 芡實 治風 澤

瀉水瀉 車前子 治瀉 苡仁 上茯苓 木鱉子 山

藥 華菱 五味子 香附 肉蔻 嬰粟壳

聚仁 金櫻子 石榴皮 赤石脂 烏梅 訶子 肉桂

盛泄瀉上為木 精苓 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

久吳茱 治冷 熱 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

久吳茱 治冷 熱 黃芩 烏梅 訶子 佐白木蓮

李氏醫鑑

卷之七

清熱解毒

毒

腸風 藏毒 痔瘻 脫肛

血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流脈中調和五臟  
泥陳去府謂之榮血陰者居于絡脈端守藏腑滋養神氣  
濡潤筋骨若感內外之邪而受傷則或循經之陽血至其  
傷處為邪所阻滯經外或居絡之陰血因留著之邪漬  
裂而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗率以腸風名之不知  
風乃六淫之一耳若腸胃受火熱二瀉與寒濕濕熱其  
氣及飲食勞力傷其陰絡之血者亦可謂之腸風平針經  
曰腸絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺○  
戴氏以隨感而見色鮮者為腸風積久而發色瘀者為藏  
毒又云色鮮為熱白大腸氣分來色瘀為寒白小腸血分  
來○又曰腸風者風邪滯胃藏毒者濕邪滯胃○藏毒腸  
風之血出於腸藏毒之血出於胃○藏毒者濕邪滯胃○  
不同○此病多由濕熱風燥之邪如久不愈者不宜純用  
寒涼須兼溫補及升提藥大法涼血用槐角地榆偏補條  
芩炒連枝子生地○和血用阿膠當歸川芎芍藥○風濕  
用秦艽防風荆芥蒼朮茯苓血瘀少加桃仁紅花蘇木寬

李氏醫鑑

卷之七

腸風痔瘻

毒

腸用枳壳升提用升麻生血補氣加人參黃耆白朮升  
黃前為近血出腸胃後為遠血出肺肝○瘻漏也痔漏  
大腸大腸與肺為表裏肺移熱于大腸故腸風痔瘻清藏  
熱則肺熱亦清矣○糞前有血名外痔瘻後有血名內痔  
殺道努肉名舉痔頭上有孔名痔瘻內有出血名虫痔大法  
用槐角地榆等與治腸風藥同不宜偏用寒涼須兼補劑  
收功○五痔此痔壯痔脈痔痔痔痔痔痔痔痔痔痔痔痔  
血分無所施洩則通肛門而為痔腫○手陽明大腸庚金  
也清燥主收司行津液以從陽明胃土之化旺則生化萬  
物人或醉飽入房酒熱留著忍精不泄流注發間前陰之  
氣歸于大腸木乘火勢而侮燥金大就燥則大便閉而痔  
作矣受病者燥氣也為病者胃濕也濕熱風燥四氣合邪  
法當為大潤燥疎風和血止痛○調麻  
日腸風宜先用通散次用歸脾湯

槐花散 治腸風藏毒下血

槐花 側柏葉 荆芥 枳壳 等分為末每三錢米飲

下 治藥生而西向東金之正氣能制木木主升金主降升相配夫婦之道和則血得以歸肝故仲景用以治吐血不止氣血虛寒用栝實湯養陰除燥濕最清血分槐花疏用芍藥清涼大腸利於散瘀搜風血二病要藥枳實 本方 除栝實地榆酒櫚九名槐角九疏風治同本方 加當歸生地用 名加減四物湯 補血寧血若以風為虛也 治同本方 除栝實枳實加當歸川芎 槐花散治腸癖下血濕毒下血

敗毒散加 荆芥 治腸風下血清鮮

羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗

茯苓 甘艸 防風 荆芥 加姜三片薄荷少許

李氏醫鑑 卷之七 腸風痔瘻 謹

胃風湯 治腸風下血 胃有風濕流入大腸故下血

龍腦雞蘇丸 治腸風 六味地黃丸 治便血

搜風順氣丸 治腸風下血

人參檮皮散 治藏毒挾熱下血 挾熱者謂挾各熱及飲酒煎炙之熱也

人參 檮根白皮 粗皮醋炙 等分為末米飲或酒調下

蘇蘇飲 合四物茯苓補心湯治便血

防風通聖散 治便血腸風痔瘻

經驗方 同研黃芩黃連二味同炒不

黑地黃丸 治血虛久痔 氣不攝血則妄行濕熱下流則成痔此治血虛久痔之聖藥

皆木 浸熱地一斤五味子半乾薑七錢夏五錢聚肉丸米飲或酒下 嘉言曰此方治脾腎兩藏之虛而去脾濕除腎燥兩擅其長超超玄著視後人之脾腎雙補麗難者相去遠矣

秦艸白朮丸 治痔瘡痔瘻有膿血大便燥結痛不可忍

秦艸 白朮 歸尾 酒洗桃仁 研一枳實 炒皂角子 燒存澤

瀉地榆 錢三 麵糊丸 大便秘澀若以大黃推之其津液益

吳利 本方 除白朮枳實地榆加若 名秦艸蒼朮湯治同

日勝 成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火本熱也去風熱火濕四者之邪以破氣藥兼之治法全矣

方 除枳實皂角地榆加防風升麻柴 秦艸防風湯治痔瘻

李氏醫鑑 卷之七 腸風痔瘻 謹

大便時疼痛 如無痛者 本方 用秦艸一味加羌活防風麻

炙甘草紅花 湯治痔瘻成塊下垂不任其癢本方 除地榆

名秦艸羌活 湯治痔瘻成塊下垂不任其癢本方 除地榆

本艸備要主治註釋

槐實 治腸風血痔十月上已採漬牛 山茶花 治腸風為末

或酒調服 枳殼燒黑 與髮灰同用更 吳茱萸 治腸風痔瘻

可代 沒藥 治痔 蕪荑 治痔 柿乾 治腸風痔瘻

不歸 代楮石 治腸 石燕 治腸風痔瘻 馬兜鈴 治血痔

脾 赤芍 治腸 首烏 治痔 續斷 治腸風 茜艸 治腸風 荊芥

治腸風痔瘡最 水賊 治腸痔 射干 治腸風痔瘡  
 散血中之風 瘰癧 治脫肛 瘰癧 治痔  
 疲勞而發便毒者用三 乾葛 治腸風 白芷 治腸風 苦參 治  
 寸與美同煎利兩行効 香附 治腸風 丹皮 治腸 山豆根 治五 黃芩 治木 驚子 治  
 風 赤石脂 治腸痔 砒石 治外痔 慈 金銀花 為腸痔藏 兒茶 治  
 腫 伏龍肝 治腸 雞肫皮 治腸 五靈脂 阿膠 治血痔 龜板  
 治五 扁柏 地骨皮 補正氣 黃柏 治痔血 訶子 治痔皮治  
 李膺 治下 黃連 因熱用熱因寒用最得製方之妙 赤小  
 豆 除大 枳壳 肺與大腸相表裏風邪入肺則并入大腸風  
 則血熱清而風自除且能引諸 卷柏 生石上俗名萬年松  
 藥至病所為風病不可少之味 卷柏 生石上俗名萬年松  
 李氏醫鑑 卷之七 腸風痔瘡

驚悸怔忡健忘  
 心藏神而生血心傷則不能生血而血少故怔忡健忘驚  
 悸盜汗汗者心之液也脾主思而藏血脾傷則血不歸脾  
 故不眠脾主肌肉故脾熱則四肢故體倦脾不健運故  
 食少脾不能健運而四肢故有因心動而驚無驚而自  
 動曰悸怔忡怔忡也有因心虛火動者有因肝虛胆怯者有  
 因水停心下者大畏水故悸也○腎燥者心亦躁火屈于  
 水故躁也水停心下則腎虛○心也者君主官也神明出  
 焉思慮過度耗其心血則神傷而心勞故怔忡健忘怔  
 忡者惕惕然動不自安也○汗流曰怔忡大抵屬虛與痰  
 經口血并下氣并下上亂而善忘又曰盛怒傷志志傷  
 善忘又曰靜則神藏躁則神亡人不靜于事物之擾擾其  
 血之陰者將竭故失其清明之體而善忘也夫藥固有安  
 心養血之功不若寧神靜慮返觀內守為尤勝也○驚悸  
 由于胆虛○心虛胆怯氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症觸  
 事易驚或夢寐不祥或短氣悸乏溫胆湯至之  
 ○心血虛則易動故怔忡驚悸不得安寧也  
 李氏醫鑑 卷之七 驚悸怔忡健忘

人參養榮湯 治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘此方統治  
 諸病 薛立齋曰氣血兩虛而變現諸症莫能名狀  
 人參 白朮 黃耆 炙甘草 陳皮 桂心 當歸 酒拌  
 熟地 五味子 炒 茯苓 分 志肉 分 白芍 錢  
 五益所以能 後治諸病也  
 孔聖枕中丹 治讀書善忘久服令人聰明 讀書易忘者心  
 神明也 敗龜板 炙 龍骨 研末入雞 志肉 石菖蒲 煮  
 等分為末每服酒調一錢日三  
 此手足少陰藥也龜者甲虫之長陰物之至靈者也龍者  
 鱗虫之長陽物之至靈者也借二物之陰陽以補吾身之

陰陽假二物之靈氣以助吾心之靈氣也。又人之精與志皆藏于腎，腎精不足，則志氣衰，不能上通于心，故迷惑善忘也。志內若洩熱而辛散，則能通腎氣上達于心，強志益心。清酒辛散而香，舒脾能開心孔，而利九竅去濕除痰，又龍能補腎，龍能補肝，使痰火散而心肝寧，則聰明開而記憶強矣。

定志丸 益心強志能療健忘

志肉 石菖蒲 人參 茯苓 蜜丸 硃砂為衣 張子和

方 無菖蒲加茯神 定志丸 酒糊丸 姜湯下 安魂定驚

天王補心丹 終南宣律師課功心 治思慮過度心血不足

怔忡健忘 心口多汗 大便或秘或瀉 口舌生瘡等症

生地 四兩 人參 玄參 丹參 茯苓 一用 當歸 洗 五味

李氏醫鑑 卷之七 驚悸怔忡健忘

子 一兩 桔梗 志肉 炒 五 棗仁 炒 柏子仁 炒 研 天冬 炒 麥

冬 蜜丸 彈子大 硃砂為衣 臨臥燈心湯下一丸 或喻會

化 一方有石菖蒲四錢 無五味子 一方有甘艸

歸脾湯 治思慮過度 勞傷心脾 怔忡健忘 驚悸盜汗等症

溫膽湯 治膽虛痰熱 不眠虛煩驚悸 即二陳加枳實竹茹 加姜或加棗或加人

養心湯 治心虛血少 神氣不寧 怔忡驚悸

黃耆 炙 茯苓 茯神 當歸 酒 川芎 半夏 通 一 甘艸 炙

錢 柏子仁 炒 棗仁 炒 志肉 五味子 人參 肉桂 錢

每服五錢

瀉青丸 治肺火搏熱 不能安臥 多怒多驚 肝虛胆怯

二陳湯加胆星 枳實 石菖蒲 治驚悸健忘 怔忡不寐

羌活勝濕湯 三因加 治卧而多驚悸 多魔溺者 邪在少陽

妙香散 夢遺門 治驚悸 桑螵蛸散 小使 能安神魂療健忘

十味溫胆湯 後夢 治怔忡健忘驚悸

本艸備要主治註釋

志肉 強志益智治迷 石菖蒲 開心孔 利九竅 為水神 茯苓

治憂志驚悸 茯神 療心虛多 郁李仁 治悸用酒 圓眼 養血

李氏醫鑑 卷之七 驚悸怔忡健忘

地黃 能交心腎 治健忘 淮藥 治健忘 虎骨 治驚 龍骨 安魂 琥珀 寧

黃公節 治健忘 柏子仁 寧神 棗仁 寧心



三黃金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙夢語驚悸

六君子湯 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

瀉青丸 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒

火干之故卧不安肝在志為怒故多怒肝虛胆怯故多驚亦由血虛

本神補要主治註釋

志肉 或善忘驚悸 栢子仁 益志寧神腎 石菖蒲 益心安

痰事仁 痰即虛不眠胆虛寒也故治胆湯加之肝虛則 丹

砂 清肝鎮心 金箔 鎮心肝定驚悸 龜板 肝經有風熱

治之 淮山藥 益心氣 百合 潤肺 枝子 治心煩懊 甜瓜蒂

李氏醫鑑

治換機 淡豆豉 治換 字仁 得眠目系內連肝胆恐則

氣結胆橫不下潤能散結隨 榆白皮 治喘嗽不眠猪康阿

膠 治煩渴 益智仁 麥冬 神麴 菊花 貝母 五味

匾豆 乾葛 俱治 羚羊角 治驚風 鹿角 治夢與鬼交酒服

龍齒 鎮心 真珠 同虎睛 人參 治多夢紛紜安 茯苓 茯

夢遺失精

心君火也君火一動相火隨之相火寄于肝胆腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固故精脫而成夢矣○陽即邪火也○半純曰病七初起亦有不在肝腎而由心肺脾之不足者然必傳于肝腎而後走也○又曰心腎是水火之藏法天地施生化而成之道故精神為五藏之宗主若由他藏而致腎之泄者必容而求其治大抵精自心而泄者則血脈空虛水液不攻自脫而泄者則皮稿毛焦喘急不利自汗而泄者色黃肉消四肢懈怠自肝而泄者筋接色青自腎而泄者色黑髓空而骨墮即脈亦有可辨也○丹溪曰主閉藏者腎也司疎泄者肝也二藏皆有相火而其系上屬于心心君火也為物所感則易于動心動則相火翁然隨之雖不交會精亦暗流而滲漏矣是以聖賢只是教人收心養性其旨深矣○要全善曰詳古治夢遺方屬醫滯者居大半庸醫不知為醫但用瀉劑固脫愈瀉愈虧其病反甚矣○心腎為水火之藏心神傷則火動火動不已則腎水受傷腎主藏精所受五藏六腑所輸

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精

致之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢泄戴氏曰遺精自則用心過度心不攝腎以至失精者有思色慾不遂致精失位輪泄而出者有色慾太過清泄不禁者亦有年壯氣盛久曠精滿而泄者○初庵曰治遺精大法有五心神

浮越者神神悉石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者紫雪珍珠粉丸滋陰降火思想傷陽者謙甫鹿茸滋陰丸等補陽除陽但虛者

丹溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補心

扶元丸 治遺精白濁

菟系子 五味子 石蓮肉 白茯苓 三淮藥 六兩將菟

浸透每酒煮五藥料為丸漏精腰湯

下亦漏精心湯下白濁茯苓湯下

水陸二仙膏 治遺精白濁

金櫻膏 取半黃者熬膏一斤 艾實一斤 熟為粉 和九鹽酒下

金鎖固精丸 治精滑不禁精滑者火炎上而水趨下心腎不交也

沙苑蒺藜炒 芡實蒸 蓮鬚二兩 龍骨酥炙 牡蠣鹽水煮一日連夜煨粉一兩

子糊粉為丸鹽湯下

珍珠粉丸 治夢遺

黃柏蛤粉等分柏鹽水炒焦黑色蛤粉

猪苓丸 治夢遺猪苓末二兩先將一半炒半夏令黃取半夏為末糊丸更用猪苓末一半同炒微裂

砂餅養之中未問空心鹽酒湯任下釋曰半夏有利性猪苓導水益腎閉導氣使通之意也

諸子清心飲治遺精淋濁遇勞即發五心煩熱

六味地黃丸 治遺精 七寶美髯丹 治心腎不交遺精

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精 聖

妙香散王荊公 治夢遺失精

淮藥二兩姜汁炒 人參 黃耆 志肉 茯苓 茯神一兩 桔梗

錢甘艸錢 木香五分 麝香錢 辰砂二錢 另研為末每服二錢酒下

十味溫胆湯 治夢遺

橘紅 半夏 茯苓或用茯神 甘艸 枳實炒 竹茹 人參

志肉 棗仁 熟地 加姜棗

本神備要王治註釋

石連肉龍骨益智仁等分為末每服二錢空心服

龍骨五倍炒 赤石脂壯蠟 牡蠣煨 餘糧石等分為末水丸 ○晚垂為

錢空心下 牡蠣五味子地黃黃肉枸杞子車前子沙苑蒺藜

藜蓮鬚杜仲治夢遺 覆盆子黃柏沙苑蒺藜蓮鬚五味砂仁

魚膠炙肉 治夢遺 ○肉蓯蓉 萆薢 漏蘆 罌粟殼

山藥 伏龍肝 蓮子 芡實 巴戟 續斷以上並治夢遺

系子止遺泄 芡子治遺 椿槲皮治夢遺 茯苓治遺精 砂餅

寒之人又當用溫熱之味峻 ○核桃肉皮瀉飲肺潤腎

時其下非決滲之味所能治 ○椒椒治泄精下 澤瀉泄精亦有因濕

時金櫻蓮鬚也 花柳治泄精下 焦虛寒 熱者用此味良

李氏醫鑑 卷之七 夢遺失精 聖

淋濁 赤白濁血

心腎氣清濁相干熱毒勝勝溺滿而痛曰淋氣淋便濁  
餘溺勞淋房勞即發冷淋寒戰後復發淋便出如膏不淋  
精結成石尿血而痛即血淋也色鮮者心火小腸實熱色  
淡者腎虛勝勝虛冷大法治淋宜通氣清心平火利濕不  
宜用補恐濕熱得補增劇也○又有中氣不足致小便不  
利者宜補中益氣經所謂氣化則能出是也○精與濁所  
出之竅不同便濁即是腎肝胆之火也精濁乃精氣滑  
出不便亦然此腎水不足火蒸蒸故精難其位也○朱  
丹溪曰葉氏原病候論曰白濁者由勞傷腎氣虛冷故  
也歷代宗其說不惟白濁之理不明所治之法亦誤不思  
內經本無白濁之名惟言少陰在泉客勝便變少陽在  
泉客勝則便白又言思無病入房太甚發為白濁與脾  
移熱于腎出自白二者皆隨濁而下大非白濁之源乎原病  
式因舉內經謂諸病水液渾濁皆屬于熱言天氣熱則水  
渾濁寒則清潔可謂發聖人之旨以正千載之誤矣予嘗  
聞先生論赤白濁多因濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂

李氏醫鑑

卷之七

淋濁

醫

中氣不足便濁之變是也必先補中氣使升舉之而後  
分其藏府氣血赤白虛寒以治與夫其他邪熱所傷者固  
在渴熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜過用寒  
涼之劑必以反佐治之要在權衡輕重而已○葉氏曰遺  
精多作腎虛補之而罔效不知此因脾胃濕熱所乘飲  
酒厚味痰火之人多有此疾腎雖虛其精本于脾胃飲  
食生化而輸于腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣清而不  
清則所輸皆濁氣邪火援動水不得而安靜故令遺濁也  
淋病在溺家局肝胆部濁病在精家局腎部或由濕熱  
或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤白濁血白濁氣或由敗  
精瘀而塞尿道痛澀異常  
非是熱淋不宜用熱藥治

治濁固本丸 治胃中濕熱滲入膀胱下濁不止

蓮鬚 黃連 黃柏 益智仁 砂仁 半夏 茯苓  
一猪苓 兩 二甘艸 兩 二 精濁多由濕熱與痰黃連瀉心火  
兩 黃柏瀉腎火所以清熱二苓所以

利濕半夏所以除痰濕熱多由于濕滯砂仁益智辛溫利  
氣又能調腎脾脾既以散留滯之氣且稍濟連柏之寒甘  
鹹潤脫

六一散

治石淋 暑熱皆陽邪在下則便秘火  
氣煎灼精結成石則為石淋本方加生柏

葉生車前生藕汁各三生益元散治血淋

八正散

治濕熱下注淋痛尿血或因熱為腫 濕熱下注  
小便不通

詳小

華薛分清飲

治虛陽白濁小便頻數漩白如油名曰膏淋  
腎氣虛則不能管束而小便數膀胱有熱則水道瀦而清  
濁不分或敗精滲入胞中及服熱藥飲食痰積滲入皆成  
淋濁○小便如膏油後三消

門白茯苓湯詳明之極妙

李氏醫鑑

卷之七

淋濁

璧

川華薛

石菖蒲 烏藥 益智仁 分甘艸稍 減分入鹽食  
煎服一方加茯苓 此以疏泄而為禁止者也 腎水虛則

使小便赤而瀦也腎既虛熱膀胱不足加之  
以渴飲則小便淋瀦由虛虛不能主其府也

琥珀散

治氣淋 血淋 膏淋 砂淋 大抵多屬于熱熱甚生濕  
則水液渾濁而為淋冷者

滑石

錢琥珀 木通 扁蓄 木香 當歸 鬱金 妙一

滑石滑可去着利竅行水扁蓄若能下降利便通淋琥珀

能降肺氣通于膀胱木通能瀉心火入于小腸血溺由于

血亂當歸能引血歸經氣淋由于氣滯木香能升降諸氣

諸淋由心火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也大法  
東垣用藥凡例小腹痛用青皮疎肝黃柏滋腎蓋小腸小  
腎部位

蓮子清心飲 治憂思抑鬱發熱煩躁或酒色過度遺精淋

濁遇勞即發四肢倦怠五心煩熱夜靜甚煩躁遺精淋  
有熱也心火妄動則不能下交于腎故元精失守也遇  
勞則發為勞淋勞則動其心火也蓋偏熱者陽虛也

石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮

麥冬 車前子 甘艸 錢 空信服

小蓴飲子 治下焦結熱而成血淋心主血小腸其府也熱

李氏醫鑑 卷之七 淋濁 栗

便出為血淋蓋小便必自小腸滲入膀胱心熱者小腸必  
熱經所謂胞移熱于膀胱則癰秘溺血是也然熱必兼濕  
戴氏曰多有熱極而血凝黑者未可便  
以為冷也○痛為血淋不痛為溺血

小蓴 蒲黃 黑藕節 滑石 木通 生地 枝子 炒 淡

竹葉 當歸 甘艸 各五 分

小蓴藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血木通降心肺之  
火下達小腸枝子散三焦鬱火由小便出竹葉涼心而清  
肺

龍膽瀉肝湯 治白濁 溲血 肝脈絡于陰器白

一方 除當歸生地澤瀉木通車前亦名龍膽瀉肝湯治同

七寶美髯丹 治淋瀝 六味地黃丸治淋瀝

還少丹 治白濁 龍膽瀉肝丸 治熱淋

滋腎丸 治淋症

羌活勝濕湯 加澤瀉 治淋症

三黃金花丸 治淋秘 茯苓丹 治白濁

導赤散 治小腸有火便赤淋痛

根木丸 加澤瀉各一 治脾濕淋症

有外皮敷小腸時艱阻非淋症也以牛骨作屑塞于皮端  
或漸展開勿藥自愈 五淋極難見効並痛欲死惟用牛  
膝一兩入乳香少許煎服數劑即安 熱淋白淋磁石湯  
金砂三錢用紅棗煮熟去皮為丸南棗亦可空心鹽湯下

李氏醫鑑 卷之七 淋濁 栗

小便淋瀝痛不可忍難脫內黃皮五錢陰乾燒存性作  
服白湯下立愈 小便及溺血者紫苑服一兩立効  
虛赤濁連子六一湯用石蓮子肉六兩炙甘艸一兩為末  
每服一錢燈心湯下 淋濁并泄精用杜鵑蓮鬚車前子  
澤瀉茯苓肉桂甘艸黑枝木通交實滑石黃芩蓮子燈心  
二十節空心服 白濁石蓮子龍骨益智仁等分為末空  
心服

案 一人病血淋痛脹欲死李時珍以  
藕汁調髮灰每服二錢三日而愈

本神備要主治詳釋

甘艸 治止莖中痛淋 尿血 天門冬 治白微淋 益  
母艸 治血 澤瀉 治淋 貝母 同 白茅根 雞蘇 黃芩 若  
參 治淋 木通 治淋瀝 通艸 燈艸 治淋 蒲公英

李氏醫鑑

卷之七

瘰

並為通淋要藥 治熱 地膚子 通淋無陰則 石葦 治淋  
妙品至驗至効 扁蓄 治淋 薏仁 治淋 益土所以生金  
海金沙 治五淋 華蘼 治淋 浮石 通淋 阿膠 治血  
微寒 瓦松 即生古瓦上 治淋 浮石 通淋 阿膠 治血  
清熱 蛤蚧 通淋 桑螵蛸 通淋 茯苓 治淋 琥珀 通淋 猪  
苓 治淋 枳實 治淋 石燕 治淋 蒼朮 治淋 虎珀 通淋 猪  
飲脾 枝干 治五 榆白皮 治五 沉香 治氣 石蓮子  
于穀放也 藕節 治五 白茅根 鬱金 苦參 澤瀉 漏蘆  
伏龍肝 扁柏 治五 雞屯皮 菲子 龍骨  
桑螵蛸 治五 車前子 治五 龍骨 龍骨  
水竅而固精竅

李氏醫鑑

卷之七

瘰

汗 盜汗 兼傷寒汗後諸症  
心之所藏 在內者為血 發于外者為汗 汗乃心之液也 五  
藏六府表裏之陽 皆心主之 以行其變化 隨其陽氣所在  
之處而生 汗亦隨其火機所在之處而為汗 是汗盡由  
心出也 汗而自汗 自汗陽虛 睡而自汗 曰盜汗 屬陰  
虛 汗者 心之陽 衰者 腎之陰 陰虛 睡而自汗 曰盜汗 屬陰  
人陰中 表液失其固 衛故 微汗 然汗出 曰盜汗 七覺則陽  
氣復而汗止 矣 因熱邪 乘陰虛 而出者 汗必熱 因寒邪 乘  
陽虛 而出者 汗必冷 有火者 謂有面赤 口渴 唇燥 便赤 皆  
重脈 數諸症 凡傷風 傷濕 中暑 風溫 寒濕 氣虛 血虛 脾  
虛 胃虛 肝陽 痰飲 驚悸 勞傷 房室 遺精 夢泄 等症 皆能令  
人出汗 經又曰 飲食飽 其汗出于胃 驚而奪精 汗出于心  
持重遠行 汗出于腎 疾走恐懼 汗出于肝 搖體勞苦 汗出于  
脾 凡頭汗 左額屬肝 右額屬肺 鼻屬脾 頤屬腎 額屬心  
心津液 自胃府旁達于外 為手足汗 有因胃熱 胃氣二  
故外感初起 多自汗

當歸六黃湯 治陰虛有火 盜汗發熱  
當歸 生地 熟地 黃芩 黃柏 黃連 等分 黃耆

加此手足少陰藥也 盜汗由于陰虛 當歸二地所以滋陰  
汗由火擾 黃芩連柏所以瀉火 熱無熱不作汗 熱得汗由  
腠理不固 倍用黃耆所以固表 初起口此盜汗與傷寒盜  
表牛黃散以和表為至古法 小柴胡加桂至之此屬陰虛  
故以補陰為主 土材曰陰虛則元氣有降而無升而復  
用此苦寒煎殺之劑得母紀虛虛之戒乎 惟火定氣強者  
宜之不然苦寒損胃 禍深耳 幸絕曰陰虛陽必炎 故  
發熱自汗 當歸六黃湯加地骨皮 芍藥 陰虛必乘故發厥自  
汗 黃耆建中湯甚善 加附子 或新附湯 有熱合和汗出  
不休以風藥勝其熱 甘藥滋其燥 活潑湯 有痰痰  
汗自出 宜理氣降痰 痰去則汗自止 有用固散 汗愈不

收止可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而  
為汗大補黃耆湯加聚仁有微熱者更加石斛下靈砂丹  
初應曰自汗陽虛盜汗陰虛然亦有過服參耆而汗反甚  
者以陽盛陰虛陽愈補而陰愈虧也又宜清熱養血而汗  
自止

牡蠣散 治陽虛自汗

牡蠣研黃耆 麻黃根一錢 浮小麥百粒 煎服

栝子仁丸 治陰虛盜汗

栝子仁炒研去油二兩 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣

麻黃根一錢 麥麩五錢 棗肉丸米飲下五十丸 三百服

附撲汗法白朮藥本川芎各二錢半 米粉兩半 為末絹袋盛週身

撲之治汗出不止又方龍骨牡蠣糯米等分為末撲之又

方用麻黃根蛤粉粟米等分為末絹袋盛撲之

溫經益元散十全大補加 治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或汗

出不止太陽宜汗汗多則亡陽故有諸症陽明

大補黃耆湯十全大補去白芍加山黃 治氣血兩虛自汗不

止

人參養榮湯驚悸 治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤

還少丹 治發熱盜汗 逍遙散 治盜汗

歸脾湯 治驚悸盜汗

調中益氣湯理氣 治氣虛多汗

黃耆六一散 治盜汗

黃耆六兩 甘草一兩 大麥煎服

升陽除濕湯羌活勝濕湯見濕門除 治陰汗不絕

五苓散治暑濕相搏自汗身重 加黃連

人參白虎湯 治身熱汗出

六味地黃丸 治自汗盜汗

人參散諸熱 治盜汗倦怠一切血熱虛勞

玉屏風散 固表聖藥 散取其相畏而相使也

李氏醫鑑 卷之二

歸脾湯 治盜汗

案 海藏曰晉郎中童子盜汗七年諸藥不効予與京臘散

三黃丸三日病已蓋腎主五液化為五濕腎水上行乘

心之虛心火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而開為

汗出也○先以涼隔散瀉胸中相火次以三黃丸瀉心

火以助陰則腎水還本藏玄府 閉而汗自已矣○玄府汗孔也

本艸備要主治註釋

葳蕤止自汗 大蘇仁治胃熱 半夏並治 天雄發汗又能 糯米

收自 浮小麥止虛汗 淡豆豉得熱則發汗 栝子仁止 桑葉

未盜汗從正日發汗不禁 地骨皮止虛 白芍固 酸棗仁止

汁五味飲止自汗 白朮無汗能發汗 澤瀉止除 酸棗仁止



柏子仁丸

治經行復止血少神衰

女子善懷每多憂思

生血而血少血少則肝無所藏而肝之脈枯故經閉不通  
行經日月事不來者胞脈閉也胞脈屬心而終于胞中今  
氣上通肺心氣不舒  
下降故月事不來也

柏子仁

去油

牛膝酒浸

卷柏

錢澤蘭

續斷

二熟地

一蜜丸

下

柏子仁安神而養心地黃牛膝續斷補肝腎而益衝  
任卷柏澤蘭活血脈而通經閉 卷柏生用破血炙

血止

五積散

傷寒表

加醋

治婦人經水不調

固經丸

治經行不止及紫黑成塊

衝任為經脈之海若無

李氏醫鑑

卷之八

經

三

三

三

三

三

龜板

炙四

白芍

酒炒

黃柏

酒炒

黃芩

酒炒

香附

牛酒丸

經多不止

陰氣不足

以制

陰氣

以制

陰氣

以制

陰氣

陰養血

壯水以制陽

光柳皮

治以止脫

正氣天香散

氣滯

治月水不調

婦人多憂移故氣病為多氣

為血配氣滿則血亦不能行

行

行

行

行

不調香附

入錢

烏藥

錢

陳皮

蘇葉

錢

干姜

每服五

錢煎

諸藥調理氣血

干姜入氣

兼入血

解鬱散肝

令氣調而血和

則經行有常

自無滯滯之患

患

返魂丹

即益母草

治月經不調

赤白帶下

胎前產後一切

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

五月五日六月六日或小雪日益母花正開時連根取

陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或棉汁干砂調內久武  
火熬成膏服忌飲如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生  
逆產胎衣不下炒益母湯下產後血暈口渴狂言產後中風  
失音口紫及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑  
口乾並童便和酒下產後喘嗽惡心吐酸或痛無九酒下  
產後瀉血東湯下產後痢疾米飲下產後崩漏米湯下  
產後帶下膠艾湯下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下  
產後以童便化下一丸能安魂魄調經絡破血痛經不調  
者服之則調久無子者服之則孕益母草功諸諸諸諸  
去瘀生新利大小便故為經產良劑益母草一名荒蔚李  
時珍曰根莖花葉實皆可用若治血分風熱明目調經  
子為良若胎產瘧癰消水行血則可並用  
蓋根莖花葉諸子行子則行中有補也

逍遙散

血虛潮熱

臍腹脹滿

經候不調

溫經湯

治經凝作痛

新故相搏

血室停寒

李氏醫鑑

卷之八

經

四

四

四

四

四

當歸

川芎

白芍

桂心

丹皮

莪朮

各半

人參

川牛膝

甘草

各一

每服五錢

水煎溫服

不拘

益胃升陽湯

補中益氣

治經候凝結

血塊暴下

脾虛水瀉

玉燭散

四物合

取四時和氣

治經閉腹痛

體瘦善

機歸尾

生地

川芎

赤芍

大黃

芒硝

甘草

當歸散

見經

治經三四月不行

或一月再至

數月不

行

者

行

少也滋之

以芍歸白芍

補之以白木

山黃一月再至

者

行

者

行

脾虛有熱也

白木能補脾

黃芩能涼血

山黃能固經

經

經

經

經

鬱金散

治經脈逆行

上為吐衄

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病

諸病



鬱金為末加酒汁與姜汁同服

升陽舉經湯

治經水不止

黃耆 當歸

白朮各三錢

羌活

防風

藥本各二錢

獨活

活 附子炮

甘草各三錢

人參

熟地

川芎各一錢

細辛

六桃仁十個去

紅花

肉桂盛夏勿用

白芍各五錢

每服三錢漸加

至五錢

調經湯

小柴胡與四物各半

柴胡

半夏

人參

甘草

黃芩

清金養血湯

治婦人經候不調骨蒸勞熱咳嗽或有汗無汗此之逍遙散之類取效甚捷

李氏醫鑑

李氏醫鑑

卷之八

五

川芎

六分

當歸

白芍

香附重便

麥冬

白朮各一錢

丹皮

地骨皮

生地

各八分

五味子

甘草九分

不拘時服

木香

枳殼見前

活血通經調和氣血量輕重用之

人參

荆芥

散後妊

治月水不調

歸脾湯

治經帶

阿膠湯

妊

治損傷衝任月水過多淋瀝不斷此即崩症

抑氣散

治婦人氣盛于血變生諸症頭暈腦滿此即氣血不和則無

諸疾荷血少氣多壅于胸

臨則滿上攻于頭則暈矣

香附

陳皮

二

茯苓

甘草

各一錢

為末每服二錢

經曰高者抑之平者散之鬱氣陳皮調諸氣伏神安心氣甘平緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣若鬱甚者不必泥此調經日氣盛于血則當抑氣若血行氣之藥則真氣耗散除火愈盛而成氣血兩虛矣是方平和為常用或用水煎之藥使陰血先足而陽火自平亦正當之一法蓋補其不足正所以制其有餘也

本草

備要調經主治註釋

丹皮

生地

益母子

澤蘭

蘭葉

延胡

香附均治月候

艾附丸

治婦人諸病

菴藹子

治經

茜

草

一兩酒煎

薑黃

通經

三稜

大黃

葶藶

瞿麥

附

子

漏蘆

王不留行

芒硝

蟹

蠶

蠶

肉桂

花

椒

俱通

桃仁

射干

紅花

牛膝

均治

五靈脂

生製

閉

妙用能

代顏石

治經

木通

行經

元子

內氣

我本

通

干姜

桂枝

皆溫

赤芍

鱉甲

均治

花粉

枇杷

藥

治婦人

發熱咳嗽

經期先至

後痛

蘇木

調經

蒲黃

同五

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

丹皮

艾葉

調經

白微

調經

種子

古

麥冬

治經

妊娠傷寒

婦人先調血此大畧之詞耳要之脈緊無汗名傷寒脈緩有汗名傷風此大畧之詞耳要之脈緊無汗名傷寒脈緩有汗名傷風此大畧之詞耳要之脈緊無汗名傷寒脈緩有汗名傷風

表實六合湯

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病

四物湯

治胎前產後血虛

此足太陽經也凡婦人傷寒六經治法皆同惟懷妊者則以安胎為主藥中不可有犯胎者則不可用也河蘇皆以四物為君或止安胎餘同傷寒例分症而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無汗者

四物四兩加桂枝地骨各七錢名表虛六合湯治妊娠傷寒

寒或虛自汗身熱惡寒頭痛項強脈浮而弱能退熱止汗

四物四兩加防風蒼朮各七錢名風濕六合湯治中風

氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻連翹各七

錢名升麻六合湯治下後過經不愈濕毒發斑如錦紋者

四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡六合湯治胸脇滿

弦小陽經症四物四兩加大黃五錢桃仁十枚

妙治大便秘小便赤氣滿而脈沉微太陽陽明本病也急

下之

之謂

四物四兩加人參五味各五錢治汗下後咳嗽不止

四物四兩加厚樸枳實各五錢治傷寒後虛痞脹滿

陽明本虛者

後不得眠四物四兩加石膏知母各五錢治大渴而煩脈

長而大四物四兩加茯苓澤瀉各五錢治小便不利太陽

本病

四物四兩加阿膠艾葉各五錢

桂各五錢治四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉遲者少陰

病也

錢治畜血症以上原本名四物大黃湯并六合湯之類

樂節之及妊娠寒傷亦併從減以部首概之

當桃仁莫妄施要教母子俱無損大黃四物對分之

日產後傷寒不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱有

李氏醫鑑

過多發熱有惡露不盡發熱有三日乳蒸發熱或早

動飲食停滯一皆發熱狀類傷寒要須詳辨大抵產後大

血虛空若汗之則變筋惕肉瞤或昏迷不醒或抽搐不定

或大便秘結其害非輕凡有發熱且與四物湯并柴胡

宜最多白芍須炒過酒蒸熟地黃佐之加軟荳蔻胡

人參主之最能益氣辛熱能引血藥入血分引氣藥入

氣分且能去瘀生新產後陰虛長之道以熱治熱深合

經之旨如病者不盡者益母丸黑神丸必兼用之胃虛食

少者加白朮茯苓有痰者加陳皮半夏其餘六經治

例同皆必以四物為主乃養血務本之要也劉河間曰火

抵產病大行從損損榮氣病從損損四物宜詳察病

妊娠 胎前產後等症 安胎 催生 下血 收子服

兼附症類

脈經云血旺則胎氣壯雖孕是以不致多由血熱血少而其源起於血陰不足陽勝而內熱也血枯也諸陰清熱則血自生胎而有子矣亦有子宮寒而不孕者當溫其子宮而即孕矣又有肥人體盛而不孕者以子宮脂滿寒故不受孕也以二陳為君而加氣血藥則自受孕矣婦人受胎一月形如露珠乃太極動而生陽天一生水謂之胎足厥陰脈主之經水即閉飲食稍異二月如桃花乃太極靜而生陰地二生火謂之脾音運膜也足少陽脈所主若吐逆思食各日惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一藏之虛如愛酸物乃肝經只能養胎而虛也三月如清昇淨先成鼻與雌雄二器乃分男女手厥陰相火所主胎易動四月始受水精以成血脈形像具手足顯成手少陽脈所主五月始受火精筋骨四肢已成毛髮始生足太陽脈所主六月始受金氣以成筋骨目眚成足陽明脈所主

李氏醫鑑

卷之八

妊娠

九

主七月始受木精以成骨造其能動左手太陰脈所主八月始受土精以成皮膚九歲皆成近其能動右手手陽明所主九月始受不精百節平備三轉其身足少陰脈所主十月神氣備足乃生足太陽脈所主推手少陰太陽脈所主者君主之官無為而已有隱胎者須防三五七月宜服清熱涼血安胎之藥

校宮丸

治子宮脂滿不能孕育

肥而不孕多由痰盛故以二陳為君

芍藥

白朮 半夏曲 香附

一茯苓 神麴

五橘紅

甘草 粥丸

紫蘇飲

治胎氣不和湊上胸腹脹滿頭痛心腹腰脇痛名

子懸

由下焦氣實相火旺盛

蘇葉

當歸

白芍

人參

陳皮

大腹皮

甘草

分

加薑煎空心服心腹痛甚者加木香延胡

補大腹以利順其氣氣順血和則胎安矣既用其氣而復以參甘養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣

也

四物湯加艾葉四製香附

虛冷不妊

白朮散

治子腫面目肢體虛腫如水狀

胎中挾濕水與血搏濕氣流溢故也

面日肢體腫脹亦各胎水原因煩渴引飲過多或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六箇月多有之

白朮

姜皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

為末

米飲

下指迷方有桑白皮無白朮

李氏醫鑑

卷之八

妊娠

十

用芍朮通補中導水行氣

此症有服鯉魚湯鯉魚名

天仙藤散

治子氣

婦人衝任素受風因妊娠而足腫痛悶妨食甚則脚指出黃水名子氣非本也

也

天仙藤

即青木香藤微炒苦溫疏氣活血能解血中之風氣

香附

烏藥

陳皮

甘草

等分加紫蘇

木瓜

生薑

空心煎服或為

末鹽湯調下日三

紫菀湯

治子嗽

紫菀

天冬

桔梗

甘草

桑白皮

杏仁

竹茹

入蜜

服

安樂散 治子淋心煩悶亂子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱則不能通利故淋心

與小腸相表裏故煩悶亦有因房勞內傷胞門衝任虛者宜八珍湯或腎氣丸

人參 細辛 兩當歸 甘草 燈草 五木通 滑石 麥冬 三

冬錢 爲末每二錢麥冬湯下陳來章曰虛熱宜補故用參甘之甘林開宜通故用

通燈之滲肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎燥則地氣不升而細辛能潤之血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也

膠艾湯 治婦人漏下或半產後下血不絕或妊娠下血

腹痛爲胞阻產者四五月而墮胎胞必傷其血海血因

續下不絕也

阿膠 芎藭 甘草 艾葉 當歸 白芍 乾地黃

李氏醫鑑 卷之八 婦人

治胎動 嚴氏治胎動經漏腰痛腹痛滿搶心短氣加黃耆又

方阿膠 一斤蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯治胎動不安腰

腹痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽

當歸散 妊娠宜常服之血少有熱胎動不安及數半產難產者並宜服之胎無疾苦臨盆易

產產後百病 當歸 川芎 白芍 黃芩 白木 斤爲

末酒調服日二此足太陰厥陰藥也衝任血盛則能養胎而安胎芎藭芍藥養血而益衝任又懷妊宜

清熱涼血血不安行則胎不安黃芩養陰退陽能除胃熱白

木通脾燥濕亦除胃熱胎氣係於脾脾虛則帶無所附故

易落脾胃健則能運化精微取汁爲血以養胎自無

惡阻嘔逆之患矣故丹溪以本木爲安胎之聖藥

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用事

不安亦有竹葉湯飲之於胎動致令煩躁者

麥冬 茯苓 黃芩 人參 淡竹葉 一方茯苓爲

君無人參有防風如母如言天者加竹瀝妊娠心煩固多

虛也如和火盛者單知母九君火盛者單黃連九心神不安者單茯苓安胎切不可作虛煩用枝或等藥

參木飲 治妊娠轉胞轉胞者胎過及胞壓在一邊胞系轉

弱痰飲壅滯以致之

當歸 熟地 川芎 白芍 人參 白木 陳皮 半

夏 甘草 加姜煎空服此即入珍湯而去茯苓

李氏醫鑑 卷之八 婦人

朱丹溪曰轉胞之病婦人稟受弱者憂悶者性燥急者食

味厚者多有之古方用滑利藥鮮効因思胞不自轉爲胎

所壓胎動起胞系自疏水道自通矣近吳宅寵人患此

似似滋重則弦子曰此得之憂思過爲血少氣多故爲有

飲血少則胎弱不能舉氣多有飲中焦不消而胎知

所避而轉下乃以上藥與服隨以探吐喉中吐出藥汁候

氣定又與之八點而安此恐偶中後治數人皆効仲景云

婦人本胞盛今反弱雙胞系了疾但利小便則愈宜服

氣丸以中右後冬故也地黃爲君功在補

胞又法將好婦倒懸胞轉而小便自通矣

托胎丸 治受孕一兩月慣墮胎者

杜仲 入兩糯米湯煎 續斷 二兩酒 山藥 六爲糊丸或棗

肉爲丸米飲下二藥大補腎氣托

安胎訣 安胎妙藥似神藥白木砂仁各一錢阿膠歸芍

如足續斷艾葉八分煎寄生一錢甘草五條文

小便安然如若腰膝加杜仲本香潤紙水

安胎飲

安胎飲可安胎任四物陳皮甘草

佛手散

佛手散治產胎血虛為効

羊肉湯

羊肉湯治產胎血虛為効

當歸

當歸 芍 牡蠣 龍骨 生薑 附子 桂

枝

每服一兩羊肉四兩加葱白煮服

達生散

達生散治產胎血虛為効

氣血虛弱

氣血虛弱榮衛滯澀期易生如達生

李氏醫案

李氏醫案卷之八

當歸

當歸 芍 人參 白朮 陳皮 紫蘇 甘草

大腹皮

大腹皮 入青葱 黃楊腦子 煎 或加枳殼

仁或春加川芎夏加黃芩冬如本方或有別症以意消息

朱丹溪曰

朱丹溪曰產難往往見于鬱悶安樂之人富貴奉養之家

若貧賤者

若貧賤者鮮有之古方有瘦胎飲為湖陽公主而作恐非

至到之言

至到之言子族妹苦于難產遇胎則觸而去之子甚憫焉

視其形肥而

視其形肥而對子女工知其氣血久坐不運男因母氣虛

亦不能自運

亦不能自運其當補母氣則兄健易產今其有孕五六月

以大全其方

以大全其方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男甚快因

以其方

以其方隨母之性稟與時令加減服無不應因各日達生

散云

散云昔湖陽公主產難方士進瘦胎飲用只壳四兩妙

送宗

送宗明其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎

澤蘭葉 人參三 川芎五 荆芥一 甘草三 為末溫酒

調下更宜燒漆器醋炭于牀前使聞其氣氣血虛弱故  
生其血人參甘草補其氣外感風邪故以荆芥散其風風  
邪去氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂荆芥散血中之  
風故以

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰蓐勞

黃芩一 人參一 當歸七 生薑五 用羊肉一斤 煮汁去肉入

煎服如惡露未盡加桂辛熱 惡露下多加川芎有寒

加吳更有熱加生地有氣加細辛本方除人參 用羊肉一斤

姜五 歸三 名當歸生姜羊肉湯治產後腹中疝痛勞音

急痛 也

黑神散 行血 治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死

腹中 由血滯 不行也

熱地 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 干姜 甘草四

黑豆炒去皮 每服二錢酒童便各半煎便產須知有生

地

前症皆因瘀血不行熱地歸尾以瀉血蒲黃黑豆之滑以  
行血桂心干姜以破血甘草緩正氣童便散瘀血酒行血  
分以助藥力也神庵曰產後惡露不行坐勢勞傷者以前  
四味從輕治之若扶宿冷氣滯血凝胞胎不下則宜全用  
快行之也綱目曰寒多及秋冬宜之若性急形瘦有火  
及夏月當審用此丹溪之論薛音內薦也坐以生座

古黑神散 百草霜白芷等分每二錢煎入童便醋少許

和服治心逆產及胎前產後虛損崩漏等症

失笑散 治惡露不行心包絡痛或死血腹痛惡露阻而不

行上衝于包

皆因面作痛

蒲黃 五靈脂 等分為末煎膏醋調服

佛手散 一名一奇散 歸身 芎 為末治產後血虛頭痛胎動

下血服此即安子死腹中服此即下催生神効

催生仙方 蘇油四 白蜜一 滑石一 共煇熱服即產或各半

又方 滑石一百 草霜三 白芷三 錢紙三 如包衣不

本氏醫鑑 卷之八 再一錢神効

下死胎胞衣

謂產先生下死胎胞衣方珍珠一兩研極細酒服効如不

細傷藏府胞胎不下以蓖麻子二粒巴豆一粒射一分

膏貼臍中并足心胎下去淨若

子死腹中或雙胎一死一生食鹽肉死者出

催生神方 生者安神驗照照收法製法本草註釋

產後子腸不收方 縮三分冷水七分和服產婦面一嚥

產後血運 敗血入肝惟童便可又方以硬炭燒紅入鐵

產後血悶而死者 以紅花數片煎湯服

產後發症 以脫血無以養筋 也宜十全大補

催生四聖散 白芷二錢 枳殼二錢 冬葵子 木通各二錢 煎服

卽下

三合散 四物四君合小柴胡湯治產後日久虛勞

麻子蘇子粥 治產後大便不通 產後有三種疾鬱胃則多汗多汗則大便秘故難干

用藥 大麻仁 蘇子 等分洗淨合研再用水研取汁煮

粥啜

或問產後禁服用白芍否曰新產血氣未平恐其酸收作痛耳其性端治血虛氣痛新產正血虛氣痛之時醇酒微炒用之何害又血塊凝滯作痛不可泥于產後大補氣血放胆下之用玉燭散無妨推陳致新亦是補法只因產後大

李氏醫鑑 卷之八 補氣血一語致廣血而殞者多矣

參朮膏 治產後胞損成淋瀝症

人參二錢 白朮二錢 黃耆半錢 茯苓 陳皮 桃仁各一錢 炙甘草

五分 用猪羊胞煮湯入藥煎服 丹溪曰收生不謹以致損

年患此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在內或亦可治診其脈虛甚用梧日難產之人多是氣虛難產之後

氣血尤虛因用峻補以此膏饒時與之每劑一兩一月而安蓋令血氣驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功

本草備要妊娠主治註釋

紫石英 治女子血海虛寒不孕 衝爲血海任主胞胎經血

云女子系胞于腎及心包經風寒乘之故不孕紫石英辛溫走二經散風 確砂 覆盆子 子多寒下焦爲媛子宮之要藥

孕淫陽覆 治陰絕 破固紙 治婦人血虛婦人之血脫氣蛇

牀子 治子藏 陽起石 治子宮 續斷 治胎漏 艾葉 治子宮

仲 治胎漏 葱白一物湯 治胎漏 發汗而安胎加姜亦佳 生地

小薊 紫蘇 阿膠 知母 木香 砂仁 薑子 俱安

黃芩白朮 聖藥 鹿角膠 治血閉不孕 胡黃連 治胎 竹茹 治

動貝母 治產 益母草 同 木通 車前子 白葵藜 王石

留行 禹餘糧 大麻仁 滑石 俱催 冬葵子 胎丹 參

胎下 牛膝 治產 麥芽 下花乳石 下死胎包衣惡血 紅花 同

赤石脂 東垣云胞胎不下 滑劑可以下之 批杷葉 治產

李氏醫鑑 卷之八 太

乾 茜根 治產後 蘇木 血暈腹滿欲死產 羚羊角 主產後

茹 胎前不損子 伏龍肝 治產後 夜明砂 治死 蟬退 治產後

治胞衣 水片 治產 皂莢 胎下 皂角刺 治胎衣 石燕 胎下 金

澤蘭 治產後 血虛腰痛行未盡 白微 治產後 鬱金 治產後

血攻 姜黃 同 白芷 治產後 傷風 知母 治產 青蒿 同 上

干姜 產後大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱也

吳萸 產後必飲之 山查 治兒枕痛惡露積于太陰少

黑芝麻 後熱主產 竹瀝 治產後 大熱者寒而能補胎后不得虛胎

前不損子世人因本草大寒二字棄而不用不知假火而成何寒如此之甚耶

柴胡新產發熱不可用

治胎前瘧熱多口渴方

黃芩酒炒 柴胡 一錢 硬石膏 五錢至一兩 麥冬 五錢至一兩 知母 二錢至四錢 橘紅 二錢至三錢 白茯苓 三錢 竹葉 五十片至一百片 胃虛加人參 二錢至三錢 河水煎饑服發日五更溫服滓再煎六分并進如

熱甚寒亦甚加姜皮 二錢至四錢 白朮 三錢

治胎前瘧寒甚不渴少汗方

人參 姜皮 各五錢 橘紅 二錢至四錢 五更溫服再煎五六分

進寒甚者陽氣虛而下陷也益陽氣則寒自止邪自散

李氏醫鑑 卷之八 胎產

故應多服人參如貧人即以白朮或黃連代之 如汗多加黃耆 五錢

治產後瘧主方

當歸 三錢至五錢 柴胡 一錢 鱉甲 四錢至七錢 牛膝 一兩 白茯苓 二錢 橘紅 三錢 姜皮 一錢至二錢 干姜 炒黑四分 煎露一宿五更溫服 如

渴加麥冬 六錢 竹葉 五十片青蒿三五錢 如渴甚更加知母 三錢 花粉 二錢 痰多加貝母 四錢 如脾胃弱加人參 三錢至一兩

元氣虛亦如之 有肺熱者去人參加白芍 四錢 如寒

多加黃耆 五錢至一兩 寒甚加桂枝 七錢至一兩 干姜 炒黑 七錢

如惡露未盡亦如之并加益母草 五錢 黑豆 炒一兩 蘇木 打碎 五錢

別以 熱多加青蒿 三四錢

滯下

凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅紅曲枳殼連肉 升麻未滿七月勿用滑石症急者必須用之不拘此

例

凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅曲升麻 益母

草炙甘草一倍滑石末 四錢至五錢 若惡露未盡兼用乳香

沒藥 各七錢 炒砂仁末 一錢 久之自愈血虛加阿膠 三錢 粉炒

李氏醫鑑 卷之八 胎產

必多致損胎薛氏云如內傷飲食外感風寒用香正氣散為主若因食滯平胃散若陽氣虛寒手足厥冷須用補為急理中湯產後霍亂藏府虛冷飲食不消調胃風冷飲水者理中湯虛冷者加附子大復丹



經漏不止曰崩陰虛陽竭謂之崩而任經虛致風動筋榮血以致崩中暴下時發時止此亦一說但未及肝血虛清亦白生風之意詞卷曰衝爲主海任主胞胎任脈通衝盛則月事以時下無崩漏之患且易有子崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病木于帶脉而得名赤濁血白濁氣白陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷或濕痰濕熱蘊積而下流也此非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏良方曰帶下起于風寒濕熱所傷人于胞中或中經脉流入藏府陰虛陽竭榮氣不升衛氣下陷滯于下焦奇經之分因帶脉而得名白濁氣其狀如涕相連而下言帶者亦病形也有濕熱流滯下焦者有肝腎陰淫精勝者有驚恐而木乘土位濁液下流者或思想無窮而爲白淫者或餘經濕熱而滯小腹之下者風者色白如涕傷脾經者或如泥傷心經者色赤如津傷肺經者色白如涕傷脾經者或如爛瓜傷腎經者黑如衄血

卷之八

主

虛者補中益氣而兼升提  
血虛者養血滋陰而兼調氣

如聖散  
治崩漏不止

烏梅肉一兩 黑姜半兩 爲末每服二錢烏梅湯下瀉能止血故用

棕酸能收斂故用烏梅溫能守中故用干姜黑能止血故並煨水勝火也

固下丸 治赤白帶

樗皮兩半 白芍五錢 良姜煨黑 黃栢煨黑 三錢 粥丸米飲下

當歸煎丸 治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦 此血虛有執之症法當涼

補血訣云崩中已久爲白帶漏下多時骨本枯  
弱久則血少復亡其陽故白滑之物下漏不止

當歸 熟地 阿膠炒 續斷 白芍炒 赤芍炒 牡蠣煅

地榆炒黑  
三錢醋 九米飲下

白芷散 治赤白帶滑脫不禁

白芷 二錢 海螵蛸 二個 胎髮 一錢 爲末酒調下二錢 白芷辛 溫燥濕

祛風螬蛭醋溫收濕和血胎髮  
補陰消瘀蝦黑又能止血也

七寶美髯丹 治白帶崩漏 古黑神散 治虛損崩漏

涼血湯 治血崩不止

川芳五富歸分生地各一錢黃芩黃連知母防風

柴胡 黃柏炒 荊芥 紅花各八分 細辛 蔓荊子 羌活

活分各六藥本分五甘草 升麻分各四 食前服

李氏醫鑑

卷之八

旗帶

歸脾湯 治經漏崩帶

本草備要崩中主治註釋

鹿角膠 治下血崩中不止

五靈脂 治崩中非正治之藥乃去風之  
劑與荆芥防風治崩中義同 生地 何首烏 同治

續斷 益母子草 並用同治 艾葉 延胡 茜草 凌霄花

地榆頭若虛白茅根 白芷帶崩升麻 雞蘇 木賊 白

礬  
 石華  
 砂仁  
 香附  
 赤石脂  
 禹餘糧  
 代赭石

伏龍肝 鷄脆皮 烏骨雞 阿膠 龍骨 海螵蛸

龜板 牡蠣 殭蚕 扁栢 訶子 椿樗白皮 秦皮

上同  
槐花 棕 竹茹 蓮子 石榴皮 蓮鬚  
同荷葉

**艾實** 治大小崩中帶類 白果 治帶濁赤者濕傷血不  
 分從肺大腸來帶濁並有寒熱二症 艾葉 治帶白者濕傷氣  
 亦有因痰者宜二陳加升柴二味 艾葉 治帶白者濕傷氣  
 之綿 蜀葵花 赤者治赤帶 肉蓯蓉 治帶白者濕傷氣  
 急 白帶 同蛇床子五味山萸杜仲續斷 治虛寒白帶  
 淫 同子收飲 同蛇床子五味山萸杜仲續斷 治虛寒白帶  
 存性與 蛤粉 丹溪云治槐米炒牡蠣 益水浸等分爲末  
 灰同服 服或糊丸米飲下治白帶 甚効

李氏醫鑑

卷之八

崩帶

三

乳婦 乳癰 乳癰 內外吹  
 猪蹄湯 治乳少 猪蹄一隻雄通草一兩 煮食  
 廣濟方用猪蹄一隻煮汁加土木瓜根渴瀝木通各三 著少  
 米葱豉煮稀粥食治同或以猪蹄湯調益元散服以木梳  
 梳乳房乳汁自下 又穿山甲王不留行皆通乳之藥俗  
 皂蛤丸 治風邪客於乳房而成妳癰 此方能導其汗散其  
 矣

皂角 蛤粉 等分爲末每服二錢酒下

治乳便用方 治乳癰初起腫痛未成膿者

李氏醫鑑

卷之八

諸乳

三

蒲公英 連根帶葉二兩搗爛好酒半斤同煎數沸熱服存  
 渣敷腫上蓋腫一時許再用連髮葱白湯一鐘微

汗而

乳吹腫驗方 蒲桃葉 搗 麥麵 醋調敷即消

乳癰奇驗方 以頭垢九下二三粒少頃一吐而愈

麥冬 治乳 貝母 上同瓜蒌子 木通 通草 蒺藜 漏蘆

俱治乳 赤小豆 大麻仁 下乳又 同 葱 冬葵子

開下乳 益母草 治乳 黃芩 同 蒲公英 治乳癰肝經病同

滑石 治乳 益母草 治乳 黃芩 同 蒲公英 治乳癰肝經病同

許木鱉子 治乳 百合 治乳癰 榆白皮 治乳癰 青皮 治乳

服木鱉子 治乳 百合 治乳癰 榆白皮 治乳癰 青皮 治乳

角刺 治乳 白梅 治乳 陳皮 治乳 青皮 治乳 天花粉 治乳

凌霄花 主瘰癧 結 治乳

乳吹乳癰方 鯽魚去鱗腸入芫花煮去芫花食湯并魚

即出頭

本草經疏忌宜 乳巖乳癰內外吹 忌 補氣 升 辛溫燥酸飲宜

散結氣 涼血活血 和肝 清熱解毒

貝母 栝葉 運翹 花粉 山慈姑 山豆根 紫花

地丁 黃連 甘草 柴胡 白芷 橘皮 牡鼠糞

乳香 沒藥 漏蘆 夏枯草 金銀花 瓜蒌仁 頭

垢 人爪 鯢鯢甲 牛枝蓮 茜根

請光

小兒

小兒有胎毒瘰癧所生初生未食乳之前用牛黃二五厘合黃連甘草末蜜調令啞之其妙小兒牙關緊閉急慢驚風用杜牛膝絞汁入好酒酒之即吐以醋拌渣敷項下服之取其吐痰風癰或因母腹中受驚或因大驚而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍含空則痰涎歸之以致痰迷心竅或風寒暑濕或飲食不節通于痰氣鬱而成涎閉塞諸經厥而乃成或數日一發或一日數發發則眩撲倒地昏不知人痰涎抽掣口眼喎斜或隨藏氣作六畜之聲滿有五疳瘰癧者有畜所屬心癰其聲如羊肝瘰癧其聲如犬腰瘰癧其聲如牛脾瘰癧其聲如雞腎瘰癧其聲如豬筋急而縮為瘰癧緩而伸為瘰癧伸縮不已為瘰癧卒然脫撲抽掣或口眼喎斜吐涎而身軟時發時止為瘰癧陰虛血熱風火相持痰隨火湧

牛黃丸 治風癰迷悶涎潮抽掣

李氏醫鑑 卷之八 小兒

美

沉香天麻丸 治小兒因驚發搐痰多眼白癰瘰筋掣

尚弱驚則神思無依又動于肝風風火相扇故痰壅心竅而筋掣抽搐音觸牽制也

羌活 獨活 沉香 益智仁 川烏 附子 天麻

防風 半夏 當歸 甘草 殭蠶 每服五錢姜三片

煎

安重散 治小兒腹痛狀似驚癰 腹痛有積痛食痛虛痛

口唇淡而沫自出當隨症用藥重與癰相似小兒本怯故胃虛冷則重痛而心痛與癰界相似但目不斜手不搐也

金液丹 治慢驚 涼膈散 治小兒驚急

索雪 傷寒 治小兒驚癰 定志丸 安重定驚

木香檳榔丸

治小兒驚癇積熱

風引湯

治小兒驚癇日數十發

控涎丹

治驚癇加

奪命丹

治小兒急慢驚風痰涎壅盛藥不可下命在須臾

青州白丸子

治小兒驚風

金匱風引湯

治驚癇日數十次

玉屑無憂散

治小兒疳癖

李氏醫鑑

卷之八

地骨皮散

治虛熱潮作及傷寒壯熱餘熱

六神散

治小兒表熱病去後又發熱

地骨皮

知母 柴胡 甘草 人參 半夏

大連翹飲

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡癰癤頭

項生核或傷風傷寒時行發熱等症並宜服之

連翹

心 瞿麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍 枝子

木通

當歸 防風 黃芩 柴胡 甘草 荊芥 蠅

退 石膏

六味地黃丸

皆屬腎虛用之應手神効

消毒犀角飲

犀角 防風 甘草 黃連 燈心 二十根

蠶 金銀花 芸薹 治遊風丹腫搗葉傳之

芋根 馬齒莧 雞腸草 地膚子 葉

本草備要主治小兒驚癇雜症註釋

李氏醫鑑

卷之八

杜牛膝 丹皮 天麻 史君子

冬花 紫苑 南星 治風痰治癰瘡

故廬虛驚 薄荷 黃連 胡黃連 附子

治驚風火也 青黛 防已 治熱氣諸癰

重鎮 燈草 燒灰塗乳 金 肝膽之病 犀角

冬瓜仁湯調 白礬 五靈脂 夜明沙 雄黃

清心脾熱利痰治驚通 阿膠 小兒驚風後腹人

有肺參 羚羊 麝香 熊膽 龍骨 治十二癰

與珠 鎮心安魂 磁石 治驚風如蟬甲由氣血

眼目斜視 翳障 蠅蛇 治驚 髮 合鴨子黃煎為水 洗

相子仁 虎頭骨 巴豆 淡竹葉 蘆薈 蕪荑 秦

皮 白梅 冰片 治驚 硃砂 治癲 鈎鈎藤 治小兒驚

散行 磨三焦 心包 風熱 火息 除白 蜈蚣 治肝風 青

諸毒 前胡 治夜 蟬退 治驚 肉蔻 治吐逆 芎子 同

胡麻 治除痰 忽虛 熱 肺 肺 以生 胡麻 生 嚼 治 秦 尤 炙 甘 草

各一兩 一方加薄荷五錢 桑螵蛸 治遺尿 葶子 益

服一二錢 治潮熱 食減 瘦弱 夜遺尿 葶子 益

智仁 牡蠣 龍骨 金櫻子 雞屎白 治遺尿 素問云

病則遺尿 五加皮 錢牛膝 木瓜 冬二 為末 每服五錢

李氏醫鑑 卷之八 小兒 三歲不能行

疳積 五疳使濁 瀉痢腹重 皆由脾胃虛弱 因而氣凝 食滯 濕熱

治疳方 宣黃連 胡連 各五 硃砂 二錢 五 入雄猪膽

錢將歸 懸掛在篋內 煮一時 取出 搗爛 研蘆薈 香射 各一

分 夜光如麻子 大每六粒 或至十二粒 止米飲下 隨兒大

小加 使君子 補脾 殺虫 柴胡 治五疳 前胡 黃連 同猪胆 煮

藥 治熱 疳 百部 百草霜 皂礬 五穀虫 肝黃 甘松 治

疳 木驚 疳 地黃 甘能 殺虫 五錢 脂 蟾蜍 治 蟾酥 治

疳積 疳積 黃丹 治疳 海螵蛸 治疳 阿魏 治疳 蜜蒙花 治

氣攻 椿榔皮 治疳 海桐皮 同 〇月明沙 治勞疳

秘傳芝蔴藥方 治小兒傷積 食積 黃瘦 疳積 等症

芡子 一兩 杏仁 三錢 莢米 各五 青皮 五錢 以上四青

木香 三錢 五穀虫 五錢 炒 查肉 一兩 穀芽 一兩 炒 橘紅 三錢 明雄 五

阿魏 五分 煎去油 約成二分 以上各製 共末 用晚米飯 搗

三日 後或作 瀉 不必慮

走馬疳 走馬疳言患迅速不可遲延故也其患多在唇疳餘毒

中又有雜病熱甚而成者牙根作爛隨便黑腐作臭甚

李氏醫鑑 卷之八 疳 三

疳積 治小兒走馬疳身熱氣粗牙齦腐爛氣臭

蘆薈 消疳 飲 治小兒走馬疳身熱氣粗牙齦腐爛氣臭

蘆薈 柴胡 川連 胡連 牛勞子 元參 桔

梗 黑枝 石膏 薄荷 羚羊角 甘草 升麻 各三

淡竹葉 十片 食 後服

疳方 水片 兒茶 各五 石膏 雄黃 各三 研末吹神効

人中白散 人中白 紅 兒茶 黃柏 薄荷 青黛 各末

水片五分 共研 細用溫湯漱淨 再吹藥 疳上 日

用六七次 吹藥 疳外 流為吉 內收 遲毒 入裡 為凶

癰瘍

李氏醫鑑

癰瘍之八

癰瘍

三

朱丹溪曰癰疽皆因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也而  
行脈中氣行脈外相並周流寒與溫搏之則凝滯而行  
為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得邪而  
津液稠粘為痰為核久滯入脈中血為之濁此陰滯  
陽也血得邪而凝滯則凝滯或凝滯久滯出脈外氣  
為之亂此陽滯也陰也百病皆出於此不止癰疽而已也  
內經曰榮氣不從逆於肉裏乃生癰腫又曰諸癰瘡皆  
以備氣急其餘各症各有專方不能多錄癰疽之生始  
喜怒憂樂之不時飲食居處之不節或金石草藥之發  
寒暑燥濕之不調致陰陽不平而結聚成癰癰而腐  
者起於大腑浮達而為癰重者發於五臟沉滯而為疽  
者為癰實者為癰深則為疽矣發於外者為背疽癰疽  
疽等症發於內者為肝癰肺癰腸癰等癰外癰癰疽  
症難明太陽經虛從背而出少陽經虛從脅而出陽明經  
虛從臍而出督脈經虛從腦而出凡癰疽痛者為實邪腫  
而不痛為虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為癰  
氣停痰血滯則氣壅氣壅則經絡滿急故腫且痛  
李東垣曰癰瘍及諸癰疽而赤雖伏火熱禁不得攻事為  
氣抑鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大  
便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤  
之如見風脈風症只宜發表風藥便可以通利太偏者止  
乾燥秘澀尤宜潤之慎不可下九竅不利癰疽難止  
可下汗之則愈癰疽要曰治癰疽須明托裏疎瀉調和藥  
其邪在內者其脈沉實發熱煩躁外無脈者其邪在表  
其邪在表者其脈浮大發熱煩躁外有脈者其邪在表  
中者外無脈者其邪在內亦宜托裏而內行當先托裏內外  
用此三者雖未即愈必無變症亦德之曰世人皆謂乳沒  
珍貴之藥可住癰疽不知癰疽初起一痛熱痛寒之  
寒痛溫之風痛除其風濕痛導其濕導痛潤之寒痛通之  
陰陽不和者調之虛痛補之實痛瀉之癰疽而閉者開之  
藥肉敗壞引之經絡開通者利之不耳一而無權也

癰疽之毒皆山榮家實熱氣逆所結急在癰疽血熱  
結解大劑連進內外夾攻務使消渴即勢大毒盛一時  
不能散盡亦必十消七八從使膿膿保無大害若失  
于救治使熱毒內攻其膜必壞壞則神人不能救矣  
真人活命飲 治一切癰疽腫毒初起未消者

銀花 錢三 陳皮 當歸 防風 白芷 甘草 貝母

天花粉 乳香 沒藥 皂角刺 穿山甲 片

粉炒 用 好酒煎毒在上飽服在下饑服善飲者多飲

酒以助藥勢忌酸物鐵器 此藥常服於未潰之先未成者  
散已成者潰者若已潰後不可服

金銀花酒 治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰  
初起便服奇効

李氏醫鑑

癰瘍之八

癰瘍

三

金銀花 五兩乾者亦可 甘草 一水二碗煎一磁罈入酒一  
不及生者力速

碗畧煎分三服一日一夜盡服重者日二劑服至大小腸  
通利則藥力到外以生者為燭酒調敷毒四圍

金銀花 藥能清熱解毒甘能養血補虛為 本方用金銀花  
癰疽聖藥甘草亦扶胃解毒之上劑也

二 甘草 一加黃耆 酒一重湯煎服名同毒金銀花湯治  
兩 升

痛瘍色變紫黑者 附忍冬膏 金銀花 四月採鮮花搗  
汁熬膏茶酒任點服養陰陽補虛療風尤宜於火熱熾

盛之人永無疔疽之患膏酒亦佳 花藥同功  
兩花尤勝

癰瘍九 治一切癰疽惡毒先服此九護膜托裏使毒不攻

癰瘍九 治一切癰疽惡毒先服此九護膜托裏使毒不攻

癰瘍九 治一切癰疽惡毒先服此九護膜托裏使毒不攻

心 黃蠟二白禁一先將蠟溶化候少冷入禁和均為丸

酒下每十九二十九漸加至百九則有力愈後服之亦

佳心為君王不易受邪凡患癰疽疔毒上攻心則命立傾矣

諸症所必用也黃蠟甘溫白禁酸澀並能固膜護心解毒定痛托裏

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪實數腫

甚欲作膿者脈弦洪實數乃實熱

金銀花 當歸一大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣

皂角刺三錢黃芩 赤芍一錢每五錢半酒半水煎

神授衛生湯外科治癰疽發背腦疽對口丹瘰癧癰毒

李氏醫鑑卷之八

疔瘡濕痰流注及外科一切瘡症但未成者即散已成者

即潰能宣熱散風行瘀活血解毒消腫疏通臟腑且藥性

平和功效甚速誠外科首用方也

羌活八分防風 白芷 川山甲土炒沉香 紅花 連翹

石決明煨各六分金銀花 皂角刺 歸尾 甘草節 花粉

各一乳香五分大黃酒拌炒二錢水二碗煎八分病在上部先服

藥隨後飲酒一杯病在下部先飲

破棺丹 治諸瘡腫熱

大黃二兩芒硝 甘草各二

救苦勝靈丹方一名救苦丹治癰癧馬刀挾瘰從耳下或耳

後下項至肩或入缺盆中缺盆在兩脇乃手足少陰經分其癰

癰在頸下或頰車乃足陽明經分受心脾之邪而作也今

將三症合而治之 黃芩護皮毛定元氣活連翹能散諸

氣聚十二經者血生血益氣聖藥一葛根五分此三味足

藥中不可無也漏蘆升麻一葛根五分此三味足

去腸胃中當歸 生地 熟地此三味和血白芍各三分

補中益氣治腹痛必用 防風五分羌活 獨活一錢此三味

之夏倍用冬寒少用 陽風辛溫若毒在

陽風辛溫若毒在

急柴胡八分功同連翹如瘰癧 牛蒡子解毒無入參補氣

李氏醫鑑卷之八

如氣短不調 甘草五分能調中和諸藥 肉桂二分能散

及喘者加之 黃連二能散

瘰癧當少用之此藥因熱用之意又為傷寒覆

蓋其症用大辛熱以消浮腫之氣煩燥者去之 黃連煩悶

黃柏炒各三分如有熱或腿脚無力加之如煩燥 昆布昆

瘰癧欲去衣者腎中伏火也更宜加之無此勿用 益智二

堅硬者宜用 三稜煨二我木煨三分此二味瘰癧堅

瘰癧者宜用 三稜煨二我木煨三分此二味瘰癧堅

散腫潰堅湯 治同前諸症

黃芩八錢半酒知母炒黃柏炒花粉酒洗桔梗昆布五錢

柴胡四錢升麻連翹甘草炙三稜酒洗莪朮酒洗葛根

歸尾酒洗白芍二錢黃連一錢每服六七錢先浸半日煎食後

熱服服後仰臥取藥在口內另將半料蜜丸留藥湯吞之量虛實服

飛龍奪命丹 治一切疔腫癰疽惡瘡初發或發而黑陷漏

氣內攻者

天南星 雄黃 巴豆去油黃丹 乳香 硝砂 信石

分斑苗十六個去頭足炒麝香少為末蟾酥和為丸如黍米太

每服十九或十四九量人虛實好酒送下瘡上下服法如前忌油膩

李氏醫鑑 卷之八 癰疽

此十二經通行之藥也毒氣內攻癰疽黑陷非平劑所能勝南星雄黃黃丹味辛性燥能殺毒破瘀巴豆硝砂大毒大熱能祛寒化積斑蟊蟾酥辛寒至毒能拔疔毒下惡物信石燥烈切破腐香寶通竅乳香能使毒氣外出不致由攻引之以酒使行經絡無毒不瀉也此乃厲劑所謂藥若不顯其厥疾不瘳此類是也此方世俗多用之然香寶燥毒之劑益無經不至者備汗吐下三法病因食食飲一切毒及瘡脈沉細脈數毒蘊在裏并濕毒用之神効若大熱大渴毒氣厥發脈浮洪在表及膏梁積熱之人不宜輕用世人多不分此又有以半夏代雄黃者殊不知雄黃治諸瘡及百節中大風中惡者之意也

托裏十補散 治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脈

無力者若癰疽不問膏梁丹毒火熱因虛氣鬱者止補形氣調經脈自常消散不得汗之下之也

黃耆 人參 當歸 錢川芎 桂心 白芷 防風 厚

朴 桔梗 甘草一錢每服二錢加至五六錢熱酒下

本方加白芍連翹木香乳香沒藥亦名托裏散治發背疔瘡此為表裏

其成助陽內托之功也丹溪曰若冬月腫痛用之可轉重

就輕若潰瘍夏月用之以桂枝之溫散佐以防風白芷各

恐難有參考難為倚仗世人不分冬夏無論經絡不能無快也

托裏黃耆湯 治諸瘡潰後膿多內虛潰後膿血出多陰陽兩竭宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 志肉 麥冬 五

味炒等分每服五錢食遠服

丹溪曰癰疽潰後補氣血理脾胃實為切要否則數月之後虛症仍見轉成他病也

托裏溫中湯 治瘡瘍為寒變而內陷膿出清鮮皮膚涼心

下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔逆氣短呃逆不得安

臥時發昏此孫彥和治王伯壽臂瘍方也六脈沉微色

用此大辛之劑益舍時從症之變法也

附子炮四錢干姜炮羌活錢二木香半錢茴香 丁香 沉香

益智仁 陳皮 甘草炙一錢加姜五片煎

止痛當歸湯 治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸 生地 白芍 黃耆 人參 甘草 官桂 各一

兩歸地活血涼血參耆益氣補中官桂解毒化膿神化腐

則痛漸止白芍和脾酸以飲之甘草扶胃甘以緩之痛自



灸法 治一切癰疽惡瘡

凡初覺發背欲結未結赤腫微痛以濕紙覆其上先乾  
處印癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾炙之三壯  
換一蒜片痛者炙至不痛不痛者炙至痛時方住最要早  
覺早灸為上若有十數頭者即用蒜餅作餅鋪頭上案  
于餅上燒之若發赤腫一片中間有黃粟米頭子便用獨  
蒜片安于頭上若艾炙十四壯或四十九壯使毒氣外出  
則易愈李迅曰癰疽着艾勝于用藥三壯一易百壯為率  
但頭項以上切不可用恐引氣上更生大禍也史源曰有  
炙至八百壯者約艾一餅初壞肉不痛直至好肉方痛  
至夜火熾滿背高阜頭孔百數則毒外出否則內過五藏  
而危矣綱目曰精要謂頭上發毒不得炙此言過矣頭為  
諸陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如椒粒少者三五壯  
而已訖庵曰東垣炙元好問胸疽以火艾炷如兩核許者  
炙至百壯始覺痛而痊由是推之則頭上發毒灸之痛者  
艾炷宜小壯數宜少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也

火攻法

凡癰疽不起癰肉不腐癰癰流注腫頑惡瘡不  
藥真良方也凡癰疽不成膿者死不治毒氣盛而元氣衰也

消無名腫毒極驗方

肥皂極肥大者 個蛤粉 四馬料豆 半肥皂 去子 將二味填

滿用麻扎固以泥包裹炭火燒煉候烟去盡去外泥人土

內一夜拔火毒研細末用醋調敷乾即加醋于上或再去

更敷

生肌散 飲瘡長肉 初起者 禁用

寒水石 煨 滑石 兩 龍骨 海螵蛸 兩 蜜佗僧 枯礬 生

粉 乾胭脂 共為細末搽瘡口上 此陽明藥也

不飲蓋因膿水散溢而潰爛也石膏亦名寒水石滑石解  
肌熱龍骨枯礬善收瘡脂活血清解毒螵蛸能定粉收  
濕燥膿故飲 又方 瘡口各一錢輕粉五錢亦名生肌散  
而生肉也 又方 瘡口各一錢輕粉五錢亦名生肌散

芙蓉敷法

一切癰疽腫毒用芙蓉花或葉根皮搗爛或乾  
即覺清涼止痛止腫消已成者即膿出已潰者即易飲湯  
秘之名為清涼散清涼散鐵錘散皆此物也或加赤小豆  
末或蒼耳燒存性為末和入亦妙芙蓉辛  
平性附延和清肺涼血散熱甚痛消腫排膿

綠豆粉 甘涼無毒主解諸熱益氣解酒食諸毒治發背癰

疽瘡腫及湯火傷灼 經疏曰菜豆粉所製氣味與菜豆同  
故能解諸熱及酒食毒湯火灼傷

護心散 內托散 乳香萬全散

凡有疽疾一日至十三日  
內宜連進十餘服方免變  
症使毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐  
或鼻生瘡齒不食即危矣四五日亦宜間服之

真菜豆粉 乳香 牛兩燈心同研和勻以生甘草煎濃湯

之煎大宜服此蓋能堅熱下氣消腫解毒服至一  
兩則香微於乳香聖藥也一方有升砂二錢五分

乳香黃耆散 治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者

或末成者速散已成者速潰敗腐膿毒不假刀砭惡肉自

脫 乳香 沒藥 各五 黃耆 瞿粟壳 共煎膜 人參 廿

草 川芎 當歸 白芍 陳皮 熟地 各一量 痢上下

食前後服之

托裏消毒散 治癰疽已成不得內消服此以托之未成者

可消已成者即潰腐肉易去新肉易生

傷胃 氣 此散不可用內消

人參 川芎 白芍 黃耆 當歸 白朮 茯苓 銀

花 各一錢 白芷 皂角刺 桔梗 各五分 脾弱者去白

排膿內托散 治癰疽腦項諸發等瘡已潰流膿時宜服

當歸 白朮 人參 各二錢 川芎 白芍 黃耆 陳皮

李氏醫錄 卷之八 癰疽

茯苓 各一錢 香附 肉桂 各八分 甘草 五分 白芷 頂上之

上加 牛膝 五分 下部加 姜三片 透膿散在後

神功內托散 治癰疽腦項諸發等瘡至十四日後當腐潰

流膿時不作腐貴兼瘡不高腫脈細身涼者用

當歸 白芍 各一錢 人參 各五分 白芍 茯苓 陳皮

附子 各一錢 水香 甘草 各五分 川山甲 八分 煨姜 三

常歸拈痛湯 見前 此方東垣本為治脚氣

濕熱之劑後人用治諸瘡甚驗

猪膏酒 治瘡疥最良 猪脂二斤 金銀花 煮酒

經驗方 治下部濕瘡久不愈兼治膿窠瘡

五加皮 石菖蒲 連翹 蒼朮 木瓜 土茯苓 黃

柏 黃耆 苡仁 金銀花 鱉龜胡麻

經驗方 此方 治下部濕瘡久不愈兼治膿窠瘡

生地 銀花 連翹 蟬退 丹皮 白蘚皮 紅花

防風 白芷 木通 靈仙 甘草 青木香 續斷

桔梗 荊芥 白蒺藜 加燈心

京省名醫治疔毒定驗方

核批殼半邊填人尿其中合毒

李氏醫錄 卷之八 癰疽

或和日

透膿散 治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之即破

黃耆 四錢 川山甲 一錢 川芎 一錢 當歸 二錢 皂角刺 一錢 服法如

前飲酒

出癰疽頭

針清二孔牛旁子亦一

周禮天官 瘍醫凡瘡瘍以五毒攻之瘍音羊瘡瘻也鄭

中燒之三日夜其烟上著以

本草備要主治癰疽瘡瘍一切腫毒消散註釋

瓜蒌仁 紅花 小薊 大黃 蒲黃 姜黃 三棱

散一切血瘀 消腫止痛 白芷 升麻 連翹 牛蒡子 金銀花

石菖蒲 防己 俱清腫 皂角刺 宜通竅 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 散十二經 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

射乾 紫柏香 山豆根 俱清散 薄荷 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

散一切瘰癧 走肢脚外達皮膚 甘遂 末傳腫處 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

芋根 瘰癧 香附 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

山藥 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

李氏醫鑑 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

石決明 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

風 苦參 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

貝母 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

子 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

其驗乃奇 消腫止痛 犀角 化膿 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

蘇木 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

服口正 辨服又 穿山甲 桔梗 養血又 地榆 大黃 枯  
 磨 丹參 以上俱 犀角 化 赤小豆 排烏梅 蝕惡肉 燒灰存  
 本草備要生肌飲口註釋

經驗飲口方

蚌竹屑 栢末 潮腦 乳香 沒藥 輕粉 冰片

黃丹 白臘 為細末鎔化貼

白飲 生肌止痛 飲方多用 木通 漏蘆 扁柏 花粉

丹參 以上 白及 逐瘀生新之聖藥 木鱉子 生肌 磁石 瘰癧

節子 生肌 續斷 自然銅 黃丹 去瘀生新 黃蠟 白蠟

李氏醫錄

卷之八

瘡毒

生肌外 白礬 生好肉 琥珀 從辛溫藥 桂心 生肌 貝母 散

火降和散 瘡口自 五倍子 散熱毒 飲瘡口 代賴石 金瘡

乳石 止金瘡出血 木敷 石灰 風化者 良藥 灰火毒 已山

尤效 散血定痛 生肌 止痛 金瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

納脂 散血 定痛 生肌 止痛 金瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

脂 散血 定痛 生肌 止痛 金瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

楊梅瘡 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

陽明 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口 瘡口

變為拘攣癰漏 竟致廢創 土茯苓 能解輕粉之毒 去陽明  
 濕熱 用一兩 為君 苡仁 金銀花 防風 木瓜 木通 白蘚皮 各  
 五分 皂莢子 四分 氣虛 加入人參 七分  
 血虛 加當歸 七分 名搜風解毒  
 杖瘡 極驗方 上好石灰 水 用無根水 浸洗 少頃 澄清 去灰 取  
 血從毛孔 而出 即愈

瘡

消風散 治癰 酒 漏癰方 慈膏 一錢 炙 為末 傅之 乾

麻油 治 天南星 治疥 艾葉 殺虫 治癰 蕪荑 治濕 燥 大風

子 取油 治 蛇床子 為末 治 使君子 治瘡 枝子 五加皮

海桐皮 白蘚皮 漏蘆 俱治 紫草 治瘡 百部 治瘡 白

李氏醫錄

卷之八

瘡毒

磐 治濕 椿實樹汁 金瘡 荔枝核 為末 醋 牙皂 金銀花 瘡

跌打損傷 韭汁和童便飲 散其 骨折者 室和葱白 搗勻 厚

錢 二 跌打損傷 韭汁和童便飲 散其 骨折者 室和葱白 搗勻 厚

防風通聖散 治折跌損傷

膠艾湯 治 加丁姜 治從高墜下 損傷五藏 吐血及金瘡 經

因經者

復元活血湯 治從高墜下 惡血留于脇下 疼痛不可忍

者 凡損傷必有惡血 停滯 不問傷在何 經惡血必留于脇下 以用主血故也

柴胡五錢 當歸 花粉 川山甲二錢 甘草 紅花二錢 桃仁

五十粒去 大黃酒浸 每服一兩加酒煎以利為度原文曰

皮尖研 經行下腦下屬陰少陽故以柴胡引引為代 諸藥破血潤氣味相合各有攸歸痛自去矣

跌打損傷方 歸尾 桃仁 澤蘭 菴蒿子 大黃各三錢

煎服非汁和童便飲散 其瘀血骨折治法見前

刀斧傷 割海螵蛸末傅之血立止古墻石灰為末傅之亦

佳

金瘡血出不止 用原蠶蛾炒為末傅之

本草備要主治註釋 琥珀合金

李氏醫鑑 卷之八 損傷 聖

續斷主折跌金瘡 白欬治撲損 骨碎補治折傷唐太 益母

草去瘀生新 澤蘭治撲損 海螵蛸刀斧傷刮末 狗脊毛同上三七

治折傷金 芋根折傷金瘡 生地主折跌 菴蒿子治悶挫氣

鹿角膠主折跌傷損瘀血或病後溫入 慈石止金 茜根治

跌打無病之血 合歡續筋骨能補 牛膝治傷折 蒲黃治撲

紅曲治跌打損 蘇木治跌打 乾漆續筋骨 半夏治跌打 南星治跌打

黃蠟續筋骨 蘇木治跌打 乾漆續筋骨 半夏治跌打 南星治跌打

出竹半刺并箭鐵

螳螂一個巴豆半粒為末敷傷處微瘻且忍極 瘻破拔之以黃連貫仲湯洗拭石灰敷之

飛進飛矢中口拔矢而鐵留于中痛用俟死一脗教以 寒食餠點之至夜落瘻一餅而出旬日而瘻音夷即愈 也

象牙諸鐵及雜物入肉刮取屑 白梅刺入肉中用骨 牛膝

王不留行 酸棗仁壳並出竹

湯火傷

葛子搗爛和蜜塗 梨切片 蘿下生搗敷治 蛤粉治湯 菜豆粉

治湯火 山茶花麻油調 白欬殺火毒治金瘡撲損 大黃為末

白或麻 薤白搗細 蜜調塗 青魚膽塗火

名公經驗方 黃蠟 白蠟各一兩 白欬一兩 雄猪板油四兩

李氏醫鑑 卷之八 損傷 聖

油一兩先將板油化開再入二蠟 炸化離火再入白欬麻油即愈

雞子清調大黃末塗之炒黃栢末亦可一法以冷燒酒淋

湯火傷驗方 烏桕樹外粗皮炒為末 桐油或麻油調敷痛即止

又經驗方 細茶葉炮過者曬乾為細末用麻油調敷痛即

止而易愈或用鐵線藏印以溫爛者敷

上亦

佳

瘻

冷服過刺半血熱服或取生蠟研冷水服

根 脉毒 綠豆 木砒石諸毒 蟹 魚毒 紫蘇 蟹毒 胡椒

根立解河綠豆解一切金石草蟹解鱉紫蘇解魚胡椒

切魚肉蟹	蒲公英	解食	砂砂	音鏡治肉	砂砂	解毒胎毒
聖苗毒	土茯苓	解傷癰瘡毒	花柳	殺魚	五味子	解毒
葛花	秦艽	蛤粉	桑椹	黃連	草薢	扁豆
參	枳實子	以上並	食鹽	檳榔	砂仁	白蔻
白果	烏梅	西瓜	甘蔗	梨	酒	白蔻
赤小豆	解小	解漆毒	見	殺魚	肉菜	石菖蒲
草	莪術	藥毒				益母

諸毒

三

**救急良方** 人之以疾病死而得終其天年者皆不幸也。幸也乃有暴橫之速大如鐵溺。此等症之傷小如骨硬刀斧湯火之害。坐視其轉死而莫之能救者多矣。茲取簡便良方以備緩急。倘用此而救活一命於人心獨無快也。

**暴死** 凡人遇溺於心卒然倒撲。急扶入暖室。扶策正坐。用菜汁灌鼻中。或用皂角末吹入鼻中。良久自醒。或揭非急于人中穴及兩足大姆指離甲一韭菜許。各灸三五壯。即活。凡人卒然昏倒。身冷無痰。此名氣厥。亦名中氣。若身溫有痰者。則名中風。但扶正坐。氣順即安。或用皂角末吹鼻。令嚏亦佳。凡冬月中寒卒倒。身強口噤。手足厥冷。如無醫藥。當煎姜湯灌之。凍死有氣者。以灰炒熱盛囊中。按其心頭。冷即易之。若暈以火烘。冷與火爭。必死。落熱卒死。以路上熱土圍臍。令人尿其中。即活。姜湯灌之。熱皆可灌之。或用熱土大磚等分。燻水灌之。或呼李氏醫鏡。

**及臥冷地** 正如凍死人。若遇近火即死。及臥冷地。正如凍死人。若遇近火即死。

**縊死** 急用手裏衣物緊塞喉道。抱起解脫。安放正平。揪髮耳內。或刺雞冠熱血滴口中。男用雞女用雞。鼻即氣轉。或再屈伸其手足。將手磨之。若氣不接。將腰打三四拳。或以皂角末搐鼻。切不可割斷繩。

**溺死** 急倒提出水。用牛一頭令橫臥。以腹合牛背上。牽牛徐行。令吐出腹中之水。以老姜擦牙。即活。口噤者。攪開。橫一筋于牙間。使水得出。如無牛。以鍋覆地。將溺人臍對到臍。俯臥。以手托其頭。水出即活。或俯臥。枕上。腳後背高。蓋蓋。臍中待其水自流出。或用皂角末。綿裹臍下。即出水。即活。切忌火烘。逼寒氣入內不救。

**噎死** 如原有噎。即得。切忌火烘。但痛咬其腳跟。或咬大拇指。而唾其面。或以皂角末吹入鼻中。得嚏即醒。

**絞腸痧**

李氏醫鑑卷之九

補養論

補者補其不足也。養者養其虛也。將護之使得生遂條達而不受戕賊之患也。人之氣稟有偏其平有偏于陽而陰不足者有偏于陰而陽不足者。必假藥以滋助之。而又須優游安舒。假之歲月。使血氣歸于和平。乃能形神俱茂。而疾病不生也。經曰。聖人不治已病。治未病。不治已亂。治未亂。夫病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。關而鎗兵。○諸方散入各門。

消導論

消者消其積也。導者行其氣也。脾虛不運則氣不流行。氣不流行則停滯而為積。或作瀉痢。或成癥痞。以致飲食減少。五穀無所資稟。血氣日以索。衰因致危。困者多矣。故消而導之。輕則用和解之劑。重必假峻下之湯。元蓋謂

李氏醫鑑卷之九

陰不降則清陽不升。客垢不除則真元不復。如截定禍亂。然後可以致太平也。消導諸方散入各門。峻劑見攻聚門。

收瀉論

滑則氣脫。脫則散而不收。必得酸澀之藥。斂其耗散。而後發者可返。脫者可收也。如汗山亡陽。此氣脫也。若亡血不已。前中暴下。諸大吐衄。此血脫也。十劑曰。瀉可去脫。牡蠣龍骨之屬是也。氣脫兼以氣藥。血脫兼以血藥。亦兼氣藥。氣者血之帥也。陽脫者見鬼。陰脫者目盲。此神脫也。當補陽助陰。非瀉劑所能收也。諸方全前。

三部原本諸方散入各門

理氣論

經曰。諸氣鬱結皆屬于肺。又曰。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。九氣不同。百病皆生于氣也。夫人身之所恃以生者。此氣耳。源出中焦。總統于肺。外榮于表。內行于裏。周流一身。頃刻無間。出入升降。晝夜常清。若化而為瀉行者。阻而不通。失其護衛。而不和。寒失營運。而弗順。氣本屬陽。及勝則為火矣。人患有宗氣。營氣。衛氣。中氣。元氣。胃氣。沖和之氣。上升之氣。而宗氣尤為主。及其氣為病。則為冷氣。滯氣。上氣。逆氣。氣虛。諸變症矣。河間所謂五志過極。皆為火。丹溪所謂氣有餘。便是火。無病之時。宜保之。養之。和之。順之。病作之時。當審其何經何症。寒熱虛實。而補瀉之。

補中益氣湯

升陽

治煩勞內傷。身熱心煩。頭暈惡寒。懶言。

惡食脉洪大而虛。或喘或渴。或陽虛自汗。

宜本湯加麻黃。

李氏醫鑑

卷之九

理氣

二

俱宜蜜水炒過。欲其引。或氣虛不能攝血。或瘧痢脾虛。久參者至表。故又不可缺。

不能愈一切清陽下陷。中氣不足之症。

中者脾胃也。藏府

胃饑飽勞役。傷其脾胃。則眾體無以稟氣。而皆病矣。陽氣下陷。則陰火上乘。故熱而煩。非實熱也。頭暈者。諸陽之會。清陽不升。則濁氣上逆。故頭痛。或作或止。非如外感頭痛。不伴也。陽虛不能衛外。故惡寒。自汗。氣虛故懶言。脾虛故惡食。脾胃虛則火上。于肺。故喘。金受火灼。不能生水。故渴。脾虛不能統血。則血妄行。而吐下。清陽下陷。則為瀉痢。氣血兩虛。則瘧不止。皆虛症。老也。

黃耆

蜜炙

人參

錢

甘草

錢

白朮

土炒

柴胡

三錢

薑三片。棗二枚。煎如血不足。加當歸。精神短少。

加入人參。五味。肺熱咳嗽。去人參。喘乾。加葛根。風藥多。燥為根。獨能止渴。



者以其能升胃中清氣入肺而生水耳 頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加  
蘇本細辛風濕相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏  
生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益智腹脹加枳實厚朴  
木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃連能食而心下痞  
加黃連咽痛加桔梗有寒加肉桂濕勝加蒼朮陰火加黃  
柏知母陰虛去升柴加熟地山茱山藥大便秘加酒煨大  
黃咳嗽春加旋覆欬冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃冬  
加不去根節麻黃天寒加干姜泄瀉去當歸加茯苓蒼朮  
益智 觀此加減則用藥之大較亦可得而識矣

王氏醫鑑

卷之九

聖氣

三

此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃耆補肺固表為君

者肺之本

土能生金脾胃一虛肺氣先絕

人參甘草補脾益氣和中瀉火

為臣

東垣曰參者甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則虛而生白熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦謂之為

木燥濕強脾常歸和血養陰為佐

補陽必兼和陰不然則已亢升麻以

升陽明清氣

右升而復其本位

柴胡以升少陽清氣左旋而陽升

則萬物生清升則濁陰降加陳皮者以通利其氣同補藥則補濁

用則

瀉脾生姜辛溫大棗甘溫用以和榮衛開腠理致津液諸

虛不足先建其中中者脾胃是也

李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而

乘其土位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之脾胃二虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令

自汗上喘氣短故以人參補之心火乘脾用炙甘草溫以  
瀉火熱而補脾元若脾胃急痛併大虛腹中急縮宜多服  
之中滿者減之白朮苦甘溫除胃中之熱利腰膝開血  
中清氣在下必加升麻柴胡以升之引參者甘草甘溫之  
氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脉之縮急氣  
亂于中清濁相干用去白朮陳皮以理之又助陽氣上升以  
散滯氣脾胃氣虛為陰火傷其生發之氣榮血大虧血減  
則心無所養致令心滿而煩病名曰怔忡門上聲故加甘  
辛微溫之劑生陽氣伸景之法血虛以人參補之陽旺則  
能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水瀉陰中伏  
火如煩猶不止少加生地補腎水木旺則心火自降李士  
材曰虛人感日不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱  
者表熱也服此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽  
氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故升瀉  
治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散藥血虛  
者四物湯加發散藥東垣治風濕無汗者用神木湯有汗者  
用白朮湯治剛瘧神木湯加羌活麻黃治柔瘧白朮湯加  
李氏醫鑑 卷之九 理氣

李氏醫鑑

卷之九

理氣

四

謂辛苦之人觸胃之病傷寒是也明醫雜著云發熱有數  
種治各不同仲景論傷寒傷風此外感也故宜發表以解  
之此麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時發病故用辛  
熱以勝寒如春溫之月則當變以辛涼之藥夏暑之月則  
當變以甘苦寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣又泄用  
藥不可溫熱又有瘟疫沿門閭閻相似者此天地之瘴氣  
隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若  
夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣  
發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此  
用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰血  
既傷則陽氣偏勝而變為火是謂陰虛火旺勞瘵之症故  
升瀉發陽有餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其陰  
而火自降此用血藥以補血之不足者也又有夏月傷暑  
之病雖屬外感却類內傷東垣所謂清暑益氣是也又有  
因暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外此  
則非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛熱解表辛溫理中

李氏贈

卷之九

理氣

五

知味舌知味及食入反出本方加白芍五味子亦名調中

益氣湯東垣治氣虛多汗餘治同前補中湯純用甘溫所謂勞者溫之損者溫之此

加白芍五味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎

分半夏黃芩益智各三分名參朮益胃湯東垣治內傷勞倦

燥熱短氣口渴無味大便溏黃本方去白朮加草薢神曲

半夏黃栢名升陽順氣湯治飲食勞倦所傷滿悶短氣不

思食不知味時惡寒  
陽氣順矣栝皮苦寒降其濁濁降則

陳皮利其膈。膈利則痰氣順矣。豆蔻神曲消其食。食消則

陽道以滋春氣之和又引參耆甘草上行充實腠理使衛

外爲固片補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸屬藥是也此助春夏之升浮者也此便是瀉秋收冬藏之藥也在人身乃肝心也但言瀉之以酸苦寒之劑并淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也諸加減主治方散入各門

在人一身是肺腎也

原爲感症中有內傷一種故立此方以補傷寒書之所未及非補虛方也今感症家多不敢用而以爲調理補虛服食之藥則謬矣調理補虛乃通其義而轉用者耳

本草備要主治註釋末附短氣論

黃耆補肺氣 甘草補三焦 人參大補肺 沙參專補肺氣 白朮補氣

黃精補中益氣 蕨蕨補中益氣 狗脊溫養氣 石斛清元氣 志肉壯氣 五味子

益氣柴胡 能引清氣上行  
升麻 能升陽氣于至陰之下  
茯苓 寧心  
益氣枸杞

平民教育

卷之九

脚氣

六

益氣地骨皮涼血而補正氣天麻益氣強陰連翹散諸經血凝氣聚蘇葉下氣

益智固氣白茅根補中益氣大棗補中益氣白果溫肺益氣胡桃補氣芋艿溫中

益氣 胡麻補氣 天冬 麥冬似益氣 雞蘇 醋 旋覆花 烏蘆

胡椒 郁李仁 桑白皮 紫苑俱丁 白欬 沒藥俱藥

志肉上同 谷芽  
麥芽氣通上 蔥陽氣 薑子  
薤白勝氣滯

葛并子性用俱降氣  
 白芥子性用俱降氣  
 滑石性用俱降氣  
 蟹性用俱降氣  
 枳性用俱降氣  
 厚朴性用俱降氣

同陳皮則下氣帶橘紅發散葶藶下氣砂仁快氣白豆蔻散氣

肉蔻氣 草蔻開鬱 百合補中 山藥益氣 羊肉益氣 牛肉氣

阿膠益氣補血 紫河車大補元氣 藿香悅氣 甘松理氣 華菱溫中 下氣

琥珀能使肺氣下大腹皮沉香能降能升上至天下至

傷氣檀香要藥吳茱萸溫中延胡索能行血中氣滯氣中

金亦不損正氣薑黃理血中我木破血中三稜散氣結功

力桔梗利肺膈痰杏仁降氣利胸陳皮同補藥則補則

青皮破滯削堅山查行氣木瓜氣脫能收枇杷葉降氣

痰消荔枝核氣散滯淡豉黑豆均下神曲散香附乃血

中氣藥通行十二經八脉主一切氣人身以氣為主氣盛

逆則病絕則死矣七情之氣香附丹溪曰天行健運不

此理耳時珍曰凡人病則氣滯而後香附為氣木香三焦

李氏醫鑑卷之九理氣

之藥能升降諸氣肺氣疎肝氣和脾氣時珍曰諸氣附

諸屬子脾中焦氣滯用之者脾喜芳香也大腸氣滯則後

重勝脫氣不化則癰秘肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者

附氣短論全匿云平人無寒熱氣短不足以息者實也又云

肺痛而短氣大吐下之二十日吐膠痰一桶而安傷寒

病短氣氣促不能相接與喘不同有實有虛有表有裏此

為水停心下亦令短氣水氣內漬所傳不一故有或為之

症初覺曰傷寒失于汗下而短氣為實汗下後短氣者為

虛虛宜解肌

理血論

人身之中氣為衛血為營經曰營者水穀之精也調和五  
藏灑陳于六府乃能入于脉也生于一身目得之而能視耳  
于肝宣布于肺施泄于腎澆灌一身目得之而能視耳  
之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步  
藏得之而能液府得之而能氣出入升降濡潤宜通靡不  
由此也飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也  
注之于脉充則實少則清生陰則諸經恃此長養衰竭則  
百脉由此空虛血盛則形盛血弱則形衰血者難成而易  
虧可不謹養乎陰氣一傷諸變立至妄行于上則吐衄妄  
行于下則腸風衰涸于內則虛勞枯槁于外則消瘵癰熱  
勝則色黑熱勝于陰發為瘡瘍濕熱于血則為癰瘡癰熱  
水則色黑熱勝于陰發為瘡瘍濕熱于血則為癰瘡癰熱  
也主血正傷其陽則火熾而血凝

李氏醫鑑卷之九理血

四物湯治一切血虛及婦人經病經期先後諸

當歸生地白芍川芎凡血症通宜四物湯如

涼血心加黃連肝條茶肺枯者大腸實者膽黃連腎膀胱

黃柏脾生地胃大黃三焦地骨皮心胞絡丹皮小腸山枝

木通如清氣心與胞絡加麥冬肺枳殼肝柴胡青皮脾白

芍胃乾葛石膏大腸三焦連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥

珀血虛加龜板血燥加人乳瘀血加桃仁紅花韭汁童便

行之瘀血加薄荷玄參散之血不止加炒蒲黃京墨久不

止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脉數為熱加芩連血

淡豚遲為寒加桂附人肥有痰加半夏南星橘紅人瘦有  
火加黑枝知母黃柏耨耨者加木香砂仁蒼木神曲瘀滯加  
桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參耨耨者氣實加枳朴

此手少陰足太陰厥陰藥也

心生血脾統血肝藏血

當歸辛苦甘溫

入心脾生血為君生地甘寒入心腎滋血為臣白芍酸寒

入肝脾欽陰為佐川芎辛溫通上下而行血中之氣為使

也川芎入厥陰心包肝經上行頭目下行血海血海衝脉

也玉機微義曰川芎血中之氣藥也通肝經性味辛散

能行血滯于氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能

生真陰之虛也當歸血中主藥也通肝經性味辛溫分三

治全用活血各歸其經也芍藥陰分藥也通肝經性味酸

寒能和血活血虛腹痛也此特血病而求血藥之屬者也

李氏醫鑑

卷之九

理血

九

若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺則能生  
陰血也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木丹皮血竭血滯者所  
宜蒲黃阿膠地榆百草霜桐灰者血虛所宜乳香沒藥五  
靈脂沒藥花者血痛所宜乳香沒藥之類而長可應無  
血寒所宜苦參生地汁血熱所宜芍藥四物湯亦分陰陽血  
之動者為陽芍藥主之血之靜者為陰地黃主之血之陰  
不足雖芍藥辛溫亦不用血之陽不足雖桂枝辛熱亦用  
之與瀉火之法正治從治相同吳鶴皋曰天地之道陽常  
有餘陰常不足人身亦然故血者難成而易虧大草木無  
情安能生血以地黃能養五臟之陰芍藥能調營中之氣  
陰陽調和而血自生耳若夫失血太多氣息幾微之際慎  
勿與之蓋四物陰類非所以生血也當重用參耨以固  
欲絕之氣故曰脫血者先益其氣否則川芎香實反能耗  
氣氣血雙亡而死矣故凡虛損胃虛氣弱之人皆不宜多  
服或問四物湯是女門諸藥于內亦有脾胃藥乎一陽子  
曰四物湯隱隱脾胃治法人味久矣脾經少血多氣當歸地

黃生血滋潤脾經土畏賊邪下來剋土芍藥能瀉水補脾  
肝欲散用川芎之辛以散之非制木補土脾胃之藥乎或  
曰產後禁用川芎否曰新產血氣未平恐芍藥酸收作痛  
耳芍藥端治血虛氣痛新產正血虛氣痛之時醇酒微炒  
用之何害又血塊凝滯作禍不可泥于產後大補氣血放  
膽下之用玉燭散無妨推陳致新亦是補法只因產後大  
補氣血一語致積血而煩者多矣○附子和玉燭散歸尾  
生地川芎赤芍大黃芒硝甘草治經閉腹痛體瘦善飢取  
爾雅四時和氣謂  
之玉燭之義也

本方加黃柏知母名知柏四物湯再加玄參名滋陰降火

湯治陰虛有火知柏四物蜜丸名坎離丸治陰虛嗽血此

詳論入勞瘵門并勞瘵忌本方加羌活防風一用名六合湯

治風虛眩運風秘便難蜜丸名補肝丸為補也本方加木

李氏醫鑑

卷之九

理血

十

香橖郎名治氣六合湯治血虛氣滯或血氣上衝本方四  
物各七錢加防風一兩枝子黃芩黃連各三錢每服五錢  
如脉實加大黃名生地黃連湯治婦人血風症去血過  
多因而燥渴循衣摸床撮空閉口揚手擲足錯語失神脉  
弦浮而虛男子去血過多亦有此症陶節菴曰大承氣湯  
也自內而之外者用之氣血合病循衣摸床症同自氣之  
血血而復之氣者大承氣湯下之自血之氣氣而復之血  
者生地黃連湯主之二者俱不大便是承氣氣湯對子又  
與三黃石膏湯相表裏是皆三焦包絡虛火之病也病既  
危急只得以此降血中之伏火耳綱目曰四物與桂枝麻  
黃白虎柴胡理中四逆柴胡承氣涼膈等皆可作各半湯  
此易老用  
藥大畧也

**當歸補血湯** 東垣 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脉大而

虛血實則身涼血虛則身熱此以飢飽勞役傷其陰血虛

之外感實熱內盛故脉大而長按之有力此症得之內傷

血虛發熱脉洪大而無力內經所謂血虛脉虛是也俱服

必楚

黃耆 炙一兩 當歸 酒洗二錢 空心服

此足太陰厥陰藥也當歸氣味俱厚為陰中之陰故能滋

陰養血黃耆乃補氣之藥何以五倍于當歸而又云補血

而後生血矣經曰陽生則陰長此其義耳切菴曰病本于勞

役不獨傷血而亦傷氣故以二藥並補之也

**歸脾湯** 引 治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘驚悸盜汗

李氏醫鑑 卷之九 理血 士

發熱體倦食少不眠或脾虛不能攝血致血妄行及婦人

經帶 心藏神而生血心傷則不能生血而血少脾主思而

諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損

人參 白朮 扶神 棗仁 龍眼肉 黃耆 當歸

志肉 木香 甘草 姜黃煎

本方香甘溫以補脾扶神龍眼志棗以補心 志肉苦泄

諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損

血腎貫曰心主血脾統血肝藏血凡治血症須按三經用

藥志肉棗仁補肝以生心火扶神補心以生脾土參耆甘

草補脾以固肺氣木香香

先入脾總欲使血歸脾耳

人參養榮湯 見 治脾肺氣虛榮血不足驚悸健忘寢汗

發熱食少無味身倦肌瘦色枯氣短毛髮脫落小便赤澀

經曰脾氣散於上輸于肺此地氣上升也肺主治節通調

水道下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則上下不交而為

諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損 諸虛諸損

此手少陰足太陰氣血藥也五藏交養互益能統治諸病

李氏醫鑑 卷之九 理血 士

論其脈但用此湯諸虛悉退喻嘉言曰方內皆心脾之藥

而此肺虛也養榮原不及肺切菴曰肺主氣凡補氣藥

皆是補肺氣肝自能生血即此便是養榮便是補心補脾

理實一貫古方補血滋黃耆五倍于當歸而云補血非明

證手見五藏互相滋養精血化生賴傳相之功焉得謂

本門諸方散入各症門類

本草備要統治諸血主治釋

當歸 補血潤燥為血中氣藥治虛勞寒熱咳逆上氣濕癰

為病腹痛滿脹溶溶如坐水中及婦人諸不足一切血症

陰虛而陽無所附者四物湯用之為君治血之總劑血虛

依以參耆血熱佐以枝苓血積佐以大黃牽牛切菴曰血

李氏醫鑑

卷之九

聖  
前

十

浮名肺血也。沉者肝血也。半浮沉者心血也。**白芍** 補血瀉  
 各隨所見。以羊肺心蘸白及末。日服之。佳。**白芍** 肝瀉欬  
 子安。肺固。脾理。和血脈。收陰氣。欬逆氣。治肺脹喘逆。其  
 收降之體。又能入血海。而至厥陰。胎產一切血病。又曰。新  
 產後忌用。同白朮。補脾。同參耆。補氣。同歸地。補血。同川芎。  
 瀉肝。同甘草。止腹痛。同黃連。止瀉痢。同防風。發痘疹。同姜  
 棗。溫經。**赤芍** 入肝經。血分通。血脈。瀉肝火。散惡血。白補而  
 散濕。**赤芍** 收赤散而瀉。白益脾。能于土中瀉木。赤散邪  
 能行血中之滯。後俱忌。**熟地黃** 平補肝腎。滋腎水。補真陰。填骨髓。生  
 精血。聰耳目。黑髮。黑髮。胎產百病。  
 為補血之上劑。月溪曰。胎前當清熱養血為主。產後宜大  
 補氣血為主。雖有雜症。從末治之。王碩云。男子多陰虛。宜  
 熟地。女子多血熱。宜生地。以好酒拌。地仁末。浸蒸。晒九次。  
 用地黃性寒。得酒與大與日。則溫性足。得沙仁。則利氣。且  
 能引入丹田。大味丸。以之為君。又脈弱者。加桂附。所謂益  
 火之原。以消陰翳也。只脈旺者。加知柏。所謂壯水之主。以  
 制陽也。**何首烏** 平補肝腎。滋清苦堅腎。溫補肝。瀉收欬精氣。  
 澤。補益髓養血。祛風。強筋骨。烏髮。髮。今人有

子爲滋補良劑氣血太和諸病不生七寶美髯丹以之爲君已鉄器中伏火色丹故入血分時珍曰伏火卽陰火也陰火卽相火也世人端以黃芩治相火不知丹皮之功更勝和血涼血而生血破積血通經脉爲吐衄必用之藥又治神志不足內經云水之情爲志故腎藏志火之精爲神故心藏神續斷補肝腎理筋骨宣通血脉而理筋骨上傷中補不足煖子宮破瘀血女科外科需爲上劑琥珀足厥陰血分清栢子仁益側栢葉補陰止血養陰滋肺而燥肺血破瘀結栢子仁血最清血分爲補陰要藥止吐衄崩痢肉桂入肝腎血分桂心活血辛走血能一切血症疎通血脉桂心活血化汗化膿地骨皮爲熱涼血退有汗之骨蒸補正防風凡治血防風爲上部之使地榆蘇木多破血紅花入肝經而破瘀血活血瘀爲下部之使蘇木少和血紅花行則血活有熱結于中暴吐紫黑血者吐出爲好吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行少用養血多用則行血茜根血

李氏醫鑑

卷之九

理血

15

行血入厥陰心竅便潤肺散瘀驅走血治血衄吐血入血  
行肝血分消瘀血損傷一切血症功効甚神  
行氣散瘀治一切血  
疔瘡汁童便和服  
養血而無膩滯之  
虞一名孩兒菊  
傷血  
干姜引血藥入血分氣藥入氣分去瘀養新有陽生  
聚  
陰長之意故吐衄腸風及產後血虛大熱者宜  
里姜乃熱因熱用從治之法也夫血遇熱則走生干姜行  
之固其宜也而吐衄下血崩漏淋產症熱者反能止之何  
也蓋物極則反血去多而陰不復則陽無所附得此以助  
陽之生而陰復矣且見火則味苦色黑守而不走血安得  
不止邪然必病久氣虛亡陽而多盜汗及手足冷者宜用  
者初病火熾虛弱提之是抱薪救火危亡立致可不謹乎  
槐花入肝大腸血分而涼血血涼則  
陰自足治氣熱一切諸而育  
射干則血散腫消而  
入肝大腸血分而涼血血涼則  
陰自足治氣熱一切諸而育  
射干則血散腫消而

李氏醫鑑

卷之九 理血

三

和降真香 治一切血症 乾柿 牛膝 散惡血 木賊 治諸

王不留行 治血分通脈 乃陽明衝任之 早蓮草 補腎止

速大麻仁 或煨 赤石脂 花乳石 能化血 禹餘糧 血分重

下李先知 下焦自病入難食 代顏石 寒熱血氣除血

治二經血分之 白礬 止痛 食鹽 熱 兒茶 蔓荊子 血

五靈脂 入肝經 血分通利 血脈散 犀角 治吐血 齒痛 五

倍子 止血 枝子 止血 厚朴 破宿 五加皮 皮肉 椿樗皮

入血分而清血病 山茶花 治諸血可 棕 燒黑與炭同 乾

漆 破日久凝結之瘀 桃仁 治熱入血室 血燥血痛 皮膚血

血能化瘀血為水 熱燥癢毒血如狂并損傷積血

及夜山查 散瘀 荷葉 涼血 散血 去瘀血 留 香附 得歸地 蚊

虫 凡血在藏府經絡者 逐攻下 蓋食血 瓜蒌子 炒香酒

治一切血症 龜甲 補新 自然銅 消痰 骨碎補 能破血止血

寒降火也 治折海螵蛸 治血 紫石英 甘辛性溫而補 重以去怯 濕以

傷 肝血不足用此 紫草 涼血 凌霄花 一名紫葳 去瘀血 延胡

重鎮心潤肺 第一 大小薊 破血下氣 行而帶止 吐血

索 為活血利氣第一 破血下氣 行而帶止 吐血

入下焦 蒲黃 生用 行血 消瘀 打損傷 炒 卷柏 生用 破

除而止 蒲黃 生用 行血 消瘀 打損傷 炒 卷柏 生用 破

行血散結 散中有 白茅根 清瘀血 開發寒熱 治吐衄 通

痛 閉挫氣痛折傷 白茅根 清瘀血 開發寒熱 治吐衄 通

人以微而忽之 惟事苦寒之 鬱金 下氣破血 治噎血吐血

刺傷冲和之氣 烏足知此 鬱金 下氣破血 治噎血吐血

血 姜黃 下氣破血 莪朮 破氣中之血 三稜 破血中之氣

荆芥 炒黑止下焦血 用山枝 疏理 地榆 黃

李士材曰 若血受病 亦先調氣 謂氣不調則血不行 氣諸

血虛者 各門惟并孔 謂血之調 則心與肝也 又驚而動

用藥加減約畧 合前補中益氣湯後注解

時珍曰 枳殼湯治胸中痞滿 下氣 取其通肺利膈下氣也

甘桔湯通治咽喉口舌諸病 取其辛苦散寒 甘平除熱也

宋仁宗加荆芥防風 連翹 逐名如聖湯 王好古加甘桔湯

頗詳 失血加調子 聲不出加半夏 上氣加陳皮 涎嗽加知

母貝 咳痰湯加五味酒 毒加葛根 少氣加人參 嘔加半

生姜 吐膿血加紫菀 肺癆加阿膠 胸膈不利加枳殼 心

痞滿加枳實 目赤加枝子 大黃面腫加茯苓 膚痛加黃耆

發斑加荆防 疫毒加牛勞子 大黃不得眠加枝子 訶菴日

觀海藏所加則用藥 之大較亦可議矣

彼此相濟主治約畧

紫蘇 味辛入氣分 色紫入血分 香溫散寒 通心利肺 開胃

安胎 利大小腸 解魚蟹毒 多服泄人 真氣同陳皮 砂仁 行

川芎 當歸 和血散瘀 同桔梗 枳殼 利膈寬腸 同荷子 黃芩

杏仁 清痰定喘 同木瓜 厚朴 散濕解暑 治霍亂 腳氣 黃芩

行瀉 肺火利胸中 氣治上焦之熱 熱熱天熱喉眼目赤

腫痛等症 得紫胡 退寒熱 得白芍 治下痢 得厚朴 砂仁 溫

黃連 止瀉 瀉胃系 皮瀉神火 得白木 安胎之聖藥 砂仁 溫

香薷 瀉肺益腎和胃 醒脾快氣 調中 通行結滯 得檀香 溫







試陳永飲若倉庫未固不宜驟貯米穀往往食早者多不可按食此理此法不但施之調劑新愈之後凡病新愈後皆宜如此調理漸次飲食至于羣腥等物愈宜緩遲若用之早不惟無益而且反復難健

六君子湯 為病後調理助脾進食之劑

八參 白朮 茯苓 甘草 黃耆 山藥 各二錢 薑三片

聚二枚煎

五皮飲 脾滿 一方五加皮易陳皮羅氏五加皮易桑白皮

治病後脾肺氣虛而致腫滿

理中丸 祛寒 治大病後喜吐久不了了胃中有微寒 宜此丸溫之

李氏醫鑑

卷之九

病後

九

久病後小便數而大便難庸醫認為脾約症妄以麻仁丸投之誤矣升溪曰此因陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣又傷于脾而成肺金受火氣無所攝脾為肺子肺耗則液虧金耗則木寡于畏土欲不傷其可得乎肺失傳送脾失轉輸故大便秘而小便數也理宜滋養陰血使火不熾而全化行木有利而脾土運津液乃能入胃腸潤而通矣

導赤各半湯 治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身

無寒熱漸覺神昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與

粥則嘔不與勿思形如醉人名越經症 傷寒不戰不滿二

也神昏睡語不思食形如醉人此邪熱傳于少陰心火

越

黃連 黃芩 犀角 知母 山枝 滑石 麥冬 人

參 甘草 茯神 加燈心姜棗煎

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐 傷寒解後

津液不足故虛羸少

竹葉 石膏 人參 甘草 麥冬 半夏 粳米 升

虛根湯 治傷寒病後嘔噦不下食 此由初病熱盛時多服

冷氣便發故脾胃虛寒而不和

蘆根 升 竹茹 升 生薑 兩 粳米 合

蘆根甘寒降伏火利小水竹茹甘寒除胃熱清燥金生薑辛溫祛寒散逆氣三者皆能和胃胃和則嘔止加梗米

者亦藉以調中州也

李氏醫鑑

卷之九

病後

手

枝子大黃湯 變現 治傷寒食復

枳實枝子湯 治傷寒勞復

參苓白朮散 治久瀉及大病後痢後調理消渴者尤宜

人參 淮藥 蓮肉 白扁豆 白朮 二 桔梗

妙黃 砂仁 白茯苓 苡仁 炙甘草 各一斤半

白扁豆 各一斤半 白朮 二 桔梗

白朮 二 桔梗

諸積 酒釐氣釐血釐

經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死東垣五積方用三枚我水皆兼人參贊助成功所以治瘵不宜

用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也初起黃連治積諸藥神曲麥芽化穀食積下化麵食砂仁阿魏山查黃連化肉食積蘇化魚蟹積花根根消積香酒積果行氣消積牛黃花行水飲三稜莪朮消積癥瘕木香檳榔行氣消積石粉粉攻痰積巴豆攻冷積雄黃粉攻涎積重出氣水經破血積者酒入血入于酒為酒黃多氣入血入于氣為氣黃虛勞人敗血難療為血黃如虫之行上段人咽下使人肝或附脇或腹胸腹惟用蕪荑炒兼暖胃理氣之藥乃可殺之初起日久成積謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或痰或食聚多是氣傷肉食輕者宜山查黃連重者宜礬紅棗肉為丸服二錢不可過終身忌蕎麥傷麵食宜炒

礬砂丸 一切積聚 治一切積聚痰飲心脇引痛 礬乃刀切音饒

礬砂 巴豆 三稜 干姜 白芷 木香 青皮 胡椒 大黃 乾漆 檳榔 肉豆蔻 為末醋醋

李氏醫鑑 卷之九 諸積

二升煮巴豆五七沸再下三稜大黃末同煎五七沸入礬砂熬成膏和諸藥杵丸菜豆大每五粒姜湯下

此治肉積氣積血積通劑也礬砂化肉食性大熱能爛五全本草言其能化人心為血故治膈噎癥瘕肉積有殊功乾漆散瘀血木香青皮行滯氣三稜破沉寒銅冷大黃巴豆能斬關奪門方內多辛熱有毒之品用之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之以湯熱去實蓋積聚既深攻治不得不峻用醋者酸以收之也王機微義曰方中因白芷散水行氣故更言治及飲也山查古曰壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱或血兩衰四時有感皆能成積若連以磨堅破結之藥治之誠似去而人己衰矣乾漆礬砂三稜大黃牽牛之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消或愈大竟何益哉故善治者當先補虛使氣血旺積自消如滿座皆君子則小人自無容地也不問何積先調其中使能飲食是

感應丸 治新舊冷積 倒倉法

用壯黃牛肉二十斤洗淨煮為糜濾去渣熬成琥珀色前一晚不食至日空腹坐空室取汁每飲一鍾少時又飲積數十鍾身能覺痛如病在上則吐在下則利在中則吐而利後必渴即飲已溺數碗以解餘垢飢倦先與米飲二日與糜粥次與厚粥軟飯將養一月而沉痾悉安矣須斷房事半年牛肉五年月溪曰生坤上黃中色肉胃藥液無形之物也積聚既久回薄腸胃曲折之患豈能除九散所能寬也乎肉充滿流行無處不到如洪水泛溢一切凝滯皆由氣而充矣此方傳于西域里人中年後行一二大亦却疾養壽之一助也王綸曰牛肉補中非以下藥補之奇方也

李氏醫鑑卷之九

諸積

李氏醫鑑卷之十

治法提綱

陰陽寒熱虛實氣血



病在于陰明其陽病在于陽明其陰犯之者是謂誅伐無過病之熱也當察其源火荷實也苦寒鹹寒以折之若其虛也甘寒酸寒以攝之病之寒也亦察其源寒從外也辛熱辛溫以散之動于內也甘溫以益之辛熱辛溫以佐之經曰五藏者藏精氣而不瀉者也故曰滿而不能實是有補而無瀉者其常也雖偶受邪則瀉其邪邪盡則止是瀉其邪非瀉臟也臟不受邪母輕犯也世謂肝無補法知其謬也六府者傳導化物糟粕者也故曰實而不能滿邪客之而為病乃可攻也中病乃已母盡劑也病在于經則治其經病流于絡則及其絡經直絡橫相維輔也病從氣分則治其氣虛者溫之實者調之病從血分則治其血虛則補肝補脾補心實則為熱為寒者清之為者行之因症互異宜精別之病在于表母攻其裏病在于裏母虛其表邪之所攻必從之受邪為本現症為標五虛為本五邪為標營夫腹脹由于濕者其來必速當利水除濕則脹自止是標急于本也當先治其標若因脾虛漸成脹滿夜劇晝靜病屬于陰當補脾陰夜靜晝劇病屬于陽當益肺氣是病從本生本急于標也當先治其本舉一為例餘可類推矣病屬于虛宜治以緩虛者精氣奪也若屬沉痾亦必從緩治虛無速法亦無巧法蓋病已沉痾凡欲施治宜有大策故亦無速法病屬于實宜治以急實者邪氣勝也邪不速逐則為害滋蔓故治實無遲法亦有巧法此病機緩急一定之法也

李氏醫鑑

卷之十

治法

臟氣法四時并四氣所傷藥隨所感論

夫四時之氣行乎天地之間人處氣交之中亦必因之而感者其常也春氣升而生夏氣長而散長夏之氣化而順秋氣收而斂冬氣藏而沉人身之氣自然相通是故生者順之長者敷之化者堅之收者肅之藏者固之此藥之應于天者也春溫夏熱元氣外洩陰精不足藥宜養陰秋涼冬寒陽氣潛藏勿輕開通藥宜養陽此藥之因時制用補

李氏醫鑑

卷之十

藏氣

二

不足以和其氣者也然而一氣之中初中末與一日之內寒燥或殊假令大熱之候人多感暑忽發水泄亦復感寒由先而感則為暑病由後而感則為寒病此藥之因時制宜以合乎權乃變中之常也此時令不齊之所宜審也假令陰虛之人雖當降冬陰精虧竭水既不足不能制火則陽無所依外洩為熱或反汗出藥宜益陰地黃五味黨甲拘杞之屬是矣設從時令快用辛溫勢必立斃假令陽虛之人雖當益陽氣不足不能外衛其表表虛不任風寒灑淅戰慄思得熱食及御重裘是雖天令之熱亦不足以敵其真陽之虛病屬虛寒藥宜溫補參耆桂附之屬是矣設從時令快用苦寒亦必立斃此藥之舍時從症者也假令霍亂須用黃連滑石以洩之本不利升須用葛根以散之此藥之舍症從時者也從違之際權其輕重耳至于四氣所傷因而致病則各從所由是故經曰春傷于風夏傷于暑秋必痲痺冬必泄瀉宜清暑溫氣以除寒熱石膏知母乾薑冬病夏治參苓白朮之屬是矣邪若內陷必便膿血藥宜祛邪

制方和劑治療大法論

夫虛實者諸病之根本也補瀉者治療之綱紀也何謂虛五藏六府虛所生病也何謂實五藏六府實所生病也經

寒因寒用通因通用寒因熱用熱因寒用用熱遠熱用

寒遠寒論

經曰寒因寒用者譬夫脾虛中焦作脹腎虛氣不歸元氣上焦逆滿用人參之甘以補元氣五味子之酸以收虛氣則脾得補而脹自消腎得補而氣自歸元上焦清泰而逆滿自平矣通因通用者譬夫傷寒挾熱下利或中有燥屎必用調胃承氣湯下之乃安下利不休得六一散清熱除積而愈皆其義也寒因熱用是藥本寒也而反佐之以熱熱因寒用是藥本熱也而反佐之以寒則無拒格之患故法應熱治所投熱劑僅使中病毋令過焉過則反生熱病矣用寒遠寒義亦同此

天地風氣漸薄人亦因之漸弱用藥消息亦必因之而

變不可執泥古法輕用峻利論

大人在氣交之中其強其弱卒莫逃乎天地之氣明是以上古之人度百歲乃去今則七十稱古稀矣身形長大常過七八尺今則世鮮六尺之軀矣其壽數精神既已漸減則血氣虧損亦應因之漸薄乃天地之風氣使然有非人力所能挽回者又況時下本造衆生識昏見陋五欲熾然難解難遏強衰敗賦性不足是疾病衆生虛多實少臨症施治多事調養專防耗代此今日治法之急務也設宜用熱亦當先之以溫病宜用寒亦當先之以清縱有積滯宜前必須先養胃氣氣血有邪氣宜祛必須隨時逐散不得過劑以損傷氣血血者人之所賴以生者也氣血一虧則諸邪輻輳百病橫生世人之疾病十有九虛醫師之藥百無一補寧知用藥之誤則實者虛虛者死是死于藥而非死于疾病也其慎其難屬諸司命臨症之頃宜加戰兢勉之哉毋執已見而輕人命也

通評虛實論

經曰邪氣盛則實精氣奪則虛又曰邪之所湊其氣必虛凡言虛者精氣奪也凡言實者邪氣勝也是故虛則受邪邪者為實法先攻邪邪盡治本邪若未盡勿輕補益犯之者是謂實實精者陰也氣者陽也設被創奪是五臟六腑之陰精陽氣皆虛也宜從其類以補之陰精虛者補陰精陽氣虛者益陽氣一切剋伐攻擊之藥概勿施用犯之者是謂虛虛經曰實實虛虛損不足而益有餘如是者醫殺之耳戒之哉

治陰陽諸虛病皆當以保護胃氣為急論

夫胃氣者即後天元氣也以穀氣為本是故經曰脈有胃氣曰生無胃氣曰死又曰安穀則昌絕穀則亡可見先天之氣縱猶未盡而他氣不至盡傷獨胃氣獨有傷敗以至手絕則死矣穀氣者譬國家之餉道也餉道一絕則萬眾立散胃氣一敗則百藥難施若陰虛若陽虛或中風或中暈乃至瀉利瀉下胎前產後下腫癰疽瘡疹痧癘驚癇靡不以保護胃氣補養脾氣為先務本所當急也故益陰宜遠苦寒益陽宜陽溫氣祛風勿過燥散消暑毋輕下通瀉利勿加消導瀉下之忌芒硝巴豆牽牛胎前泄瀉之忌當歸產後寒熱之忌芩連枝子丁腫癰疽之未潰忌食歸

癆瘵之不可妄下其他內外諸病應設藥物之書  
凡與胃氣相違者概勿施用投藥之頃宜加三思

### 諸病惟虛與火為難治論

經曰精氣神則虛又曰邪之所湊其氣必虛虛者空也無  
也所謂國內空虛人民離散則百禍易起鎮撫為難非委  
任賢智安靖休養以生息之末有保其無事也病之重者  
亦猶是已醫非明辨孰能鎮之以靖久而不搖卒成敗合  
散以克復故物之功哉是故經曰不能治其虛安問其餘  
蓋言虛為百病之本宜其首舉以冠諸症也夫火者陽也  
氣也與水為對精者血也水為陰精火為陽氣二物既配名  
曰陰陽和平亦名少火生氣如是則諸病不作矣設不善  
攝養以致陰虧水涸則火偏勝陰不足則陽必奏之是謂  
陽盛陰虛亦曰壯火食氣是知火即氣也氣即火也故仙  
經謂藥即火火即藥一而二而一者也東垣亦曰火與  
原氣不兩立亦指此也醫諸水性水流不寒過極則凝  
不流為層冰矣解則復常非二物也蓋平則為水火既濟  
當斯時也火即真陽之氣矣及其偏也則即陽氣而為火  
李氏醫鑑 卷之十 虛火 五

### 陽常有餘陰常不足藥必因之以為損益誤則殺人論

人身之有陰陽也水一而火二焉是稟受之始陽常  
有餘陰常不足天地且然況於人乎故自少至老所生疾  
病靡不由於陰虛不足者其恒也若夫真陽不足之病千  
百而一二矣陽者氣也火也神也陰者血也水也情也陰  
陽和乎氣血均調是為平人氣血之常候苟失所養或陰  
虛陽室或肆情喜怒或勞傷陰陽或嗜好辛熱以致腎水  
真陰不足不能配陽火運使陽氣有餘氣有餘即腎水  
故火愈盛而水愈涸于是發為吐血咳嗽吐痰內熱骨蒸  
盜汗種種陰虛等病醫師不察不揆其本凡見前症不分  
陰陽類施溫補參耆二水視同食物佐以姜桂若咳五

倘遇惡劇輒投附子于是輕者重重者斃藥相連死而  
不悟良可慨也然使其術得售者不獨醫師之罪亦病者  
不明有以致之耳何則難成易敗者陰也蓋精之藥縱醫  
師運用無差亦必無旦夕之功助陽之藥能使胃氣一動  
暫則飲食如增或陽道與起有似神王醫藉以要功病者  
利其速效彼此因循莫辨虛實由是知陰虛真水不足之病  
十人而九陽盛真火不足之病百不得一醫師之藥補助  
陽火者往往陰虛之反存也予見世醫以此  
傷人者甚眾茲特著其誤以為世戒

### 上盛下虛本于腎水真陰不足論

人身以陰陽兩稱為平偏勝則病此大較也水不足則火  
有餘陰既虧則陽獨盛蓋陰陽之精互藏其宅是陰中有  
陽陽中有陰也故心火也而含亦液腎水也而藏白氣赤  
液為陰白氣為陽循環往復晝夜不息此常度也苟不知  
攝養縱恣情慾虧損真陰陽無所附因而發越上升此火  
空則發之義是周身之氣併于陽也併于陽則陽盛故上

### 李氏醫鑑 卷之十 虛火 六

焦熱而致嗽生痰迫血上行而為吐血衄為煩躁為頭痛  
不得眠為胸膈骨痛為口乾舌苦此其候也陽愈盛則陰  
愈虛陰愈虛則為五心煩熱為潮熱骨蒸為遺精為骨之  
無力為小水短赤升日不接則飲食不化為泄瀉為卒僵  
此其候也治之之要當急降氣當益陰精氣降則陽交  
于陰是火下降也精血生即腎陰復是水上升也此既濟  
之象為坎離交也坎離交即是小周天至此  
則陰陽二氣復得其平矣病何自而生哉

### 陰精陽氣補益不同論

經曰形不足溫之以氣人參羊肉黃耆人胞紅鉛之屬是  
矣蓋陽氣也乃可以却沉寒經曰精不足補之以味人乳  
鰵甲地黃黃柏枸杞牛膝天冬之屬是矣補陰精也乃可以除伏熱

### 治氣三法藥各不同論

一補氣氣虛宜補之如人參黃耆羊肉小麥糯米之屬是也  
二降氣調氣降氣者即下氣也虛則氣升故法宜降其

之輕者如蘇子補皮麥冬此把藥根汁其重者如  
番降香鬱金等之藥則宜用和則調也其  
藥如木香沉香白豆蔻等藥則宜用之風○  
三破氣破者損也實則宜破如少壯人暴怒氣聚之類然  
亦可暫不可久其藥如枳實青皮枳殼等之屬溫氣分  
之病不出三端治之之法及所主之藥皆不可混溫者也  
誤則使病轉劇世多  
不察故表而出之

### 治血之法三各不同論

血虛宜補之虛則發熱內熱治宜甘寒甘平酸寒酸溫以  
養榮血其藥為熟地白芍牛膝炙甘草酸棗仁龍眼肉鹿  
角膠肉蓯蓉甘枸杞  
甘菊花人乳之屬

血熱宜清之涼之熱則為癰腫瘡毒為鼻衄為齒衄為  
衄血為舌上出血為舌腫為血崩為赤淋為月事先期  
熱入血室為赤帶升為眼暴赤痛法宜酸寒苦寒酸藥  
涼以除實熱其藥為重便丹皮赤芍生地黃芍藥犀角地骨  
李氏醫鑑

大小前荷草黃連山枝大黃青黛天冬玄參刺芥之屬  
血瘀宜通之瘀必發熱發黃作痛及作結塊癰積滋宜辛  
溫辛熱辛平辛寒甘溫以入血運行佐以酸寒乃可較堅  
其藥為當歸紅花桃仁蘇木桂五靈脂蒲黃姜黃鬱金  
三稜延胡索花蕊石沒藥蟲乾漆自然銅韭汁重便壯  
竅者也病既不同藥亦各異治之之  
法要在合宜倘失其宜為屬不淺

### 治吐血三要論

宜降氣不宜降火氣有餘即是火氣降即火降火降則  
氣不上升血隨氣行無滯出上痰之患矣降火必用寒涼  
之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血血愈不降歸經矣  
今之療吐血者人患有一則專用寒涼之味如黃芩山  
枝青黛柿餅灰四物湯黃柏知母之類往往傷脾作泄以  
致不救一則專用人參肺熱遠傷肺氣逆愈甚亦有有用  
而愈者此是氣虛喘嗽氣弱陽不由陰虛火熾所致寒  
百不一二也宜以白芍藥炙甘草制肝枇杷葉桑門冬

荷藕紅貝母清肝散仁濟藥養脾非藥番降香蘇子下氣  
青蒿歸心山黃柏地骨皮地骨皮補腎清熱酸棗仁白  
神養心山黃柏地骨皮地骨皮補腎清熱酸棗仁白  
補之法非多服藥不効病家試其功醫者張皇無主百  
藥難試以致殞命悲夫  
宜行血不宜止血血不流則經絡者氣逆上壅也夫血得  
熱則行得寒則凝故降氣行血則血循經絡不求其止而  
自止矣止之則血凝血凝必發熱惡食及胸脇痛日就  
痼矣  
宜補肝不宜伐肝經曰五藏者藏精氣而不瀉者也肝  
為將軍之官主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平  
而血有所歸伐之則肝不能藏血而愈不止矣

### 腎泄多明黎民所由論

凡人之生二五妙合之頃識神依託是中即攬父精母血  
以為立命之基遂成左右兩腎腎間動氣即道家所謂  
天祖氣是也藏乎兩腎之中以腎屬水故稱坎宮以平人  
氣象言之此氣至于午一陽生生即漸漸上升歷五寅  
李氏醫鑑

已而六陽已極則入離宮午後一陰生即白氣變為赤  
液漸漸降下至坎宮復為白氣晝夜循環升降不息此即  
腎家所謂真陽之火道家所謂若火即先天祖氣腎家所  
謂為相火者是也方此火之自下而上也行過中焦必經  
脾胃則能腐熟水穀蒸轉而化精微脾氣散精上歸于  
肺通調水道下輸膀胱氣化而出是謂清升濁降既濟之象  
也苟不慎攝生之道不明正性之理則必務快其心逆于  
生樂憂患以傷心寒熱以傷脾疲憊以傷脾多慾以傷肝  
多慾以傷腎則真氣漸衰精神日損馴至子午一陽不以  
時生不能上升腐熟水穀則精無由而化實為三陽之候  
陽氣微則不能應候而化物故天黎明而泄其泄亦澀  
名陽微泄是為腎泄亦名大瘕泄昔人以四神丸治之予加  
人參蓮肉驅獲奇効蓋人  
參補五藏之陽氣故也

### 少年人陽痿因于失志不宜助陽論

經曰腎為作強之官技巧出焉情與志者也夫志主決  
定心主思慮思慮則或遷或改決定則一立不移此作強

之官之驗也。若夫盛之火，則其氣不舒，陽氣不舒，則其火也。火立死而寒矣。此非真火矣。也。乃問其氣之故也。宜其抑鬱。通其志意，則陽氣立舒，而病立起矣。

### 痰飲藥宜分治論

大痰之生也，其由非一。其為治也，亦不同。由于陰虛火炎，上迫于肺，肺氣熱則煎液凝結，為痰是謂陰虛痰。火痰在乎肺而不乎腎。治宜降氣清熱，蓋陰虛水法忌辛。溫燥熱補氣等藥，由于脾胃寒濕生痰，或兼飲痰，遇度好食，油麵猪脂，以致脾氣不利，壅滯為痰，濃厚膠固，甚至流于經絡及皮膚膜外，或結為大塊，或成瘰癧，或成癰疽，或成疔毒，或成身重腹脹，不便行走，或泄瀉不止，及成癰疽種種怪症。皆痰所為。故昔人云：怪病多屬痰。痰病多屬火。有以夫。此病在脾胃，無關肺腎。治宜燥脾行氣，散結軟堅。云云。泥若寒濕，則等藥及諸厚味，由于風寒鬱閉，然氣在肺，而痰成痰，則喘病亦在肺。治宜散除肺熱，藥中加辛熱藥。

### 李氏醫案

### 卷之十

九

溫如麻黃生薑干姜之屬，以散外寒，則藥無格拒之患。法忌滋補酸收等藥，病則不齊，藥亦宜異。利潤利燥及利發散各有攸當，非可混施也。世以痰飲混稱，藥亦混投，殊不知痰之與飲，其由自別。其狀亦殊。痰質稠黏，同粘飲如清水，特其色有異，或青或黃或綠或黑，或如酸漿，或伏于腸胃，或上支胸膈，刺痛難忍，或流于經絡，四肢則關節不利，支飲上攻，為心痛，為中脘痛，甚則汗出，為嘔吐，酸水苦黃水等種種各異，或發寒熱，不思飲食，及不得眠，皆其候也。此症多因酒後過飲，茶湯則水漿與腸胃飲食濕熱之氣，壅而為飲，或因情抱抑，飲食停滯，不得以時消散，亦能成飲。總之，必由脾胃有濕，或脾胃本虛，又感飲食之濕，則停而不消。此飲之大畧也。治宜燥濕利水，行氣健脾，乃為得也。其藥大都以半夏茯苓為君，佐以猪苓澤瀉，以導滲泄之，白豆蔻橘皮以開散之，蘇梗旋覆花以通暢之。東垣五飲中有人參，其旨概可見矣。

### 瘧痢宜從六淫例治論

風寒暑濕燥火，此天之六淫，其邪自外而入，感之而病。宜適其邪之所在，以收治之。經曰：夏暑于胃，秋必痲痺，乃暑邪為病也。雖有山嵐瘴氣，發瘧一症，治猶不同。然其症大都多熱多寒，或熱多寒少，或寒多熱少，或單熱不寒，或單寒不熱，頭疼骨疼，大渴引飲，口苦舌乾，嘔吐不思食，或煩躁不得眠，必用白虎湯。二三劑隨症增損，解表以祛暑邪。而後隨症消息，以除其苦。可也。滯下者，俗呼為痢疾，皆緣暑濕與飲食之積滯膠固而成。其症類多，莫急後重，數登固而不便，或發熱口渴，或惡心不思食，何莫非暑之標症也。必用六一散黃連芍藥為君，而後隨其所苦為之增損。傷氣分則調氣益氣，傷血分則行血和血，然未有不先治暑而可獲効者矣。治病必求其本，其斯之謂歟。

病由七情生者，祇應養性怡情，發舒志氣以解之，不宜

### 全仗藥石攻治論

大喜怒憂思悲恐驚七者，皆發于情者也。情即神機，病由不定無跡，可尋。觸境乃發，滯而難通，藥石無知焉。能損其

### 李氏醫案

### 卷之十一

十

妄執縱通其已滯之氣，活其已傷之血，其狀默約綿之，意物而不化者，能保無將來復結之病乎。祇宜以識遺識以理遺情，此即心病還將心藥醫之謂也。如是庶可以便者通結者化，情與境離，不為所轉，當處寂然，心君泰定，其為累也乎。

傷寒溫疫癰疽瘰癧瘡疾諸病，皆由實邪所發，自裏發

### 出于表者，吉由表陷入于裏者凶論

傷寒溫疫初發，邪在于表，必頭疼身熱，病偏三陽。即于此時急表散之。冬月即病，宜用辛溫辛熱以汗之。春溫夏熱，宜用辛涼辛寒甘寒以汗之。汗後身涼脈靜，無所傷。犯病不復作而愈。如投藥滯滯，或病重煩躁不徹之干，表致邪熱內結，病偏三陰，須下乃愈。內虛之人，不勝下藥，多致危殆。又有少陰咽痛等症，則又不宜下，或成狐惑蟲食肛門，種種難治之條，皆失于不早發散故也。瘰癧皆由榮家實熱氣逆所結，急宜涼血活血散結，解毒大劑連進，內耗



夾攻務使消散即勢大毒盛一時不能散盡必十清  
八經使潰膿保無大害若失于救治使熱毒內攻其膿必  
壞壞則神人不能救矣痘疹之害多在血熱解于一二日  
內者十全八九若遲則熱毒內攻陷入于裏腸胃當之必  
致大便泄乳食不化或神昏悶亂便秘腹脹則十不救  
一除是稟受虛寒方堪前托濟以溫熱可救危急若夫寒  
家便須速用辛寒甘寒苦寒之劑清涼發散十不失一假  
令病重藥輕或治療後期或誤投溫熱則邪熱內攻煩躁  
悶亂不可救藥 瘧本暑邪法當解肌若元氣先虛之人  
脾胃薄弱候投破氣消食克伐之藥則中氣愈虛邪反內  
陷必便膿血治或失宜多成腹脹馴至不救往往而是此  
之四症皆須急治要以自裏達表者吉自表陷裏者凶故  
藥宜解散通利最忌收瀉破氣及諸溫補其開乎死  
生者最大故特表而出之俾世人知所先務也

### 五運六氣之謬論

原夫五運六氣之說其起于漢魏之後乎何者張仲景  
末人也其書不載也華元化三國人也其書亦不載也  
之則越人無其文後之則叔和鮮其說予是以知其為後  
世所撰無益于治療而有誤乎後學學者宜深辨之予見  
今之醫家學無源本不明所自侈口而談莫不動云五運  
六氣將以施之治病譬之指算法之精微謂事物之實有  
豈不謬哉不知五運六氣者虛位也歲有是氣至則算無  
是氣至則不第既無其氣焉得有其藥乎一言可竟矣其  
云必先歲氣者譬夫此年忽多淫雨民病多濕藥宜類用  
二木苦溫以燥之佐以風藥如防風羌活升麻葛根之屬  
風能勝濕故也此必先歲氣之謂也其云母伐天和者即  
春夏禁伐陰秋冬養陽之義耳乃所以道養天和之道也  
昔人謂不明五運六氣檢偏方書何濟者正指後人愚蒙  
不明五運六氣之所以而誤于方冊之所載依而用之動  
輒成過即雖檢偏方書亦何益哉予少檢素問中載有是  
說既長游于四方見天下醫士學士大夫在在說談其義  
于時心竊疑之又見性理所載元儒草廬吳氏于天之氣  
運之中亦備載之予益自信其為天運氣數之法而非醫  
家治病之書也後從岐邑見趙少宰家藏宋板仲景集


論其非善板始終詳檢並未嘗載有是說六經治法之  
中亦並無一字及之予乃諦信予見之不謬而所為非治  
傷寒外感之說予嘗遵仲景法治一切外邪為病靡不  
應乃信非仲景之言不可為萬世法程羅學混溫疑誤後  
人故特表而出之俾  
來學知所決擇云



續補傷寒并雜方說

前編主治古方俱已備載各門所有散列傷寒卷內如變現祛寒發表表裏和解祛風中風時行瘧症等類諸方與石山汪先生傷寒大綱並集於後以便稽覽至於前卷間有只載主治方名未及藥味者如六味地黃湯逍遙散補中益氣小柴胡二陳湯之類靡不習見習聞即令未及見聞他本可考不必規又於此也

新安理田詒安堂昌期氏書



續雜方目錄

犀角地黃湯	<small>吐衄諸症詳論</small>	加味犀角地黃湯
人參敗毒散	<small>表散室用人參詳論</small>	牛黃丸
清胃散	<small>原列口齒門遺誤今補出</small>	黃耆湯
訶子清音湯		枳實導滯丸
十棗湯		龍膽瀉肝湯
四逆湯	<small>四逆者四肢厥逆也○方載傷寒卷內</small>	吳茱萸湯
烏藥順氣散		紫雪
九味羌活湯	<small>見後傷寒卷內</small>	五積散
代類旋覆湯		小建中湯
調胃承氣湯	<small>方見後傷寒卷內</small>	五苓散
麻黃湯	<small>見後傷寒卷內</small>	黃芩湯
桂枝白虎湯		理中湯
消風散		茵陳丸
神水散		青州白丸子
三黃石膏湯		金匱風引湯
搜風順氣丸		
時氣瘟疫	天災流行	補方目錄畢

犀角地黄湯 并解論 治傷寒胃火熱盛吐血衄血嗽血便

血蓄血如狂等症。

生地黃 兩半 白芍 兩一 丹皮 犀角 二錢半角尖尤良其精氣盡在是也

每服五錢熱甚如狂者加黃芩一兩因怒致血者加枝子

柴胡 黃芩瀉上中二焦之火枝子瀉三焦之火 節庵加當歸紅花

桔梗陳皮甘草藕汁名加味犀角地黄湯治同 當歸引血歸經藕汁

涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦

此足陽明太陰藥也血屬陰本靜因諸經火逼遂不安其

位而妄行犀角大寒鮮胃熱而清心火芍藥酸寒和陰血

三

而瀉肝火丹皮苦寒瀉血中之伏火生地大寒涼血而滋

水以其平諸經之僭逆也

海藏曰血分三部藥有重輕犀角地黄湯治上血如吐血

之類抵當湯九治下血如蓄血如狂之類又曰脾不裹血

越而上行實者犀角地黄湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐

血者咸用芍藥王之故知太陰藥也醫賈曰犀角地黄湯

乃衄血之方蓋犀水飲也可以分水可以通天鼻衄之

血從任督而至顛頂入鼻中惟犀角能下入腎水引地黃

滋陰之品由腎脉而上故為對症若陰虛火動吐血與咳

咯者可借用成功若陽虛勞嗽及脾胃虛者皆不宜

朱肱活人書言瘀血入裏吐衄血者犀角地黄湯乃陽明聖

人參敗毒散 詳論解方載

喻嘉言曰傷寒室用人參其辭不可不明蓋人受外感之

邪必先汗以驅之惟元氣旺者外邪始乘勢而出若素

弱之人藥雖外行氣從中較輕者半出不出重者反隨元

氣縮入發熱無休矣所以虛弱之體必用人參五七分入

表藥中少助元氣以為驅邪之主使邪氣得藥一湧而出

全非補養衰弱之意也即和解藥中有人參之大力者居

間外邪遇正自不爭而退否則邪氣之縱悍肯聽命和

解耶不知者謂傷寒無補法邪得補而彌熾古方表汗用

五積散參蘇飲敗毒散和解用芍藥白芍湯竹葉石膏

等方皆用人參領內邪外出乃得速愈奈何不察邪外感

體虛之人汗之熱不退下之和之熱亦不退大熱呻吟津

液灼盡身如枯柴醫者技窮正為元氣已竭故藥不應手

耳倘元氣未竭先用參三五七分領藥深入驅邪何至

汗和而下不應耶東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一

二味熱服而散外邪有功千古傷寒諸科從仲景至今明

旨使體虛之人百無一活醫家卑除不用全失相傳宗

而殺人者是與耆耆術歸桂附等藥同行溫補之誤不謂

與羌活獨活柴胡胡川芎半受枳殼枳實黃芩石膏等

同行汗和之法所致也安得視等砒鴆耶○用參必須用

牛黃丸 治風癰迷悶延潮抽掣

胆星 全蝎去足 蟬蛻二錢五分 牛黃 白附子 僵蚕洗防

風 天麻半錢 麝香五分 煮棗肉和水銀五分 細研入藥末為

丸荆芥薑湯下

此手少陰足太陰厥陰藥也牛黃清心解熱開竅利痰天

麻防風南星全蝎辛散之味僵蚕蟬蛻清化之品白附頭

面之藥去頭面皆能搜肝風而散痰結麝香開竅水銀劫

痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也認庵曰牛黃丸之方

要在於搜風化痰寧心通竅多用水磨牛雄金珠犀珀若

中藏者室之如中府中血脉者反能引風入骨此方藥味

口即斃

清胃散原列口齒門今補于此

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

黃耆湯

黃耆 熟地 白芍 五味子 麥冬三兩 天冬 人參 廿

草三錢 茯苓一兩 每服三錢加烏梅薑棗煎

訶子清音湯

甘草二兩 桔梗一兩 或等分 訶子 加童便服

枳實導滯丸

大黃一兩 枳實炒 黃芩炒 黃連炒 神曲炒 白朮土炒 茯苓三錢

澤瀉二錢 蒸餅為丸多寡量服

十棗湯

芫花炒 甘遂 大戟等分 大棗十枚 先煮棗去滓入前藥末煎

人服一錢 虛人五分 或棗肉為丸病不除者再服得

龍膽瀉肝湯原耳門

龍膽草酒炒 黃芩炒 枝子酒炒 澤瀉 木通 車前子 當歸酒洗

生地酒炒 柴胡 甘草

吳茱萸湯

吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚 生薑六兩

烏藥順氣散

烏藥 橘紅二錢 麻黃節 川芎 白芷 桔梗 枳殼炒 一兩

去系炒 炮姜 甘草炙 加姜葱煎虛汗者去麻黃加

紫雪

黃金百兩 寒水石 石膏 滑石 磁石水煎三斤湯煎 升麻

玄參一斤 甘草炙 犀角一兩 沉香五錢 丁香一兩

並搗入前藥汁中煎去渣入後藥 林礞石二斤 吳茱萸一斤 吳茱萸一斤 吳茱萸一斤

微炭再加辰砂三兩麝香當門子一兩二錢研細合成退火氣冷水調服每一二本事方無黃

五積散

白芷 陳皮 厚朴六分當歸 川芎 白芍 茯苓 桔梗  
八蒼朮 枳殼七分半夏 麻黃四分乾姜 肉桂重表者甘草  
三加姜葱煎有汗去蒼朮麻黃氣盡去枳殼桔梗加入參白朮

代煎旋覆湯

旋覆花即金沸草三兩代煎石一人參一兩甘草三兩半夏半升生薑五大棗十二枚

小建中湯

七

桂枝 生姜三兩芍藥六兩甘草一兩大棗十二枚入飴糖一微火解服

五苓散

猪苓 茯苓 白朮炒十淨澤瀉一兩六錢桂半兩認鹿日雞三錢服後多飲熱水汗出而愈無惡寒症不可用桂五錢為渴而小便不利者設若不渴則茯苓甘草湯足矣若但渴則四苓足矣

黃芩湯

黃芩三兩芍藥 甘草二兩大棗十二枚去核

桂枝白虎湯

石膏一斤知母六兩甘草二兩梗米六先煮石膏數十沸再投藥米合熟湯成溫服加桂枝各本方理中湯

白朮陳壁土人參 乾薑炮甘草炙一兩一本方等分蜜丸各理消風散

荆芥 陳皮去厚朴 甘草炙五錢防風 羌活 藿香 蠶 蟬蛻 川芎 茯苓 人參 為末每服三錢茶酒下

茵陳丸

茵陳 枝子 鱉甲炙芒硝二兩大黃五兩常山 杏仁炒三兩

巴豆

八

巴豆一兩去殼五蜜丸梧桐子每服一九或吐或利或汗如不應更服一九不應則以熱湯投之老幼以意加減

神水散

蒼朮二兩川芎 白芷 羌活 藥本 細辛 炙甘草各一兩

每服四錢加薑葱煎

青州白丸子

白附子生南星生半夏水浸生衣川烏去皮臍生為末絹袋盛之水攪出粉未盡再搗再攪以盡為度貯磁盆日晡夜露春五日夏三秋七冬十日晒乾糯米糊丸兼豆大每服

二十粒薑湯下、癰與酒下、驚風薄荷湯下、三五丸、

三、黃石膏湯

石膏半兩 黃芩 黃連 黃柏 七錢 枝子 三十箇 麻黃 淡豉 二合

每服一兩薑三片水二枚細茶一振煎熱服

金匱風引湯 原撰注已見前卷脚門

搜風順氣丸

大黃 酒拌九蒸 大麻仁 郁李仁 山藥 酒蒸 山萸肉 車

前子 牛膝 酒蒸 菟絲子 酒洗 獨活 防風 煥柳 根

錢一兩 蜜丸 補方畢

時氣瘟疫 天災流行

四時不正之氣謂之時氣。時當熱而反大涼時當寒而反人溫非時而有其氣也。冬時傷寒不即病者至春而變為溫病。至夏而發為熱病。天災流行治門同。瘟疫染相以謂之瘟疫。頭病發熱惡寒無汗。邪在表也。時氣發熱惡寒。邪在裏也。表實而裏虛為之不利也。邪傷風寒而咳嗽者其感為時氣。熱流於百節則一身盡痛。上熱下寒則為腫。大者大頭瘟。行頭面則為腫。大者大頭瘟。

大無神木散 治感山嵐瘴氣。憎寒壯熱。一身盡痛。頭面腫。

大時毒 蒼朮 厚朴 各一錢 橘紅 二錢 甘草 炙 藿香 石菖蒲 各一錢

蒲各一錢。此即平胃散而重用陳皮為君者也。蓋人之一身。必以強胃為先也。加藿香菖蒲取其辛香通竅亦能避邪。而益胃也。吳鶴皋曰。大無此方。但理脾胃而解脾之妙自在其中。不愧為丹溪之師矣。

十神湯

治時氣瘟疫風寒兩感。頭痛發熱。惡寒無汗。咳嗽鼻寒聲重。升麻葛根能解。陽明瘟疫時氣。

人參敗毒散 論詳解前。治時氣瘟疫。風痺鬼驢。或聲如蛙鳴。

俗名蝦蟆瘟。邪氣定也。本方除人參加黃芩治溫病不惡風寒而溫病已未入江蘇大疫用。敗毒散倍人參。去前胡獨活。服者盡效。萬曆己卯大疫用。本方更效。崇禎辛巳年大飢大疫。道鍾相望。汗和藥中。惟加人參者多。活元鍾相望之。餘飲食起居不節。致患時氣者。宜用此法。嘉言曰。暑濕熱三氣。門中推此方為第一。三氣合邪。豈易當哉。其氣互傳。則為疫矣。方中所用。皆辛平。更有人參大力者。荷正以祛邪。病者日服二三劑。使疫邪不復留。計不快哉。奈何俗醫。城去人參。與他方有別耶。

普濟消毒飲

治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛

目不能開上喘咽喉不利口渴舌燥俗云大頭天行親戚

救泰和間多有此者醫以承氣加鹽提下之稍緩翌日

如故下之又緩終莫能愈漸危為東垣視之曰夫身半

以上入之氣也身半以下地之氣也此邪熱客于心肺之

間上攻頭面為腫盛以承氣湯瀉胃中之定熱是為誅伐

無過病以遠至其所為故遂震此方

全活甚眾遂名普濟消毒飲

黃芩酒炒 黃連酒炒 玄參 連翹 板藍根 馬勃

犀角剉碎 薄荷錢 僵蚕 升麻七分 柴胡 桔梗二錢

末湯兩時又服之或密為丸嚥化一方無薄荷有人參三

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

也諸藥各走一經祛風發汗而勝

熱散三陽之邪而能升清者也

蒼朮二兩 川芎 白芷 羌活 藁本 細辛 炙甘草

一兩每服四錢加薑葱煎

水解散 治天行一二日頭痛壯熱

麻黃四兩 桂心 甘草炙 白芍二兩 大黃 黃芩三兩

天行溫疫鬱熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖

一二日之淺可以汗下兼行不必同於傷寒之治法也

小柴胡湯加羌活防風各柴胡羌活湯 治溫疫少陽症

柴胡升麻湯見發表門 治時行瘟疫

九味羌活湯 治感冒四時不正之氣瘟疫熱病

玉屑無憂散見發表門 治八和辟瘟疫

單參散 治天行癘疫

破棺千金湯 治天行熱毒垂死

苦參一兩 水與酒各一煎八分重者水醋各半煎服一汗而

時行腫頭經驗方 用井底泥塗一塊俟消後又塗一塊

追遲散 治溫疫

人參養胃湯見發表門 治嵐瘴瘟疫

本草備要主治註釋發狂并傷寒

花椒善辟疫故元 桃仁辟邪治發 黃仲疫氣流行雖水經

旦飲椒酒熱如狂中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

中飲此水則不傳

藥	升麻治時氣	苦參治溫	龍胆草治時氣	大青草治傷寒
狂	漏蘆治傷寒	茵陳治時疾	花粉治時疾	葱治時疾
猪苓	治傷寒	苦楝子治傷寒	杏仁治天行	元參治傷寒
內驚	海金沙枝子牙硝逐砂	治傷寒	便此釜底抽薪之義也	小服雪
水煎	治時行瘟疫又宜	水置腹中甚妙	中而乳中間也	
白虹	能利水治瘟疫病大熱狂言	五穀重	治熱病	人中黃
治天行	竹瀝白蘚皮	治天行	葛根生精汁解	木通治天
盛之	官行而邪不能容故能療之	烏藥	主天行疫癘皆足	陽明受病陽明開
從口鼻而入此藥辛溫	緩胃辟惡散邪故主之	白藥	研如	二

錢漿水一大盞空腹頓服之便臥仰一食頃心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疴利病良久當有吐利數行勿能飲藥時先令煮漿水粥于井中懸着待令若吐疴音腸急中利過度即喫冷粥一碗止之不喫即困人

新安汪石山先生傷寒大綱

傷寒歌訣

婺源昌期李文來輯訂

一日二日太陽膀胱頭痛體熱腰痛脊強寒則傷營惡寒無汗脈浮而緊麻黃表散風則傷衛有汗惡風脈浮而緩桂枝宣宗營衛俱傷宜大青龍二日三日陽明胃經鼻乾目痛身熱倍增脈洪而長不睡惺惺有汗桂枝無汗葛根惡寒弱定大柴○通論三日四日少陽胆腑寒熱往來嘔逆口苦脇痛耳聾脈弦而數小柴胡湯是本經藥胆無出入和解為常只此加減再無他方四日五日傳脾太陰腹滿作瀉口乾脈沉桂枝大黃可與之通脈寒自利附子理中五日六日少陰腎經脈沉口渴湯宜小承沉瀉不渴四逆是稱六日七日厥陰在肝唇青筋急煩滿囊拳脈如不浮建中可安浮緩如瘧各半之間辯經用法又固如是日以論經猶恐為末日斃雖多但見表症亦宜汗之日製雖少但見裏症亦宜下之半表半裏即和解之邪之中人初亦無常或入於陰或入於陽有在太陽全不傳者有從太陽即傳陰者有不從陽直中陰經而即病者又曰巡經越經傳者語下表裏及得度者合病併病兩感等名非常其道寧造其精三陽脈浮則當汗差不浮不

沉法室和解三陰脈沉有無力分有力室下無力室溫汗下  
溫涼俱非細故苟或一差變症繼至病若少愈室慎起居食  
復勞復安可忽諸所謂傷寒得之冬月故仲景方爲冬月設  
非冬寒時法當有變四時傷寒世俗之見非時感冒致用辛  
涼九味羌活小柴胡湯葛根敗毒竹葉等湯

主治方

麻黃湯

麻黃湯內用桂枝 杏仁甘草四般兒  
發熱惡寒身體痛 須知一服汗淋漓

麻黃錢六 桂枝錢四 甘草錢三 杏仁二十 加葱五 薑二 水煎服

桂枝湯

桂枝湯內藥四般 芍藥甘草一處橫  
若把二方合室用 方名各半治傷寒

桂枝白芍錢三 甘草錢二 薑五 水煎服取微汗爲度

大青龍湯

大青龍湯不用猪 麻黃湯中用石膏  
風寒俱盛如煩躁 須教服此汗消又

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 石膏 加薑棗水煎服

升麻葛根湯

升麻葛根湯四味 更加芍藥甘草是  
傷寒發熱與頭痛 汗出惡寒風熱治

升麻 赤芍 甘草 芍藥 每服三錢水煎熱服

大柴胡湯

大柴胡湯用大黃 半夏枳實此爲良  
赤芍黃芩通六樣 薑棗前來利大腸

柴胡兩半 黃芩兩半 赤芍兩半 大黃兩半 枳實三錢 分作三服

生薑大棗水煎溫服如不利再服

小柴胡湯

小柴胡湯只五般 半夏人參一處橫  
更有黃芩與甘草 生薑來子水同煎

柴胡

黃芩

甘草

人參

半夏

各三錢

每服五錢加姜棗

水煎不拘時服

小承氣湯

小承氣湯三件藥 枳實大黃并厚朴  
結胸諸語大便秘 每服五錢湯沸啗

大黃兩半

厚朴

枳實

各三錢

分作二服

加薑三片

水煎服未利再服絞汁服

四逆湯

四逆湯中薑一兩 生附減半去皮尖  
二兩甘草水煎服 逆而下利用之登

甘草二兩

乾薑

兩附子

每服五錢

水煎湯服不拘時

建中湯

建中湯內藥何如 甘草芍藥同桂枝  
又有黃耆建中者 即于此內加黃耆

甘草一兩

白芍

桂枝

各三錢

水煎服內加黃耆

各三錢

黃耆建中湯

小承氣湯

小承氣湯半裏薑 細辛肉桂與麻黃  
芍藥五味同甘草 八般水煎服之良

半裏 乾薑 細辛 肉桂 麻黃 芍藥 各三錢 五味二錢

草錢三

每服五錢

加生薑四片

水煎溫服

大承氣湯

大承氣湯用朴硝 大黃等分不須饒  
厚朴倍加併枳實 通腸四味甚奇佳

大黃 厚朴 枳實 朴硝 每服看症酌酌多少先煮厚

朴枳實至七分

納大黃煮至五分

去渣納朴硝煎二三

沸通口服以利爲度

未利再服

調胃承氣湯

調胃承氣藥是三 芒硝甘草大黃各  
水煎服之須再利 便秘狂言醫藥前

大黃三錢

芒硝

各一錢

甘草

三錢

水煎溫服



<p>三承氣湯 三一承氣如何識 大小調胃三合一 甘草硝黃枳朴同 却來五件同煎汁</p> <p>大黃 芒硝 厚朴 枳實 各半 甘草 一兩 水二鍾煎至一鍾</p> <p>納芒硝煎一沸去滓過口服不拘時每服一兩</p> <p>六一順氣湯 六一順氣六方併 四承大陷大柴等 大黃厚朴枳實芒硝 甘芍柴芍鉄粉領</p> <p>大黃 厚朴 枳實 甘草 芍藥 柴胡 黃芩 朴硝</p> <p>先 水煎滾二三沸後入藥煎至八分臨服時鉄粉水</p> <p>桃仁承氣湯 桃仁承氣五般奇 甘草硝黃與桂枝 血症發黃并血渴 狂言亂語總相宜</p> <p>桃仁 甘草 芒硝 大黃 桂枝 水煎服</p> <p>大陷胸湯 大陷胸治大結胸 芒硝甘草大黃 傷寒下早回成此 服散快利斯為功</p> <p>大黃 芒硝 甘草 五分 〇分作二服每服水一鍾煎大黃 錢芒硝三錢甘草末 至六分納硝煎一二沸絞汁調 甘遂末二分半 溫服未快再服</p> <p>小陷胸湯 小陷胸治小結胸 黃連半夏瓜蒌同 以其苦泄辛能散 微吐黃涎氣便通</p> <p>半夏 四錢湯洗 黃連 二錢 瓜蒌實 大者一兩半惟剖其壳 全不剖 到 子不剖又其子非也 水</p> <p>三鍾煮瓜蒌汁一鍾半納藥煎至 一鍾絞汁兩大溫服以吐涎為度</p> <p>白虎湯 白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄 人參亦有加之者 熱渴虛煩用此煎</p> <p>知母 石膏 四兩 甘草 炙 一 加梗米 合 〇煎六分溫服無時</p> <p>加入人參半兩各</p> <p>大參白虎湯</p> <p>竹葉石膏湯 竹葉石膏更用參 甘草人參半夏 生薑以及陳倉米 虛煩躁渴熱相尋</p>	<p>石膏 一兩 半夏 二錢 人參 二錢 麥門冬 五錢 半 甘草 炙 二錢 〇每服</p> <p>五錢水一鍾入青竹葉生薑各五片又云竹葉十片 半去滓入梗米百餘粒再煮米熟去米溫服不拘時</p> <p>黃連解毒湯 黃連解毒湯四味 黃柏黃芩枝子是 黃連解毒湯 黃連解毒湯四味 黃柏黃芩枝子是</p> <p>黃連 黃芩 黃柏 枝子 各等 〇每服一兩水二鍾</p> <p>既濟湯 既濟湯中藥七般 甘草參香半夏枳 竹葉門冬兼附子 陰陽隔絕四肢寒</p> <p>甘草 人參 黃耆 半夏 門冬 附子 竹葉</p> <p>真武湯 真武湯中芍藥魁 白朮茯苓甘草 附子炮來加減用 生薑水煎總相宜</p> <p>芍藥 白朮 茯苓 甘草 附子 〇每服五錢加生薑</p> <p>九味羌活湯 九味羌活生地黃 川芎白芷細辛 黃芩蒼朮同生地 能代麻黃桂枝湯</p> <p>羌活 防風 蒼朮 各錢 甘草 川芎 白芷 生地 黃</p> <p>芩 細辛 各一錢惟 水鍾半加姜三片葱白三莖煎</p> <p>一鍾溫服食後取微汗為度如無汗啖稀粥助之</p> <p>人參敗毒散 人參敗毒散桔梗 川芎甘草茯苓等 枳殼前胡羌活獨活 柴胡十味性京冷</p> <p>人參 柴胡 甘草 炙 桔梗 羌活 獨活 芎藭 茯苓</p> <p>枳殼 前胡 等分 〇每服三錢水一盞姜三片薄荷少 許煎至七分去渣溫服</p>
--	--

附代寧汪初菴先生手授三焦命門辨

五藏六府有三焦一府內經言之最詳難經又加發明愈益  
賜書後人不信三經妄生臆說如龍川志云有徐道者見一  
餓夫獨制始盡而骨脉尚全往視其藏見右腎下有時脈如  
掌大正與膀胱相對有二句脉夾脊貫腦以此為三焦馬玄  
臺素問解又分列右腎以為三焦之府是皆一焦而非三焦  
矣李東垣又分手足三焦是為六焦而非三焦矣張景岳類  
經以有名無形一語為非是而以軀殼之邊際為三焦是泥  
其外而遺其中矣皆與經文不相符也按先正云三焦取火  
能腐物之義火之性自下而上三焦者始子原氣由于中脘  
散于膈中皆相火之自下而上者也上焦主納而不出下焦  
主出而不納其納其出皆係乎中焦之腐熟焦之為義可見  
矣張景岳三焦包絡命門辨其略曰難經曰心主與三焦  
為表裏俱有名而無形叔和啟玄而下皆宗之二子不能辨  
孰敢再辨至徐遁陳無擇始創言三焦之形有脂膜如掌大  
李氏醫鑑

正與膀胱相對子編考內經曰三焦者中瀆之府水道出焉  
屬膀胱是脈之府也曰密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮  
者三焦膀胱薄以及緩急而結各有所分曰勇士三焦理橫  
怯士其焦理縱曰上焦開發宣五穀味薰膚充身澤毛是謂  
氣中焦受氣取汁變化而赤是謂血曰營出中焦衛出下焦  
曰上焦出胃口貫膈而布胸中中焦亦並胃中出上焦之  
後化精微而為血下焦別迴腸注于膀胱而滲入焉水穀居  
十胃中成糟粕下于大腸而成下焦曰上焦如霧中焦如瀾  
下焦如澗其在心包絡則曰諸邪之在于心者皆在于心之  
包絡之三焦既無形矣何以有水道之出有厚薄緩急直結  
縱橫之分何以如霧如瀾如澗及氣血之別心主亦曰無形  
矣則代心而受邪者受之何所則此經文有無可見夫所謂  
三焦象三才也焦者象火也色赤屬陽之謂也夫人之一身  
外自皮毛內自臟腑其腔腹周圍上下全體狀若大囊者果  
何物乎其著內一層形色最赤象如六合總統諸陽是非三

李氏醫鑑 三焦命門辨

焦而何至其相配表裏則三焦為藏府之外衛心包絡為心  
主之外衛如帝關之重城故皆屬陽均稱相火而其脉絡相  
通允稱表裏此固甚明無容辨也客曰既三焦心主為表裏  
何以復有三焦命門表裏之說余曰內經初無命門之名惟  
根結篇氣陰陽離合等篇有曰命門者目也此蓋指太陽經  
穴終了睛明此外並無左右腎之分及右腎為命門之說也  
命門之始起于難經曰腎有兩者非皆腎也左者為腎右者  
為命門命門者精神之所舍原氣之所繫男子以藏精女子  
以繫胞王叔和因之而曰腎與命門俱出尺部後世致有命  
門三焦之配內經實所無也黃庭經曰上有黃庭下關元後  
有幽關前命門又曰丹田之中精氣微玉房之中神門戶梁  
丘子註曰男以藏精女以約血故曰門戶元陽子曰命門者  
下丹田精氣出飛之處也脉經又曰左為腎右為子戶所謂  
子戶即子宮也俗名子腸居直腸之前膀胱之後當關元氣  
海之開男女精血皆存乎此而子由此出又子宮者男女之

通都道家以先天真一之炁藏乎此為九還七返之基故曰  
丹田醫家以衝任之脉盛于此名曰血室以氣之呼接乎天  
根氣之吸接乎地根又名氣海實則一子宮耳在女子可以  
手探而得俗名產門在男子精泄之時自有開闢知覺父母  
交會之際施由此出受由此入謂非先天立命之門戶乎夫  
命門者子宮之門戶也子宮者腎藏藏精之府也腎藏者先  
天真一之氣北門鎖鑰之司也而所以為鎖鑰者正賴命門  
之開固蓋坎中之真陽以為一身生化之原也坎卦內奇而  
外偶腎兩者坎外之偶也命門一者坎中之奇也命門總主  
乎兩腎兩腎皆屬于命門為水火之府陰陽之宅精氣之海  
死生之寶若命門虧損則五藏六府皆失所恃而陰陽病變  
無所不至矣醫不知此尚安足云思按難經所云三焦有名  
無形者蓋指上中下之空處而言景岳以為有形者蓋指軀  
殼之邊際而言兩人所說實共一物也愚竊以理推究之則  
難經之義為長夫景岳以軀殼之邊際為一大府此與內經

所謂脈府雖經所謂外府兩說相合特從前水經道破而最  
出又由焉而不知者耳但三焦之用實係中央之空處而  
不在於四旁之邊際也老子曰三十幅共一轡管其無有車  
之軸運以爲器當其無有器之用繫戶牖以爲室管其無  
有室之用故有之以爲利無之以爲害夫車器室三者皆自  
也然車之載物器之受物室之便居處利出入者則在乎空  
無之處也經曰宗氣積於上焦營氣出于中焦衛氣出于下  
焦又曰上焦貫膈而布胸中中焦化精微而爲血下焦注勝  
胱而滲入是其所以網繼宗氣變化精血流行營衛與夫貫  
膈布胸別迴腸注勝胱者將在乎無形之中央乎抑在乎有  
形之邊旁乎經又曰上焦如霧中焦如沤下焦如瀉夫霧與  
沤皆結于空中似有而無之物也瀉所以行水而非水亦空  
無之地也是內經數說悉皆歸重于無形之空處而非創自  
于難經矣景岳特據厚薄直結縱橫以爲辨是皆執有之遇  
而求達夫用無之妙遂致輕議古人不知古人已得其精已

李氏醫鑑

三焦論

三

通得其指耳難經曰三焦者水穀之道路氣之所終始也上  
焦在胃上口主內而不出其治在膻中兩乳間中焦在胃中  
脘主腐熟水穀其治在臍旁下焦當膀胱上口主分別清濁  
主出而不內其治在臍下一寸又曰三焦主持諸氣有名而  
無形其經屬于少陽此外府也又曰三焦所行之命爲原何  
也臍下腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰  
原三焦者原氣之別使也主通行三氣經脈于五臟六腑原  
者三焦之尊號也故所止轉爲原五臟六腑之有病者皆取  
其原也夫既曰主持諸氣又曰經脈五臟六腑而通于十二經  
府豈非以三焦兼包內外能統五臟六腑能通行于十二經  
絡也乎難經又曰小腸謂赤腸大腸謂白腸臍謂青腸胃謂  
黃腸膀胱謂黑腸下焦之所治也是明言下焦兼包五府矣  
豈上中二焦獨不能兼包諸藏乎是景岳腔腹大囊之說難  
經久已兼及之景岳特不書未透耳又按華元化中藏經曰  
三焦者三元之氣也號曰中清之府總領五臟六腑營衛經

絡內外左右上下之氣也三焦通則內外左右上下皆通也  
其于周身灌體和內調外營左養右導上宣下奠大于此也  
其言正與難經同何待景岳之置辨乎若夫腎有兩枚皆屬  
于水惟中央命門一點眞陽屬火所以成坎卦而正位乎北  
也故易曰坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也  
蓋以命門相火能代心君行事凡人之主云爲而應萬事者  
賴相火而化精微皆賴此相火之運用故曰勞卦故爲萬物之  
所歸以易象觀之其理甚明難經經脈皆分左爲腎右爲命  
門而以命門配于右尺夫章泰並無命門之名而十二經中  
又無命門之絡何以能見脉于右尺能配三焦而稱表裏也  
哉此實從來相沿之誤須賴後賢爲之改正者也張景岳乃  
以命門屬之子宮產門不知命門在兩腎之中央藏先天之  
眞火爲生身之根蒂男女媾精之時皆賴此命火以受胎人  
之窮通壽夭皆本乎此在來脊第七節猶北辰居其所而不  
動內經所謂七節之旁中有小心者氏所謂玄牝之門爲天

李氏醫鑑

三焦論

四

地根正謂此也蓋指此爲藏精之宮則可指爲泄精之處則  
不可指爲繫胎之根則可指爲藏胎之地則不可若命門之  
大可以容胎是特哀然一革囊而已其何以孕育元精元神  
元氣子一離宮此中之精氣盡耗尙賴何者以爲安身立命  
之基乎景岳看難經未明致多三焦一辨已屬駢枝又不識  
命門眞面目而以子宮子腸當之且混認丹田氣海便是子  
腸以爲九還七返之基正在于此不亦大可駭乎此愚之聲  
說特加辨析以聽識者之論定焉續醫說亦有辨三焦爲有  
形一篇議論尤爲不暢不足置辨

三焦命門繫乎軀命者甚大古今之論其夥求其確得眞  
詮而無疑義者實未易見甚矣斯道之至精至微而言之  
之不易也來醫鑑於請正於先生蒙先生極口贊賞  
詳正差訛玉成全璧更將近著素靈內三焦命門端按增  
卷內博極而精詳確而明破從前之疑誠建司命之津鑒  
光固照耀斯編功更昭垂萬載  
後學李文來敬啟

李氏醫鑑十卷續補二卷

內府藏本

國朝李文來編文來字昌期婺源人初休寧汪桓作醫方集解本草備要二書淺顯易明頗行於世康熙丙子文來撮合兩書條分縷析分類排纂以成是書名曰李氏醫鑑實則汪氏書也又以裸證及傷寒有未備者更輯爲續補二卷末附桓所作三焦命門辨一篇稱醫鑑成請正於桓詳校差訛玉成完璧更授以是篇附刻卷末則文來輯是書時桓尙無恙與所手定無異矣

# 濟陰綱目十四卷

〔明〕武之望輯 〔清〕汪淇箋釋

中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻本

附《四庫全書總目·濟陰綱目

十四卷》提要

## 濟陰綱目序

夫醫者活人之事而亦殺人之機也今天下醫書亦繁夥矣未盡其變紙上陳言何足爲用設沉疴當前醫士環視生之乎殺之乎曰殺之也何以明其然也拘泥古方以療今疾如此者醫殺之耳男子無論矣自序一女子之情隱微難見病不自知而一委於醫醫又不能得其隱微望聞問無有焉一憑於脈脉其可盡憑乎惟是妄意揣度聊復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其

思欲不遂脉出魚際一寸是也從其顯而顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之拔劍砍之彼則蒲伏不敢仰視久之愈矣是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之

自序三

義矣水能生人亦能殺人故禹之治水也窮其源而疏之因其勢而利導之自無汎濫之患禹非能治水也因水以治水也人能知禹之治水則知所以治婦女之科矣故濟陰綱目一書其立論自調經始有綱領有原委有條貫有分疏一病之中三致

意焉一方之設細詳釋焉得其隱微能盡其變使人閱之一團生氣浮於紙上詎非活人之書哉雖曰濟陰而實所以扶陽也無陽則陰無以生無陰則陽無以化陽施陰化而醫道之能事畢矣吾非能知醫也而因醫以知醫故重爲訂之以廣仁人之

自序三

心而已雖然喻指爲月指終非日讀者因指識月焉可也

肯

雍正戊申年孟冬月西陵懽漪子汪其右  
子甫題於孝友堂別業



濟陰綱目凡例

一凡醫家治男子易治婦人難所以丹溪云寧治十男子不治一婦人甚言女科之難也惟茲濟陰綱目一書集百家之精華彙諸書之奧旨真千古之秘義功參大化一時之鴻寶福庇坤元也

一。是書理解微妙無不條分節判標榜詳明卽一圖一點俱出匠心令人一見了然至于上層批評箋釋各從本末源流分疏辯駁學者開卷既易于尋方病者得醫無

濟陰綱目

凡例一

綱目

難于對症矣

一。是編雖屬婦人端刻其論脉理經絡處俱採內經素問之精微如某症加減某藥等不僮女科要書卽大小諸家細爲觀覽咸可觸類旁通所謂造化在手物類聽其鑪錘橐籥在心乾坤亦任其旋轉耳

一婦人得病種種與男子不同其所由起世人畧而不知此書獨先明其病源因何而啟然後論脉論症中引古方之的確而增減其藥味上批議論之可否而酌量其

去從此因病用藥按脉切理不拘于方之內也神而明之存乎其人

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法加減之精當各以類推種種不同初入門者宜細心翫習卽四澥醫宗窮究厥中與理則其學自居聖功之上而盧扁再出矣

一。是書醫家之秘寶因原板無存世人每欲購求遺本真如丹經仙錄可思而不可得今本坊重登梨棗照原本不易一字至于紙用精良鐫寫名手以方可壽人書

濟陰綱目

凡例二

綱目

可壽世述者不厭精工識者自爲鑒賞

一。此刻之後隨有慈幼綱目卽證治準繩之幼科也復增圈點詳加評釋亦如是編之精詳梓以問世蓋濟陰所以扶陽地天于焉常泰而慈幼卽以康老運會用是咸亨不佞壯志既頽致藉仁術以傳婆心熱腸未冷願持垣方下問國手倘不棄於梁公之藥籠或有補夫黃帝之緒鞭也

康熙四年一陽月西陵僭漪子注 洪石子父題于蜩寄

調經

論經主衝任二脉

論脾胃生血

論三月一來為居經

論調經當抑氣

論調經大法

論經候愆期

論月水不利

論過期不止

論經病發熱

論熱入血室

脉法

調經通用諸方

四物湯

簡易當歸散

大溫經湯

四製香附丸

九味香附丸

百子歸附丸

當歸地黃丸

治經候先期方

先期湯

金匱土瓜根散

論心脾為經血主統

論經不調由風邪客於胞中

論師尼寧婦異乎妻妾之治

論調經先去病

論經水異色

論月水多少

論月水不斷

論經病疼痛

論往來寒熱

論行經泄瀉

天德堂

增損四物湯

嚴氏抑氣散

十味香附丸

艾附暖宮丸

人參養血丸

治經水過多方

當歸飲

滋血湯

膠艾湯

四物加熟地黃當歸湯

七沸湯

四物加熟地黃當歸湯

牛膝散

養榮湯

歸濟丸

治經候過期方

過期飲

治經水過多方

當歸飲

丹溪方

治經水澀少方

七沸湯

四物加熟地黃當歸湯

治月水不利方

牛膝散

養榮湯

歸濟丸

治月水不斷方

止經湯

蒲黃散

治過期不止方

芩心丸

補中膏

治經病疼痛方

越痛散

加味四物湯

加味烏藥湯

薑黃散

琥珀散

治經水過多方

滋血湯

膠艾湯

四物加熟地黃當歸湯

七沸湯

四物加熟地黃當歸湯

牛膝散

養榮湯

歸濟丸

治月水不斷方

止經湯

蒲黃散

治過期不止方

芩心丸

補中膏

治經病疼痛方

越痛散

加味四物湯

加味烏藥湯

薑黃散

琥珀散

治經水過多方

滋血湯

膠艾湯

四物加熟地黃當歸湯

七沸湯

四物加熟地黃當歸湯

牛膝散

養榮湯

歸濟丸



當歸散 治久遠血氣病痛小 經驗方 治經閉不省人

三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛 交加散 治經閉不調腹痛

交加散 治月事不調腹痛 交加地黃丸 治經閉不調血塊

瓦龍丸 治血塊 桂枝桃仁湯 治經閉不調

柴胡丁香湯 治三十歲經閉九腰 小溫經湯 治經閉不調

沒藥除痛散 治經閉不調 治經病發熱方

逍遙散 治血虛煩熱口燥咽乾 加味四物湯 治月事不調

治往來寒熱方 六神湯 治血氣不足煩熱

本事方 治血脈不調往來 地骨皮散 治血氣兩虛寒

柴胡散 治寒熱如勞倦 七寶湯 治寒熱

柴胡四物湯 治虛勞日久 柴胡抑肝湯 治經閉不調

生地黃丸 治經閉不調 治熱入血室方

小柴胡加地黃湯 治中風發熱惡寒水逆 乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人 海蛤散 治婦人傷寒

卷之二 經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火 論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃 論室女經閉成勞因心虛

論經閉因積冷結氣 論經閉因痰飲所隔

論下利經閉利止經來 論經閉總由血滯血枯

論經閉大法 脈法

治血枯經閉方 玉燭散 治胃熱善食津液燥竭以致

二黃散 治婦女經閉 二氣丸 治月經不調

五補丸 治血虛安胎 衛生湯 治血虛

相子仁丸 治血虛有火經閉不通 加味補中益氣湯 治血虛

十全大補湯 治血虛多產傷血或經閉 治經閉方

溫經湯 治經閉不通 行經紅花湯 治經閉

紅花當歸散 治經閉不通 瑞金散 治經閉

麥香花散 治月事不調 土牛膝散 治經閉

琥珀散 治心膈氣悶 桃奴飲子 治經閉

萬病丸 治經閉不通 通經丸 治經閉

產寶方 治月經不調 千金桃仁煎 治經閉

和血通經丸 治經閉不通 斑荷通經丸 治經閉

大黃膏 治血氣不通 聖惠方 治經閉

通經丸 治月候不通 治痰結經閉方

丹溪方 治痰傷經閉 一方 治形實氣虛

加味導痰湯 治經閉 掌中金丸 治經閉

礞石丸 治經閉堅結 一粒仙丹

通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論氣隔血脫法當升舉

論過服寒涼法當溫補

論開痰行氣

論崩漏難治

瘕法

治血熱崩漏方

刺芥四物湯 治崩漏初起不閉

河間生地黃散 治經期紫黑

小蘇湯 治崩漏血色如木得溫則順此方治崩中者逆為藥酒

治崩中丟血不止

一方治

簡易黃芩湯 治陽衰陰

治勞傷崩漏方

膠艾四物湯 治勞傷月水過多不止

當歸芍藥湯 治經期鮮紅因勞傷脾虛氣

歸脾湯 治思慮傷脾不能固血以致妄行或健

相子仁湯 治思慮過度心傷不

治崩漏氣陷方

益胃升陽湯 治血脫益氣先補胃以助生長

柴胡調經湯 治鮮血不止項急

調經升陽除濕湯 治崩下血或不止多

論血崩因虛熱

論血瘀腹痛法當收止

論補中去積

論殺血心痛

經驗簡要治崩中等法

奇效四物湯 治肝熱血

涼血地黃湯 治野水陰虛不能

天德堂

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五靈脂散 治血崩不止昏

香附子散 治血崩五色不止併治產後小

煮附丸 治崩漏帶下積聚疼痛

如神散 治血崩亦

一方同

加減四物湯 治天癸至或後至卒暴崩漏不止

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯 治心氣不足飲食不節崩漏不

芎藭湯 治血寒下腹重痛急虛寒腹痛及胎動

斷下湯 治血虛下血崩漏不調每月

加味四物湯 治崩漏

鹿茸丸 治經候過多其色紫黑呼吸少氣

治崩漏虛脫方

大前方 治崩下不止

又方 治崩中不止結血

伏龍肝散 治勞傷任脈如豆汁血片五色赤

地榆散 治崩中

補宮丸 治諸虛久不妊

一方 治崩漏不止

血見黑則止方 治諸方品味錯雜然總是治久崩止

五灰散

如聖散

當歸散

治崩漏目

木

天德堂

一方治血崩

立應散

必效散

香礬散

止崩雜方 共二十方

孫真人方 治九發

卷之三

赤白帶下門

論帶下由勞傷衝任

論帶下虛寒宜溫補

論帶下當以壯脾胃升陽氣為主

論帶久不止當補衛厚脾

論帶下濕熱藥用正治從治之異

論帶下雜治法

論室女帶下

消瘀血

用法

治濕熱帶下

清白散 治白帶 有

檳皮丸 治赤白帶

蒼蠅檳皮丸 治赤白帶

苦楝丸 治赤白帶

萬安散 治赤白帶

大聖萬安散 治赤白帶

治濕熱帶下方

琥珀散 一名易

立效散

烏金散

一方

千金方 治婦人無

論帶下五包因風邪入於胞門

論帶下痰實宜吐下

論帶久枯涸宜潤補

論帶久不止當補衛厚脾

論帶下濕熱藥用正治從治之異

論帶下雜治法

論室女帶下

消瘀血

用法

治濕熱帶下

清白散 治白帶 有

檳皮丸 治赤白帶

蒼蠅檳皮丸 治赤白帶

苦楝丸 治赤白帶

萬安散 治赤白帶

大聖萬安散 治赤白帶

治濕熱帶下方

琥珀散 一名易

立效散

烏金散

一方

千金方 治婦人無

論帶下五包因風邪入於胞門

參濕消痰飲 治濕熱痰積

小胃丹 治上取明眼痰下取腸胃

治風邪帶下方

胃風丹 治風邪入胞中

蒼柏參芩散 治上有頭風

治虛損帶下方

衛生湯 治帶下脈

六君子湯 治胃虛有痰食

歸脾湯 治思慮過度傷心脾

當歸澤蘭湯 治經水不調赤

嚴氏當歸煎 治赤白帶下

補宮丸 治諸虛久不妊

千金方 治帶下脈

補真固經丸 治白帶流而

助陽湯 治白帶腰中痛

治虛寒帶下方

元戎四物湯 治赤白帶

延胡苦練湯 治陰下冷

當歸附子湯 治赤白帶

酒煮當歸丸 治赤白帶

鶴頂丸 治赤白帶

神仙聚寶丹 治赤白帶

茱萸浴湯 治赤白帶

勝陰丹 治赤白帶

同陽丹

玉仙散 治赤

桂附湯 治白帶

暖宮妙應丸 治赤白帶

蒼柏檳皮丸 治赤白帶

補藥方 治赤白帶

小柴胡湯 治風邪帶下

地榆散 治赤白帶

補中益氣湯 治飲食勞倦

加味八珍湯 治血虛

止帶丸 治赤白帶

菴菴見經丸 治赤白帶

丹溪方 治赤白帶

千金方 治帶下脈

補真固經丸 治白帶流而

助陽湯 治白帶腰中痛

治虛寒帶下方

元戎四物湯 治赤白帶

延胡苦練湯 治陰下冷

當歸附子湯 治赤白帶

酒煮當歸丸 治赤白帶

鶴頂丸 治赤白帶

神仙聚寶丹 治赤白帶

茱萸浴湯 治赤白帶

勝陰丹 治赤白帶

同陽丹

玉仙散 治赤

桂附湯 治白帶

暖宮妙應丸 治赤白帶

千金方 治帶下脈

補真固經丸 治白帶流而

助陽湯 治白帶腰中痛

如聖丹 治經脈不調

治帶下清脫

側柏地榆湯 治赤白帶下

伏龍肝散 治赤白帶下

固真丸 治赤白帶下

茅花散 治赤白帶下

白附丸 治赤白帶下

治白濁白淫

加味四七湯 治婦女小便不

固精丸 治下虛白濁

金鎖正元丹 治遺精白濁

威喜丸 治遺精白濁

烏金散 治身熱口燥氣塊

卷之四

虛勞

論婦女虛勞與男子不同

論無熱虛勞

論察骨蒸熱

治虛勞平補諸方

增損四物湯 治血虛不足

六神湯 治血虛不足

加減大建中湯 治虛損月水不調

雙和散 治虛勞乏力

補中益氣湯 治虛勞乏力

白芷散 治赤白帶下

馬蹄丸 治赤白帶下

健白丸 治赤白帶下

地榆湯 治赤白帶下

鎖精丸 治赤白帶下

內金鹿茸丸 治赤白帶下

小便白濁日夜無度

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

一方 治虛寒白濁

論初病大法

論有熱虛勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

論血風勞

歸脾湯 治脾虛失血

桔梗引子 治心氣不足

却勞散 治心氣不足

補中丸 治心氣不足

七補丸 治心氣不足

十補丸 治心氣不足

滋陰百補丸 治心氣不足

六味丸 治心氣不足

八味丸 治心氣不足

益陰腎氣丸 治心氣不足

烏雞煎丸 治心氣不足

艾煎丸 治心氣不足

治無熱虛勞

附子理中湯 治真陽不足

加味黃耆湯 治真陽不足

渾身碎痛引子 治真陽不足

戊己丸 治真陽不足

治有熱虛勞

逍遙散 治血虛煩熱

黃耆散 治血虛煩熱

知母散 治血虛煩熱

秦芫散 治血虛煩熱

胡黃連散 治血虛煩熱

紅藍花散 治血虛煩熱

黃耆散 治食後身

補肺湯 治食後身

人參丸 治食後身

羊乳丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

人參丸 治食後身

阿膠丸 治勞嗽出血發熱口渴盜汗

治骨蒸勞瘵

加味四物湯 治骨蒸

青蒿散 治骨蒸

河車丸 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等

地黃煎丸 治勞嗽生肌

治傳尸勞

天靈蓋散 治傳尸勞熱四肢無力

獺肝丸 治勞嗽煩

治血風勞方

人參荊芥散 治血風勞熱體疼頭昏

大效油煎散 治血風勞熱

濟陰綱目

萬全逍遙散 治血風勞熱頭暈

熟地黃丸 治冷氣攻心小腹

卷之五

積聚癥瘕

論婦人諸積形狀 瘕瘕積聚入

論癥瘕

論血瘕

論瘕瘕 瘕瘕積聚左有一條筋急

論腸覃 瘕瘕積聚左有一條筋急

論婦人瘕瘕並屬血病 瘕瘕積聚

論痰積用吐下 瘕瘕積聚

通治諸積方

開鬱正元散 治瘕瘕積聚

豬肚丸 治熱勞

黃連散 治骨蒸勞熱四肢骨

柴胡散 治骨蒸勞熱

黃耆丸 治骨蒸勞熱

地骨皮 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

地骨皮 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

微鬼丸 治血風體弱

大七氣湯 治瘕瘕積聚上下心腹痞滿

勝紅丸 治瘕瘕積聚上下心腹痞滿

香稜丸 治瘕瘕積聚上下心腹痞滿

阿魏膏 治瘕瘕積聚上下心腹痞滿

分治八瘕方

早莢散 治瘕瘕積聚上下心腹痞滿

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

三稜煎 治婦人血瘕

大硝石丸 治七情八氣下疳

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

療瘕瘕方

桃奴散 治血虛血枯諸症水不  
琥珀散 治經絡病塞瘀  
地榆散 治打撲傷損

治症瘕方

麝香丸 治痰癖令氣逆氣  
葱白散 治心氣不和嘔吐氣攻胸脇胎前產後  
烏雞煎丸 治胎前產後諸疾及脾寒  
又方 治三積

治疝瘕方

乾漆散 治疝瘕久不消令人黃  
硃砂丸 治疝瘕久不消令人黃  
黑神丸 治疝瘕久不消令人黃  
烏雞煎丸 治疝瘕久不消令人黃

求子

烏雞煎丸 治男婦不孕  
鹿茸丸 治男婦不孕  
求子 治男婦不孕

卷之六

論求子須知先天之氣

論求子先調經

論求子必知細細之時

論男女精血盛衰

論男女各由百脉齊到

逐月養胎法

論求子禁用熱藥

脈法

論求子脉須平和

論求子貴養精血

論合男女必當其年

論成胎分男女之異

趕經法

論痰飲不孕

論孕子雜法

治血虛不孕方

加味四物湯 治血虛不孕  
調經種子湯 治血虛不孕

經驗育胎丸 治血虛不孕

神仙附益丸 治血虛不孕

金蓮種子仙方 治血虛不孕

百子建中湯 治血虛不孕

加味香附丸 治血虛不孕

增損三才丸 治血虛不孕

神效聖附丸 治血虛不孕

大烏雞丸 治血虛不孕

十全濟陰丸 治血虛不孕

治官令不孕方

調生丸 治官令不孕

勝金丸 治官令不孕

白薇丸 治官令不孕

秦桂丸 治官令不孕

壬子丸 治官令不孕

南嶽魏夫人濟陰丹 治官令不孕

紫石英丸 治官令不孕

坐導藥 治官令不孕

治痰塞不孕方

丹溪種子湯 治痰塞不孕

金斯丸 治痰塞不孕

消脂膜導痰湯

丹溪茂芝丸 治痰塞不孕

丹溪茂芝丸 治痰塞不孕

丹溪茂芝丸 治痰塞不孕

丹溪茂芝丸 治痰塞不孕

加味小柴胡湯 治肝經腫脹小便不利寒熱往來嘔吐泄瀉熱厥脇作痛

又方上 治会廷下脫方

當歸散 治婦人陰中寒出 一物長 又方

三葉丸 治陰中一物牽引 腹痛或 治陰下脫方

一稔金丸 此又附一方妙

又方

托藥

敷藥

治陰冷方

五加皮浸酒方 治婦人 寒 治陰冷方

八味丸 治血弱不能榮養 治陰冷方

又二方

治交接出血作痛方

千金方 治女人交 又五方

濟陰綱目

小戶瘰癧方

治傷丈夫頭痛方 附脚指 又三方

集驗方 治婦人傷丈夫 桑白皮湯 治傷丈夫 頭痛欲嘔

金蓮穩步膏 治婦人脚 拍縫壞痛

卷之八

胎前門上

論胎屬十二經所養

論胎前調理法

孕婦食忌

孕婦起居忌

診婦人有姙歌

驗胎方

艾醋湯 治月經不調 驗胎方 已結三月

連月養胎法

烏雞湯 治婦人一月寒多 為痛熱多 卒驚舉重

補胎湯 治婦人月經 治胎前

黃連湯 治婦人月經 治胎前

茯神湯 治婦人月經 治胎前

調中湯 治婦人月經 治胎前

安中湯 治婦人月經 治胎前

柴胡湯 治婦人月經 治胎前

杏仁湯 治婦人月經 治胎前

葵子湯 治婦人月經 治胎前

濟陰綱目

豬腎湯 治婦人月經 治胎前

惡阻

半夏茯苓湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

陳皮半夏湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

縮砂二陳湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

青竹如湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

一方 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

茯苓丸 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

橘皮湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

人參丁香散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

白朮散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

縮砂散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

艾葉湯 治婦人月經 治胎前

雄雞湯 治婦人月經 治胎前

菊花湯 治婦人月經 治胎前

阿膠湯 治婦人月經 治胎前

麥門冬湯 治婦人月經 治胎前

葱白湯 治婦人月經 治胎前

芍藥湯 治婦人月經 治胎前

牛夏湯 治婦人月經 治胎前

二香散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

保生湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

人參半夏丸 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

歸原散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

白朮湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

參橘散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

蘆根湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

旋覆花湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

參橘散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

蘆根湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

人參半夏丸 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

歸原散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

白朮湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

二香散 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不

保生湯 治惡阻 嘔吐 心煩 眩暈 食不



胎動不安

安胎散 治胎動不安

草木湯 治胎動不安

金匱當歸散 治胎動不安

釣藤湯 治胎動不安

十聖散 治胎動不安

佛手散 治胎動不安

膠艾膏 治胎動不安

阿膠散 治胎動不安

當歸湯 治胎動不安

三物解毒湯 治胎動不安

胎漏下血 治胎動不安

加減膠艾湯 治胎動不安

濟陰綱目 治胎動不安

大千方 治胎動不安

安胎當歸湯 治胎動不安

當歸寄生湯 治胎動不安

阿膠散 治胎動不安

榆白皮散 治胎動不安

子芩散 治胎動不安

防風黃芩丸 治胎動不安

桂枝茯苓丸 治胎動不安

大千方 治胎動不安

煩躁 治胎動不安

竹葉湯 治胎動不安

犀角散 治胎動不安

人參散

治妊娠心煩熱不止

竹茹湯 治胎動不安

一母丸 治胎動不安

紫蘇飲 治胎動不安

訶梨勒散 治胎動不安

保胎和氣飲 治胎動不安

瘦胎飲 治胎動不安

葱白湯 治胎動不安

倉公下氣湯 治胎動不安

大聖散 治胎動不安

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

安胎和氣飲 治胎動不安

仲景附子湯 治胎動不安

心痛論

火龍散 治胎動不安

白木湯 治胎動不安

一方 治胎動不安

雜方 治胎動不安

補遺五方 治胎動不安

心腹痛論方

川芎散 治胎動不安

當歸芍藥散 治胎動不安

一方 治胎動不安

香義散

治五六月胎動氣刺痛崩漏有

古今錄驗方

治胎動不安

一方

治胎動不安

腹痛論方

地黃當歸湯

治胎動不安

小腹痛論方

瘵姪娘驚胎

治胎動不安

補遺湯

治胎動不安

腰腹及背痛論方

通氣散

治胎動不安

五加皮丸

治胎動不安

療姪娘氣壅

治胎動不安

濟陰綱目

目錄

小品學根方

治胎動不安

紫酒

治胎動不安

胎水腫滿論方

治胎動不安

白朮散

治胎動不安

葶藶散

治胎動不安

一方

治胎動不安

天仙散

治胎動不安

崔氏方

治胎動不安

子和方

治胎動不安

腹中鐘鳴方

治胎動不安

產寶方

治胎動不安

補遺方

治胎動不安

一法有

積聚論

丹溪方

治胎動不安

卷之九

胎前門

傷食

平胃散

治胎動不安

木香丸

治胎動不安

中惡

當歸散

治胎動不安

散滯湯

治胎動不安

又方

治胎動不安

傷寒

白朮散

治胎動不安

安胎阿膠散

治胎動不安

香蘇散

治胎動不安

黃龍湯

治胎動不安

三黃解毒湯

治胎動不安

桂枝芍藥當歸湯

治胎動不安

加減當歸六黃湯

治胎動不安

加減黃芩湯

治胎動不安

黃龍四物湯

治胎動不安

梔子大青湯

治胎動不安

護胎法

治胎動不安

六君子湯

治胎動不安

白朮散

治胎動不安

又方

治胎動不安

補遺方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

又方

治胎動不安

中風

防風散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

防已散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

赤箭丸 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

醋艾熨法 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

風症

羚羊角散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

芍活湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

瘕瘕

釣藤湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

子瘕

子瘕 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

子瘕 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

痰嗽

桔梗散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

百合散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

喘急

平安散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

馬兜鈴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

吐血

吐血 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

河間生地黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

瘕疾

七寶散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

人參養胃湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

驅邪散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

生犀角散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白僵蠶散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白木酒 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

葛根湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

羌活酒 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

黃帝問 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

馬兜鈴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

紫苑湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

桔梗湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

局方必勝散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

柴胡散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

清脾飲 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

驅邪散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

又方

香蘇散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

七味白朮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

人參散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

木瓜煎 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

益元散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

冬葵子湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

胃苓湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

胃風湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

加味中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

草果散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白朮湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

三黃熱湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

大寧散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

鴨蛋湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

大小便不通 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

大腹皮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

一方 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

回生散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

理中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

白朮散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

竹茹湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

桂苓甘露飲 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

不換金正氣散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

加味理中湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

錢氏益黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

歸善湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

厚朴散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

二黃散 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

當歸芍藥湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

蒙黃連湯 治婦人中風 口眼歪斜 手足不遂

葵子湯 治妊婦得病六七日以上身熱又方

猪苓散 治妊婦小便不利安胎除熱

小便不通

冬葵子散 治妊婦轉胞小便不通

葵榆湯 治妊婦小便不通

歸母苦參丸 治妊婦小便不通

子淋

五淋皮 治孕婦淋熱結膀胱

安樂散 治孕婦淋熱小便不通

生津湯 治孕婦淋熱小便不通

冬葵子湯 治孕婦淋熱小便不通

地膚子湯 治孕婦淋熱小便不通

子淋散 治孕婦淋熱小便不通

加味木通湯 治孕婦淋熱小便不通

大腹皮散 治孕婦淋熱小便不通

地膚大黃湯 治孕婦淋熱小便不通

遺尿

白微散 治妊婦尿

一方

續斷湯 治妊婦下血及尿血

蓮蓉湯 治妊婦小便不通

雜方

眼目

天門冬飲子 治妊婦肝經風熱上

臟燥悲傷

甘麥大棗湯 治婦人臟燥

又方

疳病下胎

桂心散 治妊婦因疳病下胎

千金神道湯 治一獨死此方主之

又方

防胎自墮

芎藭補中湯 治血氣虛弱不能養胎

千金保胎丸 治婦人受孕經

刑繁方 治妊婦懷胎數

胎墮後為半產

濟陰綱目

人參湯 治半產血下過多心驚目

龍骨散 治血不止

生地黄湯 治血不止

烏金散 治血不止

白蜜湯 治血不止

地黃湯 治血不止

蒲黃酒 治血不止

芎藭湯 治血不止

當歸補血湯 治血不止

胎不長

安胎白朮散 治胎不長

長胎白朮丸 治胎不長

滑竹茹湯 治妊婦心驚悸

一方

千金神道湯 治一獨死此方主之

又方

防胎自墮

芎藭補中湯 治血氣虛弱不能養胎

千金保胎丸 治婦人受孕經

刑繁方 治妊婦懷胎數

胎墮後為半產

濟陰綱目

人參湯 治半產血下過多心驚目

龍骨散 治血不止

生地黄湯 治血不止

烏金散 治血不止

白蜜湯 治血不止

地黃湯 治血不止

蒲黃酒 治血不止

芎藭湯 治血不止

當歸補血湯 治血不止

胎不長

安胎白朮散 治胎不長

長胎白朮丸 治胎不長

先期欲產過期不產

知母丸 治經期月  
未足病欲產

又方 治三  
首

鬼胎

斬鬼丹 治鬼胎如  
抱一變

雄黃丸 治鬼胎癰  
血腹癰

卷之十

臨產門

論臨產調理法

論難產由於安伏氣滯

論難產由於血滯血乾

產難治驗

論胎死腹中

臨月束胎方

束胎丸 治易生  
胎

又方 治九  
月

內補丸 治難產衝任  
脈

保生無憂散 治難產  
血少胎弱

難產催生方

三合濟生湯 治難產  
此即生

佛手散 治難產此  
即生

來麝散 治難產用力  
大過胎氣

黑神散 治難產一名  
催生

榆日皮散 治難產  
此即生

槐子丸 治經期月  
不而似欲產

加味四物湯 治過月  
不產

斑玄丸 治鬼胎或  
於妖魅

枳實檳榔丸 治難產  
癰塊

臨產催生法

論難產由於氣虛不運

論十產 楊子

論交骨不開

臨產脈法

達生散 治孕至八  
九月

滑胎枳殼散 治孕至  
八九月

張氏方 治胎前產  
後諸症

神寢丸 治難產  
易生

催生散 治難產  
此即生

催生湯 治難產此  
即生

活水無憂散 治難產  
此即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

免腦丸 治難產此  
即生

催生如聖散 治難產  
此即生

催生如聖散 治難產  
此即生

滑胎散 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

又方 治難產此  
即生

小品方 治難產此  
即生

黃金散 治難產此  
即生

催生萬金不傳遇仙丹 治難產  
此即生

一方 治難產此  
即生

立聖丹 治難產此  
即生

治交骨不開 治難產  
此即生

龜殼散 治難產此  
即生

治胎死腹中 治難產  
此即生

烏金散 治難產此  
即生

平胃散 治難產此  
即生

千金神造湯 治難產  
此即生

一方 治難產此  
即生

半夏湯 治難產此  
即生

催生散 治難產  
此即生

七聖散 治難產  
此即生

勝金散 治難產此  
即生

油蜜煎 治難產此  
即生

柞木飲子 治難產  
此即生

催生如意散 治難產  
此即生

三退散 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

神妙乳砂丹 治難產  
此即生

如神散 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

勝金丹 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

維方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

香桂散 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

一方 治難產此  
即生

下胎丸 治難產胞衣不出橫倒  
及兒死腹中母氣欲絕

露靈奪命丹 治臨產驚風口紫  
痰目翻口紫

牛膝丸 治難產及死  
胎下胞衣

如聖膏 治難產及死  
胎下胞衣

雜方 治難產及死  
胎下胞衣

卷之十一

產後門

論產後調理法

論產後服藥之誤

產後諸忌

胞衣不下

奪命丹 治胞衣不下  
胎下胞衣

牛膝湯 治胞衣不下  
胎下胞衣

加桂芍歸湯 治產後血暈  
元氣虛弱

花蘆石散 治產後血暈  
元氣虛弱

千金憐急丸 治產後血暈  
元氣虛弱

雜方 治產後血暈  
元氣虛弱

血暈附歌

清魂散 治產後血暈  
元氣虛弱

保命集方 治產後血暈  
元氣虛弱

獨行散 治產後血暈  
元氣虛弱

四味散 治產後血暈  
元氣虛弱

紅花散 治產後血暈  
元氣虛弱

鬱金散 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

宣明 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一字神散 治產後血暈  
元氣虛弱

論產後大補氣血為主

論新產三病

脈法

奪命丸 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

牛膝散 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

黑龍丹 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

胡氏方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

一方 治胎死腹中胞衣  
不下胎產危急

牡丹散 治產後血暈  
元氣虛弱

荆芥散 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

倉公 治產後血暈  
元氣虛弱

張露不下

起枕散 治產後血暈  
元氣虛弱

通瘀飲 治產後血暈  
元氣虛弱

保命集方 治產後血暈  
元氣虛弱

黑龍丹 治產後血暈  
元氣虛弱

血露不絕

論血露不絕

加味四物湯 治產後血暈  
元氣虛弱

烏金散 治產後血暈  
元氣虛弱

豆淋酒 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

產書一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

白薇湯 治產後血暈  
元氣虛弱

荷葉散 治產後血暈  
元氣虛弱

廣濟方 治產後血暈  
元氣虛弱

沒藥丸 治產後血暈  
元氣虛弱

治惡血不下雜方

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

一方 治產後血暈  
元氣虛弱

大巖蜜湯一名桂 治素有宿寒因寒 失笑散治惡血上攻

黃金散 治惡血上衝心腹 伏龍肝散 治惡物不出

一方 治產後血不 腹痛 治惡露不

加味四物湯 治惡露不 一方 治產後血不

一方 治產後血不 延胡索散 治惡血攻刺

烏金散 治惡血走刺 四神散 治惡血不消

丹溪散 治惡血不消 卷荷散 治惡血不消

荷葉散 治惡血不消 隱居澤蘭湯 治惡血不消

又方 治惡血不消 延胡索散 治惡血不消

當歸養血丸 治惡血不消 柴金丸 治惡血不消

玉燭散 治惡血不消 枳實芍藥散 治惡血不消

下瘀血湯 治惡血不消 保命方 治惡血不消

千金桃仁芍藥湯 治惡血不消 增損四物湯 治惡血不消

獨聖散 治惡血不消 當歸散 治惡血不消

定痛散 治惡血不消 羊肉湯 治惡血不消

當歸建中湯 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

千金方 治惡血不消 生料五積散 治惡血不消

胎前症 乾地黃湯 治產後兩脇滿

蘇葛湯 治產後惡露不食 經效方 治產後肝經氣滯

當歸散 治產後腹脹 廣濟方 治產後血氣不調

抵聖湯 治產後腹脹 廣濟方 治產後血氣不調

腰疼 當歸散 治產後血氣不調 玄胡四物湯 治血氣不調

如神湯 治產後血氣不調 又方 治產後血氣不調

廣濟方 治產後血氣不調 寄生防風湯 治產後血氣不調

桃仁湯 治產後血氣不調 五香連翹湯 治產後血氣不調

頭痛 五香連翹湯 治產後血氣不調 一奇散 治產後血氣不調

一奇散 治產後血氣不調 芎附散 治產後血氣不調

通身疼痛 芎附散 治產後血氣不調 五積散 治產後血氣不調

趁痛散 治產後血氣不調 加味四物湯 治產後血氣不調

加味四物湯 治產後血氣不調 獨活寄生湯 治產後血氣不調

獨活寄生湯 治產後血氣不調 外感風寒 加味芍藥湯 治產後血氣不調

加味芍藥湯 治產後血氣不調 竹葉湯 治產後血氣不調

竹葉湯 治產後血氣不調 中風 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

小續命湯 治產後血氣不調 小續命湯 治產後血氣不調

華陀愈風散 治產後中風及

血風湯 治產後

防風湯 治產後中風

雲岐方 治產後半身不遂言語卷

防風羊角湯 治產後中風

川芎散 治產後中風

濟危上丹 治產後中風

大豆紫湯 治產後中風

獨活酒 治產後中風

雞矢酒 治產後中風

交加散 治產後中風

一物獨活湯 治產後中風

羌活散 治產後中風

發瘧 治產後中風

小續命湯 治產後中風

大紫紫湯 治產後中風

大豆紫湯 治產後中風

一方 治產後中風

羚羊角飲子 治產後中風

防風當歸散 治產後中風

瘰癧 治產後中風

華陀愈風散 治產後中風

防風湯 治產後中風

增損柴胡湯 治產後中風

當歸散 治產後中風

拘攣 治產後中風

泰升湯 治產後中風

舒筋湯 治產後中風

防已膏 治產後中風

不語 治產後中風

八珍散 治產後中風

狂言謬語 治產後中風

一方 治產後中風

奪命丹 治產後中風

逐血補心湯 治產後中風

胡氏抵風散 治產後中風

一靈三聖散 治產後中風

華陀愈風散 治產後中風

防風湯 治產後中風

增損柴胡湯 治產後中風

當歸散 治產後中風

拘攣 治產後中風

泰升湯 治產後中風

舒筋湯 治產後中風

防已膏 治產後中風

不語 治產後中風

八珍散 治產後中風

狂言謬語 治產後中風

一方 治產後中風

奪命丹 治產後中風

逐血補心湯 治產後中風

胡氏抵風散 治產後中風

一靈三聖散 治產後中風

華陀愈風散 治產後中風

防風湯 治產後中風

增損柴胡湯 治產後中風

當歸散 治產後中風

拘攣 治產後中風

泰升湯 治產後中風

舒筋湯 治產後中風

防已膏 治產後中風

不語 治產後中風

八珍散 治產後中風

狂言謬語 治產後中風

調經散 治產後中風

栢子仁 治產後元氣虛

妙香散 治產後中風

烏金散 治產後中風

四物補心湯 治產後中風

寧神膏 治產後中風

琥珀地黃丸 治產後中風

見鬼神 治產後中風

大聖澤蘭散 治產後中風

辰砂遠志丸 治產後中風

抱龍丸 治產後中風

見鬼神 治產後中風

加味八珍湯 治產後中風

見鬼神 治產後中風

調經散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

茯神散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

驚悸 治產後中風

見鬼神 治產後中風

加味四物湯 治產後中風

見鬼神 治產後中風

白茯苓散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

乾熱地黃散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

人參散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

茯苓散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

歸脾湯 治產後中風

見鬼神 治產後中風

白茯苓丸 治產後中風

見鬼神 治產後中風

恍惚 治產後中風

見鬼神 治產後中風

千金方 治產後中風

見鬼神 治產後中風

琥珀散 治產後中風

見鬼神 治產後中風

天麻丸 治產後中風

見鬼神 治產後中風

登二十三 治產後中風

見鬼神 治產後中風

產後下 治產後中風

見鬼神 治產後中風

虛煩 治產後中風

見鬼神 治產後中風



<p><b>金黃散</b> 治產後惡血不 川芎散 治產後血不盡 經效方 治產後氣滯上衝心腹脹痛 治血氣煩悶雜方 竹葉湯 治產後短氣欲 蘇白湯 治產後胸中 仲景二物黃芩湯 治在病白發 經驗方 治產後 發渴</p>	<p><b>荷葉散</b> 治產後血不 集驗方 治產後心迷悶 沒藥丸 治產後心悶煩 人參當歸湯 治產後去血過多陰 甘竹茹湯 治產後內虛 芍藥梔子豉湯 治產後虛 竹皮大丸 治產後中虛</p>	<p><b>千金竹葉湯</b> 治產後 熱地黃湯 治產後 清心蓮子飲 治產後 括蕒根湯 治產後 當歸補血湯 治產後血脫煩躁脉洪 一方 治產後虛 桃花散 治產後不 自汗</p>	<p><b>黃著湯</b> 治產後虛 止汗散 治產後盜 當歸六黃湯 治產後盜 參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒逆冷 著附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口 全生活血湯 治產後四肢無力行步艱 發熱</p>	<p><b>竹葉歸著湯</b> 治胃氣虛 毛味白木湯 治中氣虛弱 產寶方 治產後大 黃芩散 治產後 一方 治產後血 一方 治產後中</p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>
---	--	---	--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<p><b>丹溪方</b> 治產後 抽薪散 治產後血 人參當歸散 治產後去血過多 犀角飲子散 治產後虛 往來寒熱</p>	<p><b>柴胡四物湯</b> 治產後往 增損四物湯 治產後陰陽不 大調經散 治產後惡露不調增寒發熱 小柴胡加生地黃湯 治產後寒熱 產寶方 治產後寒熱口 瘧疾</p>	<p><b>草果飲子</b> 治產後瘧 清脾飲 治產後瘧疾寒 七寶飲 治產後瘧疾久而不 尊勞</p>	<p><b>白茯苓散</b> 治產後 當歸建中湯 治產後虛弱不足腹 柴胡四物湯 治產後日久 雲岐熟地黃散 治產後四肢煩 石子湯 治產後虛弱面色黃 胡氏牡丹散 治產後虛弱經候不調 黃著養散 治產後勞傷肌瘦寒熱 虛羸</p>	<p><b>補虛湯</b> 治產後一切雜病 黃著建中散 治產後虛弱 加味佛手散 治產後血虛 三合湯 治產後 黃著丸 治產後勞傷 人參歸脾散 治產後虛弱 猪腰子粥 治產後勞傷</p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>	<p><b>天德堂</b></p>
--	---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

黃耆四物湯 新產補虛要藥以芍藥酸寒能

十全大補湯 治產後失血氣未復

黃雌雞湯 治產後虛弱

一方 治產後虛弱

痞悶

見睨丸 治產後虛弱飲食

腹脹

抵聖湯 治產後腹脹不能納穀

加味六君子湯 治產後腹脹不能納穀

紫金丹 治產後腹脹不能納穀

白聖散 治產後腹脹不能納穀

浮腫

濟陰綱目

大調經散 治產後腹脹不能納穀

經驗方 治產後腹脹不能納穀

正脾散 治產後腹脹不能納穀

橘皮酒 治產後腹脹不能納穀

奪魂散 治產後腹脹不能納穀

漢防己散 治產後腹脹不能納穀

加味吳茱萸湯 治產後腹脹不能納穀

加味八物湯 治產後腹脹不能納穀

加減金匱腎氣丸 治產後腹脹不能納穀

積聚

河間芍藥湯 治產後腹脹不能納穀

一方 治產後腹脹不能納穀

當歸羊肉湯 治產後

產寶方 治產後

又方 治產後

香砂養胃湯 治產後腹脹不能納穀

加味平胃散 治產後腹脹不能納穀

又方 治產後

小調經散 治產後腹脹不能納穀

日水湯 治產後腹脹不能納穀

小調中湯 治產後腹脹不能納穀

丹溪方 治產後腹脹不能納穀

張氏方 治產後腹脹不能納穀

七聖丸 治產後腹脹不能納穀

四神散 治產後腹脹不能納穀

桂心丸 治產後腹脹不能納穀

天德堂

產寶方 治血瘀病

千金方 治血

四生散 治一切瘧

理中丸 治脾胃虛寒嘔吐

溫中散 治脾胃虛寒嘔吐

高良薑散 治脾胃虛寒嘔吐

藿香正氣散 治脾胃虛寒嘔吐

萊復丹 治脾胃虛寒嘔吐

香靈丸 治脾胃虛寒嘔吐

橘紅半夏湯 治脾胃虛寒嘔吐

薑末散 治脾胃虛寒嘔吐

錢氏益黃散 治脾胃虛寒嘔吐

加味四君子湯 治脾胃虛寒嘔吐

吃嘔

丁香散 治脾胃虛寒嘔吐

羌活散 治脾胃虛寒嘔吐

一方 治脾胃虛寒嘔吐

旋覆花湯 治脾胃虛寒嘔吐

二母散 治脾胃虛寒嘔吐

經效方 治脾胃虛寒嘔吐

喘急

奪命散 治脾胃虛寒嘔吐

二味參蘇飲 治脾胃虛寒嘔吐

天德堂

五苓散 治霍亂

白朮散 治霍亂

附子散 治霍亂

蒲黃散 治霍亂

開胃散 治霍亂

石蓮散 治霍亂

天德堂

五味子湯治產後

見眠凡治產後傷風

大補湯治產後百日外

鼻衄

加味參蘇飲

濟陰綱目目錄

卷之十四

泄瀉

調中湯治產後腸胃虛怯

草薢理中丸治產後元氣虛弱

神效參香散治產後脾胃虛寒

痢疾

淋陰綱目

救急散治產後赤白

白頭翁加甘草阿膠湯治產後

黃連丸治產後熱滑赤

一方治產後血不止餘血

神仙感應丸治產後固無積滯

連翹丸治產後久病不愈

三聖散治產後血不止

治產後諸病雜方

必效方治產後諸病

經驗方治產後諸病

大便秘澀

調導散治婦人產後產前

旋覆花湯治產後傷風

六君加失笑散治產後嘔急

天德堂

如味四君子湯治產後

槐連四物湯治產後熱滑血

神效參香散方證見前

治產後血痢雜方

經效方治產後久病

七味白朮散治產後痢止

治產後血痢雜方

經效方治產後久病

七味白朮散治產後痢止

治產後血痢雜方

經效方治產後久病

七味白朮散治產後痢止

滋腸五仁丸治產後血氣虛損

麻蘇粥治產後自汗多則

兵部手集方治產後秘結不通

大小便不通

通氣散治產後大便不通

枳殼丸治產後大便不通

金鑰匙散治產後大便不通

遺尿

補遺方治產後遺尿

加味補中益氣湯治產後虛寒

四神丸治產後遺尿

廣濟方治產後遺尿

淋陰綱目

淋閉

茅根湯治產後諸淋無問

滑石通淋散治產後小便赤澀

石膏散治產後小便赤澀

一方治產後小便赤澀

療卒不得小便方

灸臍法治產後小便不通

小便數

桑螵蛸散治產後陽氣虛弱

補遺方治產後小便數

小便不禁

千金方治產後小便不禁

阿膠枳殼丸治產後大便

桃仁散治產後血氣

一方治產後血氣

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

還少丹治產後遺尿

五味子散治產後遺尿

集驗方治產後遺尿

鷄內金散 治產後溺

廣濟方 治產後小

黃耆當歸湯 治產後尿不禁面微浮

補腎飲 治產後傷動肝腎

固腎散 治產後尿不禁

小便出血 治產後血

血餘散 治產後血

滑石散 治產後小

崔氏方 治產後血

補遺方 治產後小

大便出血

的奇散 治產後惡露不行

加味清胃散 治因胃火積熱

加味八珍湯 治產後血

當歸黃耆散 治產後陰脫

當歸散 治產後血

加味四物湯 治產後血

硫黃散 治產後血

馬椒湯 治產後血

寸金散 治產後血

復元湯 治產後血

一方 治產後血

又方 治產後血

丹溪方 治產後血

雜方 治產後血

又方 治產後血

灸法 治產後血

產門不開腫痛

十全大補湯 治產後血

硫黃湯 治產後血

飲陰法 治產後血

當歸湯 治產後血

一方 治產後血

桃仁膏 治產後血

一方 治產後血

萬應丸 治產後血

乳汁不行

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

通草湯 治產後血

漏蘆散 治產後血

秘傳湧泉散 治產後血

羅氏湧泉散 治產後血

湧泉散 治產後血

產寶方 治產後血

胡桃散 治產後血

皂角散 治產後血

張氏方 治產後血

三露散 治產後血

加味四物湯 治產後血

當歸補血加葱白湯 治產後血

通脈散 治產後血

通乳湯 治產後血

一方 治產後血

精蹄湯 治產後血

立效散 治產後血

又方 治產後血

鍾乳散 治產後血

雜方 治產後血

鍾乳散 治產後血

乳汁自出

鍾乳散 治產後血

漏蘆散 治產後血

鍾乳散 治產後血

一方 治產後血

鍾乳散 治產後血

吹乳癰腫

鍾乳散 治產後血

消毒飲 治產後血

鍾乳散 治產後血

一方 治產後血

鍾乳散 治產後血

內托升麻湯 治產後血

鍾乳散 治產後血

清肝解鬱湯 治產後血

鍾乳散 治產後血

一方 治產後血

鍾乳散 治產後血

丹溪方 治產後血

鍾乳散 治產後血

一方 治產後血

鍾乳散 治產後血

治乳癰方

鍾乳散 治產後血

復元通氣散 治產後血

鍾乳散 治產後血

神效瓜蒌散 治產後血

鍾乳散 治產後血

神效瓜蒌散 治產後血

鍾乳散 治產後血

神效瓜蒌散 治產後血

鍾乳散 治產後血

神效瓜蒌散 治產後血

鍾乳散 治產後血

神效瓜蒌散 治產後血

鍾乳散 治產後血

究源五物湯 治乳癰疔發背

橘香散 治乳癰已結未結痛

一方 治乳癰

二灰散 治乳癰不消熱毒

獨勝散 治乳癰不消熱毒

又方 治乳癰

一方 治乳癰

葱熨法 治乳癰

一方 治乳癰

雜方 治乳癰

乳妬

連翹湯 治產後乳妬

一方 治乳妬

天麻湯 治乳妬

飛鳥散 治乳妬

黃連胡粉膏 治乳妬

鹿角散 治乳妬

補遺方 治乳妬

乳癰

青皮散 治乳癰

益氣養榮湯 治乳癰

木香餅 治乳癰

乳癰

乳癰

括莖散 治乳癰

補遺方 治乳癰

通和湯 治乳癰

夜陰散 治乳癰

一方 治乳癰

勝金丹 治乳癰

敷乳方 治乳癰

一方 治乳癰

柳根熨法 治乳癰

瓜蔓散 治乳癰

赤龍皮湯 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

一方 治乳癰

濟陰綱目卷之一

關中 武之望叔卿父輯著

西陵 汪 洪濟濟子箋釋

天都 在 望于 醫藥醫聞

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

○論經

薛立齋曰血者水穀之精氣也

和調五臟瀝陳六腑在男子則化

化液入心而

生血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

統血者脾氣

子 52-221

主亦藉肝氣... 爲精在婦人則上爲乳汁下爲月水故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁苦寒辛散之藥飲食亦然

○論經不調由風邪客於胞中  
陳氏曰婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脈經手太陽少陰之經蓋衝任之脈皆起於胞中爲經絡之海與手太陽少陰少陽心經爲表裏上爲乳汁下爲月水然月水乃經絡之餘苟能調攝得宜則經應以時矣

○論三月一來爲居經  
脈經云師曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可否者此爲居經三月一來曰寸口脈微而遲微則衛氣不足遲則血氣不

不月此則又無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言諸謬誤然小腸而通跌陽脈浮而滿滿則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣逆則失液少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒滿則血不來此爲居經三月一來○問曰婦人妊娠三月師脈之言此類人非經今月經當下其脈何類何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則少血孤陽獨浮陰不能吸二氣不停降榮竭陰爲積寒陽爲聚熱陽盛不調經脈不足陰虛陽往一作故令少血時發酒漸咽燥汗出或瘦弱數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故知非經而煩滿血月來一經三月一來陰盛則爲名曰居經

○論師尼算婦人子妻妾之治

盛地氣不足... 羅謙甫曰宋禧登療師尼算婦人別製方者蓋有謂也此二種居

○論調經當抑氣  
濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒哀思悲恐驚者七氣也七情以外益之以寒熱二證而爲九氣也氣之爲病男子婦人皆有之惟婦人血氣爲屬尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺吐逆不食甚則手足指搦狀類驚癇或作寒熱或爲癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而爲癆疾者多矣

○論調經先去病  
李氏曰月水循環織絡不作而有子若兼潮熱腹痛重則加之噤嗽汗嘔或瀉有汗則血愈消耗有咳嘔則氣往上行瀉則津偏於後痛則積結於中是以必先去病而後可以滋血調經就中熱疼痛尤爲婦女常病蓋血滯積入骨髓便爲骨蒸血滯積於中與日生新血相搏則爲疼痛血枯不能滋養百骸則蒸熱於外血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷外邪則爲疼痛

新理無餘論  
症極難察能  
悉此何患不  
良

○論調經大法

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不通之中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者若細推之不通之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前為血實經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒外因飲冷形寒蓋人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也大抵氣行血行氣止血止故治血病以

以經字推之  
則該者真  
幸母執也而  
為先為佐元  
所當知

○論經水異色

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅。稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經為氣之配因氣而行成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由病源論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑者北方水色

二公之說甚  
明

用証相參元  
妨的確

也紫淡於黑非冷而何乎曰經云尤則皆承乃制熱甚苦必兼水化所以熱則紫甚則黑也塊婦人性熱而見即欲加倍臍腹厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百而一二也

準繩云冷症外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱矣且寒則凝既行而紫黑故非寒也○葉氏曰血黑屬熱丹溪論善矣然風寒外乘者十中常見一二何以辨之蓋寒主引澀小腹內必時常冷痛經行之際或手足厥冷唇青面白唇脈或遲或微或虛或雖大而必無力熱則尺脈或洪或數或實或雖小而必有力於此審之可以得其情矣

李氏曰心主血故以色紅為正雖不對期而色正者其色紫者風也黑者熱甚也淡白者虛也或挾痰停水以混之也如米泔水如屋漏水如豆汁或帶黃混濁模糊者濕痰也成塊作片血不

變者氣滯也或風冷乘之也色變紫黑者血熱也大藥紫者四逆湯加防風白芷荆芥黑者四逆湯加升連香附淡白者芎歸湯加參芪白芍藥香附有痰者二陳湯加芩歸如煙塵者二陳湯加蒼朮防風蒼朮如豆汁者四物湯加升連成塊者四物湯加香附立胡索枳殼陳皮隨症選用

○論經候短期

王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽忽伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致

丹溪云經水不及期而來者血熱也。四物湯加本連香附。○肥人  
不及日數而多者痰多血虛有熱。南星白朮蒼朮黃連香附川芎  
作丸。○薛氏曰先期而至有因脾經血盛者宜加味逍遙散。○有  
因脾經鬱滯者宜歸脾湯。○有因肝經火者宜小柴胡湯加生  
地黃。○有因血分有熱者宜四物湯加柴胡牡丹皮山梔子。○有  
因勞役火動者宜補中益氣湯。  
丹溪云經水過期血少也用川芎當歸人參白朮兼痰藥治之。○  
過期色淡者痰多也。二陳湯加芎歸。○過期紫黑有塊血熱也。必  
作痛。四物湯加香附黃連。○薛氏曰過期而至有因脾經血虛者  
宜入參養榮湯。○有因肝經血少者宜六味地黃丸。○有因體虛  
而弱者宜八珍湯。  
論月水多少  
準繩云婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛者不  
審一例呼為經病。不知陽勝陰陰勝陽所以服藥無効蓋陰氣乘  
陽則已藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少  
而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢  
故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也。○陽勝陰月候  
多者當歸飲陰勝陽月候少者七沸湯。○又云經水過多為虛熱  
為氣虛不能攝血。○經水過少為虛為虛則補之。○經水過多  
脈經曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰會更下利  
若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水反少設經  
下多於前有當所若因當言恐大便難身無復汗也

○論月水不利  
良方云婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風令客於胞內傷  
於衝任之脈故也。若寸脈沉關脈沉是肝病也。兼主腹痛。孔叢生  
瘡尺脈滑血氣實經絡不利或尺脈絕不至兼主小腹引腰痛氣  
攻胸膈也。  
薛氏曰前證屬肝鬱二經滯肝相為表裏多因悲怒所傷。應若本  
經風熱用補肝散。○血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用  
六味丸。若患諸瘡瘍治見後。  
○論月水不期  
準繩云婦人月水不期淋瀝無時或因勞傷氣血而傷衝任或因  
經行而合陰陽皆令氣虛不能攝血。若時止時行腹痛脈沉細此  
寒熱邪氣客於胞中非因虛弱也。○薛氏曰前証若經水不期  
歸脾湯。毒怒傷肝用逍遙散。肝火妄動用加味四物湯。○經水不  
用六君子湯。元氣下陷用補中益氣湯。熱傷元氣前湯加五味麥  
門冬。妙藥黃藥。  
○論過期不止  
產寶云男子生於寅寅屬木陽中有陰故男子得八數女子生於  
申申屬金陰中有陽故女子得七數。男以氣為主八八則卦數已  
盡。女以血為主七七則卦數已終。終則經水絕。衝任脈虛衰天癸  
絕地道不通而無子矣。或勞傷過度喜怒不時經脈衰微之際又  
為邪氣致衝所以當止不止而崩下也。許學士云婦人經脈過  
期不止腰腹疼痛或七七數盡而月經下者宜用當歸散治之



此宜用十  
全大補丸  
婦人參養  
湯之病

○論經病疼痛

達實云經水者行血氣通陰陽以榮於身者也氣血盛陰陽和則  
形體通或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲  
行身體先痛也此論

良方云婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷於太陽少陰

經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁生地

黃通經丸方見若血結而成塊用萬病丸

丹溪云經水將來作痛者血實也一云氣滯四物湯加桃仁香附

黃連○臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血四物湯加紅花桃仁

義術玄胡索木香有熱加黃芩柴胡○經行後作痛者血氣俱虛

也以八珍湯加減服○戴氏曰經事來而腹痛者經事不來而腹

痛者皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加吳茱萸

半錢香附子一錢和氣飲加吳茱萸半錢亦可痛甚者玄胡索湯

然又恐感外邪傷飲食致痛痛不因血尤宜詳審和氣飲却能兼

治因冷而積因積而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用

汪石山治一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後隨行腹痛

惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按洪洪而

滑此血熱也或謂惡寒如此何謂為熱曰熱極似寒也遂用酒煮

黃連四兩香附歸身尾各二兩五錢脂一兩為末粥丸空腹吞之

而愈

○一婦年二十一歲六月經行腹痛如割難忍求死脉得細數而

駛尺則沉弱而近駛注曰細軟屬虛數則為熱尺沉屬虛也

以

此全以麻

主不寒亦非

此藥可全

思致工大

進

靈驗者

酒黃連半兩炒香附六兩五錢脂半炒半生三兩歸身尾二兩  
為末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得一子後屢服  
屢幼歷十五年後前藥罔効汪復診之脉皆洪滑無力幸其尚有  
精神汪曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始為熱中  
終為寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛陽竭當作寒治  
且始病時而形飲小今則形肥大矣舊曰瘦入血熱肥入血虛豈  
可同一治也所可慮者汗大泄而脉不為汗衰血大虧而脉不為  
血減耳其痛日重夜輕知由陽虛不能健運故亦擬清而痛以  
証察脉宜用助陽若得脉減痛輕方為佳兆遂投參桂湯以  
加桂附一貼來早再診脉皆稍寧服至三三貼痛且愈蓋痛由  
始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可  
一而通治哉

○論經病發熱 附客熱  
李氏曰潮熱有時為內傷為虛無時為外感為實虛者大溫經湯  
熱者四物湯加柴胡黃芩經閉者滋血湯滑甚者大崩連丸大烏  
雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者桂枝湯心湯有汗  
者逍遙散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經  
後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加生地黃此藥加減  
為退熱聖藥尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料加便炒黃  
芩一兩四製香附一兩蜜丸服

○吳養山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不効以四  
物加胡黃連三服而愈

此係傷風反  
兩月一度上  
休以來

○薛新甫治一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反  
兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如閉新散薛曰脾為  
諸陰之首目為血脉之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於胃矣  
遂用補中益氣湯生歸脾二湯專主脾胃年餘尋愈大全云客熱  
者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上  
無胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

容和而中  
無須須心  
休認用相  
泰必其者  
方可不熱  
經實之  
薛氏曰前證若客邪所侵補中益氣加川芎防風肝虛血少夫味  
地黃丸胃火伏冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散潮熱時熱  
入珍湯肺熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣湯毒熱發熱小柴  
胡湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

論往來寒熱

濟陰綱目 卷一 潮熱

有熱入血室  
之象  
諸症皆見在  
少則經用此  
湯此經多氣  
少血因爲不  
用當歸赤芍  
生地  
經水適來適斷或有信來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後以  
四物湯和之○薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口  
苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治  
之諸病悉退

大全云師尼與婦與室女出嫁適期者多因慾心而不遂慄慄  
成病乍寒乍熱久則爲勞又有經閉白淫痰涎頭風腦氣痞悶面  
癯瘦瘡等證皆鼻婦之病也○薛氏曰前證若肝脈弦出魚際用  
小柴胡加生地黃送下生地黃九久而血虛佐以四物湯○若兼  
怒動肝火而寒熱者佐以加味逍遙散○一婦人因夫經期久不  
歸發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥反潮熱內熱自汗盜汗  
赤是正注大  
約其京望變  
又與治本通  
月經頻數余曰熱汗氣血虛也經頻肝脾虛也用歸脾湯大味凡

邪入血分  
發狂者且  
煩躁內解  
多恐悲之  
故云然

而愈  
論熱入血室

良方云婦人傷寒傷風發熱經水適來甚則安靜暮則譫語有如  
瘧狀此爲熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若  
脈遲身涼當刺期門穴下鍼病人五吸停鍼良久徐徐出鍼凡鍼  
期門穴必瀉勿補肥人二寸瘦人寸半也

凡遇此症須  
當問此

○許學士治一婦人病傷寒發熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽  
然昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰  
得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一  
二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從曰昨不省人事許曰此乃熱  
入血室証仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來甚則明子藥則

濟陰綱目 卷一 潮熱

本傳

嚴語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以邪刺之  
遂致胸膈不利涎潮上脫喘急息高昏冒不知人當先化其痰後  
除其熱乃急以一呷散投之兩時頃頃下得睡省人事次投以小  
柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣

使不能或  
用能仁本  
台小柴胡亦  
可

○一婦人患熱入血室証醫者不識用補血調氣藥治之數日遂  
成血結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無已用期  
門穴斯可矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或問熱入血室  
何爲而成結胸也許曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇  
經水適來適斷邪愈乘虛入於血室血爲邪所迫上入肝經肝受  
邪則譫語而見鬼復入胆中則血結於胸中矣何以言之婦人平  
居水養不血養肝方水受孕則下行之爲月水既孕則中商之以

於胎及已產則上壅之以為乳皆血也今邪逐血併歸於肝經痰

於胆中結於乳下故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也

○虞恒德治一少婦夏月行經得傷寒似瘧諸語狂亂諸醫皆以

傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨反如風狀次以牛黃

丸金石之藥愈投愈劇一日延虞診視脈弦而大虞思傷寒內熱

狂亂六陽俱病豈不口乾舌黑况脈不數病體稠之或熱或靜其

腹急痛意必有內傷在前傷寒在後今傷寒得汗雖已內傷則尚

存故也因細問之患者曰正行經時因飲食後多汗用冷水沐浴

因得此証方知冷水外閉其汗內阻其血邪熱入室經血未盡血

得邪熱乍靜乍亂寒熱語語掉眩類風須得玉燭散下之而愈下

後諸語已定次以四物小柴胡湯調理五日熱退身涼患遂瘳

濟陰綱目 卷一 婦人 五德堂

以脈六七至 行義云一婦人溫病已十二日論之其脈六七至而漸寸稍大尺

稍小發寒熱煩赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬

少陽熱入血室也苦治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服

之二日又與小柴胡湯加官桂乾薑一日寒熱遂止又云臍下急

痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脈漸勻尚不了了乃復與

小柴胡湯次日但胸中熱躁口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利

次日心下痛又與大陷胸湯半服利三行次日虛煩不寧時妄有

仲景方 薛立齋治一婦人懷抱素鬱感冒經行諸語服發散之劑不應

用寒涼降火前證益甚更加月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎

自出此脾胃虛寒用香砂六君子脾胃漸健諸證漸退又用歸脾

湯而全愈 論經行世 汪石山治一婦人經行必瀉三日然後行診其脈皆濡弱此脾虛也

脾虛血弱經水將動脾血先已流注血海然後下流為經脾血

既虧則虛而不能運行其氣令作參苓白朮散每服一錢一日米

飲調下二三次月餘經不瀉矣 ○一婦年逾四十形長色脆病經不行右脈浮軟而大左脈虛軟

不運之說欠 而小近馴常時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴汗多因

泄一月六月復因洗浴發泄六七次雖止而神思不爽至八月

盡而經水過多白帶時下瀉泄瀉右腳疼痛舊曾閃脚脚跟今則

假此延痛痛腿腰膝竹頭項右邊筋脈皆掣痛或咳嗽一節則

腰痛如腰札日輕夜重叫號不已幸痛稍止飲食如常今詳月

水過多白帶時下日輕夜重瀉泄無時亦屬下多亡陰宜作血虛

府證之變治法殊常故記之

○脈法

脈經曰尺脈滑血氣實婦人經脈不利。○小陰脈弱而微微則少血。○寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血。○脈來至狀如琴弦苦少腹痛主月水不利孔竅生瘡。○肝脈沉主月水不利腰痛。○尺脈來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也。○經不通繞臍寒疝痛其脈沉緊此由寒氣客於血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏故痛。

○調經通用諸方

四物湯 治婦人衝任虛損月水不調經病或前或後或多或少或臍腹痛或腰足中痛或崩中漏下及胎前產後諸證服之

濟陰綱目

卷一

天德堂

益榮衛滋氣血若有他病隨證加減

當歸 治血虛血弱如血虛

川芎 治血滯不通如血滯

芍藥 治血不和如血不和

熟地黃 治血不足如血不足

右列各等分每服四錢水煎服 春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃

冬倍當歸 天春生夏長秋收冬藏者四時生功之物也物順四時

冬倍當歸而為生則人身之氣血亦順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

時物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

若其物易者無時而生則人身之氣血亦不順四時而為升沉矣若四

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黃

若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合

若風眩暈加秦艽羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力庭然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合

氣之藥加平當

若發熱而煩不能睡臥者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脈微白汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合

濟陰綱目

卷一

天德堂

若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合

若婦人筋骨肢節疼及頭痛脈弦當寒如瘧宜治風六合四物湯

加羌活防風

若血氣上衝心腹脇下滿悶宜治氣六合四物加木香檀榔

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合四物加玄胡索

練

若氣衝經脈月事頻併臍下多痛宜倍芍藥加黃芪

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血濕也加玄胡苦練沙木香

橫

若婦人血虛腹痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯

補下元加乾薑甘草

氣榮小腹痛加玄索

若腹中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥

若腹痛作發經脈不快加熟地黃一倍添桂心半倍

經行腹痛腰背痛加雲薑牛膝紅花吳茱萸荳蔻甘草銀器煨心

若經水澀少加葵花煎又加紅花血見愁

若經水少而色和者倍加熟地黃當歸

若經水暴下加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連

經水過多別無餘證宜黃芩六合湯四物湯黃芩白朮等分

經血淋漓不斷加乾薑蓮房炒入藥

濟陰綱目

天

天

安合經行法

陰陽交合經脈行加赤石脂黃芩肉桂百草藉藕節敗櫻灰肉豆

菴當歸木香龍骨白茯苓白朮地榆

若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱

後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變証表邪猶在不

能效也依前論中變証隨証用藥調治

若血崩者加生地黃蒲黃

補血住崩加百草霜櫻灰首烏蘇灰蒲黃炒過龍骨白蘇

血成片加地黃藕節血黑片加人參白朮

若血臌虛冷崩中去血過多加阿膠艾

月水不調血崩或多或少或前後嘔逆心膨加陳艾黃芩心膨宜香

若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半

四物湯為細末蜜煉九梧子大空心米飲湯下三四十丸治高年婦人白帶良驗如白淫濁加龍骨地黃當歸如濁下五色研麝香好酒下如鮮紅溫酒鹽湯下如帶下加肉桂蒲黃百草煎甘草煎

豆白朮玄胡索白藕龍骨空心鹽酒下如白帶加白龍骨酒下

若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆各等分

若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分王右肅云熟地黃

滯血安能止痛不若以五靈脂代之

血滯不通加桃仁紅花

經閉加枳殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子

車前子

血寒加甘草烏梅柴胡柳枝

濟陰綱目

天

天

野孝入藥

月經久閉加肉桂甘草黃芩黃芩子木通紅花

月水不通如野草根牛膝紅花蘇木舊酒小同煎血氣不調加吳

葉萸等分甘草減半

諸虛不足加香附子

四物湯加甘草半兩為細末煉蜜九每兩作八丸酒醋共半盞煎

湯同化調下各當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一服無

時

若虛熱病四物湯與參蘇飲相合名補心湯主之添柴胡名五神

湯大能補虛退虛熱

潮熱加黃芩地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參

虛熱口乾加麥門冬黃芩

老弱寒熱力草生者牡丹皮紫胡

赤眼生風加防風黃芩

<p>風濕赤腫加荆芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒          腳腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮          若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者加黃芪白朮茯苓甘草宜          八物湯</p>	<p>以有汗入桂          若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽          經病宜表虛六合湯四物湯桂枝地骨皮          若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太陽經病宜表實六合四物          湯麻黃細辛          若妊娠傷寒中風濕之氣脈節煩疼脈浮而熱頭痛此太陽標病          也宜風濕六合湯四物湯防風蒼朮          若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合四物          湯陰綱目          若妊娠傷寒胸膈滿痛脈弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯          柴胡黃芩          若妊娠傷寒大便難小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急          下之宜大黃六合四物湯大黃桃仁          若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止宜入參六合四物湯人參五味          子          若妊娠傷寒汗下後虛弱脈微者陽明本虛也宜厚朴六合小治          嗽喘喘滿四物湯厚朴枳實          若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合四物湯梔子黃芩</p>	<p>合升麻湯          合小柴胡          合桃仁承氣          以咳嗽而用          人參五味          古難之此          在汗下後二</p>
---	--	--

<p>若妊娠傷寒身熱大渴發熱而煩脈長而大宜石膏六合四物          湯石膏知母          若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合四物湯茯苓澤          瀉          若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合四物湯          琥珀茯苓          若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合四物湯          阿膠艾          若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜          附子六合四物湯附子          若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯四物湯加          濟陰綱目          生地黃大黃          四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆黃芩承氣涼膈等皆可作          各半湯不能殫述此易老用藥大略也          安胎及漏下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過          若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末黃          耆減四味之半當歸只用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉          以水四盞熟艾六塊如鷄子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分          作四服一日令盡一方加粉草乾姜黃芪日二三服至二臘七日          加阿膠艾葉水煎服名六物湯胎前產後每日可一二服亦治血          刺不止腹痛難忍</p>	<p>合白虎湯          合四苓          非仲景法          仲景無此          此仲景法          所謂有故無          損也</p>	<p>以胎前而加          黃耆何也</p>
---	---	--------------------------------

用石膏不可輕

產後傷風頭痛加石膏等分甘草半

藍水煎服○如冷去黃芩加肉桂○一方有熟地黃  
增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血溫經駐顏



<p>此藥翁先生</p> <p>交感丹法也</p> <p>氣與有餘方</p> <p>可用</p> <p>配四物更佳</p> <p>有熱者須加</p> <p>條黃</p>	<p>一變也白</p> <p>水溫而丹</p> <p>皮地骨和清</p> <p>肌骨之藥</p> <p>溫字忌燥</p> <p>既曰溫經何</p> <p>為又治諸熱</p> <p>証也諸細詳</p> <p>之不如無</p> <p>基有謂矣</p>	<p>當歸 川芎 芍藥 熟地黃 白木</p> <p>牡丹皮 各一錢</p> <p>地骨皮 一錢</p> <p>右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服</p> <p>大溫經湯 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或</p> <p>崩中夫血過多或損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱金皆治</p> <p>之此溫劑內</p> <p>當歸 去蘆 川芎 人參 阿膠 碎炒 肉桂 去麋</p> <p>白芍藥 炒 吳茱萸 湯 牡丹皮 甘草 炒各</p> <p>麥門冬 去心 二錢 半夏 生薑 湯泡七</p> <p>右到作一服加生薑五片水煎食前稍熱服</p> <p>嚴氏抑氣散 治婦人氣盛於血變生諸證頭暈胸滿</p> <p>香附子 四 陳皮 二 扶神 去木 甘草</p> <p>右為末每服二錢食前湯調下</p> <p>四製香附丸 治婦人女子經候不調</p> <p>香附子 搗去皮一分分作四分好酒浸一分鹽水浸一分童</p> <p>右為細末醋糊丸如桐子大每服七十丸空心食前酒下附</p> <p>子血中之氣藥也開鬱行氣而血</p> <p>自調何病不愈婦人宜常服之</p> <p>十味香附丸 治婦人經候不調</p> <p>香附 四 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各四</p> <p>白木 澤蘭葉 陳皮 各二 黃柏 炒 甘草 炙各</p> <p>右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心塩湯下</p> <p>九味香附丸 治婦人百病皆宜</p>
--	---	--

<p>而涼下此以</p> <p>茵陳而溫下</p> <p>白木又倍于</p> <p>前別是一種</p> <p>意見不可不</p> <p>有</p>	<p>艾少行有之</p> <p>外陳石補酸</p> <p>滋陰是固經</p> <p>之藥</p> <p>藥弱者先天</p> <p>之氣弱也血</p> <p>生于氣自生</p> <p>于下致崩漏</p> <p>地為君人參</p> <p>佐之以生下</p> <p>無之氣使陰</p> <p>氣旺而生血</p> <p>也臣以烏梅</p> <p>以生液而散</p> <p>血入肝夫其</p> <p>生矣叙矣而</p> <p>不為流行之</p> <p>則血凝而不</p> <p>通故以烏梅</p> <p>為便其散矣</p>	<p>艾附煖宮丸 治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮寒冷</p> <p>香附 四 艾葉 醋浸炒 當歸 川芎 白芍藥 炒</p> <p>生地黃 各一斤 玄胡索 炒 甘草 生用</p> <p>為細末醋糊丸如桐子大每服七八十丸米湯酒任下</p> <p>百子歸附丸 調經養血安胎順氣胎前產後及月事參差有餘</p> <p>不足諸證悉治久服有孕</p> <p>香附 四 製 阿膠 碎 艾葉 當歸 酒 川芎</p> <p>芍藥 炒 熟地黃 酒洗各</p> <p>右為末用陳石榴一枚連皮搗碎煎水打糊丸如桐子大每服</p> <p>百丸空心淡醋湯下</p> <p>人參養血丸 治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝任調經候</p> <p>暖下元生血氣</p> <p>熟地黃 五 烏梅肉 三 當歸 二 人參 川芎</p> <p>赤芍藥 蒲黃 炒各</p> <p>右為細末煉蜜丸如梧子大每服八十丸溫酒米飲任下</p> <p>當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛</p> <p>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各半 牡丹皮</p>
---	--	---

<p>玄胡索 各二 人參 黃芪 各一分</p> <p>右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前米飲下</p>		<p>○治經候先期</p> <p>先期湯 治經水先期而來宜涼血固經</p> <p>當歸 白芍藥 生地黃 黃藥 知母 炒各</p> <p>條芩 黃連 川芎 阿膠 炒各</p> <p>香附子 甘草 各七分</p> <p>右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服</p>		<p>金匱土瓜根散 治帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者</p> <p>土瓜根 芍藥 桂枝 廬蘞 各七分</p> <p>右四味搗為散酒服方寸七日三服</p>		<p>○治經候過期</p> <p>過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當補血行氣</p> <p>當歸 白芍藥 熟地黃 香附 各二 川芎 各一</p> <p>紅花 桃仁 泥分 蓬莪茂 木通 各五分 甘草 四分</p> <p>肉桂 分</p> <p>右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服</p>		<p>滋血湯 治婦人血虛損血脈虛弱月水過期</p> <p>人參 黃芪 山藥 各一 白茯苓 各一</p> <p>川芎 白芍藥 熟地黃 各一</p> <p>右作一服水二鍾煎至一鍾食前服</p>		<p>○治經水過多</p>	
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------	--

<p>當歸飲 治經水過多</p> <p>當歸 酒 川芎 白芍藥 熟地黃 酒 白朮</p> <p>黃芩</p> <p>右到水煎服○如久不止成血崩者加阿膠 炒 山梔子 炒 地榆 荆芥 甘草或再不止更加搗茅根汁磨墨同服</p>		<p>恩艾湯 治勞傷氣血衝任虛損相水過多淋瀝不止及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動下血並治</p> <p>熟地黃 白芍藥 各一 當歸 艾葉 各七分 阿膠 炒</p> <p>川芎 甘草 各五分</p> <p>右到水煎服 一方加地榆黃芪</p>		<p>丹溪方 治婦人稟受弱氣不足極血故經水來多</p> <p>白朮 一錢 黃芪 生 陳皮 各一 人參 五分 甘草 二分</p> <p>右到水煎服</p>		<p>○治經水過少</p> <p>七沸湯 治榮衛虛經水過期或過或少腹痛一云陰虛陽虛少者用此</p> <p>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 蓬朮</p> <p>川薑 木香 各等分</p> <p>右每服四錢水一盞半煎至八分溫服</p>		<p>四物加莢花湯 治經水過少</p> <p>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 莢花 各一</p> <p>一升又加紅花血見愁</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

妙在色和二 字尤妙在如 後二物	右到水煎服	四物湯加熟地黃當歸湯 治經水少而色和 四物湯 <small>再熟地黃</small> 當歸 <small>各一兩</small>	右每服一兩水煎服	○治月水不利	牛膝散 治月水不利。臍腹作痛。或小腹引腰。氣攻胸膈。 牛膝 <small>酒洗</small> 桂心 赤芍藥 桃仁 <small>去皮</small> 玄胡索 <small>炒</small> 當歸 <small>酒洗</small> 木香 牡丹皮 <small>各七錢半</small>	右為細末每服三錢空心溫酒調下或五六錢水煎亦可	牡丹散 治月候不利。腹臍疼痛。不欲食	牡丹皮 大黃 <small>炒</small> 赤茯苓 桃仁 當歸	濟陰綱目 卷一 調經通月諸方 天	生地黃 桂心 赤芍藥 白朮 <small>各七錢半</small> 石菖蒲 <small>去毛</small>	木香 各五錢	右吹咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分空心溫服	養榮湯 治婦人血海虛弱。心中恍惚。時多驚悸。或發虛熱。經候不利	當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 青橘皮	薑黃 川薑 五加皮 牡丹皮 海桐皮	白芷 各等分	右到每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一盞溫服不拘時	玄歸散 治月經壅滯。臍腹滿痛
-----------------------	-------	---	----------	--------	--	------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	---	--------	-----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------	-----------------------------	----------------

此方以生地 為主而兼藥 止用一分又 無補氣之藥 者要知此	當歸 玄胡索 各等分	右為粗末每服三錢加生薑三片水煎稍熱服 歸脾丸 治月經不利。臍下微逆。氣腹滿	當歸 四錢 乾漆 <small>三錢</small> 令細盡	○治月水不降	止經湯 治婦人困倦。多睡。少食。經水時時淋瀝。或成片。或下赤白黃水。面色青黃。頭眩目花。四肢酸疼。此證急宜調理。免致崩漏	當歸 川芎 白芍藥 <small>炒</small> 熟地黃 <small>各一兩</small> 白朮	黃芩 阿膠 <small>炒</small> 蒲黃 <small>炒</small> 栝葉 <small>各七錢</small> 香附 <small>一兩</small>	濟陰綱目 卷一 調經通月諸方 手	砂仁 甘草 各五分	右作一服。加生薑三片。水煎空心服	蒲黃散 治血經不止	黃芩 五分 當歸 栝葉 蒲黃 <small>各四錢</small> 生薑 <small>二分</small>	艾葉 一分 生地黃 二十四分 伏龍肝 十二分	右吹咀。用水二升。煎取八合。分二服	固經丸 治經水過多不止。乃陰虛挾熱所致。法當補陰清熱	黃芩 白芍藥 各三兩 黃芩 二兩 梔子 四兩	梔根皮 香附子 各一兩半	右為細末酒糊丸。桐子大。每五七十丸。白湯下	○治過期不止
--	------------	--	--------------------------------	--------	--	--	---	------------------	-----------	------------------	-----------	--	------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	--------

本心丸 治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止

止

黃芩 心枝條二兩米泔浸七日  
炙乾又浸又炙如此七次

右為末醋糊丸如桐子大每服七十丸空心溫酒下日進二服

補中葯湯 治風虛冷熱勞傷任月水不調崩中暴下產後

失血過多虛麻腹痛或妊娠胎動下血

當歸 乾薑 地各 熟地黃 黃芪  
三兩 三兩 各 各

人參 杜仲 炒 吳茱萸 炮 甘草 炙 各一兩

每服三錢水一鍾半煎至一鍾空心服

拜附湯 補衝任調血氣

乾薑 鹿茸 三兩 當歸 牡蠣 各兩 附子 二兩

清陰綱目 卷一 調經通用方 三十 天

肉桂 龍骨 生 防風 各一兩

右每服半兩水二鍾煎八分溫服

右二方寒者宜之熱亦有血海虛寒而不禁者

○治經病疼痛

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨 五 當歸 芍藥 白朮 茯苓  
甘草 續斷 防風 白芷 蘇本

附子 各三錢

右為粗末每服五錢水二鍾生薑五片煎三枚煎至一盞不拘

時服此治身痛之劑

八物湯 治經事將行臍腹絞痛者氣滯血凝故也

此身痛故其法如此如身痛腹痛自是不同

前四味是血 後四味是氣 有氣血不可 不知

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 玄胡索

苦陳 一錢 不香 檳榔 各五分

右作一服水煎食前服

加味四物湯 治經水將來作疼不止

當歸 酒洗 川芎 各一錢 芍藥 炒 熟地黃 玄胡索

蓬朮 香附 醋煮各一錢 砂仁 八分 桃仁 七分

紅花 酒炒 五分

右到水煎服

烏藥湯 治血海疼痛

烏藥 一錢 香附 二錢 當歸 一錢 桂香 甘草 各五分

右到水煎服

清陰綱目 卷一 調經通用方 三十 天

加味烏藥湯 治婦人經水欲來臍腹痛

烏藥 縮砂 本香 玄胡索 各一兩

香附 炒去毛 甘草 炙 各一兩

右細到每服七錢生薑三片水煎溫服

瘧疾煎丸 治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈○惡心前

宜服之

香附子 炒去毛不拘多少米醋煮一日用瓦燒乾令醋盡

右為末醋糊丸如桐子大晒乾每服五十九丸淡醋湯下

已上三方行滯氣之劑

薑黃散 治血凝久冷月水不調及瘀血凝滯臍腹刺痛

薑黃 白芍藥 炒 三當歸 牡丹皮 玄胡索 各二兩

此與加味四

<p>川芎 蓬木 官桂 紅花 各一兩</p> <p>右劉每服一兩水二盞酒少許同煎食前服</p> <p>晚珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不食氣絕欲死者</p> <p>京三稜 蓬朮 赤芍藥 劉寄奴</p> <p>牡丹皮 熟地黃 眞蒲黃 當歸</p> <p>官桂 菊桂 各一兩</p>	<p>右前五味用烏豆一升生薑半切片米醋四升同煮至豆爛爲度焙乾入後五味同爲細末每服二錢溫酒調下空心食前服○本事云一方不用菊桂蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服</p> <p>濟陰綱目 卷一 調經通經方 五</p> <p>尤佳予前後救人急切不少亦宜多合以濟人</p> <p>玄胡索散 治血氣攻刺疼痛及新舊虛實腹痛</p> <p>當歸酒 赤芍藥 玄胡索 蒲黃 桂皮</p> <p>乳香 木切 沒藥 各一</p> <p>右爲細末每服三錢溫酒空心服</p> <p>當歸散 治婦人久積血氣痛小便刺痛四肢無力</p> <p>當歸 赤芍藥 劉寄奴 枳殼 蘇炒</p> <p>玄胡索 沒藥 各等分</p> <p>右爲末熱酒調下二錢不拘時服</p> <p>經驗方 治婦人臍腹疼痛不省人事只一服立止人不知者是心氣痛誤矣</p>	<p>用乳投以通氣血之滯亦更進一步法也</p> <p>用烏藥玄胡索</p> <p>此神品藥也而本方之加減更精</p> <p>別方琥珀散有琥珀本方用又無之亦覺其功而倍名耳</p> <p>而本方之加減更精</p> <p>功在去瘀脂然必在之藥一通一散皆有妙用</p>
---	--	--

<p>木通皮 芍藥 五靈脂 各等分</p> <p>右咬咀每服五錢醋水各半盞煎七分溫服</p> <p>二神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛引心疏經行滯少或經事不調以致疼痛</p> <p>楠紅 玄胡索 去皮 當歸 各一兩</p> <p>右爲細末酒煮米糊爲丸如梧桐子大每服七十丸加至百丸空心艾湯送下米飲亦可</p>	<p>交加散 治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚爲瘕及產後中風</p> <p>生地黃 生薑 各五兩 各研取汁</p> <p>右交互取汁浸沽一久汁盡爲度各炒黃末之尋常腹痛酒調下三錢產後尤不可缺</p> <p>濟陰綱目 卷一 治通經不止 五</p> <p>交加散 治榮衛不和月事湛濁逐散惡血治臍腹撮痛腰腿重墜</p> <p>生薑 二斤 搗取汁存滓用 生地黃 二斤 搗取汁存滓用 白芍藥 當歸 玄胡索 醋紙包煨熟 蒲黃 各一兩 桂心 兩 紅花 血炒無忌 沒藥 半兩 另研各</p> <p>右將地黃汁炒生薑生薑汁炒地黃各焙乾同諸藥爲細末每服三錢溫酒調下 若月經不依常蘇木煎酒調下 若腰痛糖球子煎酒調下</p> <p>交加地黃丸 治婦人經不調血塊脹痞肚腹疼</p> <p>生地黃 老生薑 各一斤 俱另搗取汁有滓 玄胡索</p>	<p>此方與現理散不相上下而此有白芍似可</p> <p>相安爲用補不足也</p> <p>功在去瘀脂然必在之藥一通一散皆有妙用</p> <p>一方而有三藥此又變</p>
---	--	---

而為丸而沒  
藥肉桂為一  
家此以三友  
人參桃仁為  
一家亦不其  
相連開古人  
方須得古人  
藥法

升陽治血塊  
多用瓦龍子  
古方治血塊  
多用薑桂熱  
藥而此用大  
黃藥宜藥  
宜熱者如

即桂枝湯法  
也芍藥用赤  
者妙

要依此法  
縮子用藥亦

氣在少痛

當歸 川芎 芍藥 各二 明乳香

木香 各一 桃仁 去皮 人參 各半 香附 半

右為末。先以生薑汁浸地黃。薄以地黃汁浸生薑。厚晒乾。皆以  
汁盡為度。其十一味合一處晒乾。研為末。醋糊為丸。空心薑湯  
下。五七十丸。

左龍丸 治瘀血作痛。

香附 四兩 當歸 牡丹 桃仁 去皮 大黃 各二兩

川芎 紅花 各半 瓦龍子 煨醋煮一 晝夜二兩

右為末。炊餅丸。空心溫酒下三四丸。

已上諸方。行瘀血之劑。

桂枝桃仁湯 治經候前偶感風寒腹痛不可忍

濟陰綱目 卷一 治經病腹痛 辛 天

桂枝 芍藥 生地黃 各二 甘草 一錢

桃仁 去皮 七錢 甘草 一錢 婦人冬月經行偶值  
右為粗末。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。婦人冬月經行偶值  
不行腹痛不可忍。用此藥一劑而痛止。經復行。其効如神。

柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經預先腰膈痛甚則腹中亦

痛經縮二三日

柴胡 一錢 香附 各一 生地黃 一 丁香 四分

全蝎 洗 當歸 各一 生地黃 一 丁香 四分

右釗作一服水四盞煎至一盞去渣。稍熱食前服。

小溫經湯 治經候不調。臟腑冷痛。

當歸 附子 炮各等分

右吹吧每服三錢。水煎空心服。

沒藥 除痛散 逐寒邪療腹痛

蓬朮 煨一 當歸 玄胡索 五靈脂

肉桂 去粗 良薑 炒 蒲黃 炒 甘草 炙

沒藥 各半

右為末。每服五錢。溫酒服。

三上諸方。祛風冷之劑。

治經病發熱

逍遙散 治血虛煩熱。口燥咽乾。減食嗜睡。月水不調。又主榮衛  
不和。痰嗽潮熱。肢體痠痛。漸成骨蒸。

當歸 酒 白芍 炒 白朮 白茯苓

柴胡 各一 甘草 各五

濟陰綱目 卷一 治經病腹痛 辛 天

右加生薑三片。麥門冬二十粒。去心。水煎服。不拘時。○一方加

牡丹皮。梔子。炒。名加味逍遙散。○一方加知母。地骨皮。○有嗽

加桑白皮。貝母。桔梗。知母。麥冬。○咳血加生地黃。山梔。牡丹皮

○嘔吐加陳皮。半夏。旋覆花。○增燥加黃連。或麥冬。連二陳

湯

加味四物湯 治衝任虛損。月水不行。肌膚發熱。如勞瘵狀。

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 各一兩

柴胡 半 黃芩 二錢

右咬咀。每服八錢。水煎服。○如骨蒸。四物湯加地骨皮。牡丹皮

○一方四物湯加胡黃連。極苦。

六神湯 治血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食  
 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃芪  
 地骨皮 各一錢  
 右以咀水煎空心服  
 ○治往來寒熱  
 本方 治婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦  
 當歸 川芎 黃芪 甘草 白芍藥 熟地黃 黃芪  
 熟地黃 白芍藥 白朮 各二錢 柴胡 阿膠 各一錢  
 右為細末每服五錢水一盞水煎空心服白湯服亦得當示  
 不生帶下調血脈養子宮終身無病  
 地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或嘔或泄  
 地骨皮 柴胡 各一錢 白芍藥 熟地黃 黃芪 甘草 各一錢  
 前胡 黃芪 各五錢 白芍藥 熟地黃 黃芪 甘草 各一錢  
 白芍藥 甘草 五加皮 連翹 各一錢  
 右以咀每服三五錢水一盞半生薑三片煎七分服  
 柴胡散 治婦人寒熱體瘦腹痛乾心煩不飲食  
 北柴胡 赤茯苓 黃芪 白朮 各一錢  
 麥門冬 三錢 龍眼 二錢 人參 地骨皮  
 枳殼 生地黃 桑白皮 赤芍藥  
 桔梗 甘草 各五錢  
 右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾末拘時服  
 七寶湯 治寒熱往來

防風去風 知母 生地黃 各半 柴胡 去蘆  
 前胡 去蘆 秦艽 甘草 各二錢  
 右以咀每服五錢水一盞半加人參三分煎七分服  
 柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱此四物湯與小柴胡  
 湯合方也 日微有寒熱則似病未甚  
 當歸 川芎 芍藥 熟地黃 各一錢  
 柴胡 人參 黃芪 半夏  
 甘草 各三錢  
 右到每服一兩生薑三片水煎  
 柴胡抑肝散 治寒居獨陰無陽感心萌而冬不遂是以惡寒瘧  
 瘧證  
 柴胡 二錢 青皮 二錢 赤芍藥 炒 牡丹皮 各一錢  
 蒼朮 米泔炒 山梔子 炒 地骨皮 香附子 各一錢  
 神麴 八分 川芎 七分 生地黃 連翹 各五錢  
 甘草 二錢  
 右到一服水煎空心臨臥服  
 生地黃丸 治師尼寡婦寒熱如燔欲男子不得者  
 生地黃 二兩 赤芍藥 一兩 柴胡 黃芪 秦艽 各五錢  
 右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸煎烏梅湯吞下日三服  
 ○治熱入血室  
 小柴胡加地黃湯 治婦人中風發熱惡寒經水適來當則明爽  
 夜則謬語如見鬼狀發作有時此名熱入血室亦治產後惡露  
 血室虛邪聚

方來忽然斷絕

柴胡三錢 半夏 黃芩各二錢 人參一錢半

甘草五分 生地黃一錢半

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

四物湯用生地黃加柴胡煎服亦可

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧或狂言見鬼

柴胡一錢 桂枝三分 括囊根五分 牡蠣炒

乾薑炮 甘草炒各三分

右水煎服汗出而愈

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢半 硃砂 鬱金 牡丹皮各三錢

腦子 甘草各一錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服一丸新水化下

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及缺期門穴

海蛤 滑石 煅水 甘草各五 芒硝一兩

右為末每服二錢用鷄子清調下小腸通利其結血自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

重訂濟陰綱目卷之一終

濟陰綱目卷之二

吳興 金德生問風父輯著 金斗 張探振公武父訂正

西陵 汪 洪禧滴子箋釋 天都 查 望于周父參閱

○經閉

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消至啓玄註曰大腸

胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化

味不化則經不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣

愈消也又經曰月事不來者胞脈閉也胞脈屬於心絡於胞中今

陽明主肌肉氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服育

血不足則肌

方中五補丸後以衛生湯治脾養血也

○論經閉不行有三治宜補血瀉火

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致

經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈

津液所化津液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時見渴燥血海枯竭病

名曰血枯經絕宜瀉胃之熱熱補益氣血經自行矣此病或經適

行而有子子亦不成而為胎病者有矣此中熱也或心包絡脈洪

數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血

海乾枯宜調血脈除心包絡中火邪而經自行矣此中熱也或因勞

心火上上行月事不來者胞脈閉也胞脈者屬於心而絡於胞中

今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自

一症又當以



子 52-241

既有延年之  
其治

分其也

婦此法能  
李子和者則  
不可用此固  
是一法然面  
自虛者不宜

脉經云有一婦將一女子年十五時來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿怪後當自下此真氣猶法事賦素弱而然也宜固天元真氣使水升火降則五臟自和而經脉通矣

○論經閉因積冷結氣

要略曰婦人之病因虛積冷結氣為證經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結臍膈寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中病在關元脉數無瘕肌若魚鱗時着男子非止女身在下未多經候不勻令陰聖痛小腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼痛奄奄欲絕胃狀是厥續或有憂慘悲傷多嘆此皆帶下非有鬼神必則羸瘦脉虛多寒三十六病千變萬端審脉陰陽虛實察行其鍼藥治危得安其雖同病脉各異源予當辨記勿謂不然

○論經閉因痰飲所隔

張子和云凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉蘭散散諸歸湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥也

一婦人月事不行寒熱往來口乾煩赤飲食少且每聞歌一二聲諸醫皆用蟲蟲水蛭乾漆礪砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟數人不然曰古方雖有此法奈病人服之必脾胃發痛飲食不進及令止藥飲食少進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故

亦有虛者則  
其亦須形病  
但實

氣血實病  
其亦須形病  
輕試之法使

女子不月既心受積熱宜抑火升水流潤燥開胃誘食乃而出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然滿流月事不為水濕所隔自依期而至矣亦不用蟲蟲水蛭之類有毒之藥如用之則月經總來小漫反閉他證生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而致天關多矣

一婦人年二十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦煩赤時

咳三三聲問其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚甲散

建中湯寧肺散鐵艾千百轉劇家人意倦不欲求治載入憫之先

涌痰五六升午前涌畢午後進食餘證悉除後二日復輕涌之又

去痰一二升食益進不數日又下通經散湯一二升數日去痰

皮數重小者如起片大者如韋膜不月餘經水自行神氣大康矣

○論下利經斷利止經來

脉經曰婦人下利而經水反斷者何也師曰但當止利經當自下勿佐所以利不止而經斷者但下利亡津液故經斷利止津液復經當自下若婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足者自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

○論經閉總因血滯血枯

李氏曰婦人以血為主天真氣降壬卒水合腎氣全盛血脉流行當以三旬一見以象月盈則虧故日月經行乘產後一經若其時餘血一點未淨或外被風寒及濕冷暑熱邪氣或內傷生冷七情鬱結為痰為瘀凝積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯

經閉不通  
身則血水相搏  
變為水腫  
怒則氣逆  
上則口鼻而出  
逆於

總結

以肝藏血  
主氣也

長方云經後破驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則血水相搏變為水腫怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之重病經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血癰瘰血風瘡瘍等病加之經血滲漏於其間遂成癰瘰血生瘡淋瀝不斷濕熱相搏遂為崩帶血結於內變為癥瘕凡此變證百出不過血滯與枯而已但血滯亦有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以帶枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已○血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝滯積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於勞役憂鬱却宜溫補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不純用峻藥以虧陰道至於耗氣益血之說雖女相要法也

清陰綱目 卷二 經閉 玉樓子

但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如氣鬱火氣盛於血者方可舉犀角附子散散氣當加木香檳榔枳殼以開鬱行氣若氣亂則調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則血亦涸豈可專耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知叔和論肝肺二脉則宜肝旺於肺其實氣血平和有孕故繼曰兩脉通和但婦人見偏性偏婦妾志不得伸鬱怒無時不起故香附為女八仙藥經曰邪氣勝則實正氣奪則虛可不悟諸大藥只虛熱氣四證而已不謂亦大相同隨證調治飲食調和自然血氣流通更有疑滯然後可用紅花當歸散紫葳散通經丸藥經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津液流通而不移氣血克和而惟以毒藥攻通是求

千金於乞巧必灰而後已

○論經閉大法

丹溪云經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調和之劑隨證用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○脈法

脉經曰腎脈微瀉為不月經閉脈法備前

○治血枯經閉

玉燭散 治胃熱消渴或食漸瘦津液為熱燥竭以致血海乾枯此即四物湯與調胃承氣湯合方也

清陰綱目 卷二 血枯經閉方

黃歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 芒硝 甘草 各等分

右剉每服八錢水煎食前服

三和湯 治勞心火上行以致胞脉閉塞月事不來此即四物散合方也

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 朴硝 黃芩 各等分

右剉每服八錢水煎服

二黃散 治婦人室女經脉不通服之如神

大黃 煨存性二錢 生地黃三錢

右為末作一服空心好酒調下

二氣丸 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴不思食有燥

子 52-243

以柴胡引子相參服之  
 大黃 四兩 另為末醋一 當歸 白芍藥 各二兩  
 右為末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前服  
 日進三服  
 五補丸 補諸虛安五臟堅骨髓養精神凡胞脉閉先服降心火  
 之劑後服此丸及衛生湯以治脾養血也  
 熟地黃 人參 牛膝 酒浸去 白茯苓 地骨皮 各等分  
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下  
 衛生湯  
 當歸 白芍藥 各二 黃芪 三兩 甘草 一兩  
 右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服○如虛者加人  
 參一兩  
 濟陰綱目 卷二 治血枯經閉方 八 天壽堂  
 生故用白茯苓以降天氣地骨皮以清氣中之火牛膝引之下行此立方之大意也  
 五補丸補水之源衛生湯行已生之血益地黃黃芪人參俱補氣之不足而黃芪甘草又益氣之不不足為補氣之不足是為先後天之意焉  
 六血生於心  
 相子仁 妙另 牛膝 酒洗 卷柏 各半 澤蘭葉 續斷 各二  
 熟地黃 三兩 酒浸半日 石研內搗成膏  
 右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三十九  
 澤蘭湯 治證同前 妙在澤蘭為君  
 澤蘭葉 三兩 當歸 酒洗 芍藥 炒 各一兩 甘草 五錢

此方溫補氣血為主所補者溫之是也  
 右為粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服  
 加味補中益氣湯 治飲食勞倦損傷脾氣弱倦發熱作渴飲食減少而不生血者  
 黃芪 人參 甘草 炙 白朮 當歸 陳皮 各一升 脉  
 柴胡 各三 生地黃 天花粉 各八分  
 右剉作一服水煎服  
 十全大補湯 治虛胎及多產育傷血或誤服汗下冠伐之藥以致血衰氣乏而經不行者  
 人參 白朮 白茯苓 甘草 炙 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃芪 肉桂 各二錢  
 右作一服水煎服  
 濟陰綱目 卷三 治血枯經閉方 九 天壽堂  
 養真湯 治婦人經閉不通臍下有塊已經三載百藥無效服此數劑經行又投數劑而塊消矣  
 當歸 酒洗 川芎 白芍藥 酒炒 熟地黃 酒洗 白茯苓 陳皮 各等分  
 梔子 炒 山茱萸 去核 益母草 小茴香 酒炒 附子 酒洗 各等分  
 右剉每服一兩水煎服 五六劑後經通作丸服  
 ○治血虛經閉  
 溫經湯 治經道不行連腰膝痛微其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不行為氣所衝新血與故血相搏所以作痛宜此湯與桂枝桃仁湯  
 當歸 川芎 芍藥 官桂 牡丹皮 蓬朮 各一 人參 牛膝 各一 甘草 各五分



<p>右為末皂角五錢，羌花二錢，水煎糊為丸，如桐子大，每服五十丸，米湯下。</p>	<p>產寶方 治月經不通，腹中痛。</p>	<p>水蛭須炒十 分，熱酒生煎 吞入也。</p>	<p>牛膝六分，大黃 桃仁 尖皮細辛 各五 川芎 當歸 各四 水蛭 三分 糯米 炒黃</p>	<p>右為細末，煉蜜丸，桐子大，每服二十丸，空心溫酒下。</p>	<p>千金桃仁煎 治血積瘕，月水不行。</p>	<p>此療行之劑 血因熱結者 宜之。</p>	<p>大黃 濕紙桃仁 尖皮朴硝 各二 重蠶 一兩 去足 右為細末，醋二升半，銀石器中慢火熬膏，却入大黃、蠶、桃仁末，不住攪，度可丸，却入朴硝再攪，良久出之，丸如桐子大，五更初溫酒下五丸，至日午取下，如赤豆汁，鵝肝鹽薑衣樣，候鮮紅。</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 治血虛經閉方 十一 天德堂</p>	<p>住，仍以調氣藥補之。</p>	<p>血和通經丸 治婦人經水凝滯，不行，腰背、臍腹、疼痛，漸成血塊。 芍藥 兩 當歸 木香 肉桂 乾漆 炒 五靈脂 大黃 廣茂 兩 各水蛭 錢半 蠅 三十個 去頭足 桃仁 二十個 湯洗去皮尖 右為末，醋糊丸，如桐子大，食前醋湯或酒下二十丸。</p>	<p>按方廣云：月 候不通，有血 滯者，血枯者 此方用之，於 血枯是求之， 金於乞巧，金 藥之。</p>	<p>斑苗通經丸 治經候閉塞，亦治乾血氣。 斑苗 二十個 桃仁 四十九 大黃 五錢 錦紋 各 右為細末，酒糊為丸，如桐子大，空心酒下五丸，甚者十丸。○如血枯經閉者，用四物湯送下。○一方加黃蠅半錢，水蛭一錢。</p>	<p>乾血氣者，然 地黃用大黃</p>	<p>大黃膏 一名 治婦人乾血氣。 川大黃 四兩 為末，用醋熬成膏，子丸，如雞頭大，每服一丸。</p>
---	-----------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	-------------------	--	--	---	-------------------------	---

<p>酒化開，臨臥溫服，大便利一二行，紅脈自下，是調經之仙藥也。○一方加當歸頭。○一方加香附二兩，童便浸炒為末，入膏丸，桐子大，熱酒下四十丸。</p>	<p>聖惠方 治婦人月水滯不快，結成瘕塊，脹大欲死。</p>	<p>此方類聚大 熱藥，非因 寒凝氣滯，血 結成瘕者，不 可服。</p>	<p>馬條草根苗五兩，剉細，水五斗，煎至一斗，去渣，別以淨器盛，熬成膏，食前溫酒調下半匙。</p>	<p>通經丸 治婦人室女月候不通，或成血瘕。</p>	<p>當歸 桂心 青皮 乾薑 炒 川椒 炒 出 川烏 炮 蓬莪朮 乾漆 炒 烟 大黃 炮 桃仁 各等分 尖皮 炒</p>	<p>右為末，先將四分用米醋熬成膏，和餘六分成劑，日中杵丸，如桐子大，晒乾，每服二十丸，用淡醋湯下，加至三十丸，溫酒亦得。</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 治血虛經閉方 十三 天德堂</p>	<p>空心食前服。○濟生方去川烏、加紅花。本草人謂子清同丸，畏漆入腸，胃生瘕也。</p>	<p>○已上諸方俱重劑，隨寒熱斟酌用。 ○治痰結經閉。 丹溪方 治積痰傷經，不行，夜則妄語。 瓜蒌子 一兩 黃連 半兩 吳茱萸 十粒 桃仁 五十 紅麴 二兩 砂三 山查末 兩</p>	<p>右為末，生薑汁研，炊餅為丸，每服百丸，空心滾白水下。</p>	<p>一方 治月水不通，屢試有驗，形實氣盛。 厚朴 不拘多少，薑汁炙，香細切，濃煎去渣，空心服，不過三四劑。</p>	<p>加味導痰湯 治胎前經閉。</p>	<p>此方中 有 奇 法 從 文 求</p>	<p>此方中 有 奇 法 從 文 求</p>	<p>此方中 有 奇 法 從 文 求</p>	<p>此方中 有 奇 法 從 文 求</p>
---	--------------------------------	--	---	----------------------------	--	---	-------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--

<p>半夏 陳皮 白茯苓 甘草 枳實 黃連 川芎</p> <p>右加生薑水煎服</p> <p>經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用運朴之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也</p>	<p>穿山甲 炮 甘草 苦丁香 川椒 苦蘆</p> <p>白附子 猪牙皂角 草烏頭各三錢 巴豆一錢全用研</p> <p>右為細末以生葱絞汁和丸彈子大每用一丸新綿包之納陰中一日即白二日即赤三日即血神効</p>	<p>礬石丸 治婦人經水閉不利臍堅癖不止中有乾血下白帶</p> <p>礬石三錢 杏仁一分</p> <p>右二味末之煉蜜丸棗核大內陰中劇者再納之一粒仙丹 治婦人乾血勞並赤白帶下種子如神</p> <p>巴豆一百二十個去殼用新磚一個將豆抵去磚足</p> <p>穿山甲五錢油 大黃 苦蘆各一</p> <p>皂角一兩刮去粗皮火炮</p> <p>右各為末合一處以漿煮去皮核丸如彈子大用綿繭開暴藥在內穿入三寸竹筒上頭後仍留二三寸餘挽一轉不令藥氣在外用時先以溫水洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕烘頭送入子宮極深處整一日一夜取出藥不用少間耳冷氣下發寒發熱如傷寒狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下忌生冷發物自此子宮和緩而交媾</p>	<p>法固巧然必非有說血在子宮者可用</p>
---	---	--	------------------------

<p>則有孕矣</p> <p>通經下取方 曾試驗神効</p> <p>海蛤粉 錢半 牙皂 錢半 巴豆 錢半 去油 天花粉 五錢</p> <p>苦丁香 紅娘子 各一錢 麝香 少許</p> <p>右為細末每用一錢葱汁同搗為丸薄綿裹以五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則經行</p> <p>血崩</p> <p>論崩中由傷損衝任</p> <p>夏方論曰婦人崩中由臟腑傷損衝任血氣俱虛故也衝任為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調達若勞動過多致臟腑俱虛而衝任之氣亦虛不獲約制</p>	<p>其經血故忽然暴下或由陰陽相搏為熱所乘或傷衝任血得熱則流散甚者至於昏悶其脉數疾小為順洪大為逆大法當調補脾胃為主</p> <p>論血崩因虛熱</p> <p>東垣曰陰虛陽搏謂之崩婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有方寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如瘻為腐肉之象中有白帶者脉必弦細寒作於中有赤帶者其脉洪數病熱明矣必腰痛或膈下痛臨經欲行而先發寒熱往來兩脇急痛兼脾胃虛弱出或四肢困熱心煩悶不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血可一服而愈或先貴而後發或先富而後貧病名脫營者心氣不</p>	<p>言謂脾門為主觀東垣法便得其然</p>
---	--	-----------------------

愚謂此証之  
 中須禹清涼  
 而清涼之中  
 又須破於凝  
 結至於補血  
 意實又須通  
 則其間兼發  
 或有不同又  
 當得其時而  
 應焉為難惟  
 蓋一也  
 開口便得熱  
 自足是不生  
 此大寒之劑  
 非實症不可  
 和煎藥之快  
 不可  
 節陰虛陽傷  
 之治  
 問原作系  
 所見証屬  
 肝脾氣虛之  
 以虛症而用  
 扶脾遠志何  
 也所謂諸補  
 脾愈而當  
 值於若然  
 則更度升不  
 可少  
 此條全在法

極則動五志之火五志之火亢甚則經血暴下失期而來久而不止謂之崩中如風動木搖火燃水沸類也治崩次第初用止血以塞其流中用清熱涼血以澄其源末用補血以還其舊若止塞其流而不澄其源則滔天之勢不能遏若止澄其源而不復其舊則源子之陽無以立故本末勿遺前後不紊方可言治也

張子和云蓋官人母五十餘血崩一載食用澤蘭丸黑神散保安  
 先白微散補之不効戴人見之曰天卒已盡本不當下血蓋血得  
 熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系  
 為之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉  
 有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服  
 大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙  
 濟陰綱目  
 卷二 血崩門  
 當歸二兩焙三味同為細末水調下又服檳榔丸不旬日而安  
 西園公治一婦人年六十二歲血崩不止投黃連解毒湯四貼後  
 服涼膈散合四物湯六貼即愈此婦因悲哀太過則心悶急肺布  
 葉舉而上焦不通熱氣在中血走而崩故效

薛氏曰一婦人年將七十素有肝脾之證每作則飲食不進或胸  
 膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小使不利余用逍遙散如由  
 抱伏神遠志木香而愈後憂女孀姑不時吐紫血其病每作先倦  
 息而後發熱經曰積憂傷肺積思傷脾肺布葉舉是令子母俱病  
 不能攝血歸經而致前證遂以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二  
 分鎮愈後因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脫也法當補氣乃用  
 人參二兩苓朮當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢炙甘草香各



一錢一劑頭止

一婦人年六十四。久鬱怒。頭痛寒熱。春間乳內作痛。服流氣飲之。類益甚。不時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。乳腫及兩脇。厥痛如炙。午後色赤。余以爲肝脾鬱火。血燥。先以逍遙散。加酒炒黑龍膽一錢。山梔一錢半。二劑腫痛頓退。又二劑而全消。再用歸脾加炒黑梔貝母。諸證悉愈。

一婦人因怒。崩血久不已。面青黃。而或赤。此肝木制脾土。而血虛也。用小柴胡合四物。以清肝火。生肝血。又用歸脾補中二湯。以益脾氣。生肝血。而此證若因肝經有風。熱而血不寧者。用防風一兩。爲丸。以兼證之藥。煎送。或肝經火動而血不寧者。用條芩炒爲丸。以兼證之藥。煎送。無有不効。

經陰制目

卷二

血崩門

十八

王德華

一婦人。性急。每怒。非太陽耳項。喉。齒。胸。孔。作痛。則胸滿。吞酸。吐瀉。少食。經行不止。此皆肝火之證。肝自病。則外證見。土受尅。則內證作。若自病。見用四物。加白朮。茯苓。柴胡。炒梔。炒龍膽。若內證作用。四君子。加柴胡。芍藥。神麴。吳茱萸。炒過黃連。諸證漸愈。惟月經不止。是血分有熱。脾氣尚虛。以逍遙散。倍用白朮。茯苓。陳皮。又以補中益氣。加酒炒芍藥。兼服而調。

論氣陷血脫法當升舉

東垣云。一婦人經候黑血。凝結成塊。左脢有血瘕。水瀉不止。穀食有時。化有將不化。至今歲四月。血塊暴下。併水注俱作。是前後二陰有形之血脫焉。於下既久。經候尤不調。水瀉日見三兩行。食罷心煩不快。飲食減少。甚至瘦弱。東垣先生曰。夫聖人治病必本四

時升降沉浮之理。權變之宜。若本四時以順爲逆。非其治也。且治之大法。必先歲氣。無伐天和。無盛盛。無虛虛。遺人天殃。無致邪。

陽虛是言陽無大正。絕人長命。故聖人云。陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛陽虛。汗之則愈。下之則死。大抵聖人立法。各自有義。且如升陽以發散之劑。是助春夏之陽氣。令其上升。乃瀉秋冬收藏。殺寒涼之氣。此病是也。當用此法治之。乃升降浮沉之至理也。夫天地之

氣。以升降浮沉。乃從四時。如治病逆之。則殺入矣。故經云。順天者昌。逆天者亡。可不畏哉。夫人之身。亦有天地四時之氣。不可止認在外。人體亦同天地也。今經滿不止。是前陰之氣血已下脫矣。水瀉又數年不愈。是後陰之氣血又下陷矣。後陰者。主有形之物也。前陰者。精氣之門戶。俱下竭。是病人周身之氣。常行秋冬之令。陰

濟陰制目

卷二

血崩門

十九

王德華

主殺此等收藏之病是也。陽生陰長。春夏是也。在人身之中。令氣升浮者。穀氣上行是也。既病則周身血氣皆不生長。穀氣又不升。其肌肉消少。是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫。血氣消竭。假令當日元是熱證。今下焦久脫。已化爲寒矣。此病然沉久降。寒濕太勝。當急救之。瀉寒以熱。降濕以燥。大升大舉。以助生長。補養氣血。不致偏枯。聖人立治之法。云濕氣大勝。以所勝助之。助甲風木上升是也。故經云。風勝濕。是以所勝平之也。當調和胃氣。次用白朮之類。以燥其濕。而滋元氣。如其不止。後用風藥以勝濕。此之謂也。此便是大舉大升。以助春夏二濕久陷下之至治也。又一本云。此病次用四物。隨證加減。論血瘀腹痛法當收止。

或行非元氣  
不能道不能  
用

有此可見  
妙論

非久崩氣脫  
者不可用

以下皆止  
之而數  
黃麻又有  
血之能

論過寒服涼法當溫補

濟陰綱目

卷二 血崩門

二十

王真

蘇氏曰血大至曰崩中或前或後或純下或血成塊或方不止證狀非一。所感亦異。甚則頭目昏暈四肢厥冷宜服艾湯以溫之。丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以沉香降氣湯加入百草霜米飲調下血崩甚而腹痛人多疑惡血未盡又見血色瘀黑愈信惡血之說不敢止截。大凡血之為患欲出未出之際停在腹中即成瘀色難盡以瘀為惡又需知瘀之不為虛冷乎。若必待見瘀血之後截之恐併與人無之矣。此腹痛更有說瘀而腹痛血通而痛止崩而腹痛血住則痛止宜芎藭湯加乾薑熟附一錢正其血而痛自止仍以刺花繡拭黑片燒灰研末米飲調下一方以毛蟹殼燒存性米飲下亦有以早黃麻根燒灰為末米飲下論過寒服涼法當溫補

薛氏曰表弟方健甫內五十歲辛丑患血崩諸藥罔效王真八月身熱體痛頭暈涕出吐痰少食衆作火治展轉發熱絕粒數日余診之曰脾胃久虛過服寒藥中病未已寒病復起遂用八味丸料一服翌早遂索粥數匙再服食倍熱減痛止乃服八味丸而愈癸卯秋因勞役憂怒甲辰夏病復作胸飽發熱脊痛腰疼神氣憊懣或作中暑崩血便血煩渴引飲粒米不進皆憤特作豚洪大按之微弱此無根之火內虛寒而外假熱也以十全大補加附子一劑遂食粥三四匙崩血漸減日服八味丸始得全愈

大尹王天戌之內久患崩自服四物涼血之劑或作或輟因怒發熱其血不止服前藥不應乃主降火更加腹脇大痛手足俱冷余曰此脾胃虛寒所致先用附子理中湯體熱痛止又用濟生歸脾

補中益氣二湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣  
之症方藥也  
別之藥也  
均一藥也  
利而方藥  
用不問然  
不捨藥附  
必可道又  
服之而愈  
不聽而效  
不知所藥

○論補中去積

東垣云丁未年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾殞身失血自後一次經數日而來今火不止其人心瘁性急多驚以予料之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容刻數診得掌中寒脉沉細而緩間有沉數九竅微不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足飲食失節脾胃虛弱之證胃院閉心

濟陰綱目

卷二 血崩門

二十

王真

而痛在脇下急縮有積當臍有動氣腹中鳴下氣太便難諸虛證極多不能盡錄擬先治其本餘證可以皆去與安心定志鎮壓其驚調和脾胃大益元氣補其血脉養其心神以大熱之劑去其寒寒凝在皮膚少加生地黃去命門相火不令四肢肢疲弱製黃芪當歸人參湯

○論開瘀行氣  
丹溪云延緩胸中清氣不升故經脉壅遏而降下非開滯不足以行氣非氣升則血不能歸隱道此論血泄之義甚明蘇蘭胸膈滿延則清氣升清氣升則血歸隱道不崩矣故其症或腹滿如孕或臍腹疼痛或血結成片或血出則快止則悶或臍上動其治法宜開結瘀行滯氣消汚血

既云心脾血  
虛自當補  
乃不為治  
即謂其失  
矣以治何  
耶

補解得治至  
云心血虛  
用烏雞白  
靈藥以夜  
便得要有

○論後血心痛  
良方云婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小  
產去血過多而心痛甚者亦然用烏雞白靈藥炒為末醋湯調下失  
笑散亦効

薛氏曰前證若陰血耗散用烏雞白靈藥收斂之若瘀血不散用失笑  
散行散之若心血虛弱用烏雞白靈藥養之若鬱結傷血用歸脾湯  
調補之

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證悉其面色萎  
黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大  
補湯參米倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

○輪崩漏難治法

丹溪云崩漏有虛有熱則下陷熱則通流

氣虛血虛者皆以四物湯加參芪

因勞者用參芪加升補藥

因寒者用乾薑

因熱者用黃芩

漏下乃熱而虛四物湯加黃連

崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止

紫色成塊者血熱四物湯加黃連柴胡之類

急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者棕櫚灰後用四物湯加

炒黑薑調理

經驗簡要治崩中等證○令君脈緊細手足寒紅去淡黑或五色

當歸建中加白龍骨血竭附子下紫石英九震靈丹炙火二熱者  
脈洪四肢溫心煩口渴燥熱血沸而成用黃芩湯荆芥散或清心  
蓮子飲加竹瀝生地黃汁甚者生地黃汁磨京墨百草霜冷服○

虛者膠艾湯加麥門冬鹿茸龍骨酸棗仁或養榮湯加龍骨血竭  
送震靈丹○實者腹中痛者附九四物湯加香附子心虛者恍惚  
多夢健忘舌強小便多面紅盜汗柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨京  
墨百草霜吞靈砂丹又靈砂當歸蓮肉龍骨棗肉丸參湯送下崩

中麝香當歸崩者心氣已散急服靈砂龍骨等○有田婦崩中斷  
下者用大蘇根酒煎清早服或生多中如蓮荷花  
產後分陰崩陽崩一受熱而赤謂之陽崩一受冷而白謂之陰崩

○脈法

脈經曰問五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳津黃

崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如動血也○寸口弦  
而大弦則為減太則為乳減則為寒乳則為虛寒虛相搏脈則為

華婦人則半產漏下○尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏

白下赤○漏血下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死○漏

下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

○治熱崩漏

荆芥四物湯治崩漏初起不問虛實服之立止

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

荆芥穗 條芩 香附子 一錢

右對水煎服○如不止加防風升麻白朮蒲黃○一方加地榆

氣之附理肝

氣條參除內 熱四物生地 黃藥養血涼 血故皆取之	尤効○一方四物加麥連梔子黃柏○一方並加膠艾	奇効四物湯 治肝經虛熱血沸騰而久不止	當歸酒洗 川芎 白芍藥 熟地黃	此方用熟地 以補肝之母 以阿膠黃藥 益肝之氣支 葉溫下元以 助真氣之升 所謂陰從陽 起也	右到水煎服	河澗生地黃散 治經漏下血脈虛洪經水紫黑	生地黃 熟地黃 白芍藥 黃芪	枸杞子 天門冬 去心 地骨皮 柴胡	右收咀水煎服 便血者加地榆	涼血地黃湯 治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守胞絡相火 故血走而崩也	濟陰綱目 卷三 婦人門 王臣 夫聖	生地黃 當歸尾 各五 黃連 黃蘗 知母 桑木 川芎 升麻 各二 柴胡 防風 羌活 黃芩 細辛 荆芥 葛荆子 甘草 各一分 紅花 少許	右收咀作一服水煎空心稍熱服	小薊湯 治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令 入下血當補其陰脈數疾小者順大者逆	小薊莖葉 搗取 生地黃 各一 白木 半兩	右三件入水一盞煎減一半去渣溫服	烏蘗酒 治崩中晝夜不止醫不能治者	烏蘗一兩 生地黃汁一盞	右用酒五盞煮烏蘗一盞去渣下地黃汁再煎二盞沸分爲三
----------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------	---	-------	---------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------	--	---------------	---	----------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------------

格之失心者 火之生也故 又以生地黃 連以治火之 原知母黃芩 滋水之母歸 尾破瘀紅花 生血所謂去 故生新也川 芎行血海之 徐曼荆黃連 經之血而風 藥者皆所以 升清經之氣 也諸經氣升 則陰血不 不隨之而 不隨之而 而起也有是	服	治崩中去血不止	大小薊根 五兩 白茅根 三兩	右二味細切用酒五觔煮取四觔去渣分四服	一方治婦人血崩	槐花 半兩 黃芩 二兩 去皮	右二味共爲細末每服五錢好酒一碗用銅稱匙一枚乘熱火 燒紅浸入酒內調服不拘時忌生冷油膩之物	金華散 治血室有熱崩下不止服溫藥不効者	玄胡索 當歸 瞿麥穗 牡丹皮 乾薑 各 石膏 二兩 桂心 另 葶藶 仙 各七 蒲黃 半兩	右爲細末每服三錢水煎空心溫服日二次	簡易黃芩湯 治崩中下血今人多用止血補血之藥惟此方治 陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者	黃芩一味研爲細末每服三錢露酒調下 卽燒芥 是升法	一方荆芥湯煎下	治勞傷崩漏	膠艾四物湯 治勞傷血氣月水過多或崩漏不止及妊娠胎氣 不安或因損動漏血傷胎者亦宜	當歸 川芎 白芍藥 熟地黃	阿膠 珠 艾葉 各一 甘草 各五	右到水酒各半煎空心服
--	---	---------	----------------	--------------------	---------	----------------	--	---------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	---------	-------	--	---------------	------------------	------------

**血不止**

此藥生方也  
而玄疊加柴  
槐以清厥陰  
之火以升肝  
脾之氣

柏子仁炒 香附子炒 芎藭 鹿茸去毛 茯神去木  
酒蒸焙

當歸各一川續斷二錢 阿膠炒 遠志去心 甘草炙五錢

百作一服圭雖五牛八頭容小兒服

柴胡七分 葛根 當歸身 甘草 三分 紅花 少許

右咬咀作一服水煎去渣和熱空心服微汗立止

調經升陽除濕湯 治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多

下水漿之物或因飲食不節或勞傷多鬱或素月氣不調

前日鮮此曰

升陽氣乃爲 之天舉大升 此從陰用陽 之義也

引入血分以 升陽氣乃爲 之天舉大升 此從陰用陽 之義也

飲酒勞倦致令心火乘脾其人心急情略四肢不舉困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而怠按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脾二者受邪病皆在脾脾者血之府也脾者人之神也心不主令胞絡代之故曰心之脉主屬心系心系者胞絡命門之脉也主月事皆由脾胃虛而心胞乘之故漏下血水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

黃芩 蒼木 苑活各一 防風  
藥本 升麻 柴胡 甘草各一  
當歸酒浸 獨活各五 蔓荊子 七分

濟陰綱目 卷二 婦人 五寶脂散  
石散阻水五大蓋煎至一大蓋去滓稍熱服空心服藥畢待少時以早膳壓之可一服而已如炙足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已

此藥乃從權衡之法用風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若病愈經血惡物已盡主病雖除後必須以黃芩甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若經血惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

治崩漏血瘀 昏暈 疼痛  
五寶脂散 治血崩不止及昏不省

五寶脂散 治血崩不止及昏不省  
右為末每服一錢溫酒調下○一方治血崩不止五寶脂二錢炒熱加當歸酒同煎或水酒煎各半蓋同煎服○一方五寶脂半生半熟為末酒調服○一方水煎五寶脂半乾去渣澄清再煎成膏入神龜末為丸如桐子大空心溫酒下二三十丸便止○一方每服三錢水酒童便各半蓋煎至八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或心腹脇肋脚痛不可忍者或止用童子小便尤佳○或中風即入草烏頭半錢同煎亦治腸風下血如不飲酒者煎烏梅栢葉湯調下○如心煩口乾渴者加蒲黃炒減半○一方同蒲黃各炒等分名失笑散治失血及產後半產惡血攻心昏迷不省及心腹絞痛欲死者其效如神真救急之良方也人家不可不備○此藥兼能解毒及蛇蝎蜈蚣咬傷處立愈

香附子散 治血崩不止或成五色亦治產後腹痛及小產血不止大是婦人仙藥常服益血調氣

香附子 不拘多少春去毛中藥之男妙

右為細末每服二錢清米飲調下能止血好酒調下能破積○冷氣盛湯下○帶下艾湯入醋少許下

煮附丸 治崩漏帶下積聚癥瘕腹痛方見調經

備金散 治婦人血崩不止

香附子 炒四 當歸尾 二錢 五寶脂 兩

右為細末每服五錢酒調下空心服立効

<p>如神散 治血崩不止赤白帶下</p> <p>香附子 炒 赤芍藥 炒各等分</p> <p>右爲末入鹽一捻水煎食前溫服。一方用香附自並均九</p>	<p>立効散 治婦人血崩臍腹痛</p> <p>香附子 三兩 當歸 一兩 赤芍藥 五兩 五靈脂 各半</p> <p>右爲細末每服三錢酒一盞重便少許同煎服</p>	<p>一方 治血崩臍腹痛</p> <p>當歸 赤芍藥 熟地黃 香附子 牡丹皮</p> <p>木賊 去節各沒藥 丁香 桂 去皮各三錢</p> <p>右爲細末酒調三錢溫服</p>	<p>縮砂散 治血崩</p> <p>濟陰綱目 卷二 血崩門</p> <p>縮砂不拘多少於新瓦上炒香爲細末米飲調下三錢</p>	<p>加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至而後至者亦有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之</p> <p>四物湯 四錢 香附子 炒去毛一錢半</p>	<p>右如生薑五片水煎食前服○如血色鮮而不止者去熟地黃加生地黃</p> <p>治崩漏虛寒</p>	<p>丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脈兩尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺臍下如水求厚衣被以禦其寒白帶白濁之物雖多問下如屋漏水下</p>
---	---	---	--	---	--	--

<p>時有鮮血不多右尺脈時微洪屋漏水多暴下者是急弦脈發寒多而洪脈時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之象也</p>	<p>當歸 一錢 白芍藥 熟地黃 各二 川芎 二分</p> <p>丁香 各四分 阿膠 炒六分 生艾葉 一錢 後入</p> <p>右爲細末作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服三服効</p>	<p>芎藭湯 治帶下漏血不止及風寒冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急淋瀝不斷及產後失血過多虛羸腹痛成痼娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食</p> <p>芎藭 黃芩 芍藥 乾地黃 甘草 各二兩 當歸 乾薑 各一兩</p>	<p>右以咀以水一斗煮取三升分三服○若月經後因有赤白不止者除地黃芩加杜仲人參各二兩</p> <p>斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每過月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下三十六疾悉能治之</p> <p>人參 去蒸 熟地黃 艾葉 各一兩 烏賊骨 燒灰 當歸 酒洗各二兩 阿膠 炒各七 乾薑 炮半</p>	<p>有咬咀水煎食前服 烏賊骨即海螵蛸</p> <p>加味四物湯 治崩漏</p>	<p>東垣所論症必折宜至</p>
--	---	--	--	--	------------------

此則轉候以  
此主之而服  
痛一症人皆  
以為瘀血者  
多而此以爲  
痛不止者服  
熟附九正元  
體所謂崩而  
腹痛者則止  
而痛除也

四物湯一兩 人參二錢 吳茱萸一錢

右剉碎每服半兩薑棗煎食前服五六服寒熱腹痛皆退崩漏  
未止續服後熟附九

熟附子 木賊 龍骨 赤石脂 各半兩

川芎 當歸 各一兩

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服五六十丸食前米飲下

鹿茸九 治經候過多其色瘀黑甚者崩下呼吸少氣腰膝冷極  
則汗出如雨尺脈微小由衝任虛寒爲風冷寒襲胞中氣不能  
固可炙關元百壯在臍下正中二寸

鹿茸 桑去毛 赤石脂 烏餘糧 各一兩

濟陰綱目 卷二 治崩漏血氣虛寒者服此方

當歸 熟地黃 續斷 各二兩

附子 艾葉 各一方

右爲細末酒糊丸如桐子大每服三十九空心溫酒下○煉蜜  
丸亦可

治崩漏虛脫

大千方 治崩中下血不止小腹痛

芍藥 一兩 柏葉 六兩 微炒丹溪

右用水一升煎至六合入酒五合煎取七合空心分爲二服一  
方爲細末酒調二錢○一方有鹿角膠等酒調治白帶臍腹痛  
極黃散 療經血不止

黃芩 一兩 側柏葉 蒲黃 各兩

以柏葉爲君  
芍藥爲臣  
清血之功可  
治崩漏之症  
即小腹痛亦  
是血虛也  
用酒此亦殺  
相有生肌也

伏龍肝 二兩 即空  
心對月土

右次咀水二升煎取八合分爲二服

又方 治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芍藥 十二分 生地黃 伏龍肝 各十  
當歸 六分 續斷 地榆 小蓀根 各二

右用水九盞煮取三盞去滓分三服

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然崩下或如豆  
汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹疼痛經久未止令  
人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 赤石脂 各一兩 芍藥 三兩 熟地黃 各七錢半

艾葉 微炒各 麥門冬 去心 當歸 乾姜 各七錢半

濟陰綱目 卷二 治崩漏血氣虛寒者服此方

肉桂 甘草 各半兩

右爲細末每服四錢棗一枚水同煎

地榆 蒲黃 白芍藥 白茯苓

柏葉 微炒 蟹爪 微炒 熟地黃 鹿角膠 碎炒

漏蘆 各一兩 芎藭 當歸 各七錢半 伏龍肝 一兩

乾姜 炮 桂心 甘草 各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞入竹茹一分煎至七分去滓食前  
溫服

按伏龍肝爲止血之聖藥蓋燥可去濕也先賢治崩用旋覆花  
半夏治崩用漏蘆而崩止者亦此意



<p>蒲黃散 治崩中不能止</p> <p>蒲黃 炒 破故紙 炒 千年古石灰 炒過各</p> <p>右為細末每服二三錢淡酒或醋湯調下</p> <p>此又無千年 蒲黃散 治經脈妄行</p> <p>香附子 三兩 川芎 石灰 油炒各</p> <p>右為細末燒秤鍾淬酒調服二錢七</p> <p>鹿茸散 治崩中漏下不止虛損羸瘦</p> <p>鹿茸 一兩去毛塗 白龍骨 鱉甲 塗酥炙令</p> <p>熟地黃 白芍藥 白石脂 烏賊魚骨 炙黃 續斷 各一 肉蓯蓉 一兩半酒浸 去皮炙乾</p> <p>右為細末每服二錢食前粥飲調下</p> <p>卷二 治崩漏諸方 三兩 玉露</p>		<p>補血丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸崩中帶下</p> <p>白微 牡蠣 白芍藥 鹿角霜 山藥</p> <p>白朮 白茯苓 烏賊魚骨 白芷 各等</p> <p>右為細末麵糊和丸如桐子大每服五十丸空心米飲送下</p> <p>壯腰丸 治月水不止眾藥不愈者</p> <p>壯腰火煨研細用醋調成丸再煨過通紅候冷研細出火毒却用醋調艾末熬成膏和丸如桐子大每服五十丸醋艾湯下</p> <p>一方 治婦人血崩</p> <p>鱉砂 炒一 伏龍肝 半兩 阿膠 一兩</p> <p>右為末空心溫酒調服二三錢大愈名無比</p>	
---	--	--	--

<p>○血見黑則止</p> <p>黑金散 治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下</p> <p>鯉魚皮 棕櫚皮 黃牛角腮</p> <p>破故紙 亂髮 各一 烏賊魚骨</p> <p>乾薑 木賊 當歸</p> <p>熟地黃 各半</p> <p>右剉碎拌勻入磁罐內鹽泥固濟候乾以炭火五斤煨令通赤烟盡取放土內埋令冷取出研細每服三錢入麝香少許空心米飲調下</p> <p>五灰散 治下血不止成血崩</p> <p>蓮蓬殼 黃絹 血餘 百草霜</p> <p>卷二 治崩漏諸方 三兩 玉露</p>		<p>五灰散 治下血不止</p> <p>棕皮 以上共 山梔 炒黑 蒲黃 炒 黑墨</p> <p>血竭</p> <p>右為細末調服或煉蜜丸桐子大清米飲下五十丸</p> <p>十灰散 治下血不止</p> <p>錦片 木賊 櫻櫚 栢葉</p> <p>艾葉 乾漆 鯉魚鱗 鯉魚鱗</p> <p>血餘 當歸 已上逐味火燒存性各等分研末 麝香 少許</p> <p>右研勻每服二錢空心溫酒調服</p> <p>十灰丸 治崩中下血不止</p> <p>錦灰 一云 黃絹灰 馬尾灰 艾葉灰</p> <p>萬節灰 蓮房灰 油髮灰 赤松皮灰</p>	
---	--	---	--

食果而此藥  
其藥之木受  
清陽之氣聚  
少陽升生之  
性能助肝胆  
之陽以養  
陰之血故  
仙一切服食  
藥不得與  
煎不食以其  
火不交不武  
而其性之  
氣也其性之  
止血皆能  
故自草藥  
百草之藥  
亦於此藥  
能治之也  
此藥之性  
能治之也  
此藥之性  
能治之也

搜側灰 蒲黃灰 各等  
右研勻用醋煮糯米糊和丸如桐子大每服七十九加至一百  
九空心米飲下  
如聖散 治血止崩  
搜側 烏梅肉 乾薑一兩五錢  
右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久思不過三服  
愈一 方去乾姜用甘草二寸半生半熟共為末二三錢淡醋  
湯調服  
當歸散 治婦人血崩不止 理氣血而久  
當歸 龍骨 燒赤 香附子 一錢  
條毛灰 五錢  
右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩豬魚雞等物  
一方 治血崩屢効  
當歸 白芍藥 乾薑 搜側 各等  
右各煨存性研為細末醋調以有節朱鋤左攪四十九轉食前  
服  
琥珀散 一名烏 治暴崩不止  
赤芍藥 當歸 香附子 乾荷葉  
男子髮水洗 搜側 烏紗帽 地漿紗頭巾敷  
右各等分並於新瓦上煨成黑灰存性三分為細末每服五錢  
空心童便調下如人行十里久再進一服即止○若產後血去  
多加米醋京墨麝香少許

生居尾生丁  
陽中之陰  
此以陰血之  
餘生手統陽  
之休又有陰  
中有陽之義  
凡血脈于下  
乃陰無陽以  
升此借陽中  
之陰以助陽  
升陰又借其  
灰以為止瀉  
之用皆良法  
也  
此方以血藥  
公乾葉有從  
治之妙而左  
搜四十九轉  
高少陽生數  
之義亦見由  
注  
荷葉清分可  
以升肝脾之  
氣而清血為  
妙藥五倍故  
能止血又有  
生津可以破  
瘀取常用者  
陽升之意  
陽風不用更  
便似有前後  
之分  
蓮花心性清  
而香可以通  
心氣之和而  
清血  
涼而能止

一法先以五積散加醋煎投一二服次服五通散  
立應散 治婦人血海崩敗又治腸風下血  
香附 三兩一牛 搜側 一兩錢  
右為細末每服五錢酒與童便各半煮煎七分溫服無時如腸  
風不用童便  
立効散 治婦人血崩不止  
當歸 蓮花心 白綿子 紅花 茅花 各一  
右剉如豆大白紙包裹泥固火煨存性為末每服三錢溫酒調  
服  
必効散 治婦人月經不調及崩漏不止  
棕皮 燒 木賊 五節槐 麝香 一錢  
右為末酒服二錢空心服  
烏金散 治血崩不止  
搜側毛 燒存性 龍骨 煨過  
右為細末研勻每三錢空心好酒調服二服立止  
香磐散 治血崩  
香附子 醋洗一宿炒焦 白礬末 二錢  
右研勻米飲調空心服神効一方用荷葉調尤妙  
一方 治婦人血崩下止  
槐花 一兩 搜側 五錢  
右為末水二盞鹽少許煎至七分去滓溫服○一方用陳槐花  
一兩百草霜半兩雞鐵燒紅淨酒下一二錢○一方槐花葉燒

<p>灰溫酒調下二錢七〇一方槐木耳燒作灰酒服方寸七</p> <p>止崩維方</p> <p>一方荆芥蓮房各等分燒灰存性爲細末空心米飲調下二錢</p> <p>一方荆芥穗燈火燒焦爲末每服三錢用童便調下</p> <p>一方葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性米飲調服</p> <p>一方香附子去毛炒焦黑存性爲末熱酒調服二錢不過兩服立止</p>	<p>一方砂仁新瓦炒黑爲末米飲調服</p> <p>一方益智仁炒黑爲末益米飲調下</p> <p>一方檳榔燒灰存性碾末溫酒調下甚妙</p> <p>一方亂髮皂角水洗淨爲末空心酒調下二錢</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>一方樓欄白礬煨爲末酒調二錢</p> <p>一方樓欄燒存性淡酒調下三錢</p> <p>一方烏梅燒灰存性爲末烏梅湯調下</p>	<p>一方桂心燒存性爲末米飲或酒調下一二錢</p> <p>一方桃仁燒灰存性研細食前溫酒調下二錢</p> <p>一方五靈脂炒令烟盡爲末溫酒調下一錢</p> <p>一方黃牛角應用尖燒爲黑灰微存性研末調服</p>	<p>一方鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢</p> <p>一方烏鰂魚骨燒存性爲細末每二錢煎木賊湯下</p> <p>一方以鹽白梅燒灰存性爲末空心米飲調下</p>	<p>一方用夏枯草燒存性爲末米飲調下</p>
---	---	--	---	---	------------------------

<p>用狗屎汁其</p> <p>奇效亦陽中</p> <p>陰藥也同白</p> <p>草者必妙必</p> <p>妙</p> <p>一方百草霜二錢煎汁拌定分作二服當歸酒調下</p> <p>一方京墨爲末二錢七同燒露蜂房爲末三指撮酒調服</p> <p>一方新綿一口燒研末空心酒調下立止名一</p> <p>方蓮蓬燒灰存性爲細末酒調下二錢</p>	<p>一方棉子花銅器炒烟盡爲末空心溫酒調下二錢</p> <p>一方用大蘆俗呼爲馬次芥連根去土勿洗以磁石器搗爛仍入冷水半盞取汁服之立止</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p> <p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真人方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p> <p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真人方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p> <p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真人方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p> <p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真人方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p>	<p>濟陰綱目 卷二 止動難方</p> <p>千金方 治婦人無故尿血</p> <p>龍骨二兩爲末以酒調服方寸七</p> <p>孫真人方 治九竅出血</p> <p>荆葉搗取汁酒和服之</p>
---	---	--	--	--	--

濟陰綱目卷之三

關中 武之望叔卿父輯著 武林 汪 瀨洋

西陵 汪 淇悌子箋釋 天都 查 望子

○赤白帶下

○論帶下由勞傷任 岐氏曰巢氏病源論婦人有三十六疾者七癰八瘕九痛十二帶下也而帶下不顯其證今人唯知赤白二帶耳此由勞傷任風

冷據於胞絡婦人平居血欲常氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脉右手尺浮浮為陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血

濟陰綱目

卷三 帶下

三句通微

所致其脉寸口弦而大弦則為漏大則為瘕其為瘕者虛相搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脈浮者不可治

產寶云帶下三十六疾者是十二癰九痛七害五傷三圓謂之三

十六疾也十二癰是所下之物一者如膏二者如青血三者如紫汁四如赤皮五如膿六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清血似水十如米泔十一如月泥十二如經度不應期也九痛者一

陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹痛六氣滿

月水閉塞不通其餘二者文佚不載而仲景所說三十六種疾皆由子藏令熱勞損而來下起於陰內也 ○論帶下五色因風邪入於胞門 良方云婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳於厥府而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經黑如衄血人有帶脉橫於腰間如束帶之狀病生於此故名為帶 李氏曰平時陰陽過多及產後亡血下虛風邪乘虛入於胞絡宜 煖宮丸加薑附吳茱萸或黃耆建中湯去桂加當歸水煎吞苦練 九○白帶兼痛風者二陳湯加蒼柏海星牛膝川芎兼頭風鼻涕 皆丹溪所定 者蒼柏辛芍散

濟陰綱目

卷三 帶下

二

○論帶下屬濕熱結不散 保命集云赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脈故津液涌溢是謂赤白帶下本不病結緣五經脈虛結熱屈滯主

帶故女子膈下痛陰中綿綿而下也經曰任脉為病男子內結七

疝女子帶下瘕瘕王註云任脉自胞上過帶脉貫于膈上故男子

內結七疝女子帶下帶脉起於季脇章門似束帶狀今濕熱宛結

○論帶下痰涎宜吐下  
子云一婦人病下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈診其兩手脈俱滑大而有方得六七至常上熱口乾壯時嘔吐水手知其實有痰在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈  
愚按李左街之妻病白帶如水如粉中綿綿不絕臭穢之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃並附之藥重燥補汚水轉多載人斷之曰此帶濁水木熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下汚水斗餘行三遍汗出周身至明日病人云汚已不下升陰綱目  
○卷三 論帶下  
三  
○論帶下虛寒宜溫補  
李氏曰帶下有虛寒帶腥臭者因小水淋瀝不已或腹中寒求

產後去血過多以致陰虧陽竭氣不升經脈凝滯氣下陷精氣累帶于下焦凝滯而成白帶如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不樂桂附湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用酒煮當歸丸小烏雞丸琥珀調經丸  
韓氏曰山妻年三十餘十八胎九殞八天會先君松潘難作賊兄弟皆西奔妻驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇皆青或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊自懸不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥蒸蒸其下則熱暈欲絕四弟還脈之始知為亡陽證也大柴胡宗嗣未立幾誤殺吾嫂急以鹽煮大附子九錢為君制以薄荷防風佐以鹽桂芎歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑斯鼻熱聰通背覺即能識人時止一嗣子二女相抱痛哭疎戚皆悲執友趙惠長驚曰君何術也弟曰方書有之假對假對真對真對上乃假熱故以假冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥反之斯上下和而病解矣繼後主以女金丹錯綜以二三方不但去其疾且調治元氣庚午生子一今應襲也壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養元氣調生氣待飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附子湯三錢而愈不費効且暮聞其用女金丹即勝金丸也得之異人倍加香附而視氣血之偏者又加薑黃倍川芎之屬取効

古卷而賦

甚多子念無子者往往有之。勸思子得子之難其苦何如。乃次第錄其方。併女金丹以濟人云。女金丹即勝金。

○論帶久枯涸宜潤補

華純云。帶下久而枯涸者。謂之凡大補氣血。皆所以濡之。如以四物湯為末。煉蜜丸。梧子大。空心米飲下。三四十丸。以療年高婦人。白帶良驗。皆潤劑也。

○治帶下當以壯脾胃升陽氣為主

薛氏曰。徐用誠先生云。帶下白濁。無而赤。楊血。東垣先生云。血崩久則亡陽。故白濁之物下流。未必全拘于帶脈。亦有濕痰流注下焦。或腎肝陰之濕。勝或因驚恐而木乘土位。濁液下流。或思慕為筋痿。或人以六脈滑大有力。用宣導之法。此為其實也。東垣以

前補五色

卷三

五

朱德堂

脈微細沉緊或共大而虛。用補陽調經。乃兼責其虛也。母溪用海石。南星。枳椇根皮之類。乃治其濕痰也。竊謂前証皆當壯脾胃。升陽氣為主。佐以各經見証之藥。色青者屬肝。用小柴胡。如山梔。防風。濕熱滯小。便赤。瀉用龍胆。瀉肝。瀉肝血不足。或燥熱風熱。用六味丸。色赤者屬心。用小柴胡。加黃連。山梔。當歸。思慮過度。用妙香散。等藥。色白者屬肺。用補中益氣。加山梔。色黃者屬脾。用六君子。加山梔。柴胡。不應。用歸脾湯。色黑者屬腎。用六味丸。氣血俱虛。八珍湯。氣下陷。補中益氣湯。痰下注。前湯加茯苓。半夏。蒼朮。黃芩。氣虛痰飲下注。四七湯。送六味丸。不可拘。肥人多痰。瘦人多火。而以燥濕瀉火之藥。輕治之也。

一婦人腹脹脇痛。內熱。月經不調。腹體痠痛。不時吐痰。或用

大氣之病

清氣化痰。痰間不利。帶下黃。腹脇膨脹。又用行氣之劑。胸膈不利。肢體如麻。此乃鬱怒傷肝。脾朝用歸脾湯。以解脾鬱。生脾氣。又用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。百餘劑而愈。

一婦人久患帶下。發熱口乾。體倦。用七味白朮散。加麥門。五味。大劑。煎與。愈。飲再發。稍可。乃用補中益氣。加茯苓。半夏。十餘劑而愈。

一婦人頭暈吐痰。胸膈氣喘。得食稍緩。苦于白帶。二十餘年矣。前藥不應。此氣虛而痰飲也。痰飲愈而帶自愈。遂朝用六君子湯。夕

用六味地黃丸。不月而愈。

一婦人耳鳴。胸膈內熱。口乾。喉中若有一核。若吐不利。月經不調。兼之帶下。予以為肝脾鬱結。用歸脾湯。加半夏。黃連。并麻藥。胡。間

以四七湯。下白丸。于而愈。

一婦人吞酸飽滿。食少便泄。月經不調。服清氣化痰丸。兩劑漸愈。

寒熱往來。帶下黃白。面黃體倦。此脾胃俱虛。濕痰下注。用補中益氣。倍用參朮。加茯苓。半夏。連炮薑而愈。

一婦人帶下。四肢無力。予曰。四肢者。主也。此脾胃虛弱。濕痰下注。以補中益氣。濟生歸脾二藥治之而愈。

一婦人帶下黃白。怒則胸膈不利。飲食少思。或用消導利氣之藥。痰喘胸滿。大便下血。予曰。此因脾氣虧損。不能攝血。歸脾。用補中

益氣。加茯苓。半夏。連炮薑。四劑頓減。又用八珍。加柴胡。山梔。而痊。

○論帶久不止當補衛厚脾

李氏曰。凡崩中下帶。或用升提。如升陽調經湯。或用收澀。如伏龍肝散。白芷散。然暫止而終不止者。蓋衛司開闔而為榮血之主。脾

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

居之。之

產室女帶下  
 之  
 此方白芷  
 根排膿散血  
 白芍生肌  
 聚寶丹  
 方用神仙  
 托藥之治也  
 肝經曰婦人  
 腸中有瘕  
 榮衛相干血  
 爲敗濁有可  
 下不可下之  
 異耳兼者之  
 問下血而  
 此產室女帶  
 腹裏白濁  
 不然非特  
 不能否又非  
 仲景之言不  
 能信如熱  
 小腹脹滿爲  
 瘀血在內則  
 可以掌熱煩  
 燥口乾而用  
 溫經藥則人  
 皆難之況此  
 湯有兩性乎  
 夏與寒更難  
 荷信服此  
 宜萬藥全皆  
 主熱  
 此素問所以  
 白淫之所  
 自筋者宗  
 筋也惟久爲  
 產寶云未出女子有三病何也答曰女子一病者經水初下陰中  
 熱或背風臥或扇風二病者太衝脈盛氣盛則內熱以冷水洗之  
 三病者或見丹下驚怖者若三病一有所受後必有帶下之証也  
 準純云帶下並腸有敗膿淋瀝不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷  
 痛此蓋敗膿血所致幸無已期須以此排膿用白芷一兩單葉紅  
 蜀葵根二兩白芍藥白礬煨枯各半兩爲末同以蠟丸如桐子大  
 空裏飯前吞飲下十丸或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之  
 如劑藥  
 論室女帶下  
 大金云婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交發水火不升降或  
 因勞傷于腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰爲澁便之道  
 胞冷腎損故有白濁白淫  
 李氏曰白淫蓋緣思想無窮所願不得意淫于外入房太甚發爲  
 筋痿入爲白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白帶過服熱藥  
 又有日夜流津如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白淫大同多

憂思過度所致。誠難治療。用平補鎮心丹。因思傷脾胃。背四肢。下白丸子。或歸脾湯。治悶少食者。沉香降氣湯。因勞傷腎氣。心腎不交者。金鎖正元丹。小兒絛子丸。威喜丸。

薛氏曰。前證若元氣下陷。用補中益氣湯。脾胃虧損。六君子加升麻柴胡脾經鬱結。歸脾加黃蘗山梔。肝經怒火。龍胆瀉肝湯。虛以用加味逍遙散。宜與帶下參香主治。

一婦人善怒。或小腹痞悶。或寒熱往來。或小便頻數。時下白濁。藥久不愈。面青口苦。予以爲積憤。而不能發散所致。用龍胆瀉肝湯而愈。用加味逍遙散。八珍湯而安。

○脉法

脉經云婦人帶下六極之病脉浮則爲腸鳴腹滿緊則爲腹中痛  
清陽總目 卷三 婦人帶下 九 宋德堂  
數則爲陰中津痛則生瘡數則陰中掣痛。因婦人帶下。脈浮惡寒。

者不治。

○治濕熱帶下

清白散  
治白帶

當歸  
川芎

構根皮酒炒貝母

右到加生薑三片

加酒炒條荊芥。

○腰腿酸痛加鹿。

之濕加升麻柴胡

解帶散  
治血氣不

10

以下四方皆  
丹溪馬造均  
以清濕熱爲  
主故用椿皮  
黃柏然芍藥  
收肝火夏暑  
爲從治而燒  
灰之法獨超  
于諸方奇哉

此方如蒼朮  
以燥中宮地  
榆以溫下部  
枳殼寬氣子

當歸身酒洗 香附子醋炒各一錢五分 白芍藥酒炒 白朮土炒各一錢二分

蒼朮 白茯苓 陳皮去白 牡丹皮各一錢 川芎

玄胡索各八分 甘草炙四分

右到一劑加生薑水煎空心服

椿皮丸 治赤白帶有濕熱者

芍藥 五錢 良薑三錢 黃蘗二錢俱燒灰 椿根皮一兩五錢

右爲末粥丸桐子大每服四五十丸空心米飲下

勝濕丸 治赤白帶因濕熱勝而下者

蒼朮益炒 白芍藥 滑石炒各一兩 椿根皮炒一兩 乾薑煨二兩

地榆 五錢 枳殼炒 甘草各三錢

右爲末粥丸桐子大空心米飲下一百丸乾薑一方用二兩似誤

上清石利  
石與雪文  
比台詩六  
太德

子下乾雲從  
而暴風也用  
著癰瘡月方  
治下  
等良反二  
荷葉一兩  
去六  
中炮炒  
去反鹽炒

三兩者非  
二兩者非  
一兩者非

柏林皮  
兩六藥半  
蒼才  
和楚  
麥皮雞

貢漢妙谷廿五  
只枝各半

黃蘗一兩 滑石 枳殼兩

此以脈數爲用  
右爲未張丸  
桐子大每五  
十九空心米  
飲下

黃連側柏不側伯禪皮丸 治白帶因七情所傷而脉數者

檳榔皮 香附子 白芍藥 白木 附子 俱 栢葉 蒸

黃連炒、黃柏炒、白朮炒、三錢

龍白水種中  
氣而培土之  
右粥丸。桐子大米飲下七十丸。

按椿根皮性涼而燥濕熱盛者宜之後一方有黃連香附木香

故可治七情所傷

香練丸 治赤白帶下甚妙

100



下消諸症

此方溫燥  
有熱所宜

此利氣  
之劑與寒

三方皆燥  
下氣利水

苦棟 浸酒 懷香 各一方 當歸 各分

有為末酒和丸如桐子大每服三五十丸空心溫酒下○瘕血加桃仁○血海寒加桂○如腰痠疼四物湯四錢加羌活防風各一錢煎湯送下

四神丸 治帶下

香附 四兩 蒼朮 治瘕 枳殼 枳實 砂仁 各兩  
右為末黃米煮飯丸桐子大每服五六十丸空心酒下  
已上諸方俱輕劑

萬安散 治女人赤白帶下或出白物如脂或有臭濁汚水並神效

小茴香 炒 木香 各二錢 黑牽牛 一兩 另

右為細末以生薑自然汁調二錢臨臥服取盡惡物為效末盡間日再服二錢後以白粥補之忌熱毒物

大聖萬安散 治女人瘕瘕瘕氣腹脹胸滿赤白帶下及患血氣虛弱痿黃無力並休息赤白痢疾並皆治之其効不可具述孕婦不可服天陰晦不可服

白木 木香 胡椒 各二錢 陳皮 去白 黃芪

桑白皮 木通 各五錢 白牽牛 炒取頭末 二兩

右為末每服二錢用生薑五片水一鍾半煎至一鍾去薑調藥臨臥服須臾又用薑湯或溫白湯飲三五口催之平明可行三五次取下惡物及臭汚水為度後以白粥補之服藥不可食晚飯及葷酒等物

宣明導水丸 治濕熱滯于下焦之分赤白帶下不止燥熱煩渴

大黃 黃芩 各二錢 牽牛 頭末 滑石 各四兩

右為末水丸如桐子大每服四五十丸滾水下隨證加減已上諸方俱重劑

○治濕痰帶下

滲濕消痰飲 治濕熱痰積滲入膀胱白帶不止

白木 蒼朮 炒 半夏 姜湯泡 橘紅 白茯苓

白芷 香附 各一錢 甘草 炙 五分

右剉水煎服○有熱加黃芩○血虛加芎歸○氣虛加參朮○久不愈加升麻柴胡升提之

蒼栲栳皮丸 治肥人白帶是濕痰

蒼朮 黃柏 枳殼 枳實 南星 半夏 海石

川芎 香附 乾薑 炮 各等分 ○暑月去乾薑加滑石

右為末醋和丸如桐子大每服五六十丸白湯下

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰及濕痰熱痰並治婦人結痰白帶惟胃虛少食者忌用

甘遂 濕熱痰涎一方便 芫花 好醋拌經宿泥器

大戟 長流水煮乾一時再用 黃藥 炒 內燒器不可焦

大黃 濕熱痰涎勿令焦切焙乾再

右為末以白木膏丸如羅荷子大臨臥津液嚥下五七丸或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服○一方加木香栲栳各半兩

補藥方 治痰結白帶。先以小胃丹半餅半飽津液嚥下。數丸。俟肝陰清熱而痰花之取。其領心向目。之意。蓋花性。而用陽。二。入氣分。一。入血分。首使。從陽而升。清。自止也。

○治風邪帶下  
胃風湯 治風邪入于胞門。或中經脉流傳臟腑。帶下五色。  
人參 白朮 茯苓 當歸 川芎  
芍藥 肉桂 各等分  
右剉。每服八錢。入粟米一撮。水煎服。○腹痛加木香。○五積散。去麻黃。亦可。

濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十三 天德堂

小柴胡湯 治風邪帶下五色  
柴胡 二錢 黃芩 半夏 人參 甘草 各一錢  
右剉。加生薑三片。棗二枚。水煎服。○色青屬肝。加山梔。防風。色赤屬心。加黃連。山梔。當歸。○色白屬肺。用補中益氣湯。加山梔。○色黃屬脾。用六君子。加山梔。柴胡。不應。用歸脾湯。○色黑屬腎。用六味地黃丸。

蒼柏參茸散 治婦人上有頭風鼻淵。下有白帶。  
辛夷 川芎 蒼朮 黃柏 南星  
半夏 滑石 牡蠣 黃芩 酒炒  
右水煎食後服。

地榆散 治漏下五色。一十二帶。兼治嘔吐下血。地榆三兩。剉碎。

以醋水各半。升煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。○本草注云。地榆。主帶下。十二病。一曰多赤。二曰多白。三曰月水不通。四曰陰蝕。五曰子臟堅。六曰子門辟。七曰合陰。陽虛痛。八曰小腹寒。痛。九曰子門閉。十曰子宮冷。十一曰夢與鬼交。十二曰五臟五定。

○治虛損帶下  
衛生湯 治帶下不止。脉微弱。腹痛。  
黃芪 三兩 當歸 白芍藥 各二兩 甘草 一兩  
右爲粗末。每服半兩。水煎。空心服。○一方下苦練丸三十粒。虛者加人參一兩。

補中益氣湯 治勞役過度。飲食不節。損傷脾胃。以致陽氣下陷。  
黃芪 人參 白朮 甘草 各一錢 當歸 陳皮 各七分 升麻 藥胡 各三分  
右作一服。水煎服。

六君子湯 治胃虛有痰。飲食減少。中氣不和。時時帶下。  
人參 白朮 白茯苓 甘草 各一錢 陳皮 白半夏 各一錢  
右剉。一服。加生薑三片。水煎服。

歸脾湯 治思慮過度。傷心脾。以致健忘怔忡。驚悸不寐。怠惰嗜臥。不思飲食。時常白帶不止。方見血崩門。  
加味八珍湯 治婦人氣血兩虛。赤白帶下。  
當歸 川芎 白芍藥 生地黃 人參 白朮

脾不健運 補心此方其 近之 爲絕者也 其山藥杜仲 烏梅又補帶 脉之不足而 加減法亦皆 得理宜法之  
 白茯苓 山藥 杜仲 香附 甘草 分  
 右加烏梅一箇生薑三片取一枚水煎食前溫服○肥人加半  
 夏○瘦人加黃柏○飽悶去人參加砂仁○腹痛去人參加小  
 茴香玄胡○冬月加炮乾薑○日久元氣下陷加升麻柴胡升  
 提之  
 當歸澤蘭丸 治婦人經脈不調赤白帶下久無子者  
 香附子 用極大子淨去毛一分四分童便浸四兩酒浸  
 當歸 酒浸 白芍藥 川芎 熟地黃 生地黃 各二  
 澤蘭葉 艾葉 白朮 各一 黃芩 二  
 右爲末醋糊爲丸如赤小豆大每服六十丸空心白湯或酒下  
 止帶丸  
 濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十五 天德堂  
 當歸 酒洗 川芎 白朮 人參 山藥  
 杜仲 剉去絲酒 破故紙 炒牡蠣 煨 椿根皮 炒  
 續斷 分 青黛 半  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心米湯下○腹痛  
 加玄胡索小茴香○肥人加薑製半夏○瘦人加酒炒黃柏○  
 冬月加炮乾薑少許○夏月加黃柏  
 嚴氏當歸煎 治赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦  
 當歸 酒 赤芍藥 炒白芍藥 炒熟地黃 酒蒸 阿膠 炒  
 續斷 酒 牡蠣 煨 地榆 兩  
 右爲末醋糊丸如桐子大每五十丸空心米飲下  
 延壽鬼絲丸 治赤白帶下此藥不熱不寒得其和平助陰生子

此方以龍 白芍藥酒以 山藥木香補 氣以正養而 治諸中淋瀝 以壯中而 濕治帶此又 別是一神意 見然不用丹 歸地黃者慮 血藥溫而也 寒局如此可  
 內庭 浸 延壽子 覆盆子 蛇床子 各一兩  
 當歸 酒洗 白芍藥 炒 川芎 各一 牡蠣 煨 烏賊骨 各八  
 五味子 防風 各六 黃芩 五錢 艾葉 三錢  
 右爲末煉蜜丸桐子大每服三四十丸鹽湯下早晚各進一服  
 補宮丸 治婦人諸虛不足久不妊娠骨蒸形瘦崩中帶下並宜  
 治之  
 鹿角霜 白芍藥 白朮 白茯苓 山藥  
 香白芷 白薇 牡蠣 煨 烏賊骨 各等  
 右爲末麵糊丸如桐子大每服五十九空心米飲湯下  
 丹溪方 治白帶屬真陰虛者  
 龜板 炙 枳子 各二 黃藥 炒一 香附子 山藥 煨  
 濟陰綱目 卷三 帶下諸方 十六 天德堂  
 苦參 楊皮 貝母 各半 白芍藥 七錢 乾薑 炒二  
 右爲末酒糊丸如桐子大每服五十九空心米飲下  
 千金方 治帶下脉數者陰虛有熱也  
 柯杞根 一 生地黄 五兩 一方五斤  
 右二味以水一斗煮取五升分三服  
 補真固經湯 一婦白帶漏久服藥不效診得心胞尺脉極微其  
 白帶流而不止脉決云崩中日久爲白帶漏下多時骨蒸枯言  
 崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白帶之物下  
 流不止是本經血海將枯津液俱亡枯乾不能滋養筋骨以本  
 經行經藥爲引用爲使以太辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益

凡東垣立方  
必原脈理  
思慮處且又  
引前古為証  
故治病多効  
今不能然何  
怪乎此之不  
效也此方以  
用參後益時  
李仁森九淵  
樂樂明升清  
氣于下腹皮  
和胃氣于中  
生李后廣其  
其清涼不滯  
也非深慮者  
不能主此方  
名曰補真經湯

津液以大辛熱之氣味補其陽近生其血脈以苦寒之藥泄其  
肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥佐而益元氣  
名曰補真經湯

人參 乾薑 各一  
生黃芩 另郁李仁 去皮 柴胡  
甘草 炙各橘皮 五分 白茯苓 十六分  
右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至二  
盞去滓空心熱服候少時以早膳壓之

助陽湯 治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山  
陰中如冰 一名升陽  
柴胡 一錢 二錢 防風 郁李仁 乾薑  
甘草 各一 白茯苓 七陳皮 生黃芩 各五  
治陰虛目 卷三 帶下諸方 十七 天德堂

右劉散只作一服水二盞煎至一盞食前熱服  
右二方用葵花郁李仁之滑以潤燥盡枯涸滯者宜之  
○治虛寒帶下  
元戎四物湯 治婦人赤白帶下脉沉微腹痛或陰中痛  
四物湯 附子 炮各  
右劉水煎食前服○一方四物加懷香桂  
玉仙散 治赤白帶下  
乾薑 白芍藥 炒附子 炒焦各 甘草 生用  
右為細末每服三錢用水白酒調下○一方只用白芍藥酒炒  
二兩乾薑炮半兩為細末水飲調下二錢  
延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

又以前輩中  
如桂附藥知  
不同之故在  
脈症上察計  
蓋人之病利  
氣血之病放  
立方之師亦  
因事制宜也

延胡素 苦練子 各二 黃柏 一分 附子 肉桂 各三  
甘草 炙 熟地黃 一  
右作一服水煎食前服

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒  
肉桂 附子 黃藥 知母 各五  
右作一服水煎食遠熱服○如少食常飽有時似腹脹加白芍  
藥半錢○如不思飲食加五味子二十個○如煩惱面赤麻木  
如蟲行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢八分七分甘草五分并  
麻五分○此補陽氣極虛用黃柏等藥引用又升降陽藥也  
當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下  
當歸 二 乾薑 附子 各一 藥附 各  
升麻 各五 甘草 炙 炒黃連 三 薑 各  
右為粗末每服五錢水煎溫服為尤亦得○東垣回陽丹註云  
必用炒黃連無則不効蓋寒疝之要藥也  
酒煮當歸丸 治癰疽白帶下注脚氣腰以下如在冰雪中居火  
坑以厚衣重蓋猶冷小便不止與白帶長流而不禁固肌肉消  
瘦面白目青目慌慌無所見身重如山行步欹側腿膝枯細大  
便閉結心下痞悶懷懷飲食不下面黃背寒小便澀而不知此  
上中下三陽真氣似竭故噤嚥不止胃寒之極也其脉沉緊而  
澀按之空虛若脉洪大而澀按之無力猶為中寒之証况按之  
空虛者乎按之不鼓是為陰寒之極也其空虛乃氣血俱虛之  
極也

今有婦人... 右四味到如麻豆大以好酒一升半同煎煮至酒盡為度炭火  
焙乾同為細末入後藥  
始乾同為細末入後藥  
炒黃鹽 丁香 各半 全蝎 三 柴胡 二 升麻 根  
木香 各一 苦練子 甘草 五分 玄胡索 錢四  
右同為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十丸空心宿食消  
盡淡醋湯下忌油膩冷物酒麵  
暖宮妙應丸 治婦人赤白帶下及子宮虛冷無子者  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 艾葉  
牡丹皮 茯苓 龍骨 牡蠣 赤石脂 各等  
右為末麵糊丸如桐大每服五十丸空心艾醋湯下  
海陰補目 卷三 補下清方 十九 天德堂  
錫頂丸 治帶下之證有三未嫁之女月經初至而即得或浴  
之以冷水或熱而弱或當風此室安病帶下志由有燥之婦陰  
陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞經屬冷遂成穢液與血水  
相連而下產後帶下由亡血失氣傷動胞絡門開而外風襲肌  
體虛而冷風入冷風與熱氣相連故成液而下冷則多白熱則  
多赤冷熱相交赤白俱下  
當歸 七錢半 附子 炮去皮 龍骨 包紙 吳茱萸 湯泡  
赤石脂 火煨 乾薑 炮各 牡蠣 一兩二錢 艾葉 半兩以醋  
右為細末研勻醋糊和丸如桐子大以赤石脂為衣每服五十  
丸空心用艾葉食鹽烏梅煎湯下  
白蘇丸 治室女衝任虛寒帶下純白

降血之方... 右為細末艾煎醋汁打糊丸如桐子大每服五十丸空心溫酒  
送下  
神仙聚寶丹 一名琥珀 治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散  
積聚成塊或成堅癖及血氣攻注腹痛疼痛小便急脹或虛弱  
嘔吐涎沫頭眩眼花腰膝重痛面色萎黃肢體浮腫月候欲行  
先若重病或多或少帶下赤白崩漏不止驚怖健忘小便頻數  
或白時見虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆治之  
常服安心去邪逐敗血養新血令有子  
當歸 木香 琥珀 沒藥 各一 滴乳香 二錢  
麝香 辰砂 各一  
右各另研為細末合一處研勻水丸如龍眼核大每用一丸溫  
酒磨下不拘時○胎息不順腹內疼痛一切產難瀉重便下  
○產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發熱面浮前烏  
梅湯和重便磨下○室女月候不調溫酒磨下半丸○產後血  
氣不調瀉便磨下  
朱黃粉湯 治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水崩漏淋瀝不  
斷  
吳茱萸 湯泡 杜仲 炮去 蛇床子 五味子 丁皮 各一  
木香 丁香 各半  
右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗煎數沸乘熱  
熏下部通手淋浴早晚二次薰洗

生藥龍鹽膏 治帶下  
 玄胡索 厚朴 當歸 茴香 炒黃鹽  
 酒防已 肉桂 紅豆 龍骨 川烏頭  
 丁香 木香 各一錢 良薑 木通 各一錢 全蝎 三枚 椿椿 五  
 右為末煉蜜丸彈子大綿裹留經在外納陰戶內  
 勝陰丹 為上藥力小再加三錢內加行性熱藥  
 羌活 柴胡 各二錢 大蘇 破故紙 各一錢 同煎  
 三奈子 川烏頭 大椒 各一錢 甘松 三錢 升麻  
 柏白卷 各一錢 全蝎 三錢 同煎  
 右為細末同前法製用  
 回陽丹  
 金竭 升麻 甘松 各二錢 草烏頭 羌活 各三錢  
 大椒 三奈子 蘇合 枯礬 各五錢 大蘇  
 破故紙 各二錢 水蛭 三錢 川烏頭 柴胡 各七錢  
 右為極細末依前製如指尖大用綿裹納陰戶中覺熱下煖為  
 効  
 如聖丹 治婦人經脈不調赤白帶下  
 柏礬 蛇床子 兩  
 右為末醋為丸如彈子大用臘脂為衣綿裹放陰戶中定坐半  
 日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難  
 効此取易達且速効而不傷腦氣也○一方用枯礬川烏各等

分煉蜜丸如彈子大綿裹納陰戶中治帶下絕產  
 側柏地榆湯 治赤白帶下以設不能成孕  
 黃芪 側柏葉 地榆 烏賊魚骨 白殭絲  
 牡蠣 用鹽泥固濟火煨肉從容浸白芷 蛇床子 各一錢  
 右到加生薑三片水煎半饑時服  
 白芷散 治赤白帶下  
 白芷 兩 海螵蛸 二個 胎髮 一團 細末空心溫酒調下二錢  
 伏龍肝散 治赤白帶下久患不癒延悻乏力六脉微濡  
 機欄 不拘多少燒研急伏龍肝 於蚌殼下取赤  
 屋梁上懸屋 炒令烟盡  
 有各等分研勻入龍腦麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋湯  
 下患十年者半月可安  
 馬蹄丸 治白帶不絕  
 白馬蹄 禹餘糧 各四錢 龍骨 三鳥鯊魚骨 白殭絲  
 赤石脂 各二錢  
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服十九空心酒下不止加至三  
 十九  
 固真丸 治白帶大下不止崩漏其寒捫之如冰腹中亦然  
 目中溜火上壅視物眩暈無所見齒齋惡熱飲痛須得黃連末  
 擦之其痛乃止惟喜乾食大渴湯飲此病皆寒濕乘其腹內故  
 喜乾而惡濕肝經陰火上升走於標故上壅而目中溜火腎水

侵肝而上溢故目眩眩無所見齒惡熱飲者是少陽明經中伏火也當大湯寒溫以左藥治之故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散以酒製白石膏龍骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱濕寒水以黃藥之大寒為因用又為鄉導故黃藥者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所主先其所因之意又為鄉導中惡熱也以此藥為本經之便以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脈用藥之法簡矣。

白石脂 燒赤水漿柴胡各一白龍骨二錢酒煮日

當歸三錢乾薑炮四黃藥洗白芍藥各五

右為細末水煎稀糊為丸如雞頭大每服三十丸空心宿食消

消食利目 卷主帶下諸方

溫酒白湯湯放溫送下無令胃中停住待少時以豆磨壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒溫過

一方治赤白帶下不問遠年近日並皆治之

龍骨半 舶上硫黃三錢

右為細末每服半錢空心無灰酒下

草花散 治婦人血崩不止赤白帶下

草花一 櫻欄皮三錢荷葉三錢甘草三錢

右為細末空心酒調半匙服

雙白丸 治白帶如神

石灰一 白茯苓二

右為末水丸桐子大每服三十丸空心白水下

此方自是血

初藥當入血

白附丸 有婦經年崩漏不止諸藥不効脉滿微此與前伏龍肝散兼服愈

白附子四 附子二 黃狗骨頭四兩

右為細末藥丸桐子大每服三十丸

地榆膏 治赤白帶下骨立者 此膏血氣稠熱

地榆一筋用水三升煎至一半去渣再煎如稠傷絞淨空心服三合日二服

治白淫白濁

加陳四七湯 治婦女小便不順甚者陰戶疼痛

半其 次一兩厚朴 赤茯苓 香附子 各五錢

右為細末水煎稀糊為丸如雞頭大每服三十丸空心宿食消

消食利目 卷主帶下諸方

溫酒白湯湯放溫送下無令胃中停住待少時以豆磨壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒溫過

一方治赤白帶下不問遠年近日並皆治之

龍骨半 舶上硫黃三錢

右為細末每服半錢空心無灰酒下

草花散 治婦人血崩不止赤白帶下

草花一 櫻欄皮三錢荷葉三錢甘草三錢

右為細末空心酒調半匙服

雙白丸 治白帶如神

石灰一 白茯苓二

右為末水丸桐子大每服三十丸空心白水下

此方自是血

初藥當入血

內金鹿茸丸 治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度

婦男子赤白帶下 崩漏 經閉 產後 諸症 治法 鹿茸 黃耆 雞內金 肉蓯蓉 五味子 遠志肉 牡蠣 桑螵蛸 龍骨 附子 各等 右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或米飲任下

金鎖正元丹 治真氣不足吸吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗及婦人白濁白淫等證

肉蓯蓉 治紫巴戟心 補虛巴 妙各補骨脂 酒浸炒

五倍子 治八莖苓 六兩 砂砂 另研 龍骨 二

右為末入藥研令勻酒和丸如桐子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

濟陰綱目 卷三 婦下諸方

王五 天德堂

威喜丸 治丈夫元陽虛弱精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頻泄及婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟 治白茯苓 去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於磁器

右以茯苓為末熔黃蠟搜為丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只喫糖醋尤忌使性氣

烏金散 治身熱口燥氣喘痰痛下黃水如葵汁

百草霜 炒 紫金皮 米泔浸粉草 各等

右為末每服二錢艾湯或醋湯空心調下○心嘈諸血入鹽酒下○白帶用鯉魚一尾去腸不去鱗將油髮一團入魚肚內黃泥固濟炭火內煨存性去泥研魚為末每用一錢以陳酒調同

此方簡切久服補佳

濟陰綱目 卷三 婦下諸方

王五 天德堂

前藥服

一方 治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

鹿茸 煨炒黃為細末每服二錢空心溫酒調服



濟陰綱目卷之四

吳興 金德生問風父輯著 白嶽 曹敬祚長胤父訂正  
西陵 汪 淇橋潘子鑑釋 天都 查 望于周父參閱

虛勞

○論婦虛勞與男子不同

補中益氣是治勞倦內傷之劑乃初治之方久病虛勞熱盜汗欬嗽諸證出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不為朋膚骨體中熱經閉不行諸證出焉謂之瘵瘵熱至於傳尸之疾則自一種其源不起於勞飢其流或至於滅門余於雜病首冊則既條分而備列矣然男以精為主女以血為主其致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵瘵勞血

按血虛勞瘵用血虛而風今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥杜丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛也

戴氏曰有病後血虛者有本血虛者其人在來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈交生諸疾焉歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯即香附末

○論無熱虛勞

陽虛虛勞乃陽虛虛其病自上下而下之脈也法宜溫補惟東垣元氣立論先生獨得其旨薛氏曰前證有內外真寒有內外真熱有內外假寒有內外假熱而外似熱者若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中湯以同陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒而外

腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒而外

假寒也亦用解毒湯六味丸若飲食少思大便不實吞酸噯氣胸腹痞滿手足逆冷面赤嘔吐畏見風寒此內外真寒而外假熱也亦用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之經曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光使不知真水火之不足泛以寒熱藥治之則舊疾未去新病復生矣夫所謂屬者猶主也謂心腎也求其屬也者言水火不足而求之於心腎也火之源者陽氣之根即心是也水之主者陰氣之根即腎是也非謂火為心源為肝木為腎主為肺也

一婦食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經不調手足逆冷此內外俱寒之證以六君加香附木香治之而瘳

一婦忽嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟喜冷水面色青赤投之

以內外俱寒而不用附子理中何也

黃連黃芩... 以藥入口... 婦內熱作渴... 一婦初患... 壯火生土... 背冷... 之證也... 藥如減而病... 卷四... 婦人... 四十餘日... 下部疾愈... 證也... 之屬... 何謂也... 從之下... 金丹錯綜... 以上論及治驗... 爾不可不察也

論有熱虛勞... 大寒而甚... 忽往來時動... 清陰綱目... 腎虛則寒... 物參朮... 血虛加味... 丹肺經氣... 氣分用清... 丹皮熱從... 黃耆熱從... 麥門冬肉... 腳心起此... 味主之... 一婦經行不調... 飲食少思... 日脯熱甚... 此肝脾氣血俱虛... 用十全大

補加山藥。山藥牡丹皮。麥門五味。而漸次年秋。寒熱如瘧。仍用前藥。而漸一婦生育多胎。經月不調。兩足發熱。年餘其身亦熱。勞則足痠痛。又年許唇腫裂痛。又半年唇裂見血。形體疲倦。飲食無味。月水不行。此氣血俱衰之證。彼誤用通經丸等藥。復傷氣血。遂致不起。

○論察骨蒸熱

骨蒸有鬼病。常察故。骨蒸之病。多因經行胎產。或飲食起居。七情重傷。肝脾之所致。又或失於調攝。或過於攻伐。而成功與男子治法。稍有不同。故彙集古藥方。專治婦人者。於此若欲究其源流。更當稽之彼籍。

○論血風勞

肝熱生風。故病名血風。血勞者。病久血虛。月候不行。而體熱不止也。此是肝腎之陰不足。故五原主治。肝熱生風。故病名血風。血勞者。病久血虛。月候不行。而體熱不止也。此是肝腎之陰不足。故五原主治。

○論血風勞  
大全云。婦人血風勞證。因氣血素虛。經候不調。或外傷風邪。內挾宿冷。致使陰陽不和。經絡痞澀。腹中堅痛。四肢痠疼。月水或斷或來。面色痿黃。羸瘦。又有因產後未滿百日。不謹將養。臟腑虛腫。百脈枯渴。遂致勞損。久不瘳。則變寒熱。休作有時。飲食減少。肌膚癢。瘡。遇經水當至。即頭目昏眩。胸背拘急。四肢疼痛。身熱煩躁。足重。

面乎或經水不通。故謂之血勞氣也。

薛氏曰。東垣云。喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故因熱懶言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐。存養其氣。以甘寒瀉其熱。氣以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之。要略云。平人脈大為勞。以黃耆建中湯治之。

一婦人勞則足跟熱痛。此足三陰血虛。用聖愈湯而痊。後遍身癢。誤服風藥。發熱抽搐。肝脈洪數。此肝家血虛。火盛而生風。以天黃膽星為丸。用四物麥門五味。參連炙甘草。山梔柴胡。煎送而痊。

○治虛勞平補諸方

增損四物湯。治婦人氣血不足。四肢怠惰。乏力。少氣。兼治產後下血過多。榮衛虛損。陰陽不和。乍寒乍熱。

當歸 川芎 白芍藥 人參 乾薑 炮甘草 等分  
右咬咀。每服四錢。水一盞。煎至六分。去滓。熱服。  
六神湯。治脾氣不和。榮衛不足。怠惰困倦。不嗜飲食。服之補養其氣。進美飲食。充澤肌膚。  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃耆 地骨皮 各等分

右為純末每服五錢水煎空心溫服

**聖愈湯** 治血虛心煩睡臥不安或五心煩熱  
黃耆 當歸 酒洗各一錢 人參 川芎 熟地黃 酒洗

**右水煎服**

**加減大建中湯** 治婦人胎前產後一切虛損月水不調膈腹疴痛往來寒熱自汗口乾煩渴  
芍藥二兩 當歸 川芎 黃耆 肉桂 各一 白木 錢五分

**右為末每服二錢加薑棗水煎服食前**

**當歸建中湯** 治婦人一切血氣不足虛損羸乏  
當歸 四兩 白芍藥 兩 肉桂 去皮 甘草 各二兩

**右咬咀每服三錢加生薑三片棗三枚水煎空心服此方以歸無著木雖藥和中氣在血分是藥加配合之妙則知古人之心**

**雙和散** 治一切大病之後虛勞乏力補血益氣  
黃耆 熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 各一錢

**肉桂 甘草 各五分**

**右咬咀每服四錢加生薑三片棗二枚水煎服**

**補中益氣湯** 治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦目漸羸弱  
黃耆 人參 各一錢 白木 錢五分 當歸 陳皮 各七分

**升麻 柴胡 各三分**

右作一服水煎食遠熱服

**八珍湯** 治脾胃虧損氣血俱傷垂入之生以脾胃為主脾胃一虛諸臟失所百病生焉  
即四君子合四物湯加薑棗煎服

**歸脾湯** 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血妄行或健忘怔忡驚悸或心脾傷痛意懶嗜臥飲食不思  
方見血崩門 勞傷條

**黃耆散** 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此因失血榮衛損也  
黃耆 防風 當歸 白芍藥 熟地黃 各七錢 甘草 兩 錢五分

**右每服五錢薑三片棗一枚水煎食前溫服**

**補陰綱目** 治心不足解勞倦益血  
黃耆 人參 麥門冬 去心 桔梗 甘草 各二兩 肉桂 半兩 白芍藥 兩 錢五分

**右為末每服三錢水一盞煎七分溫服** 此方以養心氣為要也故門者所以通心而清火桔梗散諸藥以益上焦之氣黃耆皮利氣以制諸藥之毒所謂血生於氣切勞散治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不安此多與此藥能治微有咳嗽唾中有紅線名曰肺痿失治便成癰癆之疾

**白芍藥 六錢 黃耆 四兩 人參 去心 白茯苓 半兩 甘草 兩 當歸 酒洗 五味子 阿膠 熟地黃 各二兩**

**右咬咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三**

補肺湯 治勞嗽五服虧損肺熱發熱盜汗自汗咳嗽喘急  
 人參 黃芪 柴芩 五味子 熟地黃  
 桑白皮 炒各一錢  
 右剉水煎入蜜少許食後服  
 補中丸 治婦人虛損諸疾  
 白朮 熟地黃 各一當歸 白芍藥 炒 川芎  
 黃耆 人參 陳皮 各半  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸溫水下  
 人參丸 養陰生血補虛  
 人參 白朮 鹿角膠 當歸 芍藥 川芎  
 熟地黃 各等  
 濟陰綱目 卷四 補勞方  
 右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米飲下  
 七補丸 治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結狀若懷孕月候  
 尚來未分經脈宜服此方  
 當歸 川芎 芍藥 各三熟地黃 白朮 白芷  
 阿膠 炒各二分  
 右爲細末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心米飲下  
 十補丸 治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦面黃背倦口苦  
 舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱往來一切血崩帶下墮胎落孕  
 此藥皆治孕婦服之尤有神效  
 熟地黃 淨洗酒浸蒸過 肉苁蓉 酒浸 人參 黃耆 去蘆  
 當歸 酒浸 川芎 白芍藥 白茯苓 白朮 各一兩

滋陰百補丸 治婦人勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和  
 生寒乍熱心腹疼痛不思飲食庭廡乏力  
 香附 剉用酒醋鹽湯煮 益母草 半 當歸 酒洗 六兩 川芎  
 熟地黃 炒 白朮 各四兩 白芍藥 炒 三 玄胡索 炒 人參  
 白茯苓 各二兩 甘草 一兩  
 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸砂仁湯或酒或醋  
 湯白滾水任下空心服  
 羊乳丸 治虛勞羸瘦  
 濟陰綱目 卷四 補勞方  
 黃耆 蜜 地黃 酒洗 秦芩 山茱萸肉 柴胡 地骨皮 等  
 右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸煎人參湯下不拘時候  
 日進三服  
 六味丸 一名地黃丸 治腎經不足發熱作渴小便淋瀝氣壅痰  
 嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痠軟自汗盜  
 汗便血諸虛失音水泛爲疾血虛發熱等證其功不能盡述  
 熟地黃 八兩 山茱萸肉 乾山藥 各四兩 牡丹皮 白茯苓  
 澤瀉 各三兩  
 右各另爲末和地黃膏如煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空  
 心食前滾湯下  
 八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便

此方原名醫

益陰腎氣丸 治諸臟虧損發熱肺熱潮熱盜汗或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴月經不調或筋骨痠痛飲食少思或頭目不清痰氣上壅咳嗽喘甚胸膈痞悶或小便赤數兩足熱痛或脚足痿軟肢體作痛等證此壯水之主以制陽光之劑

熟地黃 八兩 山茱萸肉 山藥 各四兩

白茯苓 牡丹皮 澤瀉 各三兩 當歸 二兩

五味子 炒各 二兩 生地黃 酒浸 各二兩

右為末入二荷加煉蜜丸如桐子大每服五十九空

心淡鹽湯下

烏雞煎丸 治婦人百病血氣虛勞赤白帶下等證

黃耆 當歸 各六兩 香附子 四兩 白茯苓 三兩 人參 官桂 各二兩

熟地黃 生地黃 地骨皮 各二兩

右為烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末和煖麵丸雞頭實大喂雞眼生胎卵死去腸肚及毛洗淨槌碎骨前藥並納雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙乾並研為末用汁打糊丸如桐子大每服五十九空鹽湯下

人參煎丸 治婦人一切虛損肌肉瘦瘠盜汗心忪咳嗽上氣經脈不調或作寒熱不思飲食

人參 當歸 赤芍藥 杏仁 湯浸去甘草 各一兩 桔梗 去 柴胡 各一兩 地骨皮 宣黃連 胡黃連 各一兩 肉桂 去 木香 各一兩 麝香 另研 龍甲 一枚 重二兩 者 磨碎黃色

右為細末用青蒿一觔研爛絞汁童子小便五升酒五升同熬至二升次入真酥三兩白砂蜜三兩再熬成膏冷方下藥末搜和令勻丸如桐子大每服五十九空溫酒送下無時

艾煎丸 治婦人諸虛

杜艾葉 大當歸 各三兩 香附子 四兩

右醋煮半日焙乾為末再用醋煮糊丸艾醋湯下

黃耆丸 補虛敗

黃耆 四兩 鹽水 北五味 二兩

右為末糯米糊丸空心鹽酒下

○治無熱虛勞

附子理中湯 治真陽不足飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食生不旁也名

附子 治真陽不足飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食生不旁也名

畏寒手足逆冷

白朮 人參 乾薑 炮 甘草 炙 附子 炮去皮臍 各等分

右到每服四錢加生薑十片水煎服

黃耆建中湯 治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生氣血

補益榮衛

黃耆 三兩 白芍藥 炒 四兩 肉桂 半錢 甘草 炙 二兩

右咬咀作一服加薑棗水煎食前服

加味黃耆湯 治陽虛惡寒

黃耆 二錢 人參 白朮 甘草 炙 各一錢 肉桂 五分

右到水煎服○甚者加附子

十全大補湯 治婦人冷勞最妙

當歸之用結 火之其或曰 當歸味辛可 以調經氣 不知辛溫之 味乃流行之 物非所以納 氣也蓋當歸 不裁而陰生 所謂水滋所 厚也動則氣 散而水滋所 謂失其用也 也水滋所 旺而反納氣 夏火旺而水 行可想命名 之義矣辛溫 之物加于納 氣九中宜乎

方見經閉血枯條

渾身碎痛引子 治婦人勞倦

虎骨錢五

防風

藥本

白芷

茯苓

甘草

白木

當歸

芍藥

續斷

附子

錢各二

右為鹿末雞卵煎服不拘時

木香九 治婦人冷勞經脈不調 臍腹氣滯 四肢疼痛 飲食無味

漸加煎服

木香

琥珀

吳茱萸

炮當歸

牡丹皮

赤芍藥

三稜

附子

炮延胡索

川芎

錢各七

乾薑

人參

桂心

各半

北柴胡

白木

黨甲

厚朴

熟地黃

陳橘皮

各一

濟陰綱目

卷四

婦人

經閉

血枯

條

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心溫酒下

戊巳丸 治新婚男子女人素稟虛寒滑泄飲食無味肌肉不生

多睡少寐終日昏蒙夜多異夢畏寒喜熱噤食嘔吐清水狀如

翻胃此藥養脾開胃滋血氣長肌肉添精益髓補緩丹田

茴香

白茯苓

香附子

炒各

三兩

胡椒

甘草

炙各

白木

二兩

硃砂

研細

右為細末生薑汁打糊丸如桐子大每服三三十丸空心食前

白湯下日三服

砂九 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢麻痺不食

驚甲

醋炙

桃仁

去皮尖

木香

五靈脂

砂

二兩

醋炙

砂

升

熟成膏

肌肉裏故用

且蘇同步

仁甘苦

潤肺下氣而

除痰也然氣

不足則寒而

心忪血不足

則熱而汗出

故又于補氣

血之中一加

柴胡地骨黃

連以除熱一

加肉桂木香

以溫寒亦涉

散血中之氣

吞仁破氣中

之滑胡連散

用荷荷散便

搜骨蒸之熱

而以射荷

引者是欲

外通而結

難也又何不

足之有此方

調氣調經行

血養血凡

附九可以此

作祖

石為細末用硃砂膏為丸如桐子大空心溫酒下二十九粒此方

太多不

宜輕用

○治有熱虛勞

遺精散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤

口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹

痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰溼潮熱肢體麻

痺漸成骨蒸

當歸酒

白芍藥酒

白茯苓

柴胡

甘草

各五分

右到散水一盞半生薑三片麥門冬二十粒去心煎七分不拘

時服○一方用薄荷少許無門冬

熱甚加牡丹皮梔子炒

骨蒸加知母地骨皮

咳嗽加五味子紫苑

吐痰加半夏貝母瓜蒌仁

飲食不消加山查神麴

發渴加麥門冬天花粉

胸中作熱加黃連梔子

心忪加遠志酸枣仁

吐血加阿膠生地黃牡丹皮

自汗加黃耆酸棗仁

久渴加炒黑乾薑

六九為和

此方只宜連

中二字上

此方只宜連







熱一開藥一  
 黃芩各七錢半 赤芍藥 木香 麝香細研各半兩  
 右為龍末每服四錢以水一中盞入生薑一錢三分桃柳心各七莖煎至六分去滓不拘時溫服  
 亦可法  
 較前方少四厘角散 治婦人熱勞心煩熱不思飲食四肢多疼經脈澀滯  
 犀角屑 黃芩 甘草各半兩 赤芍藥 虎杖 茯苓 地骨皮 麥門冬去心枳殼微炒當歸各七錢半 柴胡 紅藍花 鱉甲醋炙黃去裙各一兩  
 右為龍末每服三錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
 紅藍花散 治婦人熱勞四肢羸瘦經脈不通  
 柴胡一兩 紅藍花 當歸 生地黃 赤芍藥  
 思筋羽 虎杖 大腹皮 麥門冬去心土瓜根 地骨皮 枳殼經炒各半兩 甘草炙微赤  
 右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
 鱉甲散 治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦心腹躁悶  
 鱉甲醋炙黃去裙各一兩 麥門冬去心 知母 川大黃微炒 地骨皮 赤芍藥 黃芩 人參 黃芩  
 桑白皮各七錢半 甘草炙微赤  
 右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑半份煎至六分去滓溫服無時  
 十粒煎至六分去滓溫服無時  
 阿膠丸 治勞嗽出血咯血發熱肺熱口渴溢汗

如泰九可治  
 阿膠丸 生地黃 卷柏葉 山藥炒 大補根 五味子炒 雞蘇各一兩 杏仁炒 人參 防風 麥門冬去心各半兩  
 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬煎湯下  
 豬肚丸 治婦人熱勞羸瘦  
 北柴胡 赤茯苓 人參 黃芩各一兩 黃連三兩 地骨皮 木香各半兩 桃仁去皮 鱉甲各一兩半  
 右為細末用好猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合蒸令爛熟於磁器內研如膏丸梧桐子大食前粥飲下三十九年食前再服  
 治骨蒸勞瘵  
 濟陰綱目 卷四 婦人方 十人 天機  
 加味四物湯 治婦人骨蒸 當歸 白芍藥炒 川芎 生地黃 地骨皮 牡丹皮各等分  
 右咬咀每服六錢水煎服 一方加白木  
 黃連散 治婦人骨蒸勞熱四肢昏沉背膊疼痛面色痿黃漸漸無力  
 黃連 知母各一兩 鱉甲醋炙 柴胡 木通各一兩 麥門冬去心 白朮 地骨皮 黃芩 犀角屑各七錢半 龍膽草去心 甘草炙微赤  
 右為龍散每服四錢以水一中盞入生薑一錢淡竹葉二七片煎



益母草 青蒿各二桃枝 柳枝各一  
已上四味到細用童子小便一斗於銀鍋內煎至三升絞去滓煎成膏

柴胡 赤芍藥 犀角屑各一 驚風散 三 桃仁製爭  
天靈蓋 蘇合 犀角屑 木香 甘草 各二兩 麝香 細研  
右為末用前膏和搗五七百杵丸如桐子大每服三十丸煎烏梅甘草湯下無時

額肝丸 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩燥不欲飲食  
額肝一 驚風散 北柴胡 各一 川升麻 桃仁製  
天靈蓋 犀角屑 梔子仁 地骨皮 知母 各一  
黃耆 七錢 甘草 半兩 麝香 半兩 研砂 研水飛

濟陰綱目 卷四 骨蒸勞熱方  
右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水下無時

殺鬼方 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連  
麝香 七錢 犀角屑 木香 白朮 鬼箭羽 各一  
虎頭骨 蘇合 天靈蓋 雄黃 桃仁 各一  
硃砂 各一兩半 研

右為細末入研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水下此藥辟溫疫亦可帶

○治血風勞  
人參 荆芥散 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽  
人參 荆芥穗 生地黃 北柴胡 驚風散

酸漿仁 枳殼製 羚羊角 白朮 各一  
川芎 防風 桂心 甘草 各半  
右為末每服五錢生薑三片水煎熱服

地骨皮散 治婦人血風氣虛體弱寒熱發渴  
地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡 黃耆 各一  
人參 白茯苓 白芍藥 五加皮 各一 柴胡 二  
官桂 甘草 各半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻木血海冷敗神效  
五加皮 川烏炮 芍藥 梅桐皮 牡丹皮 各一  
濟陰綱目 卷四 骨蒸勞熱方  
右為細末每服二錢水一盞生麻油浸錢一文同煎至六分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪吃藥時不可吹

治血風勞方  
荆芥穗 白芍藥 牡丹皮 防風 地骨皮  
白芷 黑豆 甘草 各一 川芎 二錢  
右為細末每服二錢水一中盞生薑三片煎一個葱白一寸煎至八分溫服無時

萬全道遠散 治血風勞五心煩躁心多怔忡恍惚憂懼頭目昏重夜多盜汗  
人參 黃耆 白朮 白茯苓 各一

右爲散每服三錢入甘草一寸同煎溫服  
乾地黃散 治婦人血風勞冷氣攻心小腹疼痛四肢不和飲食減少日漸羸瘦

牛膝  
兩色

琥珮

卷活

\_\_\_\_\_

右爲散每服四錢加生薑半分水煎熱服

愚謂此方非  
治血風勞乃  
治氣虛症也  
用者審之  
既治冷氣當

渡險自

卷四

—

1998

同前方入無  
熱虛名條內  
添以風藥以  
有風藥以冷  
名而有藥藥  
以勢名而有  
治得藥以血  
藥清血散以  
以氣藥補氣  
行氣用平氣  
以和脾胃而  
用寒柱以溫  
經而除四肢  
之病益以散  
寒之邪而助  
錯釋之藥  
之所謂良藥  
概如此

濟陰綱目卷之四終

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生聞風父輯著 錢塘 查學淳用拙父訂正

西陵汪淇愷子箋釋天都查望子周父叅閱

積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

準繩云。大全良方分。疔瘡諸氣。疔瘡八種。腹中瘀血。癰瘡。食癰。血

癥凡七門。疝者在腹內近臍左右各有一條筋。脈急痛大者如蠶。

次者如指因氣而成如弦之狀故名曰彥癖者僻在兩肋之間有

時而痛故名曰癰疽者痛也癰者假也其結聚浮假而痛推移乃

動也。八瘕者，黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、蠃瘕、癰瘕，積在腹內。

或腸胃之間與腸氣結搏堅牢雖推之不移名曰癰疽其病形可

及險也。氣塞爲言。其氣苦塞。不宜暢也。傷食成塊。堅而不移。

名曰食癥。瘀血成塊。堅而不移。名曰血癥。若失腹中瘀血。則積而

名曰食粥。至戌時止。以惟不動爲微。惟不動爲寢也。至

夫血與芝薛則與痛俱。痛即現。不痛即隱。在臍左右爲疝。在兩肋

之問爲辭在小腹而牽引腰脇爲疝恐學者一時難了未免淆亂。

故總叙而條析之。

論婦人八瘕所因、

病源曰八癯者皆胞胎生產。月水往來。血脈精氣不調之所生也。

腎爲陰主開閉左爲胞門右爲子戶主定月水生子之道胞門子

戶主子精神氣所出入合於中黃門。玉門四邊主持開元。禁閉子。

精臍下三寸名曰關元。主臟魂。婦人之胞。三焦之府。常所從止。

子 52—284

然婦人經脈命絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來八合於臟若生血未盡而合陰陽即使婦人血脈變急小腹重急支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血不除月水不時或月前月後因生積聚如懷胎狀邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫內生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也。

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟虛弱虛感精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘦之病令人苦四肢寒熱身重淋露臥不飲食左脇下有氣結牢不可得拆若黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟虛弱虛感精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘦之病令人苦四肢寒熱身重淋露臥不飲食左脇下有氣結牢不可得拆若

腰背相引痛月水不利令人不產小腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁令人無子當刺關元氣衝行以毒藥瘡下即愈。

黃瘦者婦人新產未滿十日起行以浣洗太早陰陽虛五門四邊皆解散子戶未安骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內臟吸吸又當風臥不自隱蔽若居濕席令人苦寒酒酒入腹煩悶沉淖惡血不除結熱不得散則生黃瘦聚在左右脇下藏於背脊上與肩脾腰下急腹下有氣起甚墜不可多食四肢不欲動握手足腫面目黃大小便難其後月水爲之不通利或不復發狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法瘡當下即愈。

燥瘠者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若

舉重移輕汗出交流氣血未平而卒以悲怒致腹中悞咽不洩經脈變急內結不舒煩懣少力氣上達胸膈背脊少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他臟不去有熱則生燥瘠之聚大如半杯上下腹中苦痛連兩脇下上引心而煩害飲食欲嘔吐胸及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足癢削久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便難難病如此者其人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘡當下即愈。

血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去內有寒熱與月水合會爲血瘕之聚令腰痛不可俛仰橫骨下有積氣牢如石小腹裏急苦痛背脊疼發達腰腹下墮陰裏若生風冷子月僻月水不時來來不來此病令人無子療之瘕當下即愈。

瘕瘕者婦人月水新來若生未滿三十日以合陰陽絡脈分胞門傷子戶失禁關節散五臟六腑津液流行陰道調動百脈關樞四解外不見其形子精與血氣相遇犯禁子精化不足成子則爲瘕瘕之聚令人支滿裏急痺引少腹重腰背如刺狀四肢不舉飲食不甘臥不安席左右走腹中切痛時瘕時甚或時少氣頭眩身體解仰苦寒惡風勝此月水乍來乍去不如常度大小便血不止如此者令人無子療之當刺以長鍼行以毒藥瘡當下即愈。

孤瘕者婦人月水當日數來而反悲哀憂恐若似遠行逢暴風疾雨雷電驚恐衣被沉濕罷倦少氣心中恍惚未定四肢懈惰瘕者

當下卽愈

論食癥

濟陰綱目

則虛當養正。闢邪而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥  
大天云婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相

右以左畔為  
血癰者凡肝  
之部皆可為  
血病

此說甚佳

結漸生顆塊盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來經終  
宿塞惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇皆痛。害於飲食  
肌膚羸瘦。

問瘕一也。何以知是血瘕。曰。血外之証。皆悶煩燥。迷忘驚狂。痰嘔  
汗多。骨蒸。肢冷。其畜在下焦者。必臍下結。急外熱內痛。尺脈洪而  
數也。桃仁靈脂生地黃牛膝大黃甘草祛逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違。而致。蓋氣主噓之。血  
主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝。者多患之。腹脇作  
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣為  
主。治法當主於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速效。  
投以峻劑。反致有誤。

論腹中瘕血

卷五 瘕瘕

六

天德堂

大全云。婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為  
風冷所乘。血得冷。則成瘕。血也。血瘀在內。則時時體熱。面黃。瘀久  
不消。則為積聚瘕瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若悲怒傷肝。用加味逍  
遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子。柴胡以補元  
氣。為主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓。半夏。為主。大凡腹中作  
痛。畏手按者。此內有瘀血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁  
承氣湯。直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣。  
有餘元氣不足。用當歸散。調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲  
食少思。此形氣病氣俱不足。用六君炮薑。歸純補之。若痛而大

此然亦一  
之見。俱攻  
之藥。不得其  
發。反致傷氣  
以致不效。故  
不如善守之  
為要。

便不實。飲食難化。此脾胃虛寒。用六君炮薑。肉果溫之。若痛而  
作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君炮薑。藿香。若痛而嘔吐。不食。泄瀉。  
用六君薑桂。若兼手足逆冷。自汗。更加附子。此証多有因攻伐而  
致者。

論瘕瘕

大全云。瘕者在腹內近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次  
者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰瘕也。瘕者為僻。側在兩肋之間。  
有時而痛。故曰瘕也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得  
宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發。作疼痛。○夫瘕瘕瘕瘕血氣  
塊硬。發作則痛。甚則欲死。究而言之。皆血之所為。僕嘗治一婦人。  
血氣刺痛。極不可忍。甚而死一二日方省。醫巫併治。數年不愈。僕  
濟陰綱目。卷五。瘕中瘕血。七。天德堂。  
以葱白散。烏雞丸。遂安。又嘗治一婦人。血氣作楚。如一小盤。橫走  
注刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此二藥。而愈。尋常小小血氣。用  
此二藥。亦有奇效。故錄於後。

論瘕瘕

大全云。婦人瘕瘕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風  
冷入腹。與血相結。所生。痛者。痛也。瘕者。假也。結聚浮假而痛。推移  
乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水  
往來。取冷過度。非獨因飲食失節。多挾瘀血。氣所成也。其脈弦急。  
者。生虛弱。小者。死。尺脈滿而浮。半為血實。氣虛。其發腹痛。逆氣上  
行。此為胞中有惡血。久則結成血瘕也。

薛氏曰。子和云。遺溺閉癃。陰痿浮腫。精滑白淫。皆男子之病也。若



男子亦有血

血濁月事不行。行後小腹有塊。或時動移。前陰突出。後陰痔核。皆女子之疝也。但女子不謂之疝。而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹。小便時下白帶。小水淋瀝。此肝經濕熱。下注用龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛。小水不利。或胸乳作痛。或脇肋作脹。或氣逆心。吻余以爲肝火。而血傷。脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。

一婦人小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。懶食。用八珍湯加柴胡山梔龍膽草治之而安。

### 論腸覃

李氏曰。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸爲肺傳送。肺主氣。氣得熱則行。得冷則凝。凝則清氣散。而濁氣結爲瘕。覃延日久不。淋降綱目。卷五。瘕瘕。天德堂。

已患肉乃生。始如雞卵。久如懷胎。按之堅。推之移。月事時下。或多或少。氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。

### 論婦人瘕瘕並屬血病

華繩云。古方有五積六聚七瘕八瘕之名。五臟之氣積。名曰積。故積有五。六府之氣聚。名曰聚。故聚有六。雜病準繩。言之詳矣。若夫七瘕八瘕。則婦人居多。七者火數。屬心。蓋血生於心。八者木數。屬肝。蓋血歸於肝。雖曰強分。理似不混。夫瘕者堅也。堅則難破。瘕者假也。假物成形。古人將婦人病爲瘕疾。以蛟龍等爲生瘕。然亦不必如此執泥。婦人瘕瘕並屬血病。龍蛇魚鱉肉髮蟲瘕等事。皆出。偶然但飲食間誤中之。留聚腹臍。假血而成。自有活。性亦猶永微。中僧病瘕者。腹中有一物。其狀如魚。卽生瘕也。與夫宿血停凝。結。

爲瘕塊。雖內所感之不同。治法當以類相從。所謂醫者意也。如以。收梳治瘕瘕。銅屑治龍瘕。麴藥治米瘕。石灰治酒瘕。如此等類。學。者可以理解也。

### 論治積須養正氣

薛新甫云。婦人瘕瘕瘕瘕。大抵因飲食起居七情失宜。虧損臟腑。氣血乖違。陰絡受傷。循行失度所致。

羅謙甫云。養正積自除。必先調養。使榮衛充實。若不消散。方可。下但除之。不以漸。則必有顛覆之害。若不守禁忌。縱情嗜慾。其有。不喪者鮮矣。

一婦人內熱作渴。飲食少思。腹內初如雞卵。漸大四寸許。經水三。月一至。肢體消瘦。齒頰似蒼。脉洪數而虛。左關尤甚。此肝脾。結。瘕。瘕。綱目。卷五。瘕瘕。天德堂。

之証。外貼阿魏膏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。兩月。許。肝火稍退。脾土少健。午前補中益氣。下午味丸。午後逍遙散。下。歸脾丸。又月餘。日用蘆薈丸二服。空心以逍遙散下。日哺以歸脾。湯下。喜其謹疾。調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊。不時上攻。或作痛有聲。或吞酸痞悶。月經不調。小便不利。二年餘矣。面色青黃。余以爲肝脾氣滯。以六君加芎歸。柴胡炒連木香吳茱萸各少許二劑。却與歸脾湯送下。蘆薈丸。三月。餘。肝脾和而諸証退。又與調中益氣湯加茯苓牡丹皮。中氣健而。經自調。

一婦人姓多。鬱善怒。勤於女工。小腹內結一塊。或作痛。或痞悶。月。經不調。倍服伐肝之劑。內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形體日瘠。



牙眼蝕爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣湯六味丸至仲春而愈

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽余曰脾為諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於目也遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘而愈

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上齧蝕透血氣虛極時季冬肝脈洪數按之弦緊或用伐肝木清胃火之藥余曰真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脈頓退因大怒耳內出血肝脈仍大煩熱作渴此無根之火也仍以藥加肉桂二劑脈欬熱退復因大怒果

清陰編印 卷五 續前卷正心 十 方集

卒於季冬辛巳日乃金冠木故也

李氏曰善治癥瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻施以傷元氣寧扶脾胃正氣待其自化此開鬱正元散之由名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交如地黃丸調之凡攻癥之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

○論痰積用吐下

子和云戴人過謙遇一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰妻來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿難也如用我藥病可除孕可得卒從之戴人診其脈沉而遲尺脈洪大而有方非無子

之候也可不踰年而孕其良入笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人嘗曰用吾此法無不子之婉此言不

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯夫發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥針灸

二症至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃蘗臘水相半五六行

凡三次漸減

服經曰婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱者死○少陰脈浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

○通治諸積

開鬱正元散 治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此利氣行血和脾消滯

白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 荳蔻 神曲 麥芽 甘草

此惟病氣 氣俱中者 用總事在 氣上下句 氣生六者 忌之	此方創醫 破滯氣難 白木爲佐 氣虛者不 輕服	胃藥藥性 可用	用藥巧處	上在氣行血 流於胃消 也於在胃 之多
右劉每服一兩生薑三片水煎服	大七氣湯 治積聚癥瘕。隨氣上下。心腹痞痛。上氣窒塞。小腹脹滿。大小便不利。	京三稜 蓬朮 <small>各煨切</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 香附 <small>炒</small> 藿香葉 益智仁 桔梗 肉桂 <small>不見火</small> 甘草 <small>炙七</small>	右咬阻。每服五錢。水二盞煎至一盞。食前溫服。	助氣丸 治三焦痞閉。胸膈滿悶。氣不流通。蘊結成積。癥瘕氣塊。並皆治之。
京三稜 蓬朮 <small>已上二味各用油紙包灰</small> 青皮 <small>去白</small> 陳皮 <small>去白</small> 白朮 <small>各十兩</small> 枳殼 <small>麩炒</small> 檳榔 木香 <small>各十兩</small>	右爲末。糊丸。桐子大。每服五十丸。滾水下。	濟陰綱目 卷五 痰厥用在下	勝紅丸 治脾積氣滯。胸膈滿悶。氣促不安。嘔吐清水。丈夫酒積。女人脾血積。小兒食積。	京三稜 莪朮 <small>二味同</small> 青皮 陳皮 乾薑 <small>炮</small> 良薑 <small>炒各一兩</small> 香附子 <small>二兩</small>
右爲末。醋糊丸。如桐子大。每服三十丸。生薑湯下。○虛者以補藥下之。○一方加神曲麥芽。	三稜煎 治婦人血瘕。血瘕食積。痰滯。	三稜 莪朮 <small>各一兩</small> 青皮 <small>去白</small> 半夏 <small>湯泡</small> 麥芽 <small>炒各二兩</small>	右用好醋六升。煮乾爲末。醋糊丸。如桐子大。每服五十丸。淡醋湯下。○痰積。薑湯下。	香枝丸 治一切積聚。破癥瘕。消癥塊。

此溫行之 較而不猛行 而每中在 用醋	生有燥烈 熱藥行氣 堅之劑而此 方又以補中 藥消其千金 方也用者其 之	八種之山 自胞門子 或受飲用此
木香 丁香 <small>各半</small> 枳殼 <small>炒</small> 三稜 <small>酒浸</small> 莪朮 <small>兩用巴豆</small>	右爲末。醋煮。麵糊丸。如桐子大。朱砂爲衣。每服三十丸。薑鹽湯。或溫酒下。無時。	大硝石丸 治七癆八瘕。聚結痞塊。及婦人帶下。絕產。腹中荷癥。瘕者。當先下此藥。但去瘕瘕。令人不困。
硝石 <small>三兩</small> 大黃 <small>四兩</small> 人參 甘草 <small>各一兩</small>	右爲末。以三年苦酒三升。置銅石器中。先用大黃微火熬。微沸。常攪不息。至七分。內餘藥。復熬成膏。至可凝。即如桐子大。每服三十丸。米飲下。三日。一服。婦人服之。或下。即難。肝或如米泔。赤黑等物。二三升。後忌風冷。	濟陰綱目 卷五 治諸積方
阿魏膏 治一切瘕瘕	羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃 兩頭尖 大黃 白芷 天麻 <small>各五錢</small> 紅花 木鼈 <small>子</small>	去 槐柳桃枝 <small>各三錢</small> 亂髮 <small>雞子大</small>
右用香油二觔。四兩。煎黑。去渣。入髮。煎髮化。仍去渣。徐下黃丹。煎軟。硬得中。入芒硝。阿魏。蘇合油。乳香。沒藥。各五錢。麝香三錢。調勻。即成膏矣。攤貼患處。鋪平。半指厚。以紙蓋。用熱熨斗。熨其久。如硝耗。再加熨之。二時許。方貼膏藥。	○分治八瘕	皂莢散 瘕黃瘕導方
皂莢 <small>一兩</small> 蜀椒 <small>一兩</small> 細辛 <small>一兩</small>		

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中欲便則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

療青瘰癧方

戎鹽一升同皂莢半兩去皮子炙細辛一兩

右搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但臥瘰癧下青如葵汁養之如產法

療燥瘰癧方

大黃如雞子許乾薑各二兩黃連三兩桂心一兩厚朴四兩

郁李仁一兩去皮炙炒麝香三枚雞臍脰中黃膜一枚

右搗散早朝空腹以溫酒一盞和三錢頓服瘰癧當下昇養之如產法三月勿合陰陽無子者當有

療陰綱目

卷五通治諸瘰癧方

十兩

天德堂

療血瘰癧攻刺腹脇時痛藥方

大黃當歸各半山茱萸皂莢去皮炙細辛戎鹽各二兩

右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正坐良久瘰癧自下養如乳婦法

療婦人血瘰癧方

乾薑烏鰂魚骨炙各一兩桃仁一兩去皮炙

右搗散酒服二方寸七日二〇一方無桃仁

桃仁煎治婦人血瘰癧經候不通

桃仁大黃各半蠶蟲半兩朴硝另研

右為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃

蠶蟲桃仁不住手攪煎至可丸下朴硝攪勻出之丸如梧桐子

太前一日不用喫晚飯五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣之狀未下再服如鮮血來即止續以調補氣血藥補之○本事方云項年在毗陵有一貴宦妻患小便不通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治以八正散之劑愈甚

診之曰此血瘰也非噴眩藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍遂臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止得愈○此藥治病的切然猛烈氣虛血弱者不可輕用

療脂瘰癧方

皂莢七錢半去皮子炙礬石燒二錢半五味子蜀椒法同

右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘰癧即愈

卷五通治諸瘰癧方

導散方

皂莢炙去子吳茱萸當歸各一兩蜀椒去汗乾薑

大黃戎鹽各二兩細辛炒礬石燒五味子各二兩

右搗篩為散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中正臥隨意勿行走小便時去之則換新者

療狐瘰癧方

取新死鼠一枚裏以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠形置其中桑柴火灼其上一日一夜出之研為末肉桂心末二錢半酒服二方寸七病當下瘥者不過再服愈

療蛇瘰癧方

子 52-291



礞石丸 治婦人食噎塊久不消、攻刺心腹疼痛

青礞石 巴豆去皮 朱砂 粉霜 木香各二錢半

右研勻以糯米軟飯和丸如菜豆大每服二丸空心溫酒下取  
下惡物為度○右二方犯穢砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑  
勢不兩立者不可輕用也

○治血癥

增味四物湯 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 三稜

廣茂 肉桂 乾漆炒烟盡

右為籠末每服五錢水煎服○余妻曾患小腹積塊每遇寒觸  
刺痛不可忍諸醫治莫效余用此一服立止

濟陰綱目 卷五 治血積方

六合湯 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄酒洗 官桂 蓬朮煨切各

右咬咀每服四錢水煎空心服

血竭散 治婦人血癥作痛臍下脹滿月經不行發熱體倦

當歸八分 芍藥炒 桂心 血竭 蒲黃炒各六分 玄胡索炒四分

右為細末每服二錢空心酒調下

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走心腹疼痛

牡丹皮 當歸 玄胡索 桂心各一兩 赤芍藥 牛膝

莪朮各一兩 京三稜一兩

右為粗末每服三錢水酒各半蓋煎服

當歸丸 治婦人月經不調血積證

當歸 赤芍藥 川芎 熟地黄 廣茂 京三稜各半

神麴炒 百草霜各二錢半

右為細末酒糊為丸如桐子大溫水下六七十九

大黃散 治婦人血癥血瘕食積痰滯

川大黃七錢半 隨甲醋炙黃去 牛膝去蘆乾漆一兩炒

右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前溫酒調下

大紅花丸 治婦人血積癥瘕經絡滯

川大黃 紅花各二兩 蘇蠶十個去

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五七丸食後

溫酒下目三服

○治腹中瘀血

濟陰綱目 卷五 治血積方

桃奴散 治血癥及瘀血停積經水不通男子跌撲損傷皆効

桃奴炒 假蘇炒 玄胡索 肉桂 五靈脂

香附炒 砂仁 桃仁各等分

右為末每服三錢酒調服

大黃湯 治婦人血瘀不消及撲損血瘀

大黃生用 桃仁湯浸去皮尖 桂去粗 郁李仁去皮研

生薑 地黃各一兩

右粗搗篩每服三錢水酒各半蓋同煎至七分去滓溫服

琥珀散 治婦人經絡閉腹痛內瘀血痛不可忍

琥珀 乳香 沒藥各另研細

右每服二錢水酒各半蓋煎至七分入地黃白蜜各二錢

數沸去滓入溫酒服不拘時候

地榆散 治敗血

何首烏 肉桂 地榆 香白芷 各等分

右為鹿末每服二錢米泔一盞半沙糖一小塊煎至八分去滓空心食前服

○治症癖

婦人症癖冷氣兼症氣心腹痛不可忍

此症血氣凝滯無不效

麝香 另研 阿魏 二錢半 麝香 五靈脂 三錢 各七  
桃仁 七錢 花 醋炒 檳榔 各一 莪茂 桂心 沒藥  
木香 當歸 各半

右為細末入麝香令勻梗米飲飯為丸如桐子大每服十丸淡酒湯下無時

治婦人症癖及血氣等神効方

昔有一女八

此症血氣凝滯無不效

用積痛肝一具可及十兩者以巴豆五十枚去大皮熟在肝內用醋醋三碗熬肝極爛去巴豆不用入京三稜末和調得所丸如桐子大每服五丸食前溫熱酒下

葱白散 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛又治婦人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血厥宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶瘕久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 舶上懷香 芍藥 青皮 木香 麥芽 苦楝子 熟地黃 三稜

此方以酒為丸

我茂 茯苓 神麝 人參 各等分

右為細末每服三錢水一盞連雞葱白二寸拍破鹽半錢煎至七分內大黃訶子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎不入鹽如大便自利入訶子煎

烏雞煎丸 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雞 雞一隻 烏藥 蛇牀 牡丹皮 人參 白朮

黃耆 各一 若木 米泔浸切 海桐皮 肉桂 去粗

附子 炮去 川烏 炮 紅花 白芍藥 蓬莪朮

陳皮 各二 玄胡索 木香 肉荳蔻 熟地黃 洗焙

琥珀 草果 各半

右細切用烏雞雞一隻湯搗去毛及腸肚將上件藥安放雞肚中用新磁瓶以好酒一斗同煮令乾去雞骨以油壺盛焙乾為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸

治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

胎前產後傷寒蜜糖酒下 胎前氣悶壯熱炒薑酒下 赤白帶下生薑地黃酒下 產後敗血注心童子小便炒薑酒下

產後血塊填築心腹疼痛玄胡索酒下 胎前嘔逆薑湯下 催生炒蜀葵子酒下 安胎鹽酒下 安女經脈當通不通四肢疼痛煎紅花酒下 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒下 血

燥機欄燒灰酒調吞下 血悶煎烏梅湯研砂下 子宮久冷溫酒或藥湯下空心日一服 血風勞人參酒吞下 小腹痛炒茴香鹽酒吞下 血散四散遍身虛浮黃腫赤小豆酒下 常服溫酒醋湯任下並空心食前服 血邪研砂麝香

之血而不下

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

藥水香以調

行有玄胡... 皮琥珀以行... 之因寒而凝... 者有烏附肉... 桂以溫之其... 諸症或溫... 中以烏附或... 消谷以化積... 或於血中行... 氣或於氣中... 行血或行氣... 或以行血所... 以行氣成功... 總之以氣血... 為主溫行氣... 用而又以行... 此其所以為... 諸病可服也... 其日治胎前... 諸症則有所... 未信

酒下  
夫症癰癰瘕。血氣塊。發渴刺痛。甚則欲死。寢而育之。皆血之。所為。僕昔治一婦人。血氣刺痛。極不可忍。甚而死一二日方有。醫至並治數年不愈。僕以葱白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人。血氣作起。如一小盤樣。走往刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此。二藥而愈。尋嘗小小血氣。用此二藥。亦有奇效。故錄于此。

朱先生云。此藥大治心氣脾疼。用之見効。僕嘗以此治浮腫立効。陳宜入病。血氣作楚。痛不可忍。服諸藥無効。召僕診之。兩關脈弱。沉為肝脈。沉差。緊。此血氣漸成。症癰也。只以此二藥治之。而愈。又四明馬朝奉。後院亦病此。用藥治之亦愈。

四等丸 治婦人症癰氣心腹疼痛。飲食不消。  
卷五 治胎前方  
大黃 剉碎 訶梨勒 去核 檳榔 木香 各等分  
右為細末。酒煮麵糊和丸。如桐子大。每食前以生薑橘皮湯下。十五丸。溫酒亦得。

又方  
龜甲 醋炙黃 川大黃 剉碎 京三稜 炮製各等分  
右為末。醋煮麵糊丸。如桐子大。每食前以生薑湯下。十丸。  
木香 礪砂 另 丁香 官桂 附子 炮 乾漆 炒 烟  
細墨 乳香 另 廣義 青皮 沒藥 另 大黃 剉碎  
京三稜 猪牙皂角 乾薑 炮 各分 巴豆霜 減半

此服法。服升。此服法。服升。須知女子之。須知女子之。而與男子不。而與男子不。同。按此。此。字。字。以方。以方。重。重。女。女。人。人。又。又。有。有。一。一。症。症。耳。耳。大。大。抵。抵。字。字。之。之。義。義。取。取。其。其。如。如。山。山。之。之。高。高。而。而。興。興。起。起。也。也。不。不。然。然。何。何。後。後。皆。皆。難。難。編。編。焉。焉。

右除礪砂乳香沒藥外。同為末。以好醋一升。化開礪砂。去滓。銀器中慢火熬。次下巴豆霜。大黃。熬成膏。將前藥末與膏子為丸。如麻子大。每服三五十丸。食後溫酒送下。加至大便利為度。

○右三方。皆攻積之劑。全無補性。虛人禁用。實者亦須以四君子四物湯兼服。乃可。

○治痢瘕  
乾漆散 治婦人痢瘕久不消。令人黃瘦。疳癰。兩脇妨悶。心腹疼痛。  
乾漆 炮 木香 芫花 醋炒 赤芍藥 桂心 當歸  
川芎 琥珀 研 各 大黃 剉 二 牛膝 七 桃仁 一 兩  
麝香 二 錢  
右為細末。每服一錢。溫酒調下。無時。  
當歸散 治婦人痢瘕。血氣攻刺。心腹疼痛。不可忍。  
龜甲 醋炙 當歸 剉 微 桂心 檳榔 大黃 剉 微 炒  
川芎 吳茱萸 湯 七 次 木香 青皮 去 白 各 半 兩 蓬莪茂  
赤芍藥 桃仁 湯 浸 去 皮 尖 蟻 炒 各 七 錢 五 分  
右為散。每服三錢。薑一錢。三分水煎。熱服。不拘時。  
礪砂丸 治婦人痢瘕。及積瘀血在臍。時攻腹脇疼痛。  
川芒硝 礪砂 各 一 當歸 雄黃 桂心 各 半  
大黃 炮 三 稜 各 一  
右為細末。米醋一碗。熬大黃末為膏。次入餘藥末。和丸。如桐子大。空心溫酒下。十丸。漸加至二十丸。以利下惡物為度。

氣血衰食不  
立勞藥太猛  
損之

此方以氣爲  
主而血藥止  
用一味然藥  
有藥補之方  
又可以用一  
十也甚平穩  
宜備用

巴豆丸 治婦人疝瘕及血氣疼痛

巴豆去皮心醋煮 礪砂各半 大黃炒各 五靈脂

桃仁各七 木香半兩以上

右煉蜜丸如茶豆大淡醋湯空心下五丸熱酒亦可

黑神丸

神麴各四 木香各半 丁香各半

檳榔四枚 漆六兩半生半用重

右除椒漆外五物皆半生半炒爲細末用前生熟漆和丸如彈

子大又用麴香末十二兩鋪陰地陰乾候乾并麴香收器中至

極乾去麴香治腎氣膀胱疝瘕及疝墜五瀉血崩產後諸血漏

下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿尿酒下一難產炒麥子

濟陰綱目

卷五

五

天

四十九枚搗碎酒煎下 諸疾不過三服疝氣十服腸氣瘕瘕

五服血瘕三九當瘕

一婦人病腹中有大塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸

盡三服杯氣盡消終身不作

瑞露丸 治寒傷於內氣凝不流結於腸外久爲瘕瘕時作疼痛

腰不得伸名曰腸草

廣茂酒浸 三稜酒浸 乾漆流去腥 川烏各五

礪砂四錢 青皮雄黃另研 茴香炒 穿山甲炮各

輕粉一錢 麝香半錢 巴豆三十個去

右除研藥外將巴豆炒三稜廣茂二味黃色去巴豆不用共爲

末入研藥勻生薑汁打糊丸如桐子大每服二十九至三十九

蕤湯或酒下空心食前

烏喙丸 治腸疝亦治乳餘并男子疝氣

烏喙炮去皮 半夏湯洗 石膏煨 枳實炒 牡蠣

茯苓酒浸 桂心乾薑炮各 巴豆研膏

右爲末煉蜜丸如豆大每服三五丸食後酒飲任下

見呢丹 治寒客於下焦血氣閉塞而成瘕日以益大狀如懷子

名曰石瘕

附子炮去皮 鬼羽箭紫石英各三 澤瀉肉桂

玄胡索木香各二 血竭一錢半 水蛭檳榔二錢

桃仁三十個 三稜五錢 大黃

右爲細末用酒糊爲丸如桐子大每服三十丸醋湯或溫酒下

濟陰綱目

卷五

五

天

食前

蕤會丸 治疝瘕肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝

疝食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等証

蕤會 胡黃連 黃連炒 木香 白蘗炒 青皮各五

當歸 茯苓 陳皮各一 甘草錢七

右爲末米糊丸如桐子大每服七八十丸米飲下

此小兒疳積  
藥也治疳人  
亦有之大抵  
以疳積大者  
故偶錄之

此石瘕之留  
在血故多  
血分藥

濟陰綱目卷五終



濟陰綱目卷之六

關中 武之望叔卿父著輯 武林 汪之琦奇正父訂正  
西陵 汪 洪憺憺子箋評 天都 查 望于冊父編關

求子

○論求子須知先天之氣

胡氏曰男女交媾其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天淳質之物而一點先天真一之靈氣萌於情慾之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之以補氣行氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

濟陰綱目

卷之六

求子

○論求子脉須和平

以尺寸浮沉分氣血

陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脉可知含脉而獨言業者妄也脉有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而寔非正氣能自寔也正氣虛而火邪來乘以寔之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達其表及服厚味之藥以實其裏又有女人氣多血少寒熱不調月水違期

求子要訣

或後或先白帶頻下而無子者皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和平有力不熱不寒交合有期不妄用精必能生子子不傷妖故欲得子者必須對脉立方因病用藥

○論求子先調經

更氏曰求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也皆黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪帶者香附縮砂木香枳殼桃仁玄胡滯久血沉者四物之下之脉證熱者四物加芩連脉證寒者四物加桂附及濁不清虛未

濟陰綱目

卷之六

求子

同則新生之氣不最一味香附末醋為丸服之亦百發百中也

○論求子貴養精血

袁了凡先生云聚精之道一曰寡慾二曰節勞三曰息怒四曰戒酒五曰慎味今之談養生者多言採陰補陽久戰不泄此為大謬腎為精之府凡男女交接必擾其腎腎動則精血隨之而流外雖不泄精已離宮未能堅忍者亦必有真精數點隨陽之痿而溢出此其驗也如火之有烟焰豈有復反於薪者哉是故貴寡慾精成於血不獨房勞之交損吾之精凡日用損血之事皆當深戒知目勞於視則血於視耗耳勞於聽則血於聽耗心勞於思則血於思耗舌勞於言則血於言耗而血得其養而與日俱積矣是故貴節勞主閉

至北內外之  
說固其然也  
然猶未確  
至兩  
內腎二字選  
差一線法得  
口訣

濟陰綱目

卷太

求子

王

朱德堂

病者腎也。詞疎泄者肝也。二臟皆有相火。而其系上屬於心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。則疎泄者用事。而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血。而奔馳之也。血氣既衰。之人數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醞郁之味。不能生精。惟恬淡之味。乃能補精耳。蓋萬物皆有真味。調和勝而真味衰矣。不論脂素。淡煮之得法。自有一段中和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世間之物。惟五穀得味之正。但能濟食穀味。最能養精。又凡煮粥飯。而中有厚汁。淡作一團者。此米之精液所聚也。食之。驟能生精。試之有效。○煉精有訣。全在腎家下手。內

腎久久習之。而精旺矣。

○論孕子必知細縕之時  
袁了凡先生云。天地生物。必有細縕之時。萬物化生。必有孕育之時。猶犬至微。將受娠也。其雌必狂呼而奔跳。以細縕樂育之氣。觸之而不能自止耳。此天然之節候。生化之真機也。世人種子。有云三十時辰。兩日午。二十八九。須臾此特言其大槩耳。非的論也。

丹經云。一月止有一日。一日止有一時。凡婦人一月經行一度。必有一日細縕之候。於一時辰間。氣蒸而熱。昏而悶。有欲交接。不可忍之狀。此的候也。於此時逆而取之。則成丹。順而施之。則成胎矣。其日三日。月山庚。又曰溫溫鉛鼎。光透簾幃。皆言其景象也。當其慾情濃動之時。子宮內有如蓮花蕊者。不拘經淨幾日。自然挺出。陰中如蓮蕊初開。內人洗下體。以手探之。自知也。但含羞不肯言耳。男子預密告之。令其自言。一舉即中矣。

○論合男女必當其年

諸尚書求男論云。建平孝王妃姬。皆麗無子。擇其家未笄女子八御。又無子。問曰。承男有道乎。澄對曰。合男女必當其年。男雖十六而精通。必三十而娶。女雖十四而天癸至。必二十而嫁。皆欲陰陽

濟陰綱目

卷太

求子

四

朱德堂

完實。然後交而孕。孕而育。育而子。堅壯強壽。今未笄之女。天癸始至。已近男色。陰氣早泄。未完而傷。未實而動。是以交而不孕。孕而不育。育而子脆不壽。此王之所以無子也。然婦人有所產。皆女者。有所產。皆男者。大王誠能訪求多男婦人。至宮詢有男之道也。王曰。善。未再期。生六男。夫老陽遇少陰。老陰遇少陽。亦有子之道也。

○論男女精血盛衰

精尚書曰。飲食五味。養髓骨肉。血肌膚毛髮。男子為陽。陽中必有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子為陰。陰中必有陽。陽之中數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。陽精陰血皆飲食五味之秀實也。方其升也。智慮開明。齒牙更始。髮黃者黑。筋弱者強。其溢也。比充身肢體。手足耳目之餘。雖針灸之。瀝無

血竭者白  
液精竭者  
血來一以  
不及化血  
以血不化  
精二若病  
一般其氣  
又不止于

有不下。凡子形肖父母者。以其精血皆於父母之身。無所不歷也。是以父一肢廢。則子一肢不肖其父。母一目虧。則子一目不肖其母。精未通。而御女以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿。而思色以降其精。則精不出。內敗小便道澀。而為淋。精已耗。而復竭之。則大小便道澀。愈疼。則愈欲。大下便。愈便。則愈疼。女入天癸。既至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男女合。亦不調。不調。則舊血不出。新血誤行。或潰而入骨。或變而之腫。或雖合而難子。合男子多。則澀枯。虛人產乳。則血枯。殺人觀其精。血思過半矣。

○論成胎分男女之異

緒尚書曰。男女之合。二精皆暢。陰血先至。陽精後衝。血開。是精精

入為骨。而男形成矣。陽精未入。陰血後參。精開。裏血入為骨。而

五

天德堂

女形成矣。陽氣聚面。故男子而重。溺死者必伏。陰氣聚背。故女子背重。溺死者必仰。走獸溺死。仰伏皆然。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。古之良工。首察乎此。氣受偏痺。與之補之。補羸女。則養血壯脾。補弱男。則壯脾節色。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外。所務之本。不可不察也。

丹溪曰。成胎以精血之後。先分男女者。精澄之論也。愚竊惑焉。後閱東垣方。有曰。經水斷後。二日血海始淨。精勝其血。感者成男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。此論亦為未瑩。何以言之。易曰。乾道成男。坤道成女。夫乾坤陰陽之性情也。左右陰陽之

道路也。男女陰陽之儀象也。父精母血。因感而會。精之泄陽之施也。血能攝之。陰之化也。精成其骨。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。陰陽交。娠胎孕。乃凝胎之所。居名曰子宮。一系在下。上有兩岐。一達於左。一達於右。精勝其血。及剛日陽時感者。則陽為之主。受氣於左子宮。而男形成。精不勝血。及柔日陰時感者。則陰為之主。受氣於右子宮。而女形成。或自分男分女。吾知之矣。其有雙胎者。將何如。曰。精氣有餘。岐而分之。血因分而攝之。故也。若夫男女同孕者。剛日陰時感。柔日陽時感。則陰陽混雜。不屬左。不屬右。受氣於兩岐之間者也。亦有三胎四胎五胎六胎者。猶是而已。或曰。其有男不可為父。女不可為母。與男女之兼形者。又若何而分之。耶。子曰。男不可為父。得陽氣之虧者也。女不可為母。得陰氣之塞者也。兼形者。由陰為駁氣所乘。而為狀不一。以女兼男形者。有二。一則遇男為妻。遇女為夫。一則可妻而不可夫。又有下為女體。上具男之全形。此又駁之者也。或曰。駁氣所乘。獨見於陰。而所乘之形。又若是之不同。耶。子曰。陰體虛。駁氣易於乘也。駁氣所乘。陰陽相混。無所為主。不可屬左。不可屬右。受氣於兩岐之間。隨所得駁氣之輕重。而成形。故所兼之形。有不可得而同也。

○論男女各由百脈齊到

程鳴謙云。褚澄氏言。男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後參。而女形成。信斯言也。人有精先洩。而生男。精後洩。而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷。一二日血海始淨。感者成

海虞雜目

六

天德堂

承天之氣  
是謂之精  
不毛之理  
坤道不順

男四五日血脉已旺感者成女至六七日後則雖交感亦不成胎信斯言也人有經始斷交合生女經久斷交合生男者亦有四五日以前交合無孕入九日以後交合有孕者獨何歟俞子木撰廣嗣要略著方立圖謂實陽能入虛陰實陰不能受陽即東垣之故見也又謂微陽不能射陰弱陰不能攝陽信斯言也世有疝瘕之夫性弱之婦屢屢受胎雖欲止之而不能上者亦有血氣方剛精力過人顧乃艱於育嗣而莫之救者獨何歟朱丹溪論治專以婦人經水為主然富貴之家侍妾已多其中寧無月水當期者乎有已經前夫頻頻生育而娶此以圖其易者顧亦不能得胎更道與他人轉盼生男矣豈不能受孕於此而能受孕於彼乎愚以為父母之生子如天地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知

濟陰綱目

卷六

七

天德堂

不育有育而不育者有壽而黃耆無嗣者則亦精血之堅脆分爲修短耳世人不察其精血之堅脆已定於稟受之初乃以小產事其母以不育事付之男以爲天專護之數不亦謬乎

○趕經法

求嗣全書載趕經調和訣云有一女人月經來時專在下弦之期必用養血之法以逐之視其色紫則知血熱服涼血藥以緩其氣則氣血和而來遲漸漸趕之定到初頭視其色淡短少者則服養血和血藥養其命門亦趕到初頭察女人肥瘦強弱而用藥一月便不能令趕之之久定到上弦此趕經之法也以女人上弦交多生男耳又有一等女人身體肥胖子宮脂膜長滿經水難調亦令無子須服開子宮之藥以消其脂膜

濟陰綱目

卷六

人

天德堂

○逐月養胎法

袁先生云巢氏論婦人妊娠一月名胎胚足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手少陰脈養之四月始受水精以行血脉手少陽脈養之五月始受火精以成其氣足太陽脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月臟腑關節人神俱備足太陽脈養之此其大略也若求其細則受胎在腹七日一變展轉相成各有相生大集經備矣今婦人墮胎在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脈陰常易虧故多墮耳如昔曾三月墮胎則心脈受

傷先須調心。不然至三月復墮。昔曾五月墮胎。則脾脈受傷。先宜治脾。不然至五月復墮。惟有一月之內墮胎。則人皆不知有胎。但知不受妊。不知其受而墮也。一月屬肝。怒則墮。多洗下體。則竅開。亦墮。一次既墮。則肝脈受傷。他次亦墮。今之無子者。大半是一月墮胎。非盡不受妊也。故凡初交之後。最宜將息。勿復交接。以擾其子宮。勿令怒。勿令勞。勿令舉重。勿令洗浴。而又多服養肝平氣之藥。胎可固矣。

○論痰飲不孕

張子和云。戴人過謙。都營中飲會。有一卒說出妻事。戴人問其故。答曰。吾婦為室女時。心下有冷積。如覆盆按之。如水聲。以熱手熨之。如冰。娶來已十五年矣。恐斷吾嗣。是以去之。戴人曰。公勿黷也。

新法綱目

卷本求子

丸

天德堂

如用吾藥。病可除。孕可得。卒從之。戴人診其脈。寸脈沉而遲。尺脈洪大有力。非無子之候也。可不適年而孕。其良人嘆曰。試之。先以三聖散吐涎一斗。心下平軟。次服白朮調中湯五苓散。後以四物湯和之。不再月。氣血合度。數月而娠。一子。戴人常曰。用吾此法。無不子之。婦此言不誣。○一婦人年三十四歲。夢與鬼神交。驚怕異。常及見神堂陰司。舟楫橋梁。如此一十五年。竟無妊。娠。至祈禱。無所不至。鑽肌炙肉。孔穴萬千。黃髮發熱。引飲中滿。足腫。委。命。於天。一日苦請戴人。戴人曰。陽火盛於上。陰水盛於下。見鬼神者。陰之靈。神堂者。陰之所。舟楫橋梁。水之用。兩手寸脈皆沉。而伏。知胸中有寃痰也。凡三湧三泄。三汗。不旬日而無夢。一月而有娠。

○論求子禁用熱劑

妙在溫中二字。蓋人一大熱皆不能生。物故也。

此註最當

艾性雖溫。然性下寒。寒者宜之。

大味丸聖起

丹溪奉桂丸論曰。無子之因多起於婦人。醫者不求其因。起於何處。漏問古方。惟奉桂丸。其辭確。其意專。用溫熱藥。近乎人情。欣然受之。銳然服之。甘受燔灼之禍。猶憐然不悔。何者。陽精之施。陰血能攝之。精成其子。血成其胞。胎孕乃成。今婦人之無子者。率由血少。不足以攝精也。血之少也。固非一端。然欲得子者。必須調補陰血。使無虧欠。乃可推其有餘。以成胎孕。何乃輕用熱劑。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵矣。或曰。春氣溫和。則萬物發生。冬氣寒凜。則萬物消隕。非奉桂丸之溫熱。何以得子。應溫煖而戒胎。耶。子曰。詩曰。婦人和平。則釁有子。和則血氣均平。則陰陽不爭。今得此藥。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食驟進。久則口苦而乾。陰陽不平。血氣不和。疾病蜂起。焉能成胎。縱然成胎。生子亦多病。濟陰綱目

卷本求子

十

天德堂

而不壽。以奉桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。人而受其九數。服調經補藥亦無妨。但忌施子。瘦人大多者也。

○論孕子雜法

丹溪曰。婦人無子者。多由血少。不能攝精。初醫悉謂子宮虛冷。托以辛熱之藥。煎熬臟腑。血氣沸騰。禍不旋踵。或有服艾者。不知艾性至熱。入火炙則下行。入藥服則上行。多服則致毒。咎將誰挽。○若是肥盛婦人。稟受甚厚。恣於潤宜之人。經水不調。不能成胎。謂之軀脂滿溢。閉塞子宮。宜行溫燥。痰用星半。若木。台芎。防風。羌活。滑石。或導痰湯之類。○若是瘦怯性急之人。經水不調。不能成胎。謂之子宮乾澀。無血不能攝受。精氣宜涼。血降火。或四物湯加香附。黃芩。柴胡。養血養陰等藥。○東垣有六味地黃丸。以補婦人之

陰血不足無子服之者能使胎孕

薛氏曰婦人之不孕亦有因六淫七情之邪有傷衝任或宿疾淹留傳遺臟腑或子宮虛冷或氣肝血衰或血中伏熱又有脾胃虛損不能營養衝任者此更當察其男子之形質虛實何如如腎虛精弱不能融育成胎者有稟賦元弱氣血虛損者有嗜慾過度陰精衰憊者各當求其源而治之至於大要則當審男女之尺脉若左尺微細或虛大無力者用八味丸左尺洪大按之無力者用六味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸若誤用辛熱燥血不惟無益反受其害

○脉法  
素問曰腎脈生病女子不孕  
潘陰綱目 卷六 婦人子  
脈經云婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產○脈微弱而滑年少得此為無子中年得此為絕產○肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者胸中有寒

○治血虛不孕

加味四物湯 治婦人不孕久服有子甚好

當歸 川芎 錢各二 白朮 微炒

熟地黃 酒洗各一錢半 白茯苓 芍藥 微炒 續斷 阿膠 各一

香附 醋煮八分 橘紅 七分 甘草 三分

右剉水二鍾煎八分食遠服

加味四物湯 治血氣兩虛不孕

當歸 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

肉蓯蓉 酒洗 白芍藥 炒 肉蓯蓉 各二 熟地黃 酒洗

白朮

白茯苓 錢各一 人參 五錢

川芎 一錢

右剉水煎服○每月經前三服經正行三服經行後三服

調經種玉湯 凡婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜此藥百發百中効可通神

當歸 酒洗

川芎

白芍藥

白茯苓 錢各一

陳皮

牡丹皮

玄胡索 錢各一

右剉作四劑每一劑加生薑三片水一碗半煎一碗空心溫服

渣再煎服臥服待經至之日服起一日一劑藥盡經止則當交

媾即成孕矣縱不成孕經當對期候經來再服四劑必孕無疑

潘陰綱目 卷六 婦人子

○若過期而經水色淡者加官桂炒乾熟艾各二錢○若先

期三四日色紫者加條芩三錢

經驗有胎丸 治婦人久無子嗣服此經調血盛子宮溫暖成孕

孕後服之可保胎氣堅固

當歸 酒洗

熟地黃 酒洗

白朮

川芎

川續斷 酒洗

陳皮

黃芩 酒洗 香附 醋煮 砂仁 兩 芍藥 酒洗 右為細末糯米糊丸如桐子大每服七八十丸空心淡醋湯下酒亦可以乾物壓之

鹿角 大者刮去粗皮，燒末二三兩，綿紙墊鐵鍋內，文火炒為細末，用二兩。

右三味和勻，醋糊丸，如桐子大，每服三錢，早起臨睡各服一服，白滾湯下，一月經後八房即孕。

神仙附益丸 丹 不惟治婦人百病，而生育之功効如神。

香附米 一斤，用重便浸透，取出水洗淨，露一夜，乾再浸，再曬，如此二次，用益母草十二兩，東流水洗淨，烘乾為末。

右再用香附四兩，北艾一兩，煮汁用三分醋七分和前藥為丸。

如桐子大，每服五七十丸，空心臨臥淡醋湯下。

加味地黃丸 治婦人久無孕育者，効如影響。

熟地黃 四兩，山茱萸肉 二兩，白茯苓 各二兩，牡丹皮 各一兩，澤瀉 各一兩，香附子 各一兩，斷艾 五錢。

濟陰綱目 卷本末子諸方 五錢

右為末，煉蜜丸，如桐子大，每服七八十丸，滾湯下。

金蓮種子仙方 一名麥熊丸，有小苗，女人服之有孕。

熟地黃 酒洗，當歸 酒洗，白芍藥 酒炒，益母草 酒洗，川芎 酒洗，木香 酒洗，蛇床子 酒炒，條芩 酒洗，覆盆子 酒炒，玄胡索 酒炒，陳皮 水洗，白丹參 水洗，砂仁 去皮，山茱萸 酒洗，去香附 四製各五兩。

右為極細末，先用白毛烏骨雞一隻，預先喂養一月，勿令與雞同處，臨時將雞殺死，不出血，乾去毛，剖開去腸內污物，并雞內宿食，胞內黃皮，用酒洗淨，一應事件，仍裝入雞肚內，不令見水，置壘內，入酒二觔，封固，重湯煮爛，取出，割下淨肉，搗如泥，仍將雞骨用酥油和原酒或酒氣，煉為末，入前藥末內，拌勻，再

用醋煮米糊，同雞肉末杓內搗極細，為丸，如桐子大，每服四五十九，漸至八九十九，空心清水飲下。○如月信先期而至者，加黃芩地骨皮黃連各一兩半，清水飲下。○如月信後期而至者，加黃芩一兩，人參白朮各一兩半，溫酒或淡鹽湯下。○如白帶者，加蒼朮白朮升麻白芷各一兩半，淡薑下。○百子建中湯 女人服此藥，調經養血，安胎順氣，不問胎前產後，月事參差有餘不足，諸證悉皆治之。

用醋煮米糊，同雞肉末杓內搗極細，為丸，如桐子大，每服四五十九，漸至八九十九，空心清水飲下。○如月信先期而至者，加黃芩地骨皮黃連各一兩半，清水飲下。○如月信後期而至者，加黃芩一兩，人參白朮各一兩半，溫酒或淡鹽湯下。○如白帶者，加蒼朮白朮升麻白芷各一兩半，淡薑下。○百子建中湯 女人服此藥，調經養血，安胎順氣，不問胎前產後，月事參差有餘不足，諸證悉皆治之。

當歸 酒洗，南川芎 白芍藥 酒炒，熟地黃 酒洗，黃阿膠 蛤粉炒，斷艾 各一兩。

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服八十丸，空心百沸湯點醋少許下，內寒者溫酒下。

濟陰綱目 卷本末子諸方 十四 天德堂

加味養榮丸 此方服之有孕，且無小產之患。

當歸 酒洗，熟地黃 酒洗，白朮 各二兩，芍藥 酒洗，川芎 酒洗，黃芩 酒洗，香附 酒洗，陳皮 水洗，貝母 去心，茯苓 去心，麥門冬 去心，阿膠 五錢，黑豆 炒去皮，四十九粒。

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服七八十丸，食前空心白湯酒任下，忌食諸血。

加味香附丸 男服聚精丸，女服此。

香附 一斤，分四分。一分酒浸二宿，搗碎炒。○一分米醋浸二宿，同上一分，童便浸同上。○一分用山梔四兩煎汁，上同澤蘭酒洗，海螵蛸六兩搗碎，當歸四兩，川芎三兩，白芍藥酒炒，熟地黃八兩，搗碎。

右為末，用浮小麥麴酒醋水打糊為丸，如菜豆大，每日早晚兩

此方服之有孕，且無小產之患。當歸 酒洗，熟地黃 酒洗，白朮 各二兩，芍藥 酒洗，川芎 酒洗，黃芩 酒洗，香附 酒洗，陳皮 水洗，貝母 去心，茯苓 去心，麥門冬 去心，阿膠 五錢，黑豆 炒去皮，四十九粒。右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服七八十丸，食前空心白湯酒任下，忌食諸血。加味香附丸 男服聚精丸，女服此。香附 一斤，分四分。一分酒浸二宿，搗碎炒。○一分米醋浸二宿，同上一分，童便浸同上。○一分用山梔四兩煎汁，上同澤蘭酒洗，海螵蛸六兩搗碎，當歸四兩，川芎三兩，白芍藥酒炒，熟地黃八兩，搗碎。右為末，用浮小麥麴酒醋水打糊為丸，如菜豆大，每日早晚兩

此三方係男  
人藥也借以  
治婦人之經  
閉者正所謂  
因病以藥方  
勿拘方以拘  
病

服白湯酒任下忌食茶服及牛肉生冷

大五補丸 瘦人無孕乃無血攝精宜調

天門冬去心 麥門冬去心 菖蒲 茯苓 人參 益智

枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地黃各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心酒下服本方數服後以七宜丸泄之

增損三才丸

天門冬酒洗 熟地黃酒洗 人參 遠志去心 五味子

茯苓酒洗 鹿角炙

右為細末煉蜜將干下為丸如桐子大每服五十九空心好酒下○年老欲補加混元衣即頭生兒胎衣全個酒浸晒乾為末

濟陰綱目 卷本求子諸方 十五 天德堂

入藥○一方加白馬莖酥炙○一方加附子補相火不足○一方加麥門冬令有人力○一方加續斷以續筋骨○一方加沉香煨下焦虛冷

神効墨附丸 治婦人久無子而經事不調及數墮胎者服之可立致効

香附一斤分四分用米醋重四兩用米醋二碗同香附便蒸水酒各浸一日夜 綿艾四兩用米醋二碗同香附便蒸水酒各浸一日夜 熟地黃酒洗

白茯苓 人參 當歸 川芎 熟地黃酒洗

上等微墨火煨醋淬 木香錢五

右九味各另為末醋糊丸如桐子大每服五十九空心好酒下

青蒿烏雞丸 婦人服能令多子

青蒿即野蒿五斤 香附子童便浸水酒醋各一斤 斷艾童便浸水酒醋各一斤

細閱此方不  
用為藥而用  
不香其意  
行而用不欲  
飲也其意不  
知胎之陰文  
苦於血之行  
故凡艾附之  
類俱用醋製  
以醋入肝右  
微炙之氣又  
可以調血也  
其如松樹也  
其如阿膠也  
其如阿膠也

秦當歸酒洗 牡丹皮 地骨皮 白芍藥酒洗 黃芩酒洗

茯苓 人參 白朮 川芎各一兩 鱉甲酒洗

右為細末取白毛烏骨雞一隻初發聲者殺乾去毛不用水湯亦不用水洗惟用水去脚上粗皮用好酒入磁器內同熟地黃二兩煮雞熟去骨合前藥搗爛作餅復晒乾為末仍用煮雞酒調糯米粉為糊丸如桐子大每服七八十九酒下日二三服不拘時一月見効造藥忌鐵器

大烏雞丸 治女人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下不能成胎及骨蒸等證

香附一斤 熟地黃四兩 生地黄 當歸 白芍藥 人參各三兩

川芎 鱉甲各三兩 白朮 黃芪 牛膝 柴胡 牡丹皮

濟陰綱目 卷本求子諸方 十六 天德堂

知母 貝母各二兩 黃連 地骨皮 玄胡索 乾姜各一兩

白茯苓二兩 秦芩一兩 艾葉 青蒿各四兩

右香附等二十一味俱為細末用白毛烏骨雞一隻續死去毛與腸將艾蒿各一半裝入腹內將雞並餘艾蒿同入堽內以童便和水浸過雞二寸許隔湯煮爛取出去骨焙肉乾為末如

有筋骨疼痛者去肉焙骨焦為末與前末和勻雞汁打糊為丸如桐子大每服五六十丸漸加至七八十九溫酒或米飲下忌煎炒菓菜

小烏雞丸 治婦人百病

吳茱萸 良姜 白姜 當歸 白芍藥 玄胡索

破故紙 川椒 陳皮 劉寄奴 生地黄 菝葜木



灰一味

川芎 兩 荷葉灰 兩 北艾 兩

用風衣更巧中之巧

此方大熱非胎不安者所宜

賜風血又安用之

斑猶太毒不可多試

赤痢之用亦在荷葉手

頭風眼痛生瘡皆可用熱藥

右為末用白毛烏骨雞緝死煮爛去骨取肉搗如泥拌藥末咽乾磨細以雞汁作糊為丸如桐子大每服五十丸空心隨引下。如從來未曾生育者乃油膜包裹子宮以致不能生氣成孕宜加風風衣燒存性七個硃砂為衣。如腹痛血黑色者加炒黃連有濕痰者加南星蒼朮香附同丸。月水不通紅花蘇木酒下。子宮久冷茯苓煎湯下。赤帶清茶下。白帶牡蠣粉調酒下。血成豆淋酒調綿灰下。胎不安蜜酒下。腸風陳米飲調百草霜下。心痛菖蒲酒下。腹痛芍藥酒下。胎漏下血烏梅酒下。胎死不動斑猶三個調酒下。胎衣不下薤葉菜研水下。胎前產後白痢乾姜煎湯下。赤痢甘草煎湯下。耳聾腦茶清下。頭風薄荷煎湯下。血風眼黑甘草湯下。身體疼痛黃芪末調酒下。腰脚痛當歸酒下。生瘡地黃煎湯下。氣塊血塊作痛與葱白湯調服。四肢浮腫麝香湯下。咳嗽喘滿杏仁桑白皮煎湯下。常服溫酒醋任下。

十全濟陰丸 方論曰胎嗣主於濟陰者何也蓋人之所稟陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足在女人癸水易虧而難盈以至不育舊方多以辛香熱燥之劑為溫煖子宮偏助陽氣反耗陰血豈能成胎况女性多氣多鬱氣多則為火鬱多則血滯故經脈不行諸病交作生育之道遂阻矣又如脾胃虛弱者偏用四物涼血等藥則脾胃益虛飲食頓減使氣血無資生之地何以得成胎孕為子嗣之計者莫如養血順氣調經為本而兼

濟陰綱目 卷本 求子諸方

十七 天德堂

此方妙

以甘溫養脾辛溫開鬱斯為至當其調經之法又當因人而加減之初無一定之法也此方則以當歸身養血和氣為君入手少陰經以心主血也入足太陰經以脾養血也入足厥陰經以肝藏血也熟地黃補腎中元氣生心血與芍藥同用又生肝血川芎乃血中之氣藥下行血海通經導氣為臣人參通經活血助熟地黃以補下元白朮利腰膝間血與人參同用補益脾氣香附疎氣散鬱佐澤蘭能生新血而和平氣體牡丹皮養新血去壞血固真氣行結氣山藥能強陰補虛枸杞子補腎水而止下血腰疼為佐紫石英補心氣散心中結氣填補下焦艾葉助香附和百脉溫子宮兼行血藥而平其寒炙甘草通經脈血氣而和諸藥且緩肝經之急為使十年不孕者此藥主之

濟陰綱目 卷本 求子諸方

十八 天德堂

當歸身 酒洗熟地黃 香附子 重便者各四兩 乾山藥 白朮 各二兩 枸杞子 人參 各二兩 斷艾葉 去梗筋二兩 同香附用陳川芎 白芍藥 牡丹皮 紫石英 大煖者各一兩 五錢 澤蘭 兩 紫河車 一具 水內洗去穢血用 銀針挑去紫筋

右各藥俱咀片同河車入砂鍋內用陳老酒三碗陳米醋一碗清白童便一碗米泔水數碗和勻傾入鍋內浮於藥寸許如尚少再加米泔以鍋蓋蓋密勿令透氣桑柴火慢煮以河車融化汁乾為度同藥俱取出在石柏內搗極爛捻作餅子日晒夜露三晝夜宜在月滿之時以受日精月華仍焙乾為末煉蜜搗于餘杵丸如桐子大每服五十九漸加至八九十九空心淡鹽湯下隨用早飯使藥下行忌食生蘿蔔。凡月經過期而行或少

或不行皆血寒血少也尺脉必微弱加桂心五錢夏月黃芪一兩。先期而來者血熱也脉來必數加條實黃芩二兩炒酒。製生地黃一兩五錢腹痛加白芍藥一兩。凡經將行而腹中先作痛者血實而氣滯也去血成塊者氣凝也脉來弦數滑大加玄胡索一兩炒酒。陳皮八錢廣木香柴胡稍各五錢。凡經水行後作痛者氣血俱虛也尺脉必虛澁而兼緊加炒乾姜三錢。白茯苓一兩桂心夏月二錢餘月五錢。凡經行三五日後腹中綿綿作痛或淋瀝不止血氣滯未盡也尺脉見沉澁或沉弦加廣木香五錢柴胡六錢。凡經水紫色及黑色血熱之甚也尺脉見洪數加條實黃芩一兩黃柏一兩炒酒。生地黃一兩五錢酒浸。凡過期行經而色淡者肥人則有濕痰加白茯苓一兩水。

濟陰綱目

卷六 求子諸方

十九 末德堂

陳皮蒼朮水酒浸一各一兩白朮五錢減去熟地黃一兩瘦人則血虛少而水混之加桂心五錢。經行或來或斷或發寒熱者加柴胡八錢白茯苓一兩。凡經脉不調多白帶者肥人主胃中濕痰流注加製過蒼朮白茯苓各一兩五錢減熟地黃一兩。凡瘦人氣多血少脾虛加木香五錢牡蠣煅赤石脂煅火。白茯苓各一兩。凡多崩漏者減香附艾葉各一兩加荊芥穗炒黑。一兩黃芩一兩五錢血崩或多加阿膠珠一兩。乾姜五錢炒黃芪一兩。元氣虛弱經水閉者加牛膝二兩洗屬寒加桂心五錢。錢屬熱加黃芩一兩炒酒。凡婢妾素見忌於嫡室者必多抑鬱以致經水不調加味製香附二兩或血弱心虛或感時驚恐不寧則精氣不聚加琥珀另研酸棗仁隔紗茯苓各一兩。辰砂水。

衛氣血海任主胞胎此方用四物藥以白朮石斛養氣滋陰丹皮玄胡索中之極妙藥肉桂煨子官之寒去積生新溫中益胃亦溫和之正方也。不用地黃恐凝滯也。再分兩果否。

濟陰綱目

卷六 求子諸方

二十 天德堂

石莖各五錢。治宮冷不孕。調生丸一名洗丸。治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜。澤蘭葉當歸洗。熟地黃洗。川芎洗。白芍藥洗。牡丹皮洗。玄胡索石斛酒浸炒。白朮一兩。乾姜炮。肉桂去皮各。右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸空心酒下。調氣煖宮丸。當歸酒洗。川芎各二。肉桂錢。白芍藥煨。香附炒。艾葉醋。阿膠蛤粉炒成。右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸食前米湯下。艾附煖宮丸。治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢疼痛。勝金丸一名女金丹。治婦人久虛或產後失調觸犯禁忌斷產少子及經事遲來赤白帶下腰脚重痛寒熱不一身體瘦削眩暈逆此藥善調經候每日一丸若胎前二日一丸產後二日一丸去一切雜證効驗具述。環之寶之。

<p>香附子<small>十五日兩</small> 當歸 川芎 白芍藥 人參 白朮  <small>茯苓 甘草 桂心 白薇 玄胡索 牡丹皮 黃芩</small>  <small>香白芷 沒藥 赤石脂 另研各</small></p>	<p>右除香附沒藥赤石脂其餘十三味用好酒浸三日去酒曬乾  通前香附一處為末方入沒藥石脂煉蜜為丸如彈子大每服  一九五更初嚼服溫酒送下白湯亦可此藥多在四十九丸後  以葵水調平受孕為度倘有孕依前三日一服無所忌戒○一  方去沒藥加沉香○一方去桂心加熟地黃丸如桐子大每服  五十丸空心溫酒或白湯下以乾物壓之</p>	<p>白薇丸 治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏  <small>當歸 白薇 栢子仁 白芍藥 川芎 白朮 桂心</small>  <small>濟陰綱目 卷本 宮冷不孕方 二二 天德堂</small></p>	<p>附子 草薢 木香 檳榔 細辛 吳茱萸 各五  人參 白茯苓 石斛 川牛膝 澤蘭葉 各半 牡丹皮  <small>紫白英 各一 熟地黃 二</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下  白薇丸 治婦人無子或斷經上熱下冷等病皆主之  <small>白薇 熟地黃 川椒 去核及開口 白龍骨 各一 麥門冬 各一</small>  <small>去心 蕪木 卷栢 白芷 覆盆子 桃仁 各一 雙仁 微炒 各一</small>  <small>人參 白茯苓 桂心 菖蒲 遠志 七錢半 七錢半</small>  <small>車前子 當歸 芎藭 蛇床子 細辛 乾姜 各五 各五</small>  <small>右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸空心日午溫酒下○</small>  <small>昔有數人無嗣俱用此方踰年而皆有子故述之</small></p>
---	---	--	---	---

<p>泰桂丸 治婦人血海久冷不能孕育  <small>附子 一方用 白薇 半夏 茯苓 杜仲 厚朴 當歸</small>  <small>秦艽 防風 肉桂 乾姜 牛膝 沙參 各二兩</small>  <small>細辛 人參 各四</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心酒下無効更加丸  數經調受補者服七日即交合孕後忌服  艾附丸 此藥能煖子宮胎前產後各隨飲用  <small>當歸 芍藥 熟地黃 生地黃 香附子</small>  <small>斷艾 各一 陳皮 藿香 白芷 牡丹皮</small>  <small>藥本 各五 丁皮 木香 各三</small></p>	<p>右為細末酒糊丸每服三錢子宮冷熱酒下○白濁鹽湯下○  <small>濟陰綱目 卷本 宮冷不孕方 二二 天德堂</small>  <small>產後積血艾醋煎湯下</small>  <small>壬子丸 此藥服之不過一月有孕試之有効</small>  <small>吳茱萸 白芨 白茯苓 白欬 各一 人參 桂心</small>  <small>沒藥 各四 乳香 三 川牛膝 厚朴 各五 當歸 石菖蒲</small>  <small>白附子 各一錢 而白及白欬 之用法 之用法 之用法</small></p>	<p>右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四丸溫酒或鹽湯下日  進三服用壬子日雞犬不聞之處修合有孕毋服無夫婦人不  可服  <small>此方藥品難 多自成一局 南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血海虛冷久無孕育及數隨胎一</small>  <small>切經候不調崩中漏下積聚諸證</small>  <small>秦艽 人參 藥本 石斛 甘草 蠶布 灰</small></p>
--	---	--	--

此與前方相 表裏而後 烏賊又有 濕治之功 天冬和子 有清涼潤 之用惟用 者能斟酌	桔梗 <small>各二</small> 京墨 <small>各二</small> 木香 桃仁 <small>去皮半炒</small> 糯米 <small>炒</small>	川芎 當歸 肉桂 乾姜 <small>炮</small> 細辛	牡丹皮 <small>各二</small> 茯苓 <small>各二</small> 熟地黃 <small>各二</small> 香附子 <small>炒</small>	澤蘭葉 <small>各四</small> 川椒 <small>炒去</small> 山藥 <small>各三</small> 蒼朮 <small>米泔洗</small>	大豆黃卷 <small>炒</small> 一斤	一方川椒山藥各七錢半	右為末煉蜜為劑每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯 任下或以醋調和丸如桐子大每服五十九丸亦可	紫石英丸 治婦人子宮久冷不成孕育及數經墮胎月候不勻 崩中漏下七瘕八瘕白淫白帶並宜服之	紫石英 天門冬 桂心 川芎 椿楠 烏頭	濟陰綱目 卷六 宮冷不孕方 王三 天德堂	熟地黃 辛夷仁 禹餘糧 <small>炒</small> 當歸 石斛 <small>各三</small> 紫葳	牡蠣 <small>各二</small> 粉草 烏賊骨 <small>燒</small> 蓼蘗 <small>各一</small> 牛膝	栢子仁 <small>炒</small> 吳茱萸 桑寄生 牡丹皮 人參	細辛 厚朴 續斷 乾姜 <small>炮</small> 各一兩	右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心米飲溫酒任下	濕胞湯 治婦人全不產育及斷絕久不產二三十年者	朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 <small>各一</small> 桃仁 <small>各三</small>	細辛 厚朴 苦梗 赤芍藥 人參	茯苓 桂心 甘草 牛膝 陳皮 <small>各二</small>	附子 <small>炮一</small> 鹿茸 <small>炒</small> 水蛭 <small>炒</small> 各十枚	右為末每服六錢水酒各半煮煎至六分溫服日二服夜一服
---	---	---------------------------------	---	---	--------------------------	------------	--	---	---------------------	----------------------	---	--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	---	-----------------	----------------------------------	--	--------------------------

此方為最 所產者	溫覆得少汗必下積血與冷赤膿如小豆汁斟酌不盡若力弱 大困不堪者只一二服止如惡物不盡用坐導藥	坐導藥 治婦人全不產及斷絕服前濕胞湯惡物不盡用此方	皂角 <small>去皮子</small> 吳茱萸 當歸 <small>各二</small> 大黃 細辛	五味子 乾姜 <small>炮</small> 白礬 戎鹽 蜀椒 <small>各半</small>	一方無大黃有黃葵花半兩	右為細末以絹袋盛如指狀人婦入陰戶中坐臥任意勿行走 小便時去之一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見 病出可十日去之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則 發疼痛須俟病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜煎湯薰 洗之	濟陰綱目 卷六 宮冷不孕方 王三 天德堂	內藥續生丸	母丁香 附子 肉苳蔻 枯礬 烏魚骨	右為末糊為軟丸綿裹內陰中	治痰塞不孕	丹溪植芝湯 治婦人肥盛無子以身中有脂膜閉塞子宮也宜 先服此調理	當歸 <small>酒洗</small> 川芎 <small>七錢</small> 白芍藥 白朮 半夏 <small>湯</small>	香附 陳皮 <small>各一</small> 茯苓 <small>各二</small> 甘草 <small>半</small>	右剉作十貼加生姜三片水煎吞後九子	丹溪茂芝丸	白朮 <small>二</small> 半夏 川芎 香附子 <small>各一</small> 茯苓
-------------	---	---------------------------	--	--	-------------	--	----------------------	-------	-------------------	--------------	-------	------------------------------------	--	--	------------------	-------	--

用和寢黃連

神效妙各橘紅錢 甘草  
右為末粥丸如桐子大每服八十丸煎湯下  
如熱多加黃連枳實各一兩○服此藥後却服益斯丸

益斯丸 附前秦桂丸無  
當歸防風二味

丹溪深開集  
此丸之非而  
益斯丸又謂  
收司自相  
全而各因  
其病而傷  
取耳

右每服五丸空心酒下加至十丸不妨覺有娠三月後不可更  
服○按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者  
若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其五只服五  
分無妨也累試有效

消脂膜導痰湯

寒知南星滑  
石防風羌活  
之忌

半夏 南星 橘紅 枳殼 羌活 蒼朮 白芍  
滑石 研細各 川芎 防風 羌活 各五  
錢 分

濟陰綱目

卷六 婦人經不孕方

三五 天德堂

車前子 七

右細切作一服加生薑五片水煎空心服以乾物壓之

一方 治肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食經水不調不能成胎謂  
之軀脂滿溢閉塞子宮

南星 半夏 羌活 蒼朮 白芍

防風 滑石

右剉水煎服或導痰湯亦可

○治婢妾不孕

可與神仙附  
益先並駕

煮附丸 治婢妾多鬱情不宜暢經多不調故難孕此方最妙不  
須便服他藥

香附子不拘多少去毛與麝皮米泔水浸一宿曬乾用上好

如多頭

米醋砂鍋內煮之旋添醋旋煮以極爛為度取出焙乾為末  
仍用醋糊為丸如桐子大每服五七十丸經不調即調久不  
孕者亦孕

一方 治婦人妬妾僕夫無子常服不妬

天門冬 赤黍米 微炒 薏苡仁 各四兩

右為末煉蜜丸桐子大每服八九十丸白湯下

○附斷子法

用白麴麴一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去  
渣作三服候月經將來日晚下吃一服天明吃一服月經即  
行終身絕子○一方用故盤紙方圍一尺燒為末酒飲調服  
終身不復懷孕○又方用油煎水銀一日方息空

濟陰綱目 卷六 婦人經不孕方 三六 天德堂

心服聚核大一丸永斷孕不損人○一方四物湯五錢加薑

蘆子二錢於經行後空心溫服

良方論曰易曰天地之大德曰生然婦人有孕難艱難或生育  
不已而欲斷之故錄驗方以備用若服水銀蠶蟲水蛭之類不  
惟孕不復懷且禍在反掌○薛氏曰大抵斷產之法多用峻厲  
性性有不起者是則產之害未若斷產之害也吾聞閨老張羅  
峰太常李恒齋之夫人俱因服斷產之劑自謂形體俱佳遇孕  
必病有曰然矣按夷堅志載東京女子曰牡丹以售墮胎藥生  
得惡報今雖列如上方以備萬一之用用者尚其慎之

濟陰綱目卷之六終

濟陰綱目卷之七

關中 武之望叔卿父著輯 西吳 費家琰子傳父訂正  
西陵 汪 淇儋子箋評 天都 查 望于周父參閱

○浮腫

夫氣者水之  
母血者氣之  
化非氣無以  
生血非血無  
以養氣氣血  
不通則血不  
通而化爲水  
流走四肢悉  
皆腫滿亦名  
血分其證與  
水證相類  
實非水也用人參  
薛氏曰按前證或因飲食起居失養或因六淫七情失宜以致脾  
胃虧損不能生發統攝氣血乖違行失常道若先斷經後浮腫此  
濟陰綱目 卷之七 天德堂

血化爲水名曰血分宜椒仁丸治之若先浮腫後經水不通此水  
化爲血名曰水分宜用葶藶丸治之此屬形氣不足邪淫隧道必  
用此藥以宣導其邪而佐以補轉元氣之劑庶使藥力有所仗而  
行則邪自不能容而真氣亦不至於復傷矣大凡月水不通凝結  
於內久而變爲血瘕血水相并亦爲水腫

李氏曰經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞門比水腫  
更難治但能調其經則水自消小調經散葶藶丸先浮腫而後經  
水不通名曰水分乃脾不能制血與水并浮飢肉爲之虛腫紅蓉  
丸通用腎氣丸水分君澤瀉加防已葶藶水通血分君牡丹皮加  
牛膝紅花有經閉脚腫者桑白皮散

○治方

此症  
血凝成瘕因  
高致腫當知  
此症  
利而散滯  
行或用腎氣  
丸加減

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化爲水  
名曰血分

椒仁 續隨子 去皮 研 甘遂 附子 炮 郁李仁

黑牽牛 五靈脂 研碎 當歸 吳茱萸 延胡索 各五錢

芫花 醋浸 右膏各一 膽礬 信礬 各一

斑蝥 糯米炒黃 各十個

右爲末麴糊丸如豌豆大每服一丸橘皮湯下○此方藥雖峻  
利所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦  
未見其有誤也

葶藶丸 治先因小便不利後至身面浮腫經水不通水化爲血  
名曰水分

甜葶藶 炒另 續隨子 去殼另研 乾葶末 一兩

右爲末葶藶丸如桐子大每服七丸煎扁竹湯下○如大便利  
者減續隨子葶藶各一錢加白朮五錢

人參丸 一名葶 治經脈不利血化爲水流走四肢悉皆腫滿名  
曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此方

人參 當歸 大黃 濕紙裏飯上 桂心

瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓 各半 葶藶 炒另研

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至三十丸空心米飲  
下

小調經散 治敗血停積五臟日久腐爛成水變爲浮腫忌用利  
水之藥產後浮腫亦宜

此重散血  
故忌用利  
水所謂調經  
散也

<p>當歸 赤芍藥 桂心 沒藥 琥珀 甘草 細辛 麝香</p>	<p>右為末每服五分溫酒入薑汁調服</p>	<p>桑白皮散 治脚氣感發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急生臥不得</p>	<p>桑白皮 炒一錢 郁李仁 炒一錢 赤茯苓 二錢 木香 防已 酒洗 各七錢 大腹皮 各五錢 蘇子 木通 檳榔 青皮 各七錢</p>	<p>右到一服加生薑三片水煎服</p>	<p>正脫散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便秘澀兼治脚氣</p>	<p>白朮 川芎 木香 檳榔 三 天德堂</p>	<p>甘草 錢半 大腹皮 紫蘇 木瓜 陳皮 沉香 獨活 各一錢</p>	<p>右咬咀每服三錢水煎食後服</p>	<p>大調經散 治榮衛不調陰陽相乘增寒發熱自汗腫滿</p>	<p>大豆 炒去皮 茯苓 一錢 真琥珀 一錢</p>	<p>右為末每服一錢濃煎烏豆紫蘇湯下</p>	<p>大腹皮飲 治婦人血氣不和腹脹</p>	<p>大腹皮 防已 木通 厚朴 括蘂 黃芩 枳殼 桑白皮 大黃 陳皮 五味子 各等分</p>	<p>右到每服一兩水煎去滓入酒少許服</p>
---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	---------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------

<p>大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如散狀小便微微而不結產後者惟水與血并結血室也</p>	<p>大黃 半兩 甘遂 炮 阿膠 炒各一兩</p>	<p>右到每服二錢水一盞煎七分服其血當下</p>	<p>前陰諸疾 論陰戶腫痛</p>	<p>賈方論曰婦人痼疾一名便癰一名便毒俗名瘡子或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝其外證或兩拘小腹腫痛或玉門嫩腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其內證或小便澀滯或腹內急痛或小便痛悶或上攻兩脇或肺熱重墜若兩拘小腹腫痛肝經濕熱滯也</p>	<p>用龍膽瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍膽瀉肝湯加木香若癰散血攻毒之劑則誤甚矣○又曰婦人陰腫因胞絡素虛風邪客之乘於陰部血氣相搏故也○薛氏曰婦人陰腫若氣血虛弱用補中益氣湯舉而補之肝經濕熱用龍膽瀉肝湯滲而清之○李氏曰陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者用四物湯入乳香末同搗成餅安陰中立効○陰腫痛極便秘欲死者枳實煎但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草如時常陰腫者四物湯加蘇木防風○陰戶腫痛不閉者逍遙散十全大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫痛者加山梔牡丹皮○濕痒出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草○潰爛者逍遙散○陰戶腫痛不閉寒熱溺澀體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入茯苓山梔○陰戶不閉小便澀</p>	<p>濟陰綱目 卷七 浮腫 四 天德堂</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>	<p>新調經散 治經水不調 如崩漏下 血者</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>	<p>此開鬼門散 治風濕在 氣分而不 血不調者 自汗乃在 表也</p>
---	---------------------------	--------------------------	-------------------	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

滌腹中一物攻動脹痛者逍遙散加柴胡山梔車前子  
論陰痒生蟲

陰痒生蟲者。大云云婦人陰痒者是蟲蝕所爲。三蟲在於腸胃之間。因臟虛。三蟲動作。伸於陰內。其蟲作熱。微則爲痒。痒者乃痛也。○薛氏曰。前證屬肝經所化。當用龍膽瀉肝湯。逍遙散以主其內外。以桃仁研粉和雄黃末。或鷄肝納陰中。以制其蟲。○一婦人胸膈不利。內熱作渴。飲食不甘。肢體倦怠。陰中悶痒。小便赤澀。此鬱怒傷肝。脾所致。用歸脾湯。加山梔而愈。復因怒患處。并小腹脹痛。用小柴胡。加山梔。芎歸芍藥。痛止。用逍遙散。加山梔而愈。又因勞役患處。腫脹。小便仍澀。用補中益氣。加山梔。茯苓。丹皮。而痊。○一婦人陰內痛痒。不時出水。食少體倦。此肝脾氣虛。濕熱下注。用歸脾。加丹皮。山梔。陰綱目。卷七。陰戶腫痛。五。天德堂。

梔芍藥甘草主之而安。○一婦人陰內痒痛。內熱倦怠。飲食少思。此肝脾鬱怒。元氣虧損。濕熱所致。用參耆歸朮。陳皮。柴胡。炒梔。車前。升麻。芍藥。丹皮。茯苓。而痊。若陰中有蟲。痒痛亦屬肝木。以桃仁雄黃研納陰中。以殺之。仍用清肝解鬱之藥。有以雞肝納之者。乃取蟲之法也。一方搗新桃葉。綿裹。納陰中。日。李氏曰。陰中生蟲。如小蛆者。乃濕熱甚。而心氣又鬱。氣血凝滯。而生。宜養香養胃湯。補心湯。疏鯉丸。外用生艾汁。調雄黃末。燒烟薰之。更用雄黃。銳散納陰中。○陰中生細蟲。痒不可忍。食入臟腑。即死。令人發寒熱。與勞證相似。先以蛇床子煎湯。洗淨拭乾。後用梓樹皮。焙乾。爲末。入枯礬四分之一。磨香。少許。敷之。立効。○如下疽生蟲。所下如柿汁。臭穢。及心中痒痛。悶絕。虛煩。甚者不治。

此又謂脾開濕熱下流而生蟲者

諸陰戶生瘡。大云云婦人少陰脈數。而滑者。陰中有瘡。名曰匿。或痛或痒。如蟲行狀。膿水淋漓。亦有陰蝕幾盡者。皆由心神煩鬱。脾胃虛弱。致血氣流滯耳。故經云。諸痛痒瘡。皆屬於心。又云。陽明主肌肉。治之當補心。養血。外以薰洗坐導藥治之。乃可。○薛氏曰。婦人陰中生瘡。乃七情鬱火。傷損脾肝。濕熱下注。其外證有陰中舒出如蛇。俗呼陰挺。有翻突如餅。俗呼陰菌。亦有如雞冠花。亦有生諸蟲。亦有腫痛。濕痒。潰爛出水。脹悶脫墜者。其內證口乾。內熱。體倦。經候不調。或飲食無味。胸熱發熱。胸膈不利。腸助不調。小腹痞脹。赤白帶下。小水淋漓。其治法。腫痛者。宜用四物湯。加柴胡。山梔。牡丹皮。龍膽草。溫痒者。宜用歸脾湯。加山梔。牡丹皮。柴胡。淋瀝者。宜用龍膽瀉肝湯。陰綱目。卷七。陰戶生瘡。六。天德堂。

肝腎有熱。○肝腎有熱。肝湯。加白朮。牡丹皮。潰腐者。宜用加味逍遙散。腫悶脫墜者。宜用補中益氣湯。加山梔。牡丹皮。佐以外治之法。○陰挺下脫。大云云婦人陰挺下脫。或因胞絡傷損。或因子臟虛冷。或因分娩用力所致。○薛氏曰。陰挺下脫。當升補元氣爲主。若肝脾鬱結。氣虛下陷。用補中益氣湯。若肝火濕熱。小便澀滯。用龍膽瀉肝湯。○一婦人陰中突出如菌。四圍腫痛。小便頻數。內熱。腫痛。似痒似痛。小便重墜。此肝脾鬱結。蓋肝火濕熱。而腫痛。脾虛下陷。而重墜也。先以補中益氣。加山梔。茯苓。冬車前子。青皮。以清肝火。升脾氣。更以加味歸脾湯。調理脾鬱。外以生豬脂和麝香。末塗之。而收。○一婦人陰中挺出五寸許。悶痛重墜。水出淋漓。小便澀滯。夕與龍膽瀉



肝湯分利濕熱。與補中益氣湯。升補脾氣。諸證漸愈。再與歸脾湯。加山梔。用芎。茯苓。黃。梔。間服。調理而愈。後因勞役。或怒氣下部。濕痒。小便不利。仍用前藥。即愈。

### 論陰令

良方云。婦人陰冷。因勞傷子臟。風冷客之也。○薛氏曰。陰冷。屬肝經有濕熱。外來風冷所致。若小便澀滯。或小腹痛。用龍膽湯。肝湯。若內熱寒熱。或經候不調。用加味逍遙散。若寒熱體倦。飲食少思。用加味四君子湯。若鬱怒發熱。少寐懶食。用加味歸脾湯。○一婦人陰中寒冷。小便黃澀。內熱寒熱。口苦脇脹。此因肝經濕熱。用龍膽湯。祛利濕熱。用加味逍遙散。調補氣血而安。○一婦人所患。同前。更寒熱嘔吐。兩股腫痛。先用小柴胡。加山梔。一劑寒熱嘔吐。清陰綱目。卷七。陰寒下脫。七。天德堂。

### 論交接出血作痛

薛氏曰。女人交接。輒出血作痛。此肝火動脾。而不能攝血也。用補中益氣湯。濟生歸脾湯。若出血過多。而見他證。但用前藥。調補肝脾。

### 論傷丈夫頭痛

薛氏曰。女人交接。傷丈夫頭痛。當用補中益氣湯。六味地黃丸。以滋化源為主。

補遺局方。來復丹。治婦人與男子交接。相傷。因而四肢沉重。頭痛。

昏暈米飲吞下五十九

### ○脈法

脈經曰。少陰脈滑。而數者。陰中生痞。○少陰脈弦者。白腸必挺。核治陰戶腫痛。

龍膽瀉肝湯。治肝經濕熱。下部兩拘。腫焮作痛。小便澀滯。陰挺如菌。或出物如蟲等證。

龍膽草 酒炒 澤瀉 各一 車前子 炒 木通 當歸 酒  
生地黃 酒炒 山梔子 炒 黃芩 炒 生甘草 各五

右剉水煎服。○玉門腫脹。加木香。加味四物湯。治陰戶腫痛。

當歸 川芎 芍藥 生地黃

濟陰綱目 卷七 子血作痛 八 天德堂

柴胡 山梔子 牡丹皮 龍膽草

右剉水煎服

九味柴胡湯。治肝經濕熱。下注。便毒腫痛。或小腹脇肋結核。凡肝膽經部分。一切瘡瘍。或風熱結核。癰癰並皆治之。

柴胡 黃芩 各一 人參 山梔子 半夏  
龍膽草 炒焦 當歸 芍藥 甘草 各五

右剉水煎服

加味小柴胡湯。治肝經下部腫脹。小便不利。或寒熱往來。或嘔熱。或胸脇作痛。

柴胡 二錢 黃芩 炒一 人參 半夏  
山梔子 牡丹皮 各七 甘草

<p>如石者... 治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利</p>	<p>右側加生薑水煎服 加味逍遙散 治婦人肝脾血虛濕熱流注下部陰內潰爛瘰癧 發熱胸熱寒熱等證</p>	<p>當歸 芍藥 白朮 茯苓 甘草 柴胡 牡丹皮 山梔 五各</p>	<p>右側水煎服外以鶴虱草煎湯洗 萬蒲散 治婦人陰戶腫痛月水澀滯</p>	<p>葛蒲 當歸 秦艽 吳茱萸 製五 右為末每服五錢空心慈湯調下或水煎服</p>	<p>麻黃湯洗方 治婦人陰腫或瘡爛 麻黃 黃連 蛇床子 壯艾葉 烏梅 十箇 各一兩 各一兩 各一兩 各一兩 各一兩</p>	<p>濟陰綱目 卷七 陰戶腫痛方 右側細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷</p>	<p>經心錄方 治婦人陰中腫痛不可忍 艾葉 防風 大戟 二兩</p>	<p>白礬散 治婦人陰腫堅痛 白礬 半兩 甘草 半兩 大黃 一分</p>	<p>右為末水和如丸棗大綿裹內陰中日兩換以愈為度</p>	<p>黑白散 治婦人陰中腫痛 小麥 朴硝 白礬 五倍子 慈白</p>	<p>右側煎湯頻洗</p>
-----------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	--	------------------------------	--	---------------

<p>之... 用此散之足 行其氣耳</p>	<p>枳實 陳皮 各四 右二味炒令香熟以絹袋盛之過身從上至下及陰腫處頻頻 熨之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便利矣</p>	<p>雞方 治婦人陰中腫痛 用枳實半觔切碎炒熟布裹包熨之冷即易一方用枳殼 一方用鐵精粉傳上○一方以甘菊苗研爛百沸湯淋洗患 浸○一方用馬鞭草搗爛塗之</p>	<p>治陰痒生蟲 大黃散 治婦人陰痒 大黃 微炒 黃芩 黃耆 各一兩 赤芍藥 各一兩 玄參 丹參 山茱萸 蛇床子 各半</p>	<p>濟陰綱目 卷七 陰戶生虫方 右為細末每服二錢食前溫酒服</p>	<p>硫磺丸 治陰中生蟲亦治茄子疾 大鯉魚一個去頭皮入硫磺一兩黃泥固用火煨烟盡為末 米糊丸如桐子大每服二十九溫酒下</p>	<p>廣濟方 療婦人陰痒不止 蛇蛇膽 雄黃 硫黃 朱砂 各半 各半 二錢 半</p>	<p>硝石 藥食小水飯 右為細末以臘月豬脂和如膏用故布作纏子如指長一寸半 以藥塗上內陰中日一易之易時宜用豬椒根三五兩水煮稍 熱洗乾拭內之</p>	<p>一方 治陰中生細蟲痒不可忍若食入臟腑即死</p>
--------------------------------	---	---	---	--	---	--	--	-----------------------------

<p>梓樹皮<small>二錢</small> 枯礬<small>五分</small> 麝香<small>少許</small></p>	<p>右和一處研勻敷之立効</p>	<p>又方 桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱之藥</p>	<p>又方 蛇床子白礬煎水淋洗即止</p>	<p>又方 狼牙<small>二兩</small>蛇床子<small>三兩</small>以米三升煮汁沸熱洗</p>	<p>又方 取牛肝或豬肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立効</p>	<p>又方 取鴛鴦肝乘熱內陰中如有蟲當盡下</p>	<p>又方 新桃葉搗爛綿裹納陰中日三兩易</p>	<p>又方 生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中</p>	<p>聖惠方 療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多</p>	<p>濟陰綱目 卷七 療痒生虫方 十一 天德堂</p>	<p>氣思美食</p>	<p>用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法納陰中至痛處即止蟲當自出</p>	<p>崔氏療陰痒不可忍方</p>	<p>杏仁燒作灰乘熱綿裹納陰中日二易之</p>	<p>又方 蒜煮湯洗之○一方用枸杞根煎湯洗</p>	<p>又方 小蓴不拘多少水煎作湯熱洗日三次</p>	<p>治陰戶生瘡</p>	<p>補心湯 治婦人陰戶生瘡名曰漏瘡或痛或痒如蟲行狀服水淋瀝陰蝕已盡治之當補心養胃</p>	<p>人參 茯苓 前胡 半夏<small>湯泡</small> 川芎<small>各七錢半</small></p>
---	-------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------	--	------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---	---

<p>陳皮 枳殼<small>去穢</small> 紫蘇 桔梗 乾薑</p>	<p>甘草<small>各五錢</small> 當歸 白芍藥<small>各一兩</small> 熟地黃<small>一兩</small></p>	<p>右剉每服四錢加薑棗煎服○如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四味加苦參升麻桃仁吳茱萸水炒黃連</p>	<p>香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈</p>	<p>香薷 薤白仁 麻薤 烏藥<small>去木</small> 砂仁</p>	<p>半夏<small>各三錢</small> 茯苓 白朮 人參<small>各五錢</small> 草澄茄</p>	<p>甘草<small>各三分半</small></p>	<p>右剉薑棗煎服</p>	<p>一方 治陰肉生瘡膿本淋瀝或痒痛</p>	<p>升麻 白芷 黃連 木通</p>	<p>當歸 川芎 白朮 茯苓</p>	<p>右剉水煎服更用楊梅湯浴洗</p>	<p>楊梅湯 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓</p>	<p>甘草 乾漆<small>各三錢</small> 生地黃 黃芩</p>	<p>當歸 川芎<small>各二錢</small> 龜甲<small>炙五錢</small></p>	<p>右剉作一劑用水數碗煎數沸去滓時常洗患處</p>	<p>治陰瘡</p>	<p>蘇莢 川芎 黃芩 甘草 黃連</p>	<p>白芷 附子 礬石 雄黃<small>各六錢</small></p>	<p>右咬咀取豬脂四兩合煎傳之 治婦人陰瘡與男子妬精瘡犬同小異方</p>
--	---	--	-----------------------------	---	--	------------------------------	---------------	------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	------------	-----------------------	--------------------------------------	--



澤蘭 石灰炒少許

右煮水煎洗

傳藥 治茄子疾

朴硝爲末，黃荆柴燒煙調敷，或濃鐵漿水調傳。

又方 治茄子疾 治茄子疾，心躁連綿，黃水易治，白水難愈，用

生枳殼爲散，煎湯煎洗，却用線帛包枳殼滓，納入陰中，即日漸消。

治陰挺下脫

當歸散 治婦人陰中突出一物，長五六寸，名陰挺，又名癰疽。

當歸 黃芩各一兩 牡蠣半兩 蝟皮炙一兩 赤芍藥五錢

右爲末，每服二錢，食前溫酒調下，滾湯亦可，如不應，更以補中

濟陰綱目 卷七 陰中生痔方 十五 天德堂

益氣湯，倍加升麻柴胡兼服之。

又方 治陰挺

當歸 穿山甲 精黃各半兩 辰砂 一錢 麝香 少許

右爲末，每服二錢，酒調下，尤効。

三菜丸 治陰中生一物，所大牽引腰腹膨脹，痛至甚，不思飲食，

皆因多服熱藥，及煎煇，或犯非理房事，兼意淫不遂，名陰挺。

食茱萸 吳茱萸湯浸 山茱萸肉 舶上檀香

白蒺藜 桔梗炒 青皮去白 五味子

海藻洗 大腹皮酒洗 川楝子去核 玄胡索各一兩

右爲末，酒糊丸，如桐子大，每服三十五丸，木通湯下，○下虛加

川烏炮去皮，肉桂去粗皮，各一兩，腰腹痛甚，加桃仁去皮尖，麩

此是肝家藥

炒別研，青皮去白，枳實去穢，各一兩，真南木香七錢，半服之。○  
一方每服二錢，生地黃湯調，仍用金狗脊五倍，白芍、木楊  
根、魚腥草、山黃連，各一兩，爲散，分作四服，以有背瓦礫煎熟，預  
以銀錫作一長小筒，下透確背，背上一貫挺上，先煎後洗，立効，更  
服白散，凌雪花少許煎。

一捻金丸 服前藥未効，却用此

玄胡索 舶上檀香 吳茱萸炒 川楝子去核 青木香各二兩

右爲末，粳米飯糊丸，如桐子大，每服三十五丸，空心木通湯服。

又用梅花腦子半錢，鐵孕粉一錢，水調刷上，如陰畔生泡，以涼

血餘，每服三錢，加凌雪花少許，煎空心服立効。

治婦人陰挺出下脫方

濟陰綱目 卷七 治陰挺下脫方 十六 天德堂

桂心一方作 吳茱萸一兩 戎鹽二兩

右藥並炒令色變，搗羅爲末，以綿裹如指大，內陰中，日再易之，甚妙。

又方 川椒 川烏頭並生 白芨各半兩

右搗羅爲末，綿裹一錢，內陰中，深三寸，腹中熱即止，來日再用

之。

又方 蛇床子五兩 烏梅二枚 武叔卿先生著

以水五升，煮取三升，去滓，稍熱洗之，每日夜三五度用。

又方 硫黃 烏賊骨各半兩 搗羅爲末，傳之

又方 鐵精細研，以羊脂調，布裹炙熱熨之，以瘰爲度。

又方 用羊脂煎令過冷，燉取塗上，以鐵精傳之，多少令調，以火

炙布煖熨肛上漸金內之然後末磁石酒服方寸匕三

熏洗法

用荆芥穗桑榆樹皮薰香葉煎湯熏洗即入

托藥用草麻子葉有九角者好飛過白礬爲末以紙片攤藥托

入

搽藥先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬爲末乾搽立効

敷藥用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗

上吸入如入即洗去

○治陰冷

五加皮浸酒方治婦人癰瘦陰冷

五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黃

濟陰綱目 卷七 治陰下脫方 十七 天德堂

杜仲各三兩 地骨皮 天門冬各一兩 鍾乳粉四兩

右剉碎以生絹袋盛用酒十五觔漬二宿每服一盞空心食前

飲之○一方用枸杞子無地骨皮

八味丸治血弱不能榮養臟腑津液枯澁風寒客於子臟以致

陰冷

熟地黃半斤 山茱萸肉 乾山藥各四兩 牡丹皮

白茯苓 澤瀉各三兩 肉桂 附子各一兩

右爲末即地黃膏加煉蜜爲丸如桐子大每服七八十丸空心

食前白滾湯下

○治人陰冷方

乾薑 蓮花各半 蛇床子

五味子各一兩

右搗羅爲末每用兼以兔糞塗陰門用綿裹一錢內陰中熱即

爲効

又方 蛇床子 吳茱萸 甜葶藶各半 沒石子一枚

右爲末綿裹裏許大內陰中令腹內熱爲度

又方 蛇床子一兩 吳茱萸一兩半 一方用麝香

右爲末煉蜜丸如酸棗大以絹裹納陰中下惡物爲度

溫中生藥用蛇床子爲末白粉少許和勻如棗大綿裹納之自

然溫熱有効

又方 吳茱萸入牛膽中令滿陰乾百日每取二十粒研碎帛裹

納陰中良久如火熱

濟陰綱目 卷七 治陰下脫方 十八 天德堂

治交接血作痛

千金方 治女人交接出血

桂心 伏龍肝各五錢

右爲末酒服方寸七瘥止

又方 黃連六分 牛膝 甘草各四分每一分二錢半也

右細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥

又方 亂髮 青皮 二味燒灰敷之

又方 用熟艾監裹一團然後以綿裹內陰中

集驗方 療女人交接陽道遠連及他物所傷犯血流澀不止者

取釜底黑斷蒴蘆塗藥內之

又方 療女童交接陽道遠連血出不止用燒髮并青布末爲粉

塗之。一方刺雞冠血塗之。一方以赤石脂末塗之。一方五倍子末塗亦良。

治小戶嫁痛

甘草 生薑各五 白芍藥四分 桂心二分

右剉以水二升煎四沸服

又方 海螵蛸燒為末酒調服方寸七日三服

又方 小麥甘草二味各等分煎湯洗甚効

治傷丈夫頭痛

集驗方 療女人傷丈夫四肢沉重嘔吸頭痛

生地黃兩八芍藥兩五甘草三香豉一蒸白一斤生薑四

石以水七升煮取二升半分三服不得重作忌房事

濟陰綱目 卷七 治陰冷諸方 十九 天德堂

桑白皮湯 治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶

桑白皮兩半 乾薑一桂心寸五大棗二十枚

右切以酒一斗煮三四升去滓分溫服衣適厚薄母令汗出

附治脚痠

金蓮穩步膏 治婦人脚指縫壞痛

黃連 黃柏 黃丹 荆芥 等分

右為細末摻脚指縫內布扎縛自然平穩不痛

濟陰綱目卷之七終

濟陰綱目卷之八

開中 武之望叔卿父輯著 武林 何應龍父訂正

西陵 汪 洪憐濟子箋釋 天都 查 望子周父參閱

胎前門上

○論胎前十二經所養

虞氏曰脈經云診其脈手少陰之脈動甚者姪子也蓋手少陰心

脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶尺中腎脈按之不陷者姪

子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養

之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之

六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九

月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養三十日

濟陰綱目 卷八 胎前門上 天德堂

也若夫至期當養之經虛實不調則胎孕為之不安甚則下血而

墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血

手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血

多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之庶無胎墮之

患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之

○論治胎產三禁

潔古云治胎產之病從厥陰經論之是祖氣生化之源也厥陰與

少陽相為表裏故治法無犯胃氣及上二焦有三禁不可汗不可

下不可利小便發汗則傷上焦之陽利大便則脈散而動脾利小

便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯此三禁則榮衛自和

而寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而和以當歸腹

中痰而加之芍藥大抵產病大行從增損柴胡雜証從增損四物

宜詳察脈証而用之

○論胎前調理法

集略云母之腎臟係於胎是母之真氣子之所賴也受妊之後宜  
令鎮靜則血氣安和須內遠七情外薄五味大冷大熱之物皆在  
所禁使易露風邪不得投間而入亦不得交合陰陽觸動慾火務  
謹節飲食若食免缺唇食犬無聲食雜魚而致瘡癰心氣大驚而  
癰疾腎氣不足而解脾氣不和而癰瘦心氣虛乏而神不足兒  
從母氣不可不慎也苟無胎痛胎動漏痢及風寒外邪不可輕易  
服藥不得已已在審度疾勢輕重藥性高下不必多品然父少母老  
產女必虛母壯父衰生男必弱氣受偏痺與之補之補虛父少母老  
產陰綱目 卷八 胎前門上 二 天德堂

○論胎前用藥法

丹溪曰胎前當清熱養血○產婦因火逼動胎逆上作喘急者急  
用條芩香附之類為末調下條芩水中取沉者為佳○黃芩安胎  
乃上中二焦藥能降火下行○天行不息所以生生而無窮者弱  
子治血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前  
無滯產後無虛難產可煎作膏○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以  
黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血  
使血循經而不妄行乃能養胎○懷娠嗜物乃一穢之虛如受穢

物乃肝臟不能養胎而虛也○有孕八九個月必用黃芩須用枳  
殼紫蘇梗

○孕婦食忌

雞肉合糯米食令子生寸白蟲○食大肉令子無聲○鯉魚同雞  
子食令子生疳多瘡○食兔肉令子缺唇○食羊肝令子多厄○  
食豬肉令子項短縮頭○雞子與桑椹同食令子倒生心寒○鮮  
魚同田雞食令子瘡癰○雀肉同豆醬食令子向生點睛黑子○  
食螃蟹令子橫生○食生薑令子多指○食水獺令絕產○食雀  
肉飲酒令子多淫無恥○食茨菰消胎氣○食驢馬肉過月難產  
○豆醬合薑香食之墮胎○食山羊肉令子多病○食鯢鱔無鱗  
魚難產○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目  
濟陰綱目 卷八 胎前門上 三 天德堂

○孕婦藥忌

歌曰斑斑水蛙及蟾蟲烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝  
黃連與蜈蚣三稜代精荒花麝大戟蛇脫黃雌雄芽硝巴硝丹皮  
桂槐花辛牛皂角同半夏南星與通草瞿麥訶薑桃仁通礪砂乾  
漆蠟脚爪地膽牙根莫用好

○孕婦起居忌

便產須知云勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸弗向非常地便勿舉  
重登高涉險心有大驚犯之產難子必癰癩勿多睡臥時時行步  
勿勞力過傷使腎氣不足生子解顛腦破不合衣毋太溫食毋太  
飽若脾胃不和榮衛虛怯子必羸瘦多病自家及隣家修造動土  
犯其胎氣令子破形類命刀犯者形必傷泥犯者寢必垂打擊者



色青紫。繫縛者相拘攣。有此等驗。如影隨形。宜避之。

○候胎法

脈經曰。婦人懷胎七月。而不可知。時時血而轉筋。若此。為軀也。

此脈動。其者。妊子也。○素問云。婦人足少陰脈動。其者。妊子也。

○陰搏陽別。謂之有子。此脈搏擊。與寸脈殊。則謂有孕之兆。

脈經曰。妊娠初時。寸微。小呼吸。五至。三月而尺數也。脈滑疾。重以

手按之。散者。胎已三月也。脈重。手按之不散。但疾不滑者。五月也。

○尺脈左偏大。為男。右偏大。為女。左右俱大。產二子。大者如實狀。

○婦人妊娠四月。欲知男女。法左疾為男。右疾為女。俱疾。為生二

子。而疾在左。為男。在右。為女。○遣妊婦人面南行。還復呼之。左迴

首者。是男。右迴首者。是女。○看上圖時。夫從後。忽呼之。左迴首者

是男。右迴首者。是女也。○婁全善云。按丹溪云。男受胎在左。子宮

女受胎在右。子宮新言大契。是說也。蓋男受胎在左。則左重。故迴

首時。慎護重處。而就左也。女胎在右。則右重。故迴首。慎護重處。而

就右也。推之於脈。其義亦然。胎在左。則血氣護胎而盛於左。故脈

亦從之。而左疾為男。左大為男也。胎在右。則血氣護胎而盛於右

故脈亦從之。而右疾為女。右大為女也。亦猶經云。陰搏陽別。謂之

有子。言受胎處在臍腹之下。則血氣護胎而盛於下。故陰之尺脈

鼓搏有力。而與陽之寸脈殊別也。又如難節發上。則血氣從上。而

寸脈盛。發下。則血氣從下。而尺脈盛。發左。則血氣從左。而左脈盛

發右。則血氣從右。脈盛也。丹溪以左大順男。右大順女。為醫人之

丹溪以此胎  
男左女右  
不胎者胎前  
印

○診婦人有妊歌

肝藏血。母肺主氣。血為榮。分氣為衛。陰陽配偶。不參差。兩臟通和

皆類例。血衰氣旺。定無娠。血旺氣衰。應有體。○寸微關滑尺帶數

流利。往來并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷胎。猶未覺。○左疾為

男。右為女。流利相通。速來去。兩手關脈大相應。已形亦在前通語

○左手帶縱兩個男。右手帶橫一雙女。左手脈逆生三男。右手脈

順生三女。○寸關尺部皆相應。一男一女分形証。有時子外母身

存。或即母亡存子命。○往來三部通流利。滑數相參。皆皆陽實

陰虛脈得明。通滿胸膈皆逆氣。○左手太陽浮大男。右手太陰沉

細女。諸陽為男。諸陰女。指下分明長取記。○三部沉正等無疑。尺

內不止真胎婦。夫乘妻。今縱氣。霧妻夫。今橫氣。助子乘母。今逆

氣。乘母。乘子。今順氣。護。○小兒日足胎成聚。身熱腹亂無所若。汗

出不食。吐逆時。精神結。倘其中住。滑疾不散胎三月。但疾不散五

月。母弦緊。牢強滑者安。沉細而微。歸泉略。

神方驗胎散。婦人兩三個月。月經不行。疑是兩身。却疑血滯。心

煩。寒熱恍惚。此藥可驗。

真雀腦膏。一兩。當歸。全用重一兩。者只用七錢。

右二味。為細末。分作二服。濃煎好艾湯。一盞調下。或好酒調服

亦得。可待三兩個時辰。間覺臍腹微動。仍頻即有胎也。動罷即

愈安穩。無虞。如不是胎。即不動。所帶惡物自行。母亦安也。如服

藥不覺効。再煎紅花湯。調下。必有神効。

驗胎方。經脈不行。已經三月者。

用川芎爲細末。濃煎。空。心。調。下。二。錢。覺。腹。內。微。動。則。有。胎。也。否。則。是。經。痛。

艾醋湯 如過月難明。有無。或月數未足難明。

用。好。醋。收。艾。服。半。盞。後。腹。中。痛。是。有。孕。不。爲。痛。定。無。

探胎散 婦人胎氣有無。疑似之間。以此探之。有胎則吐。無則不吐。

皂角 去皮

甘草 炙各

黃連 生

右爲細末。作一服。溫酒調服。

○逐月養胎法。

北齊名醫徐之才云。妊娠一月。名胎。胎飲食精熟。酸美受御。宜食大麥。母食腥辛。是謂養正。○妊娠一月。足厥陰脈養。不可針灸其

諸陰經。

不卷八逐月養胎法

六

天德堂

經五里中。即等穴是也。足厥陰內屬於肝。肝主筋及血。一月之時。血行否溢。不爲力事。寢必安靜。無令恐畏。

妊娠二月。名胎膏。無食辛。腥。居必靜處。男子勿勞。百節皆痛。是爲胎始結。○妊娠二月。足少陽脈養。不可針灸其經。

足少陽也。足少陽內屬於膽。膽主精。二月之時。兒精成於胞裏。當慎

謹勿驚動也。

妊娠三月。名胎胎當此之時。未有定儀。見物而化。欲生男者。操弓

矢。欲生女者。弄珠璣。欲子美好。數視璧玉。欲子賢良。端坐清虛。是

謂外象而內感者也。○妊娠三月。手心主脈養。不可針灸其經。

手心主也。手心主內屬於心。母悲哀思慮驚動。

妊娠四月。始受水精。以成血脈。食宜和緩。羹宜魚鴈。是謂盛血氣。

以通耳目。而行經絡。○妊娠四月。手少陽脈養。不可針灸其經。

手少陽也。手少陽內輪三焦。四月之時。兒六腑順成。當

靜形體。和心志。節飲食。

妊娠五月。始受火精。以成其氣。臥必晏起。沐浴浣衣。深其居處。厚

其衣服。朝吸天光。以避寒殃。其食稻麥。其羹牛羊。和以菜黃。調以

五味。是謂養氣。以定五臟。○妊娠五月。足太陰脈養。不可針灸其

經。足太陰也。足太陰內輪脾。五月之時。兒四肢

皆成。母太饑。毋甚飽。毋食乾燥。毋自炙熱。毋大勞倦。

妊娠六月。始受金精。以成其筋。身欲微勞。無得靜處。出遊於野。數

觀走犬。及視走馬。食宜膏膩。溫飲之。肉是謂養筋。理初所以養其

力。以堅背脊。○妊娠六月。足陽明脈養。不可針灸其經。

足陽明也。足陽明內輪胃。六月之時。兒身皆成。調

五味。食甘美。毋太飽。

妊娠七月。始受水精。以成其骨。身搖肢無便定。止動作用。操以

運血氣。居處必燥。飲食避寒。常食稻粳。以密腠理。是謂養骨。而堅

齒。○妊娠七月。手太陰脈養。不可針灸其經。

手太陰也。手太陰內輪肺。七月之時。兒皮毛已成。無大言。無號哭。

無薄衣。無洗浴。無寒飲。

妊娠八月。始生土精。以成膚革。和心靜息。無使氣極。是謂養理

而光澤顏色。○妊娠八月。手陽明脈養。不可針灸其經。

手陽明也。手陽明內輪大腸。八月之時。兒九竅

皆成。無食燥物。無輒失食。無怒大起。

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲食甘饒帶自持而待之是謂養毛髮致才力。○妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經氣如通泉然谷太谿交信足少陰內屬於腎腎主續精九月之時兒脈續成皆成無處濕冷無著衣。○妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節入神皆備但俟時而生。

妊娠一月始胎二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備即產矣宜服滑胎藥八月即服。

烏雞雞湯 妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛。○腰痛腹滿胎惡卒有所下當預安之宜服此。

濟陰綱目 卷八 妊娠胎法 天德堂

烏雞雞一雙治 茯苓 阿膠各二 吳茱萸一升 人參 麥門冬五合 白朮 芍藥各三 甘草 生薑各二 右咬咀以水一斗二升煮雞汁取六升去雞下藥煎取二升內酒三升并膠烱盡取三升每服一升日三。

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此。

細辛 防風 乾地黃 白朮 生薑 吳茱萸 大麥 烏梅 一升

右咬咀以水七升煮取二升半分三服先食服。○寒多有倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根二兩。○若有所思加柏子人參。○一方有人參一兩。

艾葉湯 妊娠二月陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悒中風

果有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下作寒乍熱宜服此。

艾葉 丹參 當歸 麻黃各二 人參 阿膠各三 甘草一兩 生薑六兩 大棗十二枚 右咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服。○一方用烏雞雞一隻煮汁並頭血煎藥。

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此。

黃連 人參各一 吳茱萸五合 生薑三兩 生地黃五兩 一方用阿膠 一方用當歸 半兩 右咬咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合若願覺不安加烏梅一升水煎不用漿。

濟陰綱目 卷八 妊娠胎法 天德堂

雄雞湯 妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛或腰背卒有所下宜服此。

雄雞一隻治 黃芩 白朮 生薑各一 麥門冬五合 芍藥 人參 茯苓 甘草 阿膠各二 大棗十二枚 右咬咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡。○一方用當歸川芎各二兩不用黃芩生薑。

扶神湯 若曾傷三月胎者當預服此。

扶神 丹參 龍骨各一 人參 當歸 阿膠 甘草各一 大棗二十枚 赤小豆粒二十

此方治婦人經水不調，或多或少，或前或後，或痛或不痛，或崩漏不止，或帶下不止，或產後血暈，或產後腹痛，或產後惡露不盡，或產後乳汁不通，或產後大便不通，或產後小便不通，或產後一切雜症，服之無不神效。

右咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先日服七日後服一劑  
○腰痛者加桑寄生二兩深師有雞白二兩麻子一升

菊花湯 妊娠四月有寒心下憊欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋膝下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚身腰背痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服此

菊花 雞子大 麥門冬一升 人參一兩 甘草 當歸各二兩 麻黃 阿膠各二兩 半夏四兩 生薑五兩 大棗十二枚

右咬咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日○一方用烏雞一隻煮汁煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此

白木 枳實 李根白皮 厚朴 柴胡各三兩 白芍藥 生薑各四兩 當歸一兩 芎藭 續斷 烏梅各一兩 甘草二兩

右咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服一劑

阿膠湯 妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶欲飲小卒有所下宜服此

阿膠 四兩 人參一兩 當歸 芍藥 甘草 黃芩各三兩 麥門冬一升 吳茱萸七合 旋覆花二合 生薑六兩

右咬咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服○一方用烏雞一隻煮汁煎藥

此方治婦人經水不調，或多或少，或前或後，或痛或不痛，或崩漏不止，或帶下不止，或產後血暈，或產後腹痛，或產後惡露不盡，或產後乳汁不通，或產後大便不通，或產後小便不通，或產後一切雜症，服之無不神效。

一使割取咽血內酒中以水煮雞汁煎減半內酒并膠煎取三升分四服

安中湯 若曾傷五月胎者當預服此

黃芩一兩 當歸 芎藭 乾地黃 人參各二兩 甘草 芍藥各三兩 麥門冬 五味子 大棗仁各五兩 生薑六兩 大棗三十枚

右咬咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑

麥門冬湯 妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服此

麥門冬一升 人參 甘草 黃芩各二兩 乾地黃 三兩

此方治婦人經水不調，或多或少，或前或後，或痛或不痛，或崩漏不止，或帶下不止，或產後血暈，或產後腹痛，或產後惡露不盡，或產後乳汁不通，或產後大便不通，或產後小便不通，或產後一切雜症，服之無不神效。

阿膠 四兩 生薑六兩 大棗十五枚

右以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服中間進藥粥○一方用烏雞一隻煮汁煎藥

藥胡湯 若曾傷六月胎者當預服此

柴胡 四兩 乾地黃 五兩 白朮 芍藥各一兩 芎藭 麥門冬 甘草各二兩 旋覆花一兩 生薑六兩 大棗三十枚

一方有黃芩二兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進藥粥勿食生冷及重腥之物七日更服一劑

白湯 妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷服若傷寒煩熱腹滿氣短常苦驚悸及腰骨痛

此方治婦人經水不調，或多或少，或前或後，或痛或不痛，或崩漏不止，或帶下不止，或產後血暈，或產後腹痛，或產後惡露不盡，或產後乳汁不通，或產後大便不通，或產後小便不通，或產後一切雜症，服之無不神效。

此方妙在生  
黃八兩然非  
黃若傷寒而  
熱氣血而虛  
者不可輕用

葱白三四寸長 黃芩二兩 阿膠四兩 麥門冬半升 半夏各一 生薑八兩 旋覆花二合

右咬咀以水二升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗○一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服此

杏仁 甘草各二 紫苑一兩 鍾乳各二 乾薑各二

麥門冬 吳茱萸各一 五味子三合 梗米五合

右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七

濟陰綱目 卷八 婦人經月養胎法 主 天德堂

日服一劑○一方用白雞一隻煮汁煎藥

芍藥湯 妊娠八月風寒有所犯觸身發熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或時寒懷腰背苦冷而痛目眩

芍藥 生薑各四 人參 白朮 當歸 甘草各三

厚朴二兩 薤白一升

右咬咀以水五升清酒四升合煮取三升分四服日三夜一○

一方用烏雌雞煮汁以煎藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此

葵子二升 芍藥四兩 白朮 柴胡各三 厚朴

甘草各二 生薑六兩 大棗二十

八月用葵子 當思之

右咬咀以水九升煮取三升分三服日三夜一劑○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

半夏湯 妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣宜服此

半夏 麥門冬 吳茱萸 當歸 阿膠各三

乾薑二兩 大棗十二

右咬咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服病即止○一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

續腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

豬腎一具 白朮四兩 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黃

芎藭各三 附子中者 大豆三合 麥門冬一升

右咬咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑

○惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

惡阻 惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也○千金方云凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚未來顏色肌膚如常但苦沉重憊悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔酸果食飲欲少起世謂惡食其至三四月自已上皆大劇此逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臍氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也

血脈不通經絡否澁則四肢沉重按風則頭目眩也覺如此候者

便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除便飲食也既得食力體強氣壯力足養胎母便健矣

大全云妊娠惡寒怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中煩悶嘔吐痰水恍惚不能支持集氏謂之惡阻但証有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓湯茯苓丸專治阻病然此二藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散不可不謹也張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾

濟陰綱目 卷八 胎阻 天德堂

醒脾二字是

欲皆不用半夏用之多効

李茂翁云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸脾藥則愈經云無陰則嘔是也

薛氏云前證若中脘停痰用二陳藥加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣膈加枳殼胸脇痞悶更加蘇梗枳殼再加柴胡若飲食少思用六君子加紫蘇枳殼頭暈倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯益半夏乃健脾胃氣化痰滯之至藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用半夏茯苓湯倍加白朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予常用之驗

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食

酸醜多臥少起百節煩疼瘧瘦有痰胎孕不牢

半夏湯洗七次白朮 陳皮各一熟地黃各一 旋覆花

右咬咀如生薑三片水煎空心服兼服後茯苓丸○千金方無

旋覆花有紫蘇葉細辛○有熱加黃芩○有客熱煩渴口瘡去

桂心五分○若胃中虛熱大便秘小便赤澀去地黃加大黃七

分半黃芩一錢

陳皮半夏湯 治懷妊氣血不足胎氣始盛逆動胃氣惡阻嘔吐

不進飲食

陳皮去白鹽 茯苓各一半夏製一子苓 枳殼 蘇

濟陰綱目 卷八 胎阻 天德堂

右切一劑生薑三片水一鍾煎七分食遠溫服

旋覆花湯 療妊娠六七月間胎不安常處亦治阻病

旋覆花 五分 白朮 厚朴 枳殼 黃芩 茯苓 各一錢

半夏 芍藥 生薑 各一

右咬咀作一服水煎食前溫服

縮砂二陳湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 陳皮 去白 砂仁 各一 白茯苓 二錢 甘草 炙五

右加生薑三片棗一枚烏梅肉少許水煎服一二劑後服茯苓

參術散 治妊娠惡阻嘔吐逆痰水不食心虛煩悶

此方清而不寒  
藥自是一法

人參 橘皮 去白 茯苓 麥門冬 白朮

厚朴 各一錢 甘草 五分

右作一服如生薑七片竹茹如彈子大水煎服

青竹茹湯 妊娠惡阻嘔吐不食

竹茹 彈子大 橘皮 白茯苓 各一錢 半夏 湯泡 七次 生薑 各二錢

右剉水煎溫服忌羊肉鰾鮓等物

盧根湯 治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根 七分 橘紅 四分 生薑 六分 檳榔 二分 枇杷葉 三分

右切以水二盞煎七分空心熱服

一方 治妊娠惡食心中煩悶熱嘔吐

青竹茹 麥門冬 各三兩 前胡 二兩 橘皮 二兩 蘆根 二兩

濟陰綱目 卷八 惡阻 天德堂

如體熱四肢煩熱加地骨皮一兩

右切細以水一大升煮半升去渣分兩服食前

人參半夏丸 治妊娠惡阻酸心胸腹冷痛吐逆不食

人參 半夏 湯泡 七次 乾生薑 各半

右為末以生地黃汁浸蒸餅為丸如桐子大每服四十九米飲

生地汁浸餅  
餅法不特助  
牛黃之藥而  
又不傷血分  
妙妙

下○張氏曰大各方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此

而用於此方乎予治妊娠阻病果用半夏未嘗動胎也經云有

故無煩是也

茯苓丸 治妊娠惡阻心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩

劑後服此藥 赤茯苓 人參 桂心 乾薑 炮 半夏 洗七次 陳皮 各

前方用生  
薑此用炮薑

又用桂心亦  
大熱藥而炮  
而生又復有  
別不可不知

乾葛根 白朮 甘草 枳殼 去白 各二兩

右為細末煉蜜丸加桐子大每服五十丸空心米飲下日三服

○一方加麥門冬○肘後方加五味子

歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香 各半 白茯苓 各二錢

白朮 陳皮 各一兩 桔梗 炒 枳殼 炒 各二錢 半夏 洗七次

右咬咀每服三錢加生薑五片煎一服水煎服

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食

橘皮 竹茹 人參 白朮 各二錢 生薑 一錢 厚朴 一錢

右剉水煎服

惡阻惡食黃之脾虛嘔吐黃之有火所謂諸逆衝上皆屬於火

濟陰綱目 卷八 惡阻 天德堂

也此方竹茹能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人

參白朮所以益脾開胃益脾欲其安穀云爾

白朮湯 治胃虛惡阻吐水甚至十餘日水藥不入者

白朮 炒 一兩 人參 五錢 丁香 二錢 甘草 一錢

右為細末每服二錢加生薑五片水煎食前溫服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參 錢五 丁香 錢五 藿香 各二錢 蘇合 各二錢

右咬咀每服五錢水煎服

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降嘔吐酸水起坐覺重

香附子 兩 藿香 葉 甘草 各二錢

右為細末每服二錢沸湯調下不拘時

以上數方  
法俱備

吐瀉作渴則  
效在烏梅矣  
作烏梅者非

健胎養血清  
火則衛任自  
足胎孕自安

白朮散 治妊娠胎氣不和進飲食

白朮 炒 人參 紫蘇 錢 青皮 去 川芎

訶子 分 甘草 分

石岐咀作一服加生薑三片水煎服

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參 錢 白朮 炒 甘草 炒 香附 烏梅 一方作

梅紅 分

右到加生薑水煎服。覺惡心嘔吐加丁香

縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食

縮砂仁 爲末每服二錢生薑或米飲調服

○胎動不安

海陰綱目

卷八 經血

天德堂

大全云妊娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房  
室過度損動不安者有懷擊觸而胎動者有喜怒氣字不舒傷於  
心肝觸動血脈者有信醫宜服緩補反爲藥所害者有因母病而  
胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其  
母自愈當以母形色察之若面赤舌青見死母活面青舌赤口中  
沫出母死子活若唇青兩邊沫出者子母俱死

安胎散 妊娠常服安胎

白朮 當歸 錢 黃芩 錢 甘草 分

右到水煎服。如腹脹加神麴麥芽各二分。○氣虛泄瀉加

人參三分陳皮二分。○潮熱加柴胡一錢。○氣上逆加枳殼三

分

蒼朮湯 常服健脾胃清熱故胎不動

子芩 兩 白朮 錢

右到水煎服。一方芩朮各半兩加當歸二錢。一方用芩朮

等分爲末。湯丸桐子大每服五十丸白湯下。名安胎丸。

金匱當歸散 此方養血清熱孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱

胎動不安。素曾半產者皆宜服之。以清其源而無後患也。

當歸 川芎 白芍藥 黃芩 各一 白朮 兩

右爲末每服二錢酒飲調服。日再服。或用酒糊爲丸如桐子大

每服五十丸茶湯任下。日三服。

釣藤湯 治妊娠八九月胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者此由勞

動用力以傷胎宮宜急治之

海陰綱目

卷八 胎動不安

天德堂

釣藤寄生酒  
肝養補氣血

釣藤 鈎 當歸 茯神 木 人參 錢 桔梗 分

桑寄生 分

右到水煎服。煩熱加石膏二錢半

十聖散 治因母疾病氣衰血少不能護養其胎以致不安者宜

此至之補湯加減

人參 黃耆 白朮 地黃 砂仁 各五

甘草 錢 當歸 川芎 芍藥 錢 各川續斷 分

右到水煎服

黃耆湯 治胎動不安腹痛下黃汁

黃耆 川芎 各一 糯米 合

右細到水二大盞煎至一盞三分溫服



佛手散 治妊娠因事驚動胎動不安或子死腹中惡露不下疼痛不已用此藥擦之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下

當歸 去蘆酒 芎藭 各三錢

右剉先用酒一鍾煎乾再入水一鍾煎三沸溫服

小膠艾湯 治傷損動胎下血腹痛

阿膠 一兩 艾葉 二兩

右剉水煎服○指迷方加秦艽一兩

膠艾芎歸湯 治妊娠三三月上至八九月頭仆跌胎動不安腰腹疼痛欲死已有所下

阿膠 川芎 各三兩 當歸 乾地黄 艾葉 各二兩

一方有甘草無地黄

濟陰綱目 卷八 婦人經水不調

右細切以水七升煮取三升半分三服

阿膠散 治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰腹痛疼或有

所下

阿膠 蛤粉炒 艾葉 炒 當歸 酒浸 川芎 白芍藥 炒

熟地黄 洗 黃芩 甘草 炙 各一錢

右咬咀加生薑五片棗三枚水煎空心服

當歸湯 治妊娠胎動過心煩燥悶絕口乾橫生逆產上衝下築

迷悶唇口青黑手足冷厥

當歸 人參 各一兩 阿膠 一兩 甘草 三錢

右咬咀每服八錢加連翹白一莖水煎溫服○一方有川芎

○一方有川芎厚朴無甘草

此方中之一方有川芎厚朴無甘草

一方 治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地黃 益母草 各一兩 當歸 黃芩 各半

右咬咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去渣服無時

二物解毒湯 治誤服毒藥動胎

甘草 黑豆 淡竹葉 各等分

右用水煎濃服

白扁豆散 治妊娠誤服諸般毒藥毒物

白扁豆 生去皮為細末米飲調服方寸七神效或酒煎亦可

○治漏下血 妊娠經來

脈經云婦人經月下但為微少師脈之反言有痛其後番然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之則滑浮之

則輕陽明少陰各如經法身反灑淅不欲飲食煩痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛當作血盛滑則多實

六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙

胎二胎今陽不足故令微經也○大抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脈和緩滑大無病者血盛有餘也見

太能飲自來也

大全云夫妊娠胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脈

虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起

於胞內手太陽小腸脈也手少陰心脈也是二經為表裏上為乳

汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以為乳汁

也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏

此言漏胎有三種任虛者血漏自產也七情飲食傷

解毒良方

血虛則人驚矣。又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷傷胃風寒感也。宿疾者氣血失於榮養也。

遂致胎動。若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也。

曾有一娠婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古答曰婦人血盛氣衰其人必肥既婚之後月信常來而胎不動若晚進觀之便以為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言誠有旨也巢氏曰婦人經閉不利別無所苦者是謂有子以其經血蓄之以養胎壅之為乳汁也。有子之後畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必濟陰綱目卷八胎漏下血

漏胎用風藥亦忌升藥氣血不調胎自固不損風已也

精悉

胎動下必服經日婦人懷胎六月七月暴下斗餘水其胞必倚而墮此非特

服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可止或不風藥胎亦無恙然而有胎本不同而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可不審也方氏曰胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛為異爾故胎動宜行氣胎漏宜清熱李氏曰尿血自尿門下血漏胎自入門下血妊娠尿血屬胞熱者多四物湯加山梔髮灰甘苦黃藥飲亦妙因得者益元散加升麻煎湯下稍虛者膠艾四物湯久者用龍骨一錢蒲黃五錢為末酒調服

胎動下故也

薛氏曰胎漏黃汁下或如豆汁若因肝脾濕熱用升陽除濕湯血崩肝脾風熱用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃氣湯加減膠艾湯治胎動漏血有效

阿膠炒成 當歸 川芎 白芍藥炒 地榆各一 艾葉炒 甘草各五

右到一服水煎服胎漏血多起於氣憤血逆火動之故可加炒黃芩炒香附炒砂仁研細同煎或有受胎至四五個月即墮或至六七個月漏血要墮者且前方去艾葉地榆加白木

黃芩在春熟地黃續斷有氣虛亦加香附砂仁氣虛加人參黃耆之類如傷風受寒受孕後便宜服千金紫蘇飲及前加減法湯先相間服免再墮

安胎飲 治妊娠卒然腹痛下血不已 當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黃 阿膠炒 艾葉 黃耆各一 甘草各五 地榆各五 右到一劑加薑棗水煎服

天全方 治妊娠三四月腹痛時時下血 當歸 熟地黃 艾葉各六 續斷各二 阿膠 雞蘇 竹茹各一 右用水一升煎取七合空心再服

<p>如聖湯 治胎動腹痛或為胎漏</p> <p>鯉魚皮 當歸 白芍藥 熟地黃 川芎</p> <p>川續斷 阿膠 甘草 等分</p> <p>右咬咀每服四錢加芍根少許生薑五片水煎溫服</p> <p>安胎當歸湯 治妊娠舉動驚悸胎不安少腹痛引腰絡下血</p> <p>當歸 川芎 阿膠 人參 大棗 各一</p> <p>艾葉 一方有甘草無參棗</p> <p>右以水酒各三升煮至三升內膠令烊分三服</p> <p>枳殼湯 治胎漏下血及因事下血</p> <p>枳殼 黃芩 白朮 各半</p> <p>右到水煎食前溫服一方加生地八分酒煎</p> <p>當歸寄生湯 治妊娠胎漏非時下血</p> <p>當歸 川芎 艾葉 白朮 人參 各一</p> <p>桑寄生 續斷 熟地黃 各二</p> <p>右水煎空心溫服</p> <p>二黃散 治婦人胎漏下血</p> <p>生地黃 熟地黃 各等</p> <p>右為細末每服二錢煎白朮枳殼湯調食前服或咬咀水煎服</p> <p>阿膠散 治妊娠無故卒然下血</p> <p>阿膠 熟地黃 生地黃 各半</p> <p>右以清酒三升攪勻溫熱分三服</p> <p>一方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>生地黃汁 陳酒五合</p> <p>右同煎三五沸溫三服以止為度</p> <p>榆白皮散 治妊娠胎漏下血其難產常宜服之</p> <p>榆白皮 葶根 大麻仁 羅麥 木通 各二</p> <p>右咬咀水煎溫服</p> <p>一方 治妊娠胎漏下血數升胎動不安</p> <p>榆白皮 黃芩 當歸 生薑 各二</p> <p>葵子 左石 各一</p> <p>右到以水五升煮取二升半分三服不渴更作服之</p> <p>本散 治肝經有熱下血</p> <p>細條黃芩 為末每服一錢以酒調服</p> <p>防風丸 治肝經有風以致血得風而流散不歸經</p> <p>防風為末每服一錢白湯調服</p> <p>防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血</p> <p>條芩 防風 各等</p> <p>右為末酒糊丸如桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或溫酒送下</p> <p>○右三方治肝經風熱之劑</p> <p>桂枝茯苓丸 仲景云婦人宿有癥病經斷來及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥癥害妊娠六月動者前三月經不利</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

凡遇此症最  
宜斟酌

時胎下血者。後斷三月。經也。所以血不止者。其藏不去故也。當  
下其穢。桂枝茯苓丸止之。動在臍上故知是微也

桂枝 茯苓

牡丹皮 桃仁

去皮 芍藥

右五味末之。煉蜜丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知加至三  
丸。

本事方 治胎漏下血不止。

取桃樹上乾不落桃子。燒灰。和水服。○本草云。桃奴破血。  
又治伏梁氣積。

○右二方治瘕病破血之劑。

大千方 治妊娠忽然下黃汁中膠。或如豆汁等物。或胎動腹痛。

黃菁炒六兩 糯米五合

齊陰綱目 卷八 婦人 經帶

本德堂

右以水七升。煎取二升。分爲四服。

銀芩酒 治妊娠下黃汁。或如赤豆。

芎根去黑皮 銀五兩兩 金

右用水酒各一大盞。煎服。

○右二方治漏下黃豆汁之症。

○煩躁即口乾

大全云。妊娠苦煩悶者。以四月受少陰君火氣。以養精。六月受少

陽相火氣。以養氣。若母心驚膽寒。多有煩悶。名曰子煩也。產後云

夫妊娠而子煩者。是肺臟虛而熱乘於心。則令心煩也。停痰積飲

在心胸之間。或衝於心。亦令煩也。若熱而煩者。但熱而已。若有痰

飲而煩者。嘔吐涎沫。惡聞食氣。煩躁不安也。大凡妊娠多人既停

痰積飲。又寒熱相搏。氣機不舒。或煩躁。或嘔吐涎沫。則胎動不  
安。均爲子煩也。

薛氏曰。前証若因內熱。用竹葉湯。氣帶用紫蘇飲。痰帶用二陳白

木黃芩。枳殼氣鬱。用分氣飲。加川芎。則開虛。獨用大君紫蘇山梔

木黃芩。枳殼氣鬱。用分氣飲。加川芎。則開虛。獨用大君紫蘇山梔

其氣通於舌。若臍腹氣虛。榮衛不理。致陰陽隔絕。熱乘於心。脾津

液枯少。故令心煩。而口乾也。與子煩大同小異。宜用知母丸。

薛氏曰。前証若因經實。火用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用入參黃

耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經

火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。加

味地黃丸。

齊陰綱目 卷八 婦人 經帶

本德堂

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯。終日煩悶。名曰子煩。

白茯苓 麥門冬 防風 黃芩

右作一服。加竹葉十片。水煎服。無時。○一方有知母無黃芩。○

一方有人參無黃芩。

知母飲 治妊娠心脾壅熱。咽膈渴苦。煩悶多驚。

知母 麥門冬 赤茯苓 黃芩 黃耆

甘草

右作一服。水二鍾。入桑白皮半錢。煎至一鍾。再入竹瀝。煎至

煎一二沸。服無時。

犀角散 治子煩。

犀角尖 磨入 地骨皮 條芩 麥門冬 甘草

赤茯苓 各二錢

右切作一服水二鍾煎八分入竹瀝一合溫服

當歸飲 治子煩

當歸二錢 川芎

阿膠珠 豆豉

桑寄生 各錢

葱白七

右剉水煎溫服

人參散 治妊娠熱乘心脾津液枯少頭暈乾渴

人參 麥門冬 去赤茯苓 地骨皮 乾葛

黃芩 炒 犀角 錢各七 甘草 兩

右剉每服三錢水煎服

竹茹湯 治妊娠煩躁不安

用淡青竹茹二兩水煎一大升對散酒合徐徐服盡為度

治妊娠心煩熱不止

葱白 握 錢合

右以水二大盞煎至一盞半去滓溫分三服

一母丸 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得睡寢氏謂

之子煩也醫者不知作虛煩治之損動胎氣宜矣

知母 洗焙 為細末棗肉丸如彈子大每服一丸煎以參湯

下

○心腹脹滿 即子煩

此證言然也 公飲所飲飲 飲發動與氣相爭故令心腹脹滿也

大全云妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲腹脹飲冷

飲發動與氣相爭故令心腹脹滿也

心腹故以黃 藥飲氣下 氣為主餘隨 症如城

薛氏曰前証若外感風寒內傷飲食用荳蔻王氣散若食陽脾用

用六君子湯若陽氣壅滯胎上逼心用紫蘇飲

一妊娠飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山查枳殼

其脹益甚其胎上攻惡心不食右開脈浮大按之則弦此脾土不

起肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益

氣升舉脾氣而瘥

一妊娠腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃氣等藥服之反吐

轉如服滿寒心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯

其論曰妊娠通身腫滿或心胸急服名曰胎水遂去妊娠胸前看

之胸肚不分悉以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方

得分脫死胎此証蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂娠孕如此

終不知胎水之為患也

李氏曰子懸者心腹脹滿痛也妊娠四五個月以來相火養胎以

致胎熱氣逆寒心心腹脹滿疼痛宜紫蘇飲有鬱心腹脹滿甚者

加莢木及丁香少許不食者莢木湯倍白木加芍藥

火盛極一時心氣閉絕而死紫蘇飲連進救之

此証兩尺脈絕者有誤服動胎藥子死腹中則增案手拍唇爪俱

青全以舌為証驗為歸湯救之

仲景云婦人懷妊六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹

如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯溫其藏

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以上重如有水氣狀懷身七

月太陰當養不養此心氣實當刺渴勞宮及關元小便微利則愈

紫蘇飲 治胎氣不和。奏上心腹脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產。

驚恐氣結連日不下一方。無川芎。各七寶散。

紫蘇葉二錢 大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮

當歸各一錢 人參 甘草各五分

右剉作一服。加生薑三片。葱白七寸。水煎服。

本事方云。曾有一婦。累日產不下。服通催生藥不驗。予曰。此必坐草太早。心懷一熱。懼氣結而不行。然非不順也。素問云。恐則氣下。蓋恐則精神怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行矣。得此藥一服。便產。及婦人六七月子懸者。用此數數有驗。不十服。胎便近下。

陳方甫治一婦。有孕七箇月。遠歸。忽然胎上衝心而痛。坐臥不安。兩醫治之無效。遂說胎已死也。用草麻子研爛和麝香調肚臍中以下之。命在垂危。召陳診視。兩尺脈絕。他脈平和。陳問二醫作何證治之。答曰。死胎也。陳曰。何以知之。曰。兩尺脈沉絕。以此知之。陳曰。此說出何經。二醫無答。陳曰。此子懸也。若是胎死。却有辨處。面赤舌青。子死母活。面青舌赤。吐沫。母死子活。唇口俱青。子母俱死。今面不赤。口不青。其子未死。是胎上逼心。宜以紫蘇飲治之。至十服而胎近下矣。

訶黎勒散 療妊娠心腹脹滿。氣衝胸膈煩悶。四肢少力。不思飲食。

訶黎勒 赤茯苓 前胡 各一兩 陳皮 大腹皮 桑白皮 枳殼 川芎 白朮 各半

右為粗末。每服四錢。薑三片。棗一枚。水煎服。

保胎和氣飲 專治胎前四五個月。身體困倦。氣急發熱。飲食無味。食胎頭暈等証。

枳殼四錢 厚朴 香附子 各三錢 砂仁 蒼朮

橘紅 各二錢 蘇葉一錢 甘草 各九分 小茴香 半錢

右剉分作三服。每服用水一鍾。半煎七分服。

瘦胎飲 專治胎前五六個月。胎前困弱。體重食睡。食不知味。肚腹胎動。

當歸二錢 白芍藥 益母草 枳殼 各四錢 砂仁

香附子 益智 各三錢 甘草一錢

右剉分作三服。每服水一鍾。半煎至七分。空心溫服。

天德堂

枳殼湯 治婦人妊娠胎脹。

枳殼三錢 黃芩 二兩 一方只用一兩

右為粗末。每服五錢。水煎服。○如腹滿。身體沉重。加白朮二兩。

葱白湯 治胎上逼心煩悶。又治胎動因驚。

用葱白二七莖。濃煮汁飲之。若胎未死。即安。已死。即出。未效再服。○葉全善云。此方神效。脈浮滑者。宜之。本草云。葱白通陽氣。安胎。

一方 治胎動上逼心痛。

取艾葉如雞子大一團。以頭醋四升。煎至三升。半溫服。

倉公下氣湯 治心腹兩脇脹悶。飲食少思。四肢無力。

羌活 檳榔 青皮 大腹皮 赤芍藥

甘草 陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮

劉加生薑五片 棗一枚 水煎服

當歸湯 治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛

當歸 川芎 人參 阿膠 甘草

連根葱白

右細剉以水二升煎四味至升半去渣下葱再煎減三合入阿膠溫服一劑分二三服

大聖散 治婦人怔忡睡中多驚腹脹坐臥不寧

白茯苓 川芎 黃芩 當歸 麥門冬

人參 甘草 木香

治妊娠遍身癢或衝心欲死不能飲食

白木 黃芩 芍藥

右用水六升煮取二升半分三服

一方 治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓 桑白皮 前胡 郁李仁 檳榔

右為細末以水一升煮取一半去滓夜臥服

安胎和氣飲 治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子 白木 陳皮 高良薑

木香 白芍藥 陳米 甘草

右作一服生薑五片水煎服忌生冷之物

仲景附子湯 婦人懷妊六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒

者少腹如扇所以然者子臟寒故也當以此湯溫其臟

附子 白芍藥 茯苓 人參

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

心痛

大全云妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛且發

夕必發旦必若傷心支絡則乍安乍作若傷於子藏則胎動而

薛氏曰前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山查若因錯雜諸邪

當審其因而治之

一妊婦心痛煩熱作渴用白木散即愈後因停食其痛仍作胸腹

脹滿按之則痛此因飲食停滯用入參香胃湯按之不痛乃脾胃

受傷以六君子湯補之而愈

一妊婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查

山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦緊

脾脈弦長此肝脈乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

火龍散 治妊娠心氣疼

川棟子 茴香 艾葉末

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

產寶丸 治妊娠心氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴

右用水六升煎取二升分二服

<p>白木湯 治妊娠心腹痛欲死不可忍者</p> <p>白木<small>三兩</small> 赤芍藥<small>二兩</small> 黃芩<small>一兩</small></p> <p>右切以水六升煮取三升半分三服半日令盡微下生忌桃李雀肉等</p>	<p>千金方 療妊娠心痛</p> <p>青竹茹<small>一升</small> 羊脂<small>八兩</small> 白蜜<small>三兩</small></p> <p>右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三服</p>	<p>一方 治妊娠忽然心痛絕欲死者謂之中惡</p> <p>生地黃<small>二兩</small> 枳殼<small>一兩</small> 木香<small>三分</small></p> <p>右剉酒煎服</p>	<p>一方</p> <p>青陰綱目 卷八 心痛</p> <p>榆皮<small>二兩</small> 豆豉<small>五兩</small></p> <p>右爲末以酒爲丸如桐子大溫水下二七丸無時服</p>	<p>雜方</p> <p>青竹茹一升酒三升煮取一升半去滓分溫服</p>	<p>一方 破雞子一枚酒調服之</p>	<p>一方 大麻子三升研水八升煮取五升分五服</p>	<p>補遺</p> <p>沉香降氣湯</p> <p>茯苓補心湯</p> <p>四七湯</p> <p>紫蘇飲皆可用炮製前宗心痛飲亦恐延胡</p>
--	---	--	--	-------------------------------------	---------------------	----------------------------	---

<p>○心腹痛</p> <p>大全云妊娠心腹痛者或由宿有冷瘕或心膈風寒皆由臟虛而致動也邪正相擊而并於氣隨氣上下上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹痛痛多是風寒濕冷痰飲與臟氣相擊故令腹痛攻衝不已則致胎動也</p>	<p>薛氏曰前証若風寒痰飲則金沸草散難痼瘕胎氣鬱結加香附川芎若飲食停滯用六神加紫蘇枳殼若怒動肝火前藥更加柴胡山梔若鬱結傷脾則黃連湯枳殼散也</p>	<p>一妊婦心腹作痛吐痰惡食胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p>	<p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p> <p>爲陰綱目 卷八 心痛</p>
--	---	--	---	---	---	---



<p>右為細末每服二錢食前溫調服</p>	<p>阿膠散 治妊娠胎動腹中疝痛不思飲食  <small>用艾葉而此藥用白木者不忌飲食也此散當服陳皮為君</small></p>	<p>當歸 陳皮 白木 白茯苓 阿膠  <small>川芎 各七錢半 甘草 二錢</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分服</p>	<p>一方 治妊娠患腹痛并胎動不安  <small>當歸 川芎 阿膠 人參 厚朴 各二兩</small></p>	<p>葱白切一升  <small>右咬咀以水七升煎至三升分三服○一方有甘草無厚朴川芎</small></p>	<p>香義散 治妊娠五個月腹後常胸膈間氣刺痛滿或腸鳴嘔至  <small>嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致也蔡元度危人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方三服而愈</small></p>	<p>廣中莪茂 丁香 粉草 二錢  <small>右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胸中如物按下之狀</small></p>	<p>古今錄驗方 療妊娠腹內冷痛忽胎動  <small>薤白 升 當歸 切四兩</small></p>	<p>右以水五升煮取四升作三服</p>	<p>一方 治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍  <small>上等銀屑 茅根 二斤 去黑皮</small></p>	<p>右以水九升煮銀取五升入清酒一升同煎茅根取三升分三服立安</p>	<p>婦人產後血暈  <small>胎方去俱妙於此藥最奇可用</small></p>
----------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	---	---	---------------------	--	------------------------------------	--

<p>一方 治妊娠痛腹  <small>用生地黃三斤搗酒一升合煎減半頓服愈</small></p>	<p>一方 治妊娠四五箇月忽然腹痛  <small>大棗 十四枚 鹽 一錢 炒</small></p>	<p>右為末取一撮許酒調服即愈○一方單用棗十四枚燒存性為末童子小便調下○一方單用鹽一斤燒令赤以兩指取一撮酒調服</p>	<p>○腹痛 即子痛  <small>仲景云婦人懷胎腹中諸疾病當歸芍藥散主之脈經曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則男如肘頭參差起者女也冷者何面冷者為死溫者為生</small></p>	<p>濟陰綱目 卷本 婦人 胎前 產後 諸症 治法 未錄</p>	<p>薛氏曰若腹中不時作痛或小腹重墜者胎動用地黃當歸湯未應加參朮陳皮或因脾氣虛用四君子加歸地中氣虛用補中益氣湯</p>	<p>地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛  <small>當歸 熟地黃 二兩</small></p>	<p>右為末作一服水三升煎至一升去滓頓服○未效加入芍白朮陳皮</p>	<p>加味四物湯 治血少胎痛  <small>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 香附子 各等分</small></p>	<p>右為末每服三錢紫蘇湯調下</p>	<p>○小腹痛</p>	<p>妙在紫蘇湯</p>	<p>血虛者可用</p>
---	---	---	---	----------------------------------	---	--	------------------------------------	--	---------------------	-------------	--------------	--------------

大全云：妊娠小腹痛者，由胎絡虛風寒相搏，痛甚亦令胎動也。  
 薛氏曰：前証若風寒所搏，用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯，氣虛用六君子湯，中氣虛用補中益氣湯，若腹脹痛用安胎飲，加升麻白朮不應，兼補中益氣湯。  
 一妊婦小腹作痛，其胎不安，氣攻左右，或時逆上，小便不利，用小柴胡湯加青皮、山梔、清肝火而愈。後因怒，小腹脹滿，小便不利，水道重墜，胎仍不安，此亦肝木熾盛所致，用龍膽瀉肝湯一劑，諸証頓愈，乃以四君子加柴胡、升麻以培脾土而安。  
 療妊娠被驚，胎向下不安，小腹痛連腰，下血。  
 當歸 川芎 各八分 阿膠 炙 艾葉 各四分  
 茯苓 大棗 各二十  
 濟陰綱目 卷八 腰痛 天德堂  
 右細切，以水四升，煮取三升，酒分三服。  
 補遺方 治妊娠小腹痛胎動不安。  
 川芎為細末，酒調下。一方用川芎當歸等分煎服。  
 ○腰腹及背痛  
 大全云：腎主腰足，因勞傷損動其經，虛則風令乘之，故腰痛。氣乘虛入腹，則腹痛，故令腰腹相引而痛。其痛不止，多動氣，婦人腎以繫胞，妊娠而腰痛甚者，則胞墮也。  
 薛氏曰：前証若外邪所傷，用獨活寄生湯，勞傷元氣用八珍湯，加杜仲、砂仁、阿膠、艾葉，腎不足以前藥加白朮、補骨脂、氣虛兼用紫蘇飲，加桔梗、枳殼、肝火所動用小柴胡湯，加白朮、枳殼、山梔、肝脾鬱結用歸脾湯，加紫胡、枳殼。

一妊婦頭項強直，腰脊作痛，此膀胱經風邪所致，用拔萃羌活湯一劑而愈。又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊。  
 汪石山治一婦懷妊八月，嘗病腰痛，不能轉側，大便燥結，醫用人參等補劑，痛益加，用稍黃通利之藥，燥結雖行而痛如故。汪診之，脈稍洪，近服白血熱，血滯也，宜用四物加木香、乳沒、黃柏、火麻仁，煎服四五貼，痛稍減，燥結潤復，加發熱而赤，或時惡寒，仍用前方去乳香、沒藥，加柴胡、黃芩，服二貼而寒熱除，又背心悶塞，腹痛復作，汪曰：血已利矣，可於前方加人參一錢服之而安。  
 通氣散 治妊娠腰痛，狀不可忍，此藥神效。  
 破故紙 瓦上炒  
 右先嚼胡桃肉一個爛，後以溫酒調下，故紙末三錢，空心服。  
 濟陰綱目 卷八 腰痛 天德堂  
 五加皮散 治妊娠腰痛不可忍，或時痛，先服此散。  
 杜仲 炒 五加皮 阿膠 炙 防風 狗脊  
 川芎 白芍藥 細辛 草薢 各三 杏仁 皮 去尖 炒  
 有咬咀，以水九升，煮取一升，去滓下膠，作三服。  
 五加皮丸 治妊娠腰痛不可忍，若寒服此丸。  
 續斷 杜仲 各二 黃芩 獨活 各三 五加皮  
 狗脊 草薢 芍藥 訶子 肉 各四  
 右為細末，煉蜜丸如桐子大，每服四十九丸，空心酒下，日三服。  
 療胎動以致腰痛背痛。  
 杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎  
 草薢 各等分

右為末每用三錢空心酒調下

源妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸<sub>各二</sub> 阿膠<sub>各二</sub> 甘草<sub>各二</sub> 葱白<sub>切二</sub>

右細切以水七升煮取三升去滓分溫三服

小品芋根湯 療損動胎腰痛去血胎動向下

生地黃<sub>各二</sub> 芋根<sub>各二</sub> 當歸<sub>各二</sub> 芍藥<sub>各二</sub> 阿膠<sub>各二</sub> 甘草<sub>各二</sub>

右細切以水六升煮取三升去滓內膠煎烱分溫三服忌海藻

蘼莢

大地黃丸 治產前後腰腹疼一切血疼兼治血氣虛四肢不舉

骨髓熱疼

熟地黃<sub>各二</sub> 當歸<sub>各二</sub>

右為細末煉蜜丸如雞子大每服一丸空心白湯嚥下

紫酒 治妊娠腰痛如折亦治常入卒腰痛者

大黑豆二合炒令香熟酒一大盞煮取七分去豆空心頓服

雜方

治胎動腰痛搶心或下血取葱白不拘多少濃煎汁飲之

一方用鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以勿碎為度取酒

飲之鹿角為末服方寸七

一方用葛蒲汁酒一升服之

一方用艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分爲二服良

○胎水腫滿 即子腫子滿子氣

產賢論曰妊娠腫滿山崩氣本弱因妊娠虛土不尅水血故於四

肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人患有  
風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為蠶脚亦有通身腫滿心腹急脹者  
曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒  
邪氣及有所觸犯則胎動而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若  
忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕身之肌肉濕漬氣弱  
則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢  
臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆  
能使頭面或手足浮腫也然水漬于胞兒未成形則胎多損壞及  
臨產日脚微腫者乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生  
也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹滿腫也

濟陰綱目 卷八 胎水腫滿

天德堂

子氣者因于  
而用藥氣阻  
土蓋不能制  
水故一香附  
散足以散之  
然不服藥亦  
無害

產乳集論曰妊娠自三月成胎之後兩足自脚而漸腫腿膝以來  
行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出  
者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血  
風未可妄投湯藥亦恐大畏甚香慮將產之際費力有不測之憂  
故不可不治於未產之前也古方論中少有言者元豐中淮南陳  
景初名醫也獨有論治此証方名初謂之香附散李伯時名曰天  
仙藤散也

薛氏曰前証若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛  
弱佐以四君子若面目虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未腫  
用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣如茯苓若飲食失  
宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫用補中益氣指縫出水用

<p>天仙藤散 治妊婦虛弱兼四君子湯如未應用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐以加味逍遙散</p>	<p>白朮散 治妊婦面目虛浮四肢腫如水氣名曰子腫</p>	<p>白朮 二錢 茯苓 一錢 陳皮 生薑皮 大腹皮</p>	<p>桑白皮 錢一</p>	<p>右到水煎服或為細末每服三錢米飲調下○本方去白朮名五皮散 或加水香</p>	<p>木通散 治妊婦身腫浮腫四肢脹急小便不利</p>	<p>木通 香薷 紫蘇莖葉 枳殼 檳榔</p>	<p>條芩 各五分 木香 訶子皮 各三分</p>	<p>右到加生薑三片水煎食前服</p>	<p>濟陰綱目 卷八 胎前產後 聖 天德堂</p>	<p>厚朴散 治妊婦通身洪腫</p>	<p>厚朴 二兩 白朮 五兩 茯苓 桑白皮 郁李仁 各二兩</p>	<p>右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥</p>
---	------------------------------	-------------------------------	---------------	---	----------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------

<p>千金鯉魚湯 治妊婦腹脹滿或渾身浮腫小便赤澀</p>	<p>當歸 白芍藥 各一錢 白茯苓 一錢 白朮 二錢</p>	<p>橘紅 五錢 鯉魚尾 一尾</p>	<p>右作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞牛八生薑三片煎至一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未除再合一劑服之</p>	<p>一方</p>	<p>澤瀉 厚朴 各二兩 茯苓 枳殼 白朮 各六兩</p>
------------------------------	--------------------------------	---------------------	---	-----------	-------------------------------

<p>右到以水六升煮取二升半分溫二服</p>	<p>防已湯 治妊婦脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利</p>	<p>防已 一錢 桑白皮 紫蘇莖葉 赤茯苓 各二錢 木香 五分</p>	<p>右到一服加生薑四片水煎服○如大便不通加枳殼檳榔</p>	<p>子滿散 治妊婦通身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀謂之</p>	<p>澤瀉 桑白皮 木通 枳殼 檳榔</p>	<p>赤茯苓 錢一</p>	<p>右到一服加生薑五片水煎服</p>	<p>天仙藤散 治妊婦自三月成胎之後兩足自脚面漸腫至腿膝行步艱難喘悶妨食狀似水氣甚至足指間有黃水出者謂之</p>	<p>濟陰綱目 卷八 胎前產後 聖 天德堂</p>	<p>厚朴散 治妊婦通身洪腫</p>	<p>厚朴 二兩 白朮 五兩 茯苓 桑白皮 郁李仁 各二兩</p>	<p>右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥</p>
------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------	---------------------	--	---------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------

<p>以下三方不</p>	<p>產寶方 療妊婦身腫有水氣心腹脹滿小便少</p>	<p>茯苓 四兩 杏仁 檳榔 各三錢 旋覆花 郁李仁 各一兩</p>	<p>右為粗末以水六升煮取二升去滓分溫三服小便通即瘥</p>	<p>崔氏方 療妊婦體腫有水氣心腹急痛</p>	<p>茯苓 白朮 各四兩 旋覆花 各二兩 杏仁 黃芩 各三兩</p>	<p>右細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李雀肉酢物</p>	<p>腎著湯 治妊婦腰脚腫</p>
--------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------

茯苓 白朮各二錢 乾薑 甘草各一錢 杏仁半錢

右改咀水煎服

子和方 治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴

猪苓五兩為末以熱水調服方寸七服

腹哭鐘鳴

產寶方 治小兒在腹中哭及孕婦腹內鐘鳴

用空房下風穴中土一塊令孕婦嚙之即止或為末入麝香

少許酒調下二錢立愈然麝香開竅當酌量用之

補遺方 治孕婦腹中兒哭

用黃連濃煎汁母常呷之即止

一法 小兒腹哭者蓋臍帶上疙瘡兒含口中因娘婦登高舉臂

脫出兒口以此作聲令妊婦曲腰就地如拾物仍入兒口即止

積聚

黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故

岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

丹溪方 治血塊如盤有孕婦服峻劑此方至之

香附子

西兩

右為末麵糊丸服

桃仁 去皮尖

海粉 醋黃

白朮

一兩

濟陰綱目卷之九

關中 武之望致卿父輯著

西陵 汪 淇懷濟子箋釋

胎前門下

傷食

大全曰經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之

五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食噉致傷脾胃

故娠傷食最難得藥惟木香丸白朮散二方最穩提

薛氏曰東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑多食而不傷蓋

胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不

化若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所以因而調治

之若飲食停滯或肚腹作痛用平胃散腹滿泄瀉用六君子湯若

脾氣下陷用補中益氣湯凡噎噎氣且戒藥餌節飲食經云損

其脾者調其飲食適其寒溫凡脾胃虛弱飲食難化以白朮陳

皮為末等分陳麴粗末煎服最善根水丸但可暫用枳實峻厲能

耗真氣治者慎之

一妊婦因停食服枳朮丸腹腹不利飲食益少更服消導寬胸之

劑其胎下墜急讀此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君

子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊

平胃散 治妊娠飲食停滯或肚腹作痛

蒼朮 湯洗厚朴 薑製各一錢五分

陳皮 錢一分

右剉加生薑三片棗一枚水煎服

嘔吐惡心加枳殼砂仁

吞酸暖腐加黃連三分吳茱萸二分

六君子湯 治脾胃虛弱飲食難化或腹滿泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 牛黃 陳皮

右判加生薑三片棗一枚水煎服

停滯肉食如山查

停滯麪食倍加麥蘖

停滯糯米食用白酒麪一味

停滯米飲倍加穀蘖

魚腥所傷倍加陳皮

傷辛熱之物加黃連

濟陰綱目 卷九 傷食

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應

用四神丸

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香 二錢 三棱 人參 白茯苓 各三錢

右爲末麪糊丸如菜豆大每服三四十九熟水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒 紫蘇 各一兩 人參 白芷 各七錢

川芎 訶子皮 青皮 各半 甘草 錢半

右每服二錢加生薑三片水煎服

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而爲精神之主若血氣

不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠病此亦致損胎也

薛氏曰前證當調補正氣爲善用金銀藤一味煎湯飲之

當歸散 治妊娠中惡心腹病痛

當歸 丁香 川芎 各三兩 青橘皮 吳茱萸 各半兩 去梗湯

右爲細末溫酒調下一錢無時

又方 生乾地黃 一兩 枳殼 木香 各七錢半

右爲細末每服一錢酒調下

又方 苦梗 一兩 細 生薑 半兩

水煎服之

散滯湯 治癰惡氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮 三錢 黃芩 芍藥 歸尾 各一錢

濟陰綱目 卷九 中惡

川芎 一錢 木香 五分 甘草 少許

右分二貼水三盞先煮半根兩大片至二盞去滓根入煎藥同煎至一盞熱服

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水噴之吐出即安

一方用蠶心土爲末每二錢并水調服白湯亦可

傷寒

葉氏曰凡妊娠傷寒六經治例自同但要安胎爲主凡藥中有犯胎者則不可用也如薑香正氣散十味芩蘇散參蘇飲小柴胡湯

之類有半真能犯胎如用須主之若痰多咽逆必用之以半更極則可如無沸湯泡七次去皮臍生薑自然汗出咽乾乃可用也凡川烏附子天雄側子肉桂乾薑大黃芒硝芫花甘遂大戟蜀漆水蛭蠱蟲桃仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之藥凡用必須斟酌仔細之大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩白朮二味能安胎也或與此二味煎湯與之或為細末白湯調下二三錢亦佳如妊娠素喜弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如用小柴胡去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也其効如神餘皆倣此用之則妙矣

萬壽齋云妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五臟表裏所見脈證主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主半汗下和三法

汗下和三法  
萬壽齋云  
表半裏則和之  
以黃龍湯為主  
在裏則下之  
以三黃解毒湯為主  
此吾家傳之秘  
活人甚多如古  
方六合湯雖分  
治詳明猶不及  
此切當古方六  
合湯自漢唐四  
物湯至四物大  
黃湯共計十五  
方詳見第一格  
調經門四物湯  
加減條下

白朮散 治傷寒熱病先以此安胎但覺頭痛發熱便可服三三服即瘥若四肢厥逆陰證也不可用

白朮 黃芩 各等分 煎 瓦上炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

安胎阿膠散 治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥開服

阿膠 多 白朮 炒 桑寄生 人參 白茯苓 各等分

右為末每服一錢用糯米飲調下日三服

香蘇散 凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之

香附 炒黑 紫蘇 各二錢 陳皮 一錢 甘草 五分

右到加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢名曰正香蘇散

假令得肝脈其外證善濕面青善怒其三部脈俱浮而弦惡寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽受病也

假令得心脈其外證面赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裏和和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脈其外證善噦善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加白朮防己各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏善悲不樂欲哭其尺寸脈俱浮而清惡寒裏和本方加黃芪防風各一錢謂肺主燥是大腸受病也

假令得腎脈其外證面黑善恐其尺寸脈俱浮而濡惡寒裏和本方加附子炮一錢謂腎主寒是膀胱經受病也 附子犯胎忌用吳茱萸湯之

羌活湯 河間云解利傷寒不問何經所受雖不能盡解亦無壞證九益妊娠

羌活 二錢 白朮 一錢 防風 川芎 各一錢 甘草 一分

右到水煎服無時如無汗去白朮用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯 妊娠傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲

黃連湯即小  
柴胡湯半夏  
加少陽經藥  
而此自重在  
和解故主之  
其加減法更  
妙

小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 甘草各一錢

右加薑棗水煎服

如寒熱往來無汗口乾加葛根二錢去棗入葱白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢去棗加葱白三根

如發熱有汗口渴加白朮括實根各一錢半

如脈浮大有力大熱大渴本方人參白朮湯去棗東

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢去棗

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各一錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利為度

清陰綱目

卷九

木

天德堂

三黃解毒湯 姪娘傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼惡寒之

證止煩躁發熱大渴小便赤大便秘或利下赤水六脈沉實此

症邪在裏也宜此方主之

黃芩 黃連 黃蘗 山梔 大黃各等

右剉水煎服更隨五臟脈證加減

假令傷肝脈其內證煩滿消渴溲便難尺寸脈沉弦有力是肝

經本臟受病也本方加當歸一錢半甘草五分倍山梔

假令得心脈其內證煩躁心痛掌中熱而噤尺寸脈沉數有力

是心經本臟受病也本方加麥門冬一錢竹茹一團倍黃連

假令得脾脈其內證腹脹滿泄瀉其脈沉緩有力是脾經本臟

受病也本方加枳實炒黃芩各一錢半倍大黃

假令得肺脈其內證喘咳胸滿尺寸脈沉滑有力是肺經本臟

受病也本方加葶藶炒一錢桔梗五分倍黃連

假令得腎脈泄如下重足脛寒而逆尺寸脈沉而石是腎經本

臟受病也加乾薑炮五分熟地黃一錢半倍黃蘗

黃芪解肌湯 治姪娘傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎 甘草各一錢 芍藥 六錢

右咬咀每服八錢水煎服○加蒼朮生地黃亦可

桂枝芍藥當歸湯 治婦人有孕傷寒脈浮頭重腹中切痛宜此

方

桂枝 芍藥 當歸各一錢

右剉細每服一兩水煎服

清陰綱目

卷九

七

天德堂

芍藥湯 治婦人姪娘傷寒自利腹中痛食飲不下脈沉者太陰

病也宜此方

芍藥 白朮 茯苓 甘草各一錢

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯 治姪娘傷寒發汗後汗漏不止胎氣弱者

當歸身 黃芩 生地黃 黃芩

白芷 阿膠珠 炙甘草各等

右用淨小麥一握煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服

加味黃芩湯 治姪娘傷寒下後協熱而利不止胎氣損者

黃芩二錢 白芍藥 白朮 白茯苓

炙甘草 阿膠各一



此竹葉五  
湯法也以  
阿膠生地易  
知母石打炒  
甚

右用木一盞半煎一盞後入阿膠再煎八分服

加味竹葉湯 治婦汗下後熱不除者虛也此方主之  
人參 麥門冬 炙甘草 阿膠 生地黃各一

右加竹葉十二片粳米一合煎服

黃龍四物湯 治婦傷寒產後發熱者宜此方

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 甘草

當歸 川芎 芍藥 地黃各一

右判水煎服○若因於食者本方加枳實

加減四物湯 治婦傷寒熱極發斑狀如錦紋者

當歸 白芍藥 生地黃 黃芩各等

右判水煎服入錢水煎服

濟陰綱目 卷九 傷寒

八 天德堂

梔子大青湯 治婦傷寒發斑變為黑色

升麻 黃芩 梔子各二 大青 杏仁各半

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎服

一方 治婦傷寒發斑忽黑小便如血胎欲落

梔子 升麻各四 青黛二兩 生地黃二十

石膏 八兩 葱白切一 黃芩三兩

右用水煎分三服忌熱物○又以井中泥塗心下乾則易

護胎法 治傷寒熱病護胎

用白藥子不拘多少為末以雞蛋清調攤於紙上加碗大貼

臍下胎存處乾則以濕水潤之

護胎法 治孕婦一切有熱內外諸證

風者百病之  
長中之則隨  
所感而現病  
此證前明主

伏龍肝為末用井底泥調敷心下令胎不傷

○中風

大全論曰天四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其  
鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪賊害萬物人體虛  
則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脈  
寒則攣急熱則懈弛則弛縱痿軟若入臟腑則恍惚驚悸片成癰  
命皆在背臟腑虛寒邪皆從命而入隨所傷臟腑經絡而為諸病  
婦人中風若不早治則令墮胎也

薛氏曰按機要云風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血  
也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗  
下之戒而有中風中腑之分中腑者多著四肢則脈浮惡寒拘急  
濟陰綱目 卷九 中風 九 天德堂

不中中臟者多著九竅則唇緩失音耳聾目昏便秘中腑者  
宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中  
風之要法也婦人患之亦當宜此施治而佐以安胎之藥

防風散 治婦人中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強

防風 去毒 葛根 桑寄生各一 羚羊角屑 細辛 去苗 當歸

甘菊花 漢防己 皮秦芫 桂心 茯神 去木 甘草 各

右咬咀每服八錢外一盞半生薑五片煎至一大盞去滓入竹

源半合攪勻溫服無時

生犀角散 治婦人中風不語四肢強直心神憤憤

生犀角屑 麻黃 去節 防風 去毒 羌活 當歸

人參 各去 葛根 赤芍藥 錢半 秦芫 甘草 各半 石黃 一兩

右咬咀每八錢煎服法如前

防已散 治妊娠中風口眼喎斜手足頑痺。

防已去皮 羌活 防風各去 麻黃去節 松木節

羚羊角一兩 桂心 荆芥穗 薏苡仁 桑寄生

甘草各一兩

右咬咀每服五錢生薑五片水煎溫服不拘時

白殭蚕散 治妊娠中風口喎心膈痰涎壅滯言語不得四肢強直。

白殭蚕炒 天麻 獨活去蘆各 麻黃去節 烏犀角屑七

白附子炮 半夏湯洗七 天南星炮 各半 龍腦二錢半

右爲細末入研藥合勻每服一錢生薑薄荷湯調下不拘時日

濟陰綱目

卷九 中風

天德堂

三服

赤箭丸 治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語蹇澀皮膚不仁。

赤箭 草薢酒浸 麻黃去節 獨活去蘆 鼠粘子

熟乾地黄 羚羊角一兩 阿膠炒 防風去蘆

芎藭 當歸去 薏苡仁 五加皮 秦艽去蘆

漢防已去皮 柏子仁 酸棗仁 丹參去蘆各 秦艽去蘆

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如桐子大每服三十丸豆淋酒送下食前服

白木酒 治妊娠中風口喎語言不得。

白木一兩 獨活一兩 黑豆一合

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口喎者拗口灌

之得汗即愈

治妊娠因感外風如中風狀不省人事。

熟艾三兩陳米醋炒 冷極熱以綿帛裹熨臍下良久即省

風痺即子瀉

大全云妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則

口喎背強名之曰瘕又云瘕其候胃悶不識人須臾自醒良久復

作謂之風瘕一名子瀉一名子冒甚則反張

薛氏曰前證若心肝風熱用鈎藤湯肝脾血虛加味逍遙散肝脾

鬱怒加味歸脾湯氣逆痰瀉紫蘇飲肝火風熱鈎藤散脾鬱痰滯

二陳薑汁竹瀝苦兼證相雜當參照子煩門

丹溪治一婦人懷妊六月發瘕手足揚直面紫黑色合眼涎出昏

濟陰綱目

卷九 中風

天德堂

憤不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾時作時止無

減證直至臨產方自愈產一女子母皆安次年其夫疑丹毒

必作求治之診其脈浮取弦重取澀按至骨則沉實帶數時正二

月因未見其痛發正狀未敢與藥意其舊年瘕發時乃五月欲待

其時度此疾必作當審證施治至五月半其疾果作皆是午已兩

時遂教以自製防風通聖散用甘草加桃仁多紅花少或服或嘔

至四五十劑疾漸疎而輕後發爲疥而愈

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子瀉風瘕

羚羊角銹 獨活 酸棗仁炒 五加皮 薏苡仁炒 防風

當歸 川芎 茯神去木 杏仁各五 木香 甘草各二

右咬咀加生薑五片水煎服

葛根湯 療妊娠臨月因發風痺忽悶憤不識人吐逆眩倒少醒復發名曰子痼

葛根 貝母<sub>去心</sub> 牡丹皮 防風 防己 當歸

川芎 白茯苓 官桂 澤瀉 甘草<sub>各二兩</sub>

石膏<sub>碎</sub> 獨活 人參<sub>各三兩</sub>

右咬咀每服八錢水煎服。○貝母令人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻松菜酢物。○此方犯桂與牡丹不如羚羊角散之安

芎活湯 治子痼兼用產後逐惡血下胞衣

川芎 羌活<sub>各等分</sub>

剉水煎入酒少許溫服

濟陰綱目

卷九

十二

天德堂

芎活酒 治妊娠中風癱口噤四肢強直角弓反張

芎活<sub>去心</sub> 防風<sub>去心</sub> 黑豆<sub>一合</sub>

右前二味咬咀好酒五斤浸一宿每服用黑豆一合炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分兩服灌之

○痰癰

薛氏曰痰者筋脈急而縮也癰者筋脈緩而伸也一縮一伸手足相引搖擗不已與嬰兒發搐相似謂之痰癰也此證多屬風熱風

此風皆本內熱故立方亦皆從內

主搖動也醫能言云心主脈肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則為痰癰也治法若因風熱用鈎藤湯加柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風寒上涌加竹瀝白朮夏若風邪急搐加全蝎僵蚕麝香氣血用八珍湯加鈎藤山梔

升麻代貝母所未信

以風為主

此方甚佳可通經

主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝絕也皆不治一按諸肢不能伸屈服犀角燉血之劑通尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩為主佐以鈎藤湯而安後因怒發證復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鈎藤散如山梔柴胡而血止用加味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鈎藤散飲食進而漸安

鈎藤湯 方見胎動不安

子瘡

大全云孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也

濟陰綱目

卷九

十三

天德堂

亦醫家不足

哉黃帝問曰人有重身九月而瘡此為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當奈何

○欬嗽

大全云夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於胎妊娠嗽久不已則傷胎也

薛氏曰前證若秋間風邪傷肺用金沸草散難效夏間火邪犯金用人參平肺散難效冬間寒邪傷肺用人參敗毒散難效春間風邪傷肺用參蘇飲難效若脾肺氣虛用六君子湯歸結梗若血虛四物加桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣

虛風寒所傷用補中益氣加桑皮杏仁桔梗蓋肺屬辛金生於巳土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣以致肺理不密外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金生腎水為善

一姪娠嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎水而愈

一姪婦嗽嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以為此水壯為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一姪婦因怒致嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳殼白木茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子加升麻柴胡而愈

濟陰綱目 卷九 咳嗽 十四 天德堂

桔梗散 治姪婦肺癰咳嗽急不食

天門冬 去心 赤茯苓 各一錢 桑白皮 桔梗 紫蘇 各五分

麻黃 三分 貝母 人參 甘草 二分 一方有杏仁無貝母

右剉加生薑水煎服

馬兜鈴散 治姪娠氣壅塞咳嗽氣喘

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母 各五分

桑白皮 陳皮 去白 大腹 黑豆 紫蘇 各一錢 五味子 二分

一方有枳殼無人參貝母桑白皮三味

右剉一服加生薑三片水煎服

百合散 治姪娠風寒咳嗽痰多喘滿

百合 紫菀 貝母 去心 白芍藥 前胡

赤茯苓 桔梗 各一錢 甘草 五分 右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾溫服

紫菀湯 治姪娠咳嗽不止胎動不安

紫菀 天門冬 去心 各一兩 桔梗 牛兩 杏仁

桑白皮 甘草 各一錢 一方有防風五分

右咬咀每服三錢加竹茹一塊水煎去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

○喘急 呂滄洲治經歷哈散侍人病喘不得臥眾作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛於人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作

喘也乃用催生湯加芎歸煮二三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散審囑曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之眾所不知也眾慚而去

平安散 治姪娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脹痛

川芎 木香 各一錢 陳皮 熟地黃 各一錢

乾薑 生薑 厚朴 製炒 甘草 各一錢

右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服

桔梗湯 馬兜鈴散 並見前

○吐血衄血咳嗽血 大云云姪娠吐血者皆由臟腑有傷凡憂思驚怒皆傷臟腑氣逆於上血隨而溢心悶胸滿久而不已心悶甚者死姪娠病此多墮

胎也

薛氏曰前證若肝經怒火先用小柴胡加山梔生地次用前藥合四物後用加味逍遙散肝經風熱防風子芩丸心經有熱朱砂安神丸心氣不足補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地黃湯胃梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺經有火黃芩清肺飲

河潤生地黃散 治吐血衄血咯血溺血下血諸見血無寒皆屬於熱但血家證皆宜服此藥

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃芪 白芍藥 黃芩 甘草 各等分

右咬咀每服一兩水煎服○如脈微身涼惡風每兩加桂半錢

濟陰綱目 卷九 天德堂

○如下血加地榆

局方必勝散 治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟地黃 小薊 并根 人參 蒲黃 微炒

當歸 去蘆 芎藭 烏梅肉 各一兩

右件搗羅為籠末每服五錢水煎溫服

○瘧疾

大全云妊娠瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相勝寒熱作其發實者由風邪客於風府循衛而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日必其發早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注于伏衝之脈其行九日出缺盆其氣既上故發更早其間日發者風邪

內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作也妊娠而發多傷及肺

薛氏曰前證因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審察飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸脾湯若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥仍參三陰三陽經而治之七寶散治男婦一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日發或間日發或三四日一發不問塊瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

濟陰綱目 卷九 瘧疾 十七 天德堂

常山 厚朴 薑製 青皮 陳皮 一云去白

甘草 炒 板榔 草果 去殼各

右咬咀每服半兩於未發隔夜用水酒各一盞煎至一大盞去滓露一宿再用水酒煎亦露一宿來日當發之早溫溫而東

先服頭藥少頃再服藥渣大有神効

準繩曰嘗治一妊婦六七個月患瘧先寒後熱六脈浮緊醫用

柴胡桂枝無効子曰此非常山不愈衆醫難之越數日疾甚乃

從子治以七寶散一服瘧黃帝問曰婦人重身壽之奈何岐伯

曰有故無殞帝曰何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大

半而止誠審藥物之性明治瘧之方何疑攻治哉

人參養胃湯 治妊娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身

痛面色青白脉弦遲者。聖邪散治證亦同。

半夏 厚朴 製 橘紅 各八分 蒼朮 一錢 藿香葉

草果 茯苓 人參 各五分 甘草 三分

右加生薑七片烏梅一個水煎服。

清脾湯 治妊娠瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便秘澀不進飲食脉弦數者。

青皮 厚朴 製 白朮 炒 草果 茯苓

半夏 黃芩 柴胡 甘草 各五分

右加生薑水煎服。

聖邪散 治妊娠停食感冷發為瘧疾。

高良薑 炒 白朮 草果仁 橘紅

濟陰綱目 卷九 瘧疾 十八 天德堂

藿香葉 縮砂仁 白茯苓 各一錢 甘草 五分

右咬咀作一服加生薑五片棗一枚水煎服。

柴胡散 治妊娠瘧疾。

柴胡 二錢 生大黃 二錢 生黃芩 一錢 甘草 一錢

右作一服水煎臨發日五更溫服取利為度。

又方 常山 石膏 各一兩 黃芩 甘草 各半兩 烏梅 七個

右細切以水酒各一碗浸一宿平旦煎至一碗去滓分二服臨發時服。

右二方犯常山大黃吐下之劑若六脉浮緊有力中有頑痰積熱者用之所謂有故無殞也其他療治方法已備雜證門若熱甚恐致動胎者亦如傷寒熱病治方以白藥子伏龍肝等藥以清之。

臍上下可也。

霍亂

大全云飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干則之霍亂其間或先吐或腹瀉吐利是困於熱也若頭痛體疼發熱是風邪也若風折皮膚則氣不宣通而風熱上衝為頭痛若風入腸胃則泄利也吐瀉則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也。

薛氏曰前證若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用平胃散若果脾胃頓傷陽氣虛寒手足逆冷者須用溫補之劑治當詳審毋使動胎也。

萬密齋曰霍亂者陽明胃經之病名也蓋因平日五味肥醲積滯成痰七情鬱結氣盛為火停蓄胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利並作揮霍變亂故名霍亂如邪在上則嘔則常心而痛其吐多邪在下則瀉則常腹而痛其利多邪在中則其腹中痛吐利俱多吐多則傷氣利多則傷血血氣受傷不能護養其胎况邪氣鼓擊胎元母壽未有不殞者矣此危惡之證不可不亟治也宜香蘇散加藿香葉主之。

濟陰綱目 卷九 霍亂 十九 天德堂

成痰七情鬱結氣盛為火停蓄胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利並作揮霍變亂故名霍亂如邪在上則嘔則常心而痛其吐多邪在下則瀉則常腹而痛其利多邪在中則其腹中痛吐利俱多吐多則傷氣利多則傷血血氣受傷不能護養其胎况邪氣鼓擊胎元母壽未有不殞者矣此危惡之證不可不亟治也宜香蘇散加藿香葉主之。

香附 炒 紫蘇 各二錢 陳皮 一錢 甘草 又

藿香葉 縮砂 各五分

右到水煎服。如轉筋加木瓜一錢。胎動不安加白朮一錢半。如夏月得之加黃芩一錢半黃連一錢香薷二錢。如冬月得之加人參白朮各一錢乾薑炮五分。

此方甚良

回生散 治中氣不和霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮 去白

藿香 各五分

右為末水煎溫服

七味白朮散 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

人參

茯苓

甘草 炙

木香

藿香 各半

乾薑 一兩

右為末沸湯調服二錢吐瀉甚者加生薑汁

理中湯 治妊娠霍亂腹痛四肢逆冷汗出脈虛弱者

白朮

人參

乾薑 炮

甘草 炙 各一錢

右到水煎服○甚者加熟附子五分

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

濟陰綱目

卷九

橘紅 各二錢

當歸 各二錢

天德堂

人參

厚朴 薑炙

橘紅 各二錢

當歸 各二錢

乾薑 炮

甘草 炙 各一錢

右作一服加生薑三片棗一枚水煎服

白朮散 治妊娠霍亂腹痛吐利不止

白朮 炒

藿香 仁

枳殼 各二錢

橘紅 各二錢

右為散每服五錢入生薑半分水煎去滓溫服

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸 湯洗

生薑 切 各七錢

木瓜 竹刀切

各一兩半

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服熱服○一方有懷香

七錢甘草錢一葉黃加紫蘇煎右四方用乾薑黃連葉黃俱大

此方甚良

溫之劑若發熱煩渴脈數陽證者服之即死宜用後方

竹茹湯 益元散

桂苓甘露飲

冬葵子湯 並治霍亂

○泄瀉

大云云妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀

不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿

膠丸或三黃煎艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脈沉緊數用

戊己丸和之暖腐不食胃脈沉緊用感應丸下之後調和脾胃若

風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷洞泄用理中湯

治中湯伏暑煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便便利用不換金

正氣散胃苓湯此四證之大略也

薛氏曰泄瀉若米食所傷用六君加穀蘖麴食所傷用六君加麥

藥肉食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六

君加柴胡生薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂

不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益

氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不

食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更浸淫

飲食少思乃脾胃虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或

愈而復作或飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土為善

進士王徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強

進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃自和宿滯自化飲食自

進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲授降火藥余曰

若然則胃氣益傷也經云損其脾者調其飲食適其寒溫後不藥

果愈

胃苓湯 治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉水穀不化。此平胃散與五苓散合方也。

蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 茯苓

猪苓 澤瀉 各一官桂 甘草 各五分

右加生薑三片。棗二枚。水煎食遠服。

不換金正氣散 治妊婦傷濕泄瀉。

蒼朮 厚朴 陳皮 藿香 半夏 各一 甘草 五分

右加薑棗煎服。

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃米穀不下泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血或下魚腦日夜無度。

濟陰綱目 卷九 天德堂

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 芍藥 肉桂 各等

右剉每服八錢入粟米一握水煎服。如腹痛加木香。

加味理中湯 治妊娠泄瀉。

人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾薑 黃連

木香 藿香葉 訶子肉 肉豆蔻 甘草 各一錢

右剉水二鍾生薑三片大棗二枚煎一鍾飢時服。

加味治中湯 治飲食過多脾胃之氣不足以運化而瀉。

人參 白朮 乾薑 甘草 各一錢

陳皮 去白 青皮 各七 砂仁 五分

錢氏益黃散 治妊娠泄瀉嘔吐腹痛手足厥逆。

陳皮 青皮 訶子肉 各五錢 丁香 二錢 甘草 三錢

右爲末每服三錢水煎服。

草果散 治臟腑虛寒腹痛泄瀉無度。

厚朴 黃汁 炒三兩 肉豆蔻 十個 草豆蔻 十個

右每服三錢加生薑煎服。

痢疾

大金云。妊。娠。飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢也。

薛氏曰。治痢之法當察前篇其下黃水乃脾土虧損真氣下陷也。當升補中氣。若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾。若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃。若黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾胃。若黃而兼赤乃心母益子但用補中益氣。若腸胃虛弱風邪客之。用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣。凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類。

地官胡成甫之內。妊。娠。久。痢。自用消導理氣之劑。腹內重墜胎氣不安。又用阿膠艾葉之類。不應余曰。腹重墜下元氣虛也。胎動不安。內熱盛也。遂用補中益氣而安。又用六君子湯全愈。

靈仙翁治湯總兵夫人。妊。娠。病。痢。不止。翁診其脈虛而滑。兩關若瀉。此由胎氣不和相火炎上而有熱。似痢是非痢也。乃用黃芩白朮以安胎。四物生地黃以調血。數劑而安。

白朮湯 一名三 治孕婦下痢腹痛。

此方治諸氣血兩虛。久成痼疾。不可用其。曰。胃。風。取。其。益。胃。而。升。降。也。



<p>白朮 黃芩 當歸各等分</p> <p>右咬咀每服三錢至四錢水二盞煎至一盞去渣溫服日夜三次。嗽者加桑白皮食後服之。</p>	<p>當歸芍藥湯 治妊娠腹中疝痛下痢赤白。</p> <p>白芍藥 白茯苓 當歸 川芎</p> <p>澤瀉各五錢 白朮七分</p>	<p>右爲細末溫酒或米飲任意調服。一丹無川芎有條芩甘草黃連木香枳榔咬咀煎服。</p> <p>黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止。</p> <p>黃連 八分 厚朴 製 阿膠 當歸 乾薑 各六分 黃芩 艾葉 各四分</p>	<p>濟陰綱目 卷九 痢疾</p> <p>右爲細末空心米飲調下方寸七服。</p> <p>蒙黃連丸 治妊娠下痢赤白絞道腫痛冷熱皆可服。</p> <p>乾薑 炮 黃連 縮砂仁 炮 川芎 阿膠 炒粉 白朮 各一兩 乳香 二錢 另研 枳殼 炒半兩</p>	<p>右爲末用烏梅三個取肉入少醋糊同杵丸如桐子大每服四十九白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下一方有木香二錢</p> <p>三黃熟艾湯 治妊娠挾熱下痢。</p> <p>黃連 黃芩 黃蘗 熟艾 各等分</p>	<p>右到每服五錢水煎服。嘔加橘皮生薑。</p> <p>歸蓄湯 治妊娠下痢腹痛小便澀滯。</p>	<p>以三黃湯加熟艾治熱痢加橘皮生薑治嘔俱妙</p>
---	--	---	---	--	--	----------------------------

<p>黃芩 當歸 炮各一兩 糯米 一合</p> <p>右細切分四服水煎服。</p>	<p>大軍散 治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死者。</p> <p>黑豆 二十粒 甘草 二錢 半生 栗殼 二個 去頂 炙各半 右爲籠索作二服加生薑三片水煎食前服神效。</p>	<p>厚朴散 治妊娠下痢黃水不絕。</p> <p>厚朴 薑汁 黃連 各三兩 肉豆蔻 五個 連皮用</p> <p>右到水煎徐徐服。一方肉豆蔻止用一枚。</p>	<p>鴨蛋湯 治婦人胎前產後赤白痢。</p> <p>生薑 百錢 重取自然汁 鴨蛋 一個 打碎入 右二味煎至八分入蒲黃三錢煎至五七沸空心溫服立効。</p> <p>濟陰綱目 卷九 痢疾</p>	<p>二黃散 治妊娠下赤白絞刺疼痛。</p> <p>鷄子 一枚 烏雞 者佳 黃丹 十錢 入鷄子殼內同黃攪勻以 傾出清留黃用 厚紙糊牢 銀泥固濟火上銀乾 右研爲細末每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女。</p>	<p>大小便不通</p> <p>大全云：妊娠大小便不通由臟腑之熱所致。若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之。</p> <p>薛氏曰：前證若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾熱用龍膽瀉肝湯心肝虛熱用加味逍遙散加車前子。</p>	<p>須臾覺足有餘者</p>
---	---	--	--	--	--	----------------

亞卿李浦汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反虛肝脈弦急脾脈遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱怒所致也。用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散而安。

主政王天成之內。妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用清熱之劑未効余診其脈浮大而瀉此氣血虛也朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味逍遙加車前子而痊。

大腹皮散 治妊娠大小便不通。

大腹皮

赤茯苓

枳殼麩炒各一兩

甘草炙

右爲細末每服二錢濃煎葱白湯調下。一方剉作散入郁李仁去皮尖一錢半水煎空心連服以通爲度如不通必六腑熱秘用枳殼炒一錢半大黃炮二錢甘草炙一錢研爲細末作三服陰綱目

服濃煎葱白湯調下

當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小便澀產門腫

當歸五分

赤茯苓

枳殼麩炒

白芍藥

川芎各一錢

白薑炮

木香煨

粉草各三分

右用薑水煎服。氣弱枳殼減半。○大便秘如蜜同煎。

一方 治妊娠小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃

木通

檳榔各一兩

枳殼麩炒七錢半

訶黎勒四個去核半生半煨

大腹子三枚

右爲末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

一方 治妊娠風氣大便澀滯

研滑石末炒

枳殼麩炒三兩

防風二兩

甘草炙一兩

右爲末每一二錢空心用白滾湯調服日三次

又方 車前子一兩

大黃半兩炒

右爲末每服三錢蜜湯調服

又方 治虛羸大便秘

枳殼製

阿膠炒各等分

右爲細末煉蜜和劑杵二三千下丸如桐子大別研滑石末爲衣溫湯下二十九中日來未通再服三十九止於五十九

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臍大小便不利安胎除熱

葵子二升

滑石四兩碎

此利數除熱藥也

陰綱目

葵子一合

天德堂

右以水五升煮取一升去渣盡服須臾當下便愈

又方 葵子一合

川朴硝一兩

右每服三錢水煎溫服

豬苓散 療妊娠小便澀痛兼治胎水

豬苓五兩

去皮爲末白湯調方寸七加至二七日夜二不寢宜轉下之服後藥

甘遂散 療妊娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不寢宜服此下之

用泰山赤皮甘遂二兩爲末以白蜜二合和服如豆大一粒覺心下煩得微下者日一服下之後還服豬苓散不得下日兩服漸加至半錢以微利爲度此藥太峻不可輕用

右陳良甫氏所錄諸方今並存之內甘遂枳實非至寔至危不得已而為之不可輕用其他亦宜審訂用之仍味薛氏之說而參之以雜病諸方庶無悞也

○小便不通 轉胞 遺尿

大全云。妊娠小便不通。為小腸有熱。傳於胞。而不通耳。若兼心肺氣滯。則多喘急。陳無擇云。妊娠胎滿。逼胞多致小便不利。若心腎氣虛。清濁相干。則為諸淋。若胞系了戾。小便不通。名曰轉胞。若胎滿。尿出名曰遺尿。

丹溪云。轉胞病。胎婦稟受弱者。憂悶多者。性急躁者。食味厚者。大率有之。古方皆用滑利疎導藥。鮮有應効。因思胞為胎所壓。轉在一邊。胞系了戾。不通耳。胎若舉起。懸在中央。胞系得疎。水道自行。

濟陰綱目

卷九 大小便不通

二九

天德堂

然胎之墜下。必有其由。一日吳宅龍人患此。脈之兩手似滿。重取則弦。左手稍和。予曰。此得之憂患。滿為血少。氣多。弦為有飲。血少則胞弱。而不能自舉。氣多有飲。中焦不清。而隘則胞知所避。而就下。故喜墜。遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑。空心飲。隨以指探喉中。吐出藥汁。候少頃。氣定。又與一貼。次日亦然。如是八貼。而安。此法果為的確。恐偶中耳。後有數人。歷歷有効。未知果何如耶。仲景云。婦人本肌盛。頭舉身滿。今反羸瘦。頭暈中空。減胞系了戾。亦致胞轉。其義未詳。必有能知之者。一婦人四十一歲。妊娠九個月。轉胞。小便不出。三日矣。下急。脚腫。不堪存活。來告急。予往視之。見其形瘠。脈之右澹而左稍和。此胞食而氣傷。胎系弱。不能自舉。而下墜。壓着膀胱。偏在一邊。氣急。為其所閉。所以水穀不

能出也。轉胞之病。大率如此。予遂製一方。補血養氣。血氣既旺。胎自舉。則不下墜。方有安之理。遂作人參當歸身尾白芍藥白朮。陳皮炙甘草半生薑煎濃湯。四貼。任其自出。藥湯。小便立通。皆黑貼藥。直作一貼。煎令頓飲之。探喉。令吐出。藥湯。小便立通。皆黑水後。就此方。加大腹皮枳殼青蔥葉縮砂仁二十貼。與之以防產前後之虛。果得就蓐平安。產後亦健。一婦人妊娠七八個月。患小便不通。百醫不能利。轉加急脹。診其脈細弱。予意其血氣虛弱。不能承載。其胎故胎重墜下。壓住膀胱。下口因此溺不得出。若服補藥升扶胎起。則自下。藥力未至。愈加急滿。遂令一老婦用香油塗手。自產門入。托起其胎。溺出如注。服急頓解。一面却以人參黃耆升麻大劑煮服。少頃。有急滿。仍用手托放取溺。如此三日。後胎漸起。小便如故。

濟陰綱目

卷九 小便不通

二九

天德堂

薛氏曰。前證亦有脾肺氣虛。不能下輸膀胱者。亦有氣熱鬱結。膀胱津液不利者。亦有金為火燥。脾土濕熱。甚而不利者。更當詳審施治。司徒李杏岡仲子室。孕五月。小便不利。諸藥不應。余曰。非八味丸不能救。不信。別用分利之藥。肚腹腫脹。以致不起。儒者王文遠室。患此。小腹腫脹。幾至於殆。用八味丸一服。小便滴瀝。再以前丸料。加車前子一劑。即利。肚腹頓空而安。仲景云。問曰。婦人病。飲食如故。煩熱不臥。而反得倚息者。何也。師曰。此名轉胞。不得溺也。以胞系了戾。故致此病。但利小便。則愈。宜腎氣丸主之。即八味丸方見。每以酒下十五丸。至二十九日再服。

冬葵子散 治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効

冬葵子 山梔子炒 滑石各半 木通三錢

右剉一劑水煎空心溫服外以冬葵子滑石梔子爲末田螺肉搗膏或葱汁調膏貼臍中立通

全生茯苓散 治妊娠小便不通

赤茯苓 冬葵子各等分

右咬咀每服五錢水煎空心服○濟生方加髮灰少許極効

葵榆湯 治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮切各一兩

右水煎分三服

獨聖散 治妊娠小便不通

濟陰綱目 卷九 小便不通

蔓荊子爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參各四兩

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服三丸加至十丸○男子加滑

石半兩

雜方 治妊娠卒不得小便

杏仁去皮尖炒黃搗丸如萊豆大燈心湯吞七粒○一方搗

杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十丸白湯下○一方滑

石爲末水和塗臍下○一方車前子搗汁調滑石末塗臍周

圍四寸熱易之○一方紫苑爲丸并華水調下二錢○一方

桑螺蛸搗末米飯服方寸七日三

○子淋

大全云妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊娠胞繫於腎腎間虛熱而成斯證甚者心煩悶亂名曰子淋也

薛氏曰前證若小便澀少淋瀝用安榮散若腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地黃茯苓牛膝黃蘗知母芍藥甘草若頻數而色黃用四物加黃蘗

知母五味麥門玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痺而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五淋散若

脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所主用滋腎丸若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸

萬蜜齋曰子淋之病須分二證一則妊娠自病一則子爲母病然

妊娠自病又分二證或服食辛熱因生內熱者或自汗自利津液燥者其子爲母病亦分二證或胎氣熱壅者或胎形迫塞者證既

不同治亦有別也大抵熱則清之燥則潤之壅則通之塞則行之此治之之法也

五淋散 治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

赤芍藥 山梔子各二錢 赤茯苓一錢

當歸一錢 子苓六分 甘草五分

右水煎服 一方加生地黃澤瀉木通滑石車前子各等分

子淋散 治妊娠小便澀痛頻數

麥門冬去心 赤茯苓 大腹皮 木通

甘草 淡竹葉

右對水煎空心服。一方無甘草大腹皮二味。

安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名曰子淋。

麥門冬 去心 通草 滑石 人參

細辛 各二 當歸 酒浸 燈草 甘草 各半

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下。

一方無滑石燈心有車前偏蓄。

此方恐滑石太重而滑胎若臨月可用若六七個月已前宜斟酌之。

加味木通湯 治妊娠奉養太厚喜食炙煨酒麪辛熱之物以致

內熱小便赤澀作痛者。

濟陰綱目 卷九子淋 王士 天德堂

木通 生地黃 赤芍藥 條苓 甘草 稍分

右到加淡竹葉十二片水煎服。

生津湯 治妊娠婦膏病自汗或困下痢後小便短少不痛者此津

液不足也。

當歸 甘草 各五錢 麥門冬 去心 通草

滑石 各三 人參 細辛 各一

右為細末每服六七錢燈心煎湯空心調服。

冬葵子湯 治妊娠素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澀而痛者此

胎熱也此方主之。

冬葵子 一兩 赤芍藥 條苓 各半 赤茯苓 車前子 各三

右為末每服二錢水煎調服不拘時。如小便不通恐是轉門。

養灰能使血上行故轉

加髮灰少許極効。

大腹皮散 治妊娠八九月胎形肥碩小便短少小便澀重

寒起則暈眩欲倒此胎氣逼塞膀胱之氣不行也宜此方主之。

赤茯苓 三錢 大腹皮 枳殼 各一錢 甘草 各一錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯下。

地膚子湯 治孕婦小便澀數名曰子淋。

地膚子 車前子 知母 黃芩 赤茯苓 白芍藥

枳殼 各一錢 升麻 通草 甘草 各三分

右切一劑水煎服。

地膚大黃湯 治妊娠子淋宜下。

大黃 炒 地膚草 各三 知母 黃芩 炒 猪苓 赤芍藥

濟陰綱目 卷九子淋 王士 天德堂

通草 升麻 枳殼 甘草 各二

右到每服四五錢水煎服。

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食。

瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子 各一

黃芩 芍藥 枳殼 車前子 各半

右到每服四錢水煎服。

忘憂散 治妊娠心經蘊熱小便赤澀淋瀝作痛。

琥珀 不拘 萱草根 一握

右琥珀為細末每服五分濃煎萱草根調服。

補遺方 治胎前諸般淋瀝小便不通。

檳榔 赤芍藥 各分

右判每服五錢水煎溫服

一方治子淋小便數出或熱或痛及子煩

地膚草四兩以水四升煮取二升半分三服或新取地膚草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無不効

雜方 治姙娠子淋

葵子一升以水三升煮取二升分再服一方葵根一把以水三升煮取二升分再服一方葵子七合爲末水和服方寸七日三一方猪苓爲末白湯調方寸七加至二七

遺尿

薛氏曰若脬中有熱宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸

濟陰編目

卷九 遺尿

五

天德堂

一姙婦遺尿內熱肝脈洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹余以爲肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或悲怒前證仍作用八珍散逍遙散兼以清肝火養肝血而痊

白薇散 治姙娠尿出不知

白薇

白芍藥 各等分

右爲末每服三錢食前溫酒調服

桑螵蛸散 治姙娠小便不禁

桑螵蛸 炙黃二枚

右爲末每服二錢空心米飲調下

一方 白礬 牡蠣

右爲末每服二錢酒調下

一方益智爲末米飲下亦効

○尿血

按尿血之入皆從勞心動喪中來

大全云姙婦勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流溢入子脾故令尿血也

薛氏曰前證因怒動火者宜小柴胡湯加山梔因勞動火者宜補中益氣湯因厚味積熱宜清胃散雜病加犀角連翹甘草因肝經血熱宜加味逍遙散

一姙婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食少用肝脈弦弱此肝經血虛而熱也用加味逍遙散六味地黃丸兼服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治姙娠下血及尿血

濟陰編目

卷九 尿血

五

天德堂

當歸 生地黃 各一兩

續斷 半兩

赤芍藥 二錢

右爲末每服二錢空心米飲調下

一方 治姙娠尿血

阿膠

熟地黃 各等分

右爲末空心米飲調下二錢

蠶絲湯 治姙娠小便尿血

生薑 七片

蜜 半盞

白茅根 一握

右入水煎服

加減五苓散 本方去桂加阿膠炒同爲末每服四錢用車前子白茅根濃煎溫服

雜方 用葵子一升研細水五升煮三升分溫三服

止血之劑

一方用生艾一觔酒五升煮三升分三服。  
 一方用生地黃一觔酒四升煮二升分三服。  
 一方猪苓為末白湯調下一匙日三。  
 一方白茅根煮湯吞酒蒸黃連丸。  
 一方治無故尿血。  
 龍骨一兩 蒲黃半兩

右為末每服二錢酒調日三服

○眼目

目病大部因火而燥則胎熱多故以涼散之劑取功

一婦將臨月忽然兩目失明不見燈火頭痛眩暈頭暈不能轉頭諸治不瘳反加危困備得消風散服之病減七分獲安分娩其眼吊起人物不辨乃以四物湯加荆芥防風更服眼科天門冬濟陰綱目

不卷九眼目

天德堂

飲子二方間服目漸稍明大忌酒麪煎炙雞羊鷄鴨豆腐辛辣熱物并房勞此證因懷妊多居火間衣着太煖伏熱在內或酒麪炙燂太過以致胎熱也

天門冬飲子 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 去心 知母 羌藟子 五味子  
 防風 去芦 茯苓 去皮 川羌活 去芦 人參 各一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

○脾燥悲傷

脾燥者肺金燥也肺之志為悲胎熱則火炎肺不能自持故無故悲傷

仲景云婦人脾燥悲傷欲哭象如神靈所作數人伸甘麥大棗湯主之

許學士云鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳

惡候不愈

請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人脾燥悲傷欲哭象如神靈數次伸者且甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人誠病制方種種絕妙如此

薛氏曰前證或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一妊婦無故口悲用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子加山梔而安

一妊婦悲哀煩躁其夫謂之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

甘麥大棗湯 治婦人臍燥悲傷不止

甘草 三兩 小麥 一升 大棗 十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

濟陰綱目

不卷九脾燥悲傷

天德堂

淡竹茹湯 治妊婦心虛驚悸臍燥悲傷不止又治虛煩甚効

麥門冬 去心 小麥 半夏 湯泡各一錢半 人參

白茯苓 各一錢 甘草 五分

右作一服加生薑五片棗一枚淡竹茹一團如指太水煎服

一方 治胎臍燥悲哭及自笑自哭

用紅棗燒存性米飲調下

○妊病下胎

大全云妊婦羸瘦或挾疾病臍臍虛損氣血枯竭不能養胎致胎動而不堅固若終不能安者則可下之免害妊婦也

薛氏曰前證宜用腰腹背痛門方論主治其胎果不能安者方可議下慎之慎之

生而實之  
非思之

胎前固胎  
瓜破血甘草  
和中並行不  
致可哉

大中丞許慎微公向令金壇時夫人胎漏療治不止時延於上計  
公欲因其勢遂下之謀於余余第令服佛手散以為可安即安不  
可安即下順其自然而已既數服公疑不決女科醫者檢方以  
進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂  
信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知此知而馳至則聞  
盈庭皆桂麝氣蓋因胞衣未下女醫又進香桂散矣血遂暴下如  
大河決不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過余謝  
且諭余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰生則宜而熟則補故  
破血之與填精如箭鋒相拄豈獨牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎  
為白膠則安胎止血因其熱而信其生此之謂處工公嘆恨無已  
余故特著之以為世戒

濟陰綱目 卷九 妊娠下胎 主天 天德堂

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜蒌 牛膝 藟麥各五 當歸一錢

右剉水煎服

一方 單用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服

千金神造湯 婦人脈陰陽俱盛名曰雙驅若少陰微緊者血即  
凝濁經養不周胎即偏天其一獨生其一獨死不去其死害母  
失胎此方主之

蟹瓜一升 阿膠三兩 甘草二兩

右剉取東流水一斗先煮蟹瓜甘草至三升去滓下膠令烊頓  
服之不能分再服

下胎方 治難母因疾病胎不能安可下之

法用破散  
破胎

取七月七日法麝香大分四兩水二大匙煎取一匙三分  
去滓分溫三服立下

又方大麝五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食但再服  
其子如糜母無疾苦千金不傳妙方

又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神効

又方附子二枚為末以淳苦酒和塗手足去之大良

又方取雞子一枚以三指攪置放雞子中服之立出

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散諸方要全善皆不之取而獨取  
此數方其見卓矣

○防胎自墮

丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞  
濟陰綱目 卷九 防胎自墮 主九 天德堂

怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因熱火消物造化自然  
病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病源者也予見其婦人  
有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則滑知其血  
少也以其妙年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯  
下黃芩末一錢服三四帖遂得保全其生因而思之墮因內熱  
而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所  
以易墮不然何以黃芩熱艾阿膠等為安胎妙藥即好生之工幸  
無輕視

一婦年三十餘或經住或成形未具其胎必墮察其性多怒色  
黑氣是此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷精故也因令住經  
第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子



一婦住經三月後尺脈或滑或微弱其婦却無病知是子宮虛氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至產血塊或產血胞一婦腹漸大如懷子至十月求易產藥察其神色其面雖與之藥不數日生白蟲半桶蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而為穢腐蘊積之久濕化為熱濕熱生蟲理之所有亦須周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及一月而死濕熱生蟲譬之溝渠污濁積久不流則諸蟲生於其間矣

汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常思墮胎已七八見矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗其胎無滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒也兄三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多

濟陰綱目 卷九 胎前自聖 四十 天德堂

在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃蘗黃芩前服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子

錢仲陽治一孕婦病醫言胎且墮錢曰婦首五臟傳養率六旬乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全

陳斗崑治一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脈洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脈洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脈如前以蛇脫煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛復一死胎隨下病亦愈

程仁甫治一婦年近四十稟氣素弱自去其胎五日內漸漸腹脹如鼓至心前上吐不能食周補藥不効診六脈微弱但只叫脹死

此乃損傷氣而作脹然急則治標若泥丹溪法恐緩不及事用桃仁承氣加枳實厚朴倍硝黃煎服四分吐去其一。次早仍不通事急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但体倦四肢無力口不知味發熱再用參芪歸芍查木陳皮八劑而安

江應宿治汪錫壽三十五歲厥產誤服打胎藥下血如崩旬餘腹痛一陣即行或時真痛諸藥不効診得六脈數而微弦乃厥陰之火逆投四物換生地黃加阿膠炒黑山梔蒲黃一劑愈

薛氏云大抵治法須審某月屬某經育養而藥之

芎藭補中湯 治懷妊血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名曰半產而損墮得服此遂安全

芎藭 五味子 阿膠 乾薑 炮名黃耆 去毒當歸 浸

濟陰綱目 卷九 胎前自聖 四十 天德堂

白芍藥 白朮 錢半 人參 杜仲 去皮 木香 不見 甘草 炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍

阿膠 炙燥 熟地黃 焙 艾葉 炒 芎藭

當歸 切焙 杜仲 去粗皮 白朮 各一

右咬咀每服四錢桑三般水煎食前溫服

千金保胎丸 凡女人受孕經三月而胎墮者雖氣血不足乃中

衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕至此時必須節飲食

絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

白朮 土炒 熟地黃 薑汁 杜仲 各四兩當歸 酒洗 續斷 酒

阿膠 蛤粉 香附米 同製 益母草 條芩 炒各 陳皮

三月離手心  
主養胎而寧  
十二經皆受  
氣於陽明陰  
明屬中衝故  
中衝傷胎亦  
墮也  
此方極穩當

胎動於胎故  
用杜仲補腎  
若云胎動不  
安則有脾虛  
氣虛血虛有  
寒有熱之不  
同又當因症  
而藥之不可  
執也

此宜玩

川芎

艾葉 醋炙各

砂仁 炒五

右為細末煮棗肉為丸如桐子大每服百丸空心米湯下

杜仲丸 治妊娠三兩個月胎動不安防其欲墮宜預服之

杜仲 去粗皮薑

右為末棗肉杵丸桐子大每服七十丸米飲下

刪繁方 治妊娠懷胎數落而不結寢或冷或熱百病之源

黃耆

人參

白朮

甘草

川芎

地黃

吳茱萸 各等分一方

右為末空心溫酒調下二錢忌松菜桃李雀肉醋物

婁氏曰按丹溪論俱是虛熱而無寒者今姑存此一方以俟施

之於千百而一者也

○胎墮後為半產

夫妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣

虛不能滋養於胎胎氣不固或顛撲閃墜致氣血損動或因熱病

溫瘧之類皆令半產仲景謂寒虛相搏此名為革婦人則半產漏

下是也

又云半產俗呼小產或三四月或五六月皆為半產以男女成形

故也或因憂恐悲哀暴怒或因勞力打撲損動或觸冒暑熱忌忌

神散恐犯熱藥轉生他疾宜玉燭散和經湯之類便產須知云小

產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌肉腐爛補其

虛損生其肌肉益其氣血去其風邪其氣將養過於正產十

倍無不平復宜審之

丹氏曰小產重於大產蓋大產如果熟自脫小產有如生採破其

皮發傷其根蒂也但人輕忽致死者多治法宜補形氣生新血去

瘀血若未足月痛而欲產芎歸補中湯倍加知母止之若產而血

不止人參黃芪湯補之若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎氣弱

而小產者參珍湯固之若血出過多而發熱者聖愈湯汗不止急

用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕八珍湯大渴而赤脈洪而虛當歸

補血湯身熱面赤脈沉而微四君加薑附東垣云晝發熱而夜安

靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰分

也如晝夜俱發熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大

寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏發止時節

而動是無水也如太熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽

清陰綱目 卷九 胎前自隨

往來時動時止是無水也若陽氣自旺者四物二連湯陽氣陷於

陰者補中益氣湯重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六

味丸

一妊婦五月服煎紅丸墮胎腹中脹痛服破血藥甚手按之愈

痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用八珍倍參耆加半夏乳沒二劑

痛止數劑全愈

史仲子室年甫二十因疫胎墮時咳服清肺解表喘急不寐請視

余曰脾土虛不能生肺金藥重損之與補中益氣加茯苓半夏五

味炮薑四劑漸愈再往視又與八珍加五味及十全大補湯而全

愈

東垣云婦人分娩及半產漏下昏冒不省腹目無所知此蓋因血

暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火勝其肺瞑目不省人事是陰血暴去不能鎮撫也血以虧損往往用滑石甘草石膏之類乃甘辛大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴瀉氣血必天年又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈見禁川寒涼藥也分婉半產本氣不病是暴去其血亡血瀉血又何疑焉補其血則神愈常時血下降亡今當補而升舉之心得血養而神不昏矣血若暴下是秋冬之

濟陰綱目 卷九 胎前白帶 四四 天德堂 妙在升陽 令太旺令舉而升之助其陽則目張神不昏矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也名全生活血湯 生後諸症更於產後方論中下用之

人參湯 治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉或寒或熱臍腹虛脹疼痛 人參 麥門冬 生乾地黃 當歸 芍藥 黃耆 白茯苓 甘草 右咬咀每服三錢水一盞煎七分食前溫服

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止 人參 黃耆 白木 當歸 白芍藥 艾葉 阿膠 妙 各一 錢 二 錢

石作一劑水煎服 龍骨散 療因損娠下惡血不止 此重在龍骨 不止故以龍骨 之川也

龍骨 當歸 地黃 芍藥 地榆 乾薑 阿膠 艾葉 蒲黃 牛角 膠 右為細末食前用米飲調下二錢

全生活血湯 治婦人分婉及半產漏下昏冒不省瞑目無所知此因血暴亡心神無所養也用此補血升陽 升麻 白芍藥 當歸 葛根 柴胡 羌活 獨活 防風 甘草 川芎 藥本 生地黃 熟地黃 蔓荊子 細辛 紅花 石咬咀每服五錢煎至一盞去滓食前稍熱服

濟陰綱目 卷九 胎前白帶 四五 天德堂 妙在生血 黃同用從滋 認清真切方 可

生乾地黃湯 治妊娠胎氣損動氣血不調或癰撲閃墜以致胎墮 生乾地黃 大黃 芍藥 白茯苓 當歸 細辛 黃芩 甘草 桂 右咬咀每服五錢水一盞半入生薑大棗拍碎同煎至一盞去滓不拘時溫服

當歸酒 治妊娠胎後血不出 當歸 芍藥 右咬咀每服三錢無灰酒一盞入生地黃汁 合銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡血下為度

產後忌食 而此以血不 出者用之要 知以當歸 用無灰酒 生地黃同煮

此不收效  
入肝有血矣

烏金散 治妊娠墮胎後血不下兼治諸疾血病

好墨二兩折二寸挺子燒通赤用好醋一升  
煎七通又再燒通赤放冷另研為末

沒藥 研 麒麟竭 各二錢 麝香 一錢

右為細末每服溫酒調下一錢七如血迷心用重便加酒調下  
二錢七

紅藍花散 治墮胎後血不出奔心悶絕不識人

紅藍花 微炒 男子髮燒存 京墨 燒紅 血竭 研 蒲黃 隔紙炒 各等分

右為細末以重便小半盞調工錢服之立効

白蜜酒 治墮胎後惡血不出

白蜜 二兩 生地黃 取汁 酒 半盞

右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩服服三劑百

濟陰綱目 卷九 胎前產後 聖藥 天德堂

病可愈

○已上治惡血不出之劑

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出

當歸 切 牛膝 酒浸各 木通 滑石 研各 冬葵子 炒 三 瞿麥 穗 一 兩

右咬咀每服三錢水煎服未下再服以下為度

地黃湯 治胞衣不出

蒲黃 炒 生薑 切炒各 生地黃 半兩以銅 刀切炒

右以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分三服未下再

作服

澤蘭湯 治胞衣不出

澤蘭 湯

一方一盞  
似化工

澤蘭湯 治胞衣不下  
石以水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末並油煎三  
沸頓服之未下更服

蒲黃酒 治胞衣不下

蒲黃 炒 槐子 十四枚 為末

右以酒三盞煎至二盞去滓分溫三服未下更服

○已上治胎衣不下之劑

當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 玄胡索 炒 香附 陳皮 澤蘭 牡丹皮 桃仁 各等分

右水煎入童便酒各小半盞服

濟陰綱目 卷九 胎前產後 聖藥 天德堂

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜此藥或失笑散消之若按之

不痛此是血虛宜四物參苓白朮

當歸湯 治胎前產後 聖藥 天德堂

當歸 芍藥 白朮 阿膠 炒令 甘草 炙 各 一方無白朮有人參

右咀每服三錢入艾葉糯米生薑同煎食前服

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸 白芍藥 炒 川芎 黃芩 炒 各 白朮 五錢

右為細末溫酒便調下二錢

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不眠脈滑

大而虛重按全無此脈虛血虛也若誤服白虎湯必死

此方以氣血 虛弱而用則 可以藥內 停而用藥 白水恐不 病則服之 藥內虛云

此東垣補方  
也病其藥  
一服如神

此河間方  
二味非寒熱  
心火不用

當歸 三錢

黃耆 一兩

右作一服水煎服

四物二連湯 治血虛發熱或口舌生瘡或諸安夜熱

當歸 川芎 芍藥 熟地黃 胡黃連 宣黃連 各一錢

右作一服水煎服

○胎不長

大全云妊娠不長者因面宿疾或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱而胎不長也當治其疾益其氣血則胎自長矣

薛氏曰前證更當察其經絡密其所因而治之

一妊婦胎六月體倦懶食黃瘦胎熱而胎不長因勞欲墮此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓二十餘劑脾胃漸健胎安而長

濟陰綱目 卷九 胎不長

聖本 天德堂

一妊婦因怒寒熱往來內熱肺熱腸痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗梗病愈而胎亦長矣

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎癭不長或失於將理傷胎多墮

此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎 各一兩 吳茱萸 湯泡 甘草 炙 各一兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果寢

黃耆湯 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃耆 炒 白朮 炒 白茯苓 前胡

人參 各七 川芎 甘草 各五分

此方以補氣為主而前胡散結氣川芎行結血皆所以其生長

也其主治

長胎白朮丸 治孕婦宿有風冷胎癭不長或將理失宜傷胎

氣多致損墮常服益血保胎調補衛生

白朮 川芎 阿膠 生地黃 各六錢

當歸 一兩 牡蠣 二分 川椒 三分

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸米飲下

人參 治妊娠胎不長宜服養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺蘇

厚朴 桑寄生 各二兩 枳殼 七錢 甘草 半兩

此方助生氣 右為細末煉蜜丸桐子大每服二十丸食前溫水下

○先期欲產過期不產

濟陰綱目 卷九 胎前產後

聖本 天德堂

大全云婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一二年乃至四年而後產者各依後治法

薛氏曰一妊婦八個月胎欲墮似產臥久少安日晡益甚此氣血虛弱也朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯數劑而安

知母丸 治妊娠日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不拘多少為細末煉蜜丸如雞頭是大溫酒調下日三服

服○一方丸如桐子大粥飲下二十九

槐子丸 治妊娠月數不足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃 各等分

此方以治胎前產後

妙劑

此方以治胎前產後

妙劑

酒同而一以  
以藥先酒下  
其分兩雖  
一也宜致想

右爲細末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止爲度

又方 取蒲黃篩過如棗核大以井花水調服

又方 搗葛蒲根汁一二升灌喉中

又方 梁上塵灶突墨同爲末空心溫酒服方寸七

加味四物湯 治過月不產者用此補血行滯

四物湯 香附 桃仁 枳殼 縮砂 紫蘇

右用水煎服卽生

○鬼胎

大全云夫人臟腑調和則血氣充寔風邪鬼魅不能干之若榮衛  
虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

薛氏曰前證因七情相干脾虛虧損氣血虛弱行失常道衝任乖  
濟陰綱目

違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補  
庶免此證治法以補元氣爲主而佐以雄黃丸之類行散之若脾

經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用六君  
芎歸培養之肝火血耗者用加味逍遙散滋抑之肝脾鬱怒者用

加味歸脾道遙二藥兼服腎肝虛弱者用六味地黃丸

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎證之藥不應余  
診視之曰面青脈滑寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦

脾經血病也此鬱怒傷脾肝之證非胎也不信仍用治胎散之類  
不驗余用加味歸脾道遙二藥各二十餘劑諸證稍愈彼欲速効

遂服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用  
人參炮薑二劑漸愈

斬鬼丹 治鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川烏一方作 秦艽 柴胡

白僵蚕 巴戟 巴豆 羌活 諸藥各

右爲末煉蜜丸如桐子大每服七丸蜜酒送下卽出惡物而愈

○輕者去毒元花巴豆巴戟

斑玄丸 治鬼胎或於妖魅狀如癰瘕一切氣血痛亦効

斑蝥 去頭足 玄胡索 炒各 三錢

右爲末糊丸酒下或爲末以溫酒調下半錢以胎下爲度

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃 細研 鬼白 去毛 莽草 丹砂 細研

巴豆 油 領肝 各半兩 蛇蛻 一條 炙黃 蜈蚣 一條 炙黃

濟陰綱目 卷之九終

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服二丸空心溫酒下日兩服後

當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極

者下蛇蟲或如蝦蟇卵雞子或如白膏或如豆汗其病卽除

枳實檳榔丸 治妊娠癰瘕癰塊及二者疑似之間久服安養胎

氣消散癰瘕兼寬膈進食

枳實 檳榔 黃連 黃柏

黃芩 當歸 阿膠炒成 木香

右爲末水和丸如小豆大每服三十丸溫米飲下不計時日三

服

濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍瑤撰

西陵 汪 淇儋子評釋 天都 查 望于周父參閱

臨產

論臨產調理法

原有產圖此  
七載錄亦見  
出法也

健生藥切不  
可早若見未  
轉身宜以補  
血為上而實

氣佐之

中指屬心胞  
絡也

固血之說  
八珍益母配  
法服法俱詳

大全云凡妊娠至臨月當安神定慮時常步履不可多睡飽食過  
飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位各鋪床帳預請老練穩婆備辦湯  
藥器物欲產時不可多人喧鬧惶惶但用老婦二人扶行及危物  
站立若見漿水腰腹痛甚足胎離其經令產母仰臥令兒轉身若  
兒頭向產門方可用藥催生坐草若心煩用水調服白蜜一匙覺  
饑喫糜粥少許勿令飢渴恐乏其力不可強服催藥早於坐草慎  
之  
薛氏曰欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待見轉身向下時  
作痛試握產母手中指中節或本節跳動方與臨盆即產矣若初  
覺不仰臥以待轉胞或未產而水頻下此胞衣已破血水先乾必  
有逆生難產之患若胎衣破而不得分娩者保生無憂散以回其  
血自然生息如血已耗損用八珍湯料一劑益母草半劑水數十  
碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹痛未產也若連腰痛  
甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於腎故也凡孕家宜預請有仁心  
知事穩婆當以恩結其心先與說知倘有生息不順只說未產或  
遇雙胎只說胎衣未下恐驚則氣散難生息余家親驗之大抵  
難產多患於鬱悶安佚當貴之治法雖云胎前清氣產後補血

不可專執若脾胃不實氣血不充宜預調神不然臨產必有患難

論臨產催生法

固血如開水  
放舟如開水

大全云大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等  
藥或勢不得已則服之更云切不可坐早及令穩婆亂動手凡催  
必候脈動胎轉向大法滑以流通滋滯若以驅逐開塞香以開  
下藥水破方可服大法滑以流通滋滯若以驅逐開塞香以開  
致逐血氣滑者行氣胞漿先破殊困者固血  
丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

論難產由於安佚氣滯

大全云婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家  
過於安逸以致氣滯而胎不轉或為交合使精血聚於胞中皆致  
產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟入手試水致胞破裂乾  
清陰綱目 卷之十 臨產催生法 天德堂

血滯血盛以  
水解之在孕  
月尤宜靜養  
亦無害惟少  
與之

兒難轉身亦難生矣凡產直候痛極見過產門方可坐草時當盛  
暑倘或血暈血滯當飲清水解之冬末春初產室用火和暖下部  
衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難  
論難產由於氣虛不運

丹溪曰世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若  
貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公  
主作也實非極至之言何也見有用此方者其難白若子表妹苦  
於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形肥勒於針指回  
思旬日忽自悟曰此正真湖陽公主相及彼奉養之人其氣必實  
耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈  
弱兒在胞胎用母氣不能運到當補其母之氣則兒健易產矣

此法最妙

今其有孕至六七月來吉遂以大全方紫蘇飲加補氣藥與數  
十貼因得見而其快後遂以此方隨母形色性稟時令加減與  
之無不應者因名其方曰達生散

○論難產由於血滯血乾

郭精中曰難產者因兒轉身將見枕血塊破碎與胞中收血滯  
兒身不能便利是以難產急服勝金散消其血使兒自易生陳無  
擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水  
乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫  
產當用前法針刺之

大全云治胞漿先破惡水來多胎乾不得下須先與四物湯補養  
血氣次煎濃葱湯放冷令穩婆洗產戶須是款曲洗令氣上下通

濟陰綱目 卷十 臨產催生法

三 天德堂

楊子建十產論

一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相似胎氣頓  
陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛教道挺進繼之漿破血出兒自  
遂生

二曰傷產者蓋因人之生陰注陽定各有時日不可改易今有未  
產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正  
產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可  
妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却收產母  
虛亂用力兒身纔方轉動却破產母用力一逼使兒錯路忽橫忽  
倒不能正生皆緣產母用力不當所致也凡產母用力須待兒

此法最妙

之

子順身臨過門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力  
當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如  
揠苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛甚腰重  
道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經  
及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服  
藥以助產之正氣令兒速得下生

四曰凍產者冬月天寒產母經血得冷則凝以致兒子不能生下  
此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當  
滿房著火常有暖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常暖血得  
熱則流散便見易生

濟陰綱目 卷十 臨產催生法

四 天德堂

如見此症  
用字未盡  
催之

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎  
氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼面赤  
昏昏如醉乃至不知人事

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過  
也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥  
後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推  
上而正之或以指舉其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上  
徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生  
七曰倒產者產母胎氣不足間健不牢用力太早致令兒子不能  
回轉使直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去  
不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順

母氣弱而倒  
產者當服補  
劑若用力早  
者又當別論



八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏在左腿或偏在右腿故頭雖偏在一畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏在後道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於後道外邊輕輕推兒頭正便令產母用力送兒生也

九曰礙產者兒身已應而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰臥令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指接兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送便兒生下

十日坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生路急於高處將陰刺目卷十 產難生法五 天德堂

十一曰盤腸產者臨產母腸先出然後兒生趙都運泰人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚以為苦醫不能療偶在建昌得坐一法而收之其法以醋半盞新汲水七分調停喂產母面每喂一縮三咽盡收此良法也

產難治驗  
淳于意治甯州王美人懷子而不乳召于意往飲以黃芩藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血血如豆比五六枚

滑伯仁治一婦難產七日而不乳且食甚少伯仁視之以源粥一

用藥者以  
其類也又  
則性降  
木草楓葉  
能生今和  
婦亦無用  
臨月洗胎  
不知日氣  
足者亦用  
否耳  
符藥所能為害隔腹門兒手所在鍼其虎口痛即縮手所以速生無他術也取兒視之右手虎口鍼痕存焉

一婦累日產不下服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼氣結而不行非不順也素問曰恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以紫蘇飲一服便產及治婦人子懸胎紫蘇飲見胎動腹痛

治婦人子懸胎紫蘇飲見胎動腹痛

吳菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔效吳因製一方以車前子為君冬葵子為臣白芷枳殼為佐使已服牛產藥醫異之吳曰本草謂催生以此為君毛詩採芣苢以防產難是也劉復真遇府判女產不利已欲劉取紅花濃煎扶女子凳上以綿帛蘸湯熨之連以淺帛上以器盛水又熨又淋久而甦醒遂生男子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫即產見亦神矣

一醫宿客店值店婦產數日不下下體已冷無藥甚窘以椒橙葉黃等煎湯可下手則和臍腹產門處皆淋洗之氣溫血行遂產

論交骨不開

薛氏曰交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中

益氣湯。產門不開。氣血虛也。用十全大補湯。

地官李孟卿娶三十五歲女為繼室。妊娠慮其產難。案加味芍歸湯。四帖備用。至期果產門不開。止服一帖。頓然分娩。

上舍黃德之。產門不開。兩日未生。服前藥一劑。即時而產。上舍傳此方。用之者無有不驗。

一婦人分娩最易。至四十妊娠。下血甚多。產門不開。與前湯一劑。又以無憂散。勸許煎熟。時時飲之。以助其血而產。

論胎死腹中

準繩云。產難子死腹中者。多因驚動太早。或觸犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯澀而死故也。須驗產母舌若青黑。其胎死矣。當下之。

濟陰綱目 卷十 胎產難生法

大法寒者熱以行之。熱者涼以行之。燥者潤以潤之。危者救之。下之。

一穩婆之女。勤苦負重。妊娠腹中陰冷。重墜口中甚穢。余意其胎必死。今視其舌。果青黑。與朴硝半兩許服之。隨下利水而愈。

一婦胎死。服朴硝而下穢水。肢體倦怠。氣息奄奄。用四君為主。佐以四物。薑桂調補而愈。

○臨產脈法 附驗看生死法

脈經云。懷妊六七月。脈寔太牢。強弦緊者生。沉細者死。○脈勻細易產。大浮緩氣散難產。

脈訣云。欲產之婦。脈離經沉細而滑也。同名。夜半腹痛。應分遲來。朝日午定知生。○身重體熱。又頻舌下之脈。黑復高。反舌上。冷

子當死。腹中須遣母歸。真面赤舌青細尋着。母活子死。定應難。唇口俱青沫又出。母子俱死。總教。面青舌赤沫出。煩。母死子活。定知真。不信若能看應驗。尋之賢哲不虛陳。

臨月東胎方

東胎丸 胎瘦易生。服至產則已。

白木

枳殼 去穢妙

右為末。燒飯丸。如桐子大。八月一日食前服三五十九。溫水下。送生散。孕至八九個月內。服十數帖。甚好。易產。

大腹皮 三錢 人參 陳皮 紫蘇葉 各五

歸身尾

白木 各一 白芍藥 各一 甘草 各一

右切作一服。入青慈五葉黃楊腦七個。少煎。黃楊腦。藥材。見本。

濟陰綱目 卷十 胎產難生法

前服○或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩○秋加澤瀉○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣寔加香附陳皮○血虛加當歸地黃○形寔倍紫蘇○性急多怒加黃連柴胡○熱甚加黃芩○濕痰加滑石半夏○食積加山楂○食後易飢倍黃楊腦

○腹痛加木香官桂

又方 第九個月服

酒本 酒炒一兩 鹿胎人 白木 一兩 枳殼 炒

滑石 各七錢 半 臨月十日 前

右為末。粥丸。桐子大。每服五十九。空心熱湯下。○氣寔人宜服。多則恐損元氣。

滑胎枳殼散 妊娠七八個月常宜服。滑胎易產。湖陽公主每產。

累日不下南山道人進此方

商州枳殼二兩 粉甘草炙一兩

右為細末每服二錢百沸湯點服日三服○溫陽居如常歸胎木香各等分○許學士云枳殼性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸蜜丸佐之可也○名內補丸蓋枳殼散破氣有餘而內補丸補血不足也

內補丸 治娠娠衝任脈虛補血安胎與枳殼散間服

熟地黃二兩 當歸一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九溫酒或滾湯下

張氏方 治娠娠胎肥壅滯動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬胸

濟陰綱目 卷十 婦人產後生法 九 天德堂

枳殼五兩 甘草二兩 香附子三兩

右為末薑湯點服如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸同煎服○婦人脾寒血氣成塊作刺熱酒調服○大小便不通白牽牛湯調服

保生無憂散 治娠娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢或瘦人血少胎弱臨產難產入月服之則易生也

當歸 川芎 白芍藥 枳殼炒 木香

甘草炙各一錢半 乳香各五分 血餘燒存性另研各五分

右作一服水煎入乳香血餘和勻不拘時服

瘦胎丸 瘦胎滑利易產臨入月服之神効

此方為要藥

通明乳香另研 枳殼炒

難產催生方

三合濟生湯 以枳殼當歸達生三方抽其精粹而成合此湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸三錢 川芎 枳殼炒 香附子炒

大腹皮真計流各一錢半 蘇葉八分 粉草七分

右用水煎待腰腹痛甚服之即產○一方加白芷一錢

佛手散即佛手 治娠娠因事仆跌子死腹中惡露妄行疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立便逐下若腹痛隨止于母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如

加白芷行血海之氣也

濟陰綱目 卷十 婦人產後生法 十 天德堂

中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂死等證並皆治之○丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

當歸酒洗去 川芎四錢一方

右細剉分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五

七沸溫服如口噤不開灌之如人行五里許再灌一服盡此四

服便立產神驗○如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白

水童便各一盞用藥四錢煎服○如胞產五七日不下垂死及

矮石女子交骨不開者加龜板并生青過婦人頭髮燒灰為末

每三錢酒調服

投酒之法更妙然者藥性

立斷以文附

不獨為陰氣

成鬼為至陰

板則交錯相

解故用之

來時散 治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭眩目昏口  
面青髮直不省人事  
木香 神麴 陳皮 去白 麥蘖 炒黃耆 阿膠珠  
白芍藥 芋根 甘草 各三 糯米 一合 生薑 切碎 炒  
右剉細水煎挖口灌之連進為妙  
其法也

月水不止崩漏等證  
白芷 不見火 各等分  
右為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒  
煎進二服然血得黑則止此藥大能固血又免血涸甚妙○一  
方加白滑石煎湯調下  
濟陰綱目 卷十 婦人經產 天德堂

催生立應散 治難產及橫生逆產  
車前子 當歸 各一 冬葵子 白芷 各三 牛膝  
大腹皮 枳殼 川芎 各二 白芍藥 一錢  
右剉水煎熟入酒少許服立應  
榆白皮散 治妊娠滑胎易生  
榆白皮 甘草 各二 葵子 一兩  
右為末每服五錢水煎服  
一方用榆白皮焙乾為末臨月日三服方寸七分產易  
如聖散 專治孕婦難產

紫蘇葉 當歸 各等分  
右咬咀每服三五錢用長流水煎服無長流水以水煎服亦可  
右剉水煎服三五錢用長流水煎服無長流水以水煎服亦可

催生散 治難產并胞衣不下

白芷 滑石 伏龍肝 百草霜 各一 甘草 五分  
右為細末用芎歸湯入酒童便各少許調服二次立効

催生飲 治臨產生育艱難

當歸 川芎 大腹皮 枳殼 炒白芷 各等分  
右剉水煎服一方無大腹皮有益母草火麻仁

催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿水下方服

桃仁 炒去 赤芍藥 牡丹皮 官桂 白茯苓 去皮各  
右剉一劑水煎服

活水無憂散 專治十月已滿多因恣情及多製熱毒之物瘀血  
相搏臨產橫逆之厄惶忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼即  
濟陰綱目 卷十 婦人經產 天德堂

烏金丸二顆効如神

益母草 急性子 當歸 各四 陳枳殼 一兩 生地黃 蘇葉  
赤芍藥 各二 肉桂 川芎 陳艾 各一 甘草 八分 活鯉魚 鱗

右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚  
出魚死則難取効矣後下藥煎至二碗臨服之時加入好酒一  
茶匙每一碗和調烏金丸一顆如死胎不下急取無根水再煎

藥相連服二次

烏金丸 一名七聖散 實散 臨產腰痛方可服

當歸 玄胡索 香白芷 白礬  
黃芩 沒藥 桂心 各等分

右為細末每服三錢燒酒頭令紅滓酒調下臨臨時一二服

不蓋氣力治  
右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烱每服五合不覺更服不  
過三服即出

立產

一方 治難產累日氣力乏盡不得生此是宿有病者宜此方

阿膠二兩

赤小豆二升

右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烱每服五合不覺更服不  
過三服即出

勝金散 治難產因兒枕破與破血異其子故難產但服此藥遂  
其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末一錢

鹽豉一兩以布裹  
了燒紅急研細

右每服一錢用秤鍾燒赤淬酒下

一方 治橫生先露手足

阿膠炒

滑石各一

冬葵子一合

清陰綱目

卷十 治難產生法

十一 天德堂

右每服四錢水煎連進二三服一方有酥油一兩

油蜜煎 治難產應藥胞乾胎不得下

用香油蜂蜜小使各一碗和勻銅鍋內慢火煎一二滾涼去  
沫調白滑石末一兩或益母草末攪勻頓服外以油蜂蜜於  
母腹臍上下摩之或油煎一盞服之亦可一方止用波

蜜小便能下難產

鬼腦丸一名催 治難產及橫生逆產

鬼腦

明乳香二錢半

母丁香一錢

麝香一錢另

右研勻用鬼腦腦和為丸如雞頭大陰乾油紙封裹每一丸破  
水後溫水下即愈隨男左女右手中彈藥出

此藥治之  
明者

桂子引子 治產難或橫或倒胎爛腹中脹悶服之

生梓木一尺長一尺

甘草大者五寸

右用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至  
一升半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開舒  
如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散

黃蜀葵子不拘多少焙乾為末熱酒調下二錢神効如無子

花亦可○若胎漏血乾難產痛極者并進三服良久腹中氣

寬胎滑即產須見正產候方可服之○如打撲死胎紅花酒

下○歌曰黃葵子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產

難時免得全家俱哭泣

清陰綱目

卷十 治難產生法

十四 天德堂

催生如意散 治橫生倒產

人參

乳香各一

右為末臨產時急用雞子清一個調藥末再用薑汁調開冷服

即時順產子母無恙

催生鉛丹 治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上鎔化投入水銀一錢急攪結成

砂子傾出以熟絹衣角紐成丸子如萊豆大臨產時磨香水

吞下二九立下

三退散 治橫逆難產子死腹中

蛇退一條

人退即男子頭髮

右俱燒灰為末分三服酒調下

滑胎散 催生神効

益元散 一兩

蛇退 一條燒

煨退 全香

穿山甲 一片燒

男子亂髮 油煎

右為細末用鹽水一碗和藥煎二沸入煨灰攪勻冷定服之立下

一方 治產不順

蛇脫 一條 香退 一兩

右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性為末煎榆白皮湯調下一錢三服覺痛便生

一方 用蛇退一條全者燒灰入麝香一字酒調二錢面東服如橫生逆產以餘渣塗所出手足即順也

神効乳砂丹 治難產

濟陰綱目

卷十 產後催生法

十五

天德堂

明乳香為末以猪心血為丸如桐子大硃砂為衣口乾每服

一丸嚼碎冷酒下良久未生再服○或以蓮葉蒂七個水煎

化服二丸良久未生再服

如胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱

湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前藥

如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或平胃散一服送下如胞

衣未下酒水服一丸即下

產門不開用加味芎歸湯和服二丸

此藥靈驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三月

三日及月初上辰日亦可

一方乳香硃砂等分為末麝香酒調下

又方 通明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋少許調

服扶立令兩手拿石燕子二個念得靈藥聖通行文字草便生更無痛楚此法似迂用者云甚驗

一方乳香研細五月五日滴小丸如雞頭大每服一粒無灰酒下名開骨膏

一方 用大硃砂於端午晒起以百日為度研為細末取臘月更

服髓丸如茶豆大欲產時飲下一丸良久便生其藥男左女右手中握出晒硃砂不得着雨

如神散 催生累効靈驗於理固難通於事是殊効

用路上草鞋一雙取鼻梁上繩洗淨燒灰童便和酒調下三錢一名千里馬此藥委是神奇

濟陰綱目

卷十 產後催生法

十六

天德堂

小品方 療橫生倒產手足先出

用簷鐵刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回順而生

一方用鹽塗兒足底又可急搔灰之并以鹽摩產婦腹上即產

黃金散 治生產一二日難分娩者服之如神

真金箔大者五片小者七片以小硃鋪將水少許入紙入金

在內用指研勻後再添水至半鍾一面先令一人伏產婦虛

坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩上有井八前藥

溫服其胎即下○此催生聖藥如產月未足又能安之

勝金丹

治難產神効

敗鬼草葉頭一枝燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若

產母虛弱及素有冷疾者恐熱冷動氣即於銀器內重湯燉過後服

催生萬金不傳遇仙丹

草麻子十四粒 雄黃各一 蛇蛻一尺燒  
右爲末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用極湯淋深磨下火安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以漏帛束之須臾生下急取去藥一丸可用三次

如聖膏 治產難併治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒去殼細研成膏塗臍心胞即下連洗去不則腸出却用此膏塗頂上腸自縮入○一方草麻子百粒雄黃一錢細研如上法塗之○一方草麻子三粒巴豆四粒各去殼

濟陰綱目

卷十

產難生法

十七

天德堂

入麝香研細貼在臍中歌曰三麻四粒脫衣袋研碎將來入麝香若有婦人遺產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難橫逆惡候死胎不下並治神驗

寒石四兩內二兩生 礞砂

右同研如深桃花色每用三分并華水調如糊糊以紙花剪如杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三五便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以乾

者一大把水七合煎服

一方今產婦兩手各握石燕一枚須臾即下

一方雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一

一方注心爲末童便酒調服一錢神効名救苦散

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下見頭帶土而下

一方臘月兔頭煨爲末葱白煎湯調服二錢立生

一方燒銅錢通紅放酒中依之

一方用魚膠一尺新瓦上煨灰陳醋調服立下

一方好墨新汲水濃磨服之墨水裏兒出

一方取弓弩弦以縛腰及煨弩牙令赤內酒中飲之皆取法於快

速之義也

一方神麝木水服方寸七

一方赤小豆爲末東流水服方寸七

一方當歸末酒調一錢服良久再服

濟陰綱目

卷十

產難生法

十八

天德堂

一方車軸脂吞大豆許兩九

一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下

一方車前子爲末酒服二錢

一方取木夫裙帶五寸燒存性酒調服下

一方取槐樹東枝令產婦把之易產

一方用紫蘇煎湯調益元散服之即產

一方吞槐子十四粒即下

一方取槐子十四枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不生再服之水服亦得

一方生薑汁生地黃汁各半升合煎熟頓服之

治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生產

當歸 川芎 各一 敗壞板 婦人頭髮生髮皆一

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎死不下灼過  
龜板亦可

○治胎死腹中

烏金散 治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或房  
室驚指或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經行先下惡  
露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產母面赤舌青是其  
候也面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙胎或一  
死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃 酒洗切焙 真蒲黃 大當歸 交趾桂 楊芍藥

濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 十九 天德堂

軍薑 去皮 粉草 各一 小黑豆 四 百草霜 五

右為末每用二錢米醋半合許沸湯六七分浸起溫服疑或之  
際且進佛手散酒水合煎二三服探之若未死子母俱安若胎  
已死立便逐下的知其胎死進此藥後更進香桂散須臾如手  
推下常用催生更加好滑石末半兩葵子五十粒搗碎黃梓葉  
七八皮慈白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能利小便梓葉行  
氣逐血慈白內通陽氣氣盛血行即產矣

香桂散 下死胎

麝香 五分另研一方 官桂 三錢為末一方  
用當門子一個 官桂 用杜枝二錢  
右和勻作一服溫童便酒或葱湯調服須臾如手推下此方比  
之用水銀等不損血氣○一方加白芷三錢○一方單用桂末

一錢童便調下名救苦散

平胃散 治死胎不下指申舌青脹悶口中作臭

蒼朮 米泔 陳皮 厚朴 薑汁炒 甘草 炙

右到一劑酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸溫  
服其胎化血水下○或只用朴硝半兩研細以童便調溫服亦  
妙或用二錢以順流水調下

一方 治姙娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮 各三 當歸 炒 滑石 七錢

瞿麥 葵子 炒 茯苓 粉草 黃芩 各半

右為饒末每服四錢水煎服

千金神造湯 治動胎及產難子死腹中並姙娠兩兒一死一生

濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 二十 天德堂

服之令死者出生者安神驗

蟹爪 一升 甘草 一兩 阿膠 三兩

右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得三升去滓次內膠令  
烊頓服之不能分再服若人因拘口內藥藥八即活煎藥作東  
向電用葦薪煮之

一方 治胎死腹中乾燥着背

葵子 一升 阿膠 二兩

右以水五升煮取二升頓服之未出再煮服  
一方 治子死腹中可半生不下或半着脊骨在草不產血氣上  
盈母心面無顏色氣欲絕及治胞水早乾胎流不下

猪脂 一兩 白蜜 一升 淳酒 二升



<p>右三味共煎至二升服分溫二服不能服者隨多少緩服之</p> <p>一方 治胎死腹中或半產不下</p> <p>官桂 五錢 牡丹皮 川芎 葵子 各一錢二分</p> <p>右為細末每服三錢葱白湯下</p>	<p>半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不能產者</p> <p>半夏 一兩 桂 去皮七錢半 大黃 五錢 桃仁 三十個去皮炒</p> <p>右為細末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑三片水煎服如未効次服下胎丸</p>	<p>下胎丸 治產難胞衣不出橫倒者或見死腹中母氣欲絕者</p> <p>半夏 生 白飲 各半</p>	<p>濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 二十 天德堂</p> <p>右為細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下三三九續加至五七九新加至五十九</p> <p>一方 治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急妙</p> <p>蛇退 一條全者香 麝香 少許</p> <p>右為末童便酒各半盞調下一服即生效</p>	<p>毒瘰奪命丹 治臨產暴然氣喘口翻口嚔面黑唇青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活</p> <p>蛇退 一條九 香退 錢二 男子髮 燒灰 五分</p> <p>黑鉛 半 水銀 七分半 依 千里馬 取鞋鼻洗淨燒灰一錢</p> <p>右為末以豬心心血丸如桐子大金錢箔七片為衣每服二丸用倒流水灌下或入伏龍肝調下土著兒頭戴出為妙</p>	<p>危症極矣必黑銀水銀方妙然亦少後者切不可用之</p>
--	---	---	---	--	------------------------------

<p>宣明礪砂散 治胎死腹中不下</p> <p>礪砂 研細 當歸 各一兩</p> <p>右研極細只分作二服溫酒調下如重車行五里不下再服</p>	<p>牛膝丸 下死胎</p> <p>杜牛膝 兩 紫金藤 蜀葵根 各七錢 當歸 肉桂 各五錢</p> <p>右為末米糊為丸如桐子大礪砂為衣每服五十丸乳香湯送下</p>	<p>一方 治產難數日子死腹中不出母氣欲絕</p> <p>瞿麥 兩 通草 桂心 各三兩 牛膝 榆白皮 各四兩</p> <p>右細切用水九升煮取三升去渣分三服頓服即下○一方無榆皮有天花粉四兩大能墮胎</p>	<p>濟陰綱目 卷十 治胎死腹中 二十三 天德堂</p> <p>一字神散 治子死腹中胞衣不下胞破不生累有神驗</p> <p>鬼臼不拘多少黃色者去毛研為末以手指擦之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八分通口服立生如神</p>	<p>治死胎難方 用辰砂一兩以水煮數沸為末取酒服之立出</p> <p>一方真珠二兩為末酒調服盡立出</p> <p>一方葵子為末酒服方寸匕若口嚔不開格口嚔之藥下即活</p> <p>一方鹿角屑一兩熬五莖豆豉半合水煎服</p> <p>一方鹿角燒灰存性為末每服三錢溫酒調下</p> <p>一方水銀半兩桂末三錢溫酒調下粥飲亦得</p> <p>一方錫粉水銀各一錢東肉丸如大豆大吞下立出</p>	<p>以上三十餘方隨人取便用之</p>
---	--	--	---	--	---------------------

一方用雞子黃一個。生薑自然汁一合。調勻頓服。分晚後用薑薑子劑補之。

一方羅麥二兩。到碎水八盞。煎一盞服。未出再服。

一方龜心黃土為末。酒調服二錢。

一方鍋底墨酒調服。

一方米麥赤小豆同煮。濃汁服立出。

一方紅花酒煮汁服二三盞。

一方以利斧煨赤置酒中。待溫飲之。其子自下。

一方用雌雞糞二十一枚。水二升五合。下米作粥食。即下。

一方用三家雞卵各一枚。三家鹽各一撮。三家水各一升。合煮令產婦東向飲之立出。

濟陰綱目 卷十 治胎死腹中

一方取夫尿二升。煮令沸飲之。

一方以黃牯生糞塗母腹上立出。

一方以牛糞炒令大熱。入醋半盞。以青布包裹。於母臍上下熨之立下。

一方用烏雞一隻。去毛細切。水煎三三升。候湯通。用手用衣帛蘸摩腹中胎自出。

一方榆白皮煮汁服二升。

一方治有孕月數未足。子死腹中。母欲悶絕。取大豆三升。醋煮濃汁三升。頓服。

一方用瓜瓞根一味。煨為末。每服二錢。取順流水下。

濟陰綱目卷之十終

濟陰綱目卷之十一

關中 武之望叔卿父輯著 武林 張志聰隱庵父訂正

西陵 汪 洪憺漪子彥標 天都 查 望子周父察問

○產後上

○論產後調理法

大全云。凡生產畢。飲熱童便一盞。不得便臥。宜閉目少坐。須臾上牀。宜仰臥。不宜側臥。宜豎膝。未可伸足。高倚牀頭。厚鋪褥褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。及以醋塗鼻。或用醋炭及燒漆器。更以手從心膈至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血暈。血逆。不問腹痛。不痛。有病無病。以童便和酒半盞。溫服五七服。酒雖行。血亦不可多。恐引血入四肢。且能骨量宜頻食白粥少許。一月之後。宜食

濟陰綱目 卷十一 產後上

羊肉。猪蹄少許。仍懷言語。七情寒暑。梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰勞傷。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而泄氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刺舌。恐傷心氣。不可刷齒。恐致血逆。須血氣平復。方可治事。犯時。微若秋毫。成病重如山。嶽可不戒哉。陳藏器云。產後汁與產婦服之。將產婦與產

醫家語

息如法。臟腑調和。庶無諸疾。若須先服黑神散。四物湯。四順理中丸。七寶散。若壯熱頭痛。此乳脈將行。用玉露散。頭目不清。是血逆。用清魂散。粥食不美。是胃氣虛。用四順理中丸。

產後宜切實  
治法須臾之

○論產後大補血氣為主

丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為補虛。

論產後服熱藥之誤

丹溪曰或問新產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥乎  
答曰至哉坤元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧汚血  
未必積臟腑未必寒何以藥爲飲食起居勤加調護何病之有誠  
有汚血體怯而寒與之數帖亦自簡便或有他病當求病起何因  
病在何經氣病治氣血病治血何用拘執此方例令服餌設有性  
急者形瘦者本有怒火者月坐事者時旺火令聲喏皆爲素患  
之以便採擇

濟陰綱目

卷十一

序後上

二  
天德堂

生於將護之法尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具在訓戒。胡爲以羊雞濃汁作糜。而又常服當歸建中湯四順理中丸。雖是補劑。並是偏熱臟腑無寒何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便啖鷄子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。展轉生疳。不知所因。率爾用藥。寧不誤人。予每見產婦之無疾者。必教之以却去黑神散。與夫雞子火鹽。諸品肉食。且與白粥。粥理間以些少石首鯊煮令甘澹食之。半月後方與少肉。若雞子亦須熬開澹煮。大能養胃却疾。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風氣痛膈氣痰逆口乾經事不調。髮禿體熱等證。皆是陽盛陰虛之病。天生血氣本自和平。曰盛曰虛。又烏知非此等謬妄。有以兆之耶。

○論新產二病

讀此則知症  
症亦有外來  
不可專主氣  
血不足而略  
用補劑反致  
不救也

仲景云問新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱胃三者大便秘  
何謂也斷曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡血復汗寒多  
故令鬱胃亡津液胃燥故大便秘

產婦鬱胃卽今  
世所謂血暈也

○庶後請忌

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百疾滋長慎之  
凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此臯行房故也○產後七日內  
惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在  
此例候兩三日消息可服澤蘭丸此至滿月丸藥盡爲佳不爾虛  
損不可平復也至極消瘦不可救者服五石澤蘭丸補之服法必  
後服

濟陰綱目

卷十一

產後上

主  
天德堂

獲服之婦人總令無病每至秋冬須服一二劑以至年內常將服之佳。

○脉法

脉經云診婦人生產之後寸口脉洪疾不調者死沉微附骨不絕者生○婦人新生乳子脉沉小滑者生實大堅弦急者死

丹溪曰產前脉細小產後脉洪大者多死○又曰產前脉當洪數  
既產而洪數如故者多主死此亦大槩言之今見產後豈無脉洪數而生者

○胞衣不下

大全云夫有產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力比產兒出而體已疲憊不復能用力產胞經停之闕而外分乘之則血道澀故胞之不出須急以方藥救治不妨害於兒所奈者胞緊

連兒臍。胞不出。卽不得以時斷臍。浴洗。令氣得見。則臍自落。舊法胞衣不出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時方向。并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中論曰。胎衣不下者。何名曰。母生子訖。流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者。難治。但與奪命丹以逐去衣中之血。血散脹消。胎衣自下。牛膝湯亦效。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損。而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。以消瘀血。緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散。以補固元氣。或用草麻子肉一兩。細研成膏。塗母右足心。衣下卽洗去。緩則腸

濟陰綱目 卷十一 產後上 四 天德堂

亦出如腸不收。仍用此膏塗臍頂。則腸自收。益母丸亦效。家人婦胎衣不落。胸腹脹痛。手不敢近。此瘀血爲患。用熱酒下失笑散一劑。惡露胎衣並下。

一產婦胎衣不出。腹不脹痛。手按之痛稍緩。此是氣虛。而不能送出。用無憂散而下。前證余詢諸穩婆云。宜服益母草丸。或就以產婦頭髮入口。作嘔。胎衣自出。其不出者。必死。授與前法甚効。一產婦產後。面赤。五心煩熱。收血入胞。胞衣不下。有冷汗。思但去其敗血。其衣自下。遂用黑豆二合炒透。然後燒紅。鐵秤錘同豆淬酒。將豆淋酒化下。益母丹二丸。胞衣從血而出。餘證盡平。

奪命丹 治胞衣不下。蓋兒之初生。惡血流入衣中。爲血所脹。塞故不得下。須臾冲上。逼心卽死。急服此藥。

此即精中方配服有神

黑附子炮五錢 牡丹皮一兩 乾漆炒烟盡二錢五分 右爲細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏。和前藥爲丸。如桐子大。每服五七丸。溫酒下。

奪命丸治胞衣不下。並治胎死。

牡丹皮 桃仁 茯苓 赤芍 桂心各等分

右爲末。益母丸。彈子大。每一丸。醋湯化下。或葱白煎酒湯下。尤妙。

連進兩丸。死胎腐爛立出。

牛膝湯 治胞衣不出。臍腹堅脹急痛。卽殺人。服此藥。胞卽爛下。死胎亦下。

牛膝

澤麥各四兩 當歸尾 通草各六兩 滑石八兩 葵子五兩

一方有桂心二兩

濟陰綱目 卷十一 產後上 五 天德堂

右細切。以水九升。煮取三升。分三服。

牛膝散 治胞衣不出。腹中脹痛急。服此藥。腐化而下。緩則不救。

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃各七錢半 當歸一兩 桂心五錢

右到每服五錢。加生薑三片。生地黃一錢。水煎服。

加桂芎歸湯 有胎衣不下。因產母元氣虛薄者。以此溫之。自下。

川芎 當歸各二錢 官桂四錢

右到一服。水煎服。

黑龍丹 治難產及胞衣不下。血迷血暈。不省人事。一切危急惡證。垂死者。但灌藥得下。無不全活。

當歸 五靈脂 川芎 良薑 熟地黃各二兩 砂鍋

內紙筒熬爛。百草霜兩 硫黃 乳香各二錢 琥珀

固濟火煨過。百草霜兩 硫黃 乳香各二錢 琥珀

用法先法服法俱奇如

花蘆石各一

右為細末醋糊丸如彈子大每用一二九炭火煨紅投入生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

花蘆石散 治產後敗血不盡血迷血暈胎死腹中胎衣不下至死心頭煖者急用一錢化下即出其効如神

花蘆石 勸 上色硫黃 研細 四兩各

右和勻先用紙泥封固瓦罐一箇入二藥仍封固陰乾如急用以火籠內炙乾用炭火煨赤去火次日取出研細每服一錢童便熱酒下

一方 胞衣不出

牛膝一兩 葵子一合

濟陰綱目 卷十一 產後上

六 天德堂

右剉以水一升煮半升去渣分二服

千金備急丸 治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊

錦紋大黃一兩為細末用醋醋半升同煎如膏丸如桐子大溫醋湯下五丸或七丸須臾惡下即愈

胡氏法 治產後胞衣不下惟有花蘆石散一件最為要緊若鄉

居藥局遠者倉卒無之今有一妙法產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人屢驗

治胞衣不下雜方

五靈脂為細末溫酒調下二錢

一方取小麥合小豆煮濃汁飲之立出

一方皂角刺燒為末溫酒調下一錢

一方蛇退燒為細末酒下二錢

一方黑豆一合炒熟入醋一盞煎三五沸去豆分三服酒煮亦可

一方取鹽內黃土一寸研細醋調勻納于臍中續煎甘草湯三四合服之出

一方墨三寸為末酒服

一方生地黃汁一升苦酒三合煖服之

一方龍突墨三指撮許以水苦酒調服立出

一方雞子一枚苦酒一合和飲之

濟陰綱目 卷十一 產後上

七 天德堂

一方生男吞小豆七枚生女吞十四枚即出

一方浸苧水濃煮飲三碗立下

一方取產母鞋底炙熱慰大小腹上下二七次

一方取初洗兒湯服下一盞勿令產母知

一方款蘆實一個取子研細用酒重便各半煮相和煎至七分去滓溫服如無實根亦可

一方紅花一兩酒煮濃汁服

一方以鹿角鎔為屑研細三分煮葱白湯調下

一方凡欲產時必先脫常所着衣以籠籠胞衣自下仍易產

一方取夫單衣蓋井上立出

○血暈 厥逆附

一係誤用心  
力過勞  
以致血虛  
而致此症  
用藥宜  
清血  
而後  
補之  
庶不  
致誤  
此係  
誤用  
心火  
所致  
宜用  
清心  
火之  
藥  
庶不  
致誤  
此係  
誤用  
心火  
所致  
宜用  
清心  
火之  
藥  
庶不  
致誤

大全云產後血暈者由敗血流入肝經以致眼黑頭旋不能起坐  
甚至昏悶不省人事謂之血暈以細酒調服神效最作若作暗風  
中風治之誤矣血熱乘虛逆上奏心以致昏迷不省氣閉欲絕者  
服重便最妙然其由有三有用心使力過多而暈者有下血過多  
而暈者有下血少而暈者其暈雖同治之則異當審詳之下血多  
而暈者昏而煩亂而已當以補血清心藥下血少而暈者乃惡露  
不下上搶于心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥  
古法云產婦分娩訖預將秤錘或黃石子硬炭燒令通赤置器中  
急于牀上以醋沃之得醋氣可除血暈產後一月內時作爲妙崔  
氏云凡暈者皆是虛無血氣奔迸腹中空虛所致欲分曉者第一  
須先取醋醋以釜口鼻仍置醋于傍使聞其氣兼細細飲之此爲  
濟陰綱目 卷十一 血暈下 天德堂

上法如骨痛即以醋熨面暈來即飲醋仍少與解之一云仍少一  
法燒乾漆令烟濃熏產母而即醒如無乾漆取舊漆  
郭稽中口產後血暈者何答曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣  
上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣  
冷醫者不識呼爲暗風若作此治證必難愈但服清血散即省  
薛氏曰產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神  
昏口噤或痰壅盛者急用失笑散主之若血下多而暈或神昏煩  
亂者大劑芍藥湯補之或芸薹子散或童子小便有痰加二陳湯  
若因勞心力而致者宜補中益氣湯加香附若因氣血虛極不省  
人事用清魂散惟以芍藥湯及大補氣血之劑凡產可用醋漆器  
熏或用半夏末冷水和丸入鼻孔中並無前患并溪先生云血暈

因氣血俱虛痰火之上宜以二陳導痰或加減硃砂安神丸以寧  
心冬湯下亦可大凡產後日眼瞞斜等症皆由大補氣血之藥  
以治痰若脾胃虛而不能固者用六君子湯至五個月當服安胎  
飲至八九個月再加小腹皮黃楊腦如臨產時更宜服保生無憂  
散自無前患

家人婦產後小腹作痛急牙關緊急灌以失笑散良久而醒又用  
四物加炮薑白朮陳皮而愈

一產婦因產飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得酒熱而妄  
行虛而作暈也以佛手散加乾葛二錢一劑而痊酒性慄悍八月  
及產後不宜飲恐致前證產室人衆喧嚷氣熱亦致此證  
奉化陸嚴治新昌徐氏婦病產後暴死但胸膈微熱陸診之曰此  
濟陰綱目 卷十一 血暈 九 天德堂

血悶也用紅花數十斤以大鍋煮之候湯沸以木桶盛之將病者  
寢其上熏之湯氣微復加之有頃婦人指動半日遂甦此與前證  
宗治王太后之意同

仲景云產婦得胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以  
然者血虛而脈厥厥而必胃胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽  
上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗  
出陰陽乃復所以大便堅嘔不能食也小柴胡湯主之病解能食  
七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主之  
今按醫胃即榮也觀此則產後血暈有汗下和解三法當分表裏  
虛實精而別之

清魂散 產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神

故眼前生花極甚。令人悶絕。不知人口。噤神昏。氣冷。宜先服乾漆。或漆器燒烟。中熏之。頻置醋炭房內。次進此藥。即醒。

澤蘭葉 人參各二錢半 川芎半 荆芥穗一 甘草二

右為細末。每服二錢。用溫酒熱湯各半。盞或入童便調。急灌之下。咽眼即開。氣定即醒。

芎藭湯 治產後去血過多。昏暈不醒。

芎藭 當歸去蘆酒洗 各等分

右咬咀。每服四錢。水煎。熱服。不拘時。○如腹中刺痛。加酒炒白芍藥。甚者加桂心。○口乾煩渴。加烏梅。麥門冬。○發寒熱。加乾薑。白芍藥。○水停心下。微有嘔逆。加茯苓。生薑。○虛煩不得眠。加人參。竹葉。

濟陰綱目 卷十一 血暈 天德堂

保命集方 治產後血暈危困。此下多血。虛也。補之。

當歸炒 赤芍藥各半 生地黃汁一大

右剉水煎。三五沸。溫服。如覺煩熱。去當歸。入童便半盞服之。○以上治去血過多。昏暈之疾。

醋墨 纔產便服。免致昏暈。

松烟墨。或京墨。不拘多少。用炭火煨紅。以米醋淬之。再煨再淬。如此七次。研極細。纔產畢。即用一二錢。以童子小便調下。淡醋湯溫酒亦可。

獨行散 治產後血暈。昏迷不省。冲心悶絕。

五靈脂半生半炒 為末。每服二錢。溫酒調。灌入喉。即愈。不愈。更加蒲黃炒等分。名失笑散。○一方加荆芥等分。童便調下。

奪命散 治產後血暈。血入心經。言語顛倒。健忘失志。及產後百病。

血竭 沒藥各等分

右為末。纔產下。便用童便與細酒各半盞。煎一二沸。調下二錢。良久再服。其惡血自下行。更不冲上。或只用白湯調下。

四味散 治產後一切諸疾。總方。分。晚。一服。尤妙。

當歸 玄胡索 血竭 沒藥各等分

右為細末。每服二錢。用童子小便一盞。煎六分。通口服。○如心膈寒。倍當歸。○氣悶。喘急。倍玄胡索。○惡露不快。倍血竭。○心腹撮痛。倍沒藥。

黑神散 治產後惡露不盡。或胎衣不下。血氣致冲。心腹痞滿。或

濟陰綱目 卷十一 血暈 天德堂

膈腹堅脹。撮痛。及血暈。神昏。眼黑。口噤。產後瘀血。諸疾。

當歸 芍藥 熟地黃 乾薑 桂心 蒲黃

甘草炙 黑豆炒去皮

右為細末。每服二錢。酒重便各半盞。同煎調服。○貴氏曰。黑神散。寒多。及秋冬。者。宜之。若性急。形瘦。及夏。月。宜審之。

紅花散 治產後血昏。血暈。血崩。及月事不勻。連年乾血氣。

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花 蒲黃各等分

右為細末。每服半兩。酒煎和渣溫服。○如胎衣不下。榆白皮湯調半兩立效。

鹿角散 治產後血暈。此乃虛火。載血漸漸。將上。來用鹿角燒灰。出火毒。研極細。用好酒童便調灌下。一呷。即醒。此物行血。

鬱金散 治產後血上冲心已死并下胎

鬱金燒存性為末每二錢醋醃一合調灌之立活

治血鬱雜方

產後血暈全不省人事極危殆者用韭菜切入有嘴瓶內煎

熱醋沃之以瓶口對產婦鼻孔熏之即醒

一方如覺暈即以醋嗅面醒來仍與醋細細呷之又以醋塗口鼻

并置醋于旁使常聞其氣

一方麒麟竭一兩細研為末非時溫酒調下二錢

一方紅花一兩搗為末分作二服酒二鍾煎取一鍾併服如口紫

乾開灌之速效

一方用紅花三兩新者無灰酒重便各半升煮取一盞服之

濟陰綱目 卷十一 血暈 主 天德堂

一方用藕木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無蘇木取緋

衣煮汁服之亦得以上俱破血輕劑

牡丹散 治產後血暈悶絕口噤則擗開口灌之

牡丹皮 大黃 煨 芒硝 各一冬瓜子 合 桃仁 三十個 去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去滓入硝又煎分二服

產毒一方 治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭硬及

寒熱不禁

接骨木破之如算子大一握以水一升煎至半升分溫二服

或小便數惡血不止服之即痊此木煎三遍其力一般此是

起死之方以上二方俱重劑

○以上治惡血攻冲昏暈之劑

荆芥散 治產後風虛血暈精神昏昧

荆芥 一兩 桃仁 炒五錢

右為細末溫水調下三錢○微喘加杏仁炒甘草各三錢

一方治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二三錢極妙

一方用多年陳荆芥穗燈烟上燎焦黑存性每服三錢童便少酒

調下極妙

按此乃肝熱

生風之候由

血虛而肝急

也然其方最

服得屬大陽

要方之

○以上治風虛血暈之劑

倉公散 治產後血厥而目

濟陰綱目 卷十一 血暈 主 天德堂

瓜蒂 藜蘆 白礬 各一雄黃半

右為末每用少許吹鼻取嚏內服白微湯

白微湯 治產後胃弱不食脈微多汗亡血發厥等證

白微 當歸 各六錢 人參 三錢 甘草 半錢

右切分作二帖水煎服

○以上治血厥之劑

○惡露不下

大全云夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾于

宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏于血則壅滯不宜積留在

內故惡露不下也

薛氏曰前證若惡露不下用失笑散若氣滯血凝用花露石散



此產後溫行 正藥白芍藥 酒炒亦無妨	此以心神煩 悶故不用藥 而加重便 以引下	既用大黃得 用白米豈得 已之心加酒 同煎桃仁后 入又治法之 妙	此方寒熱並 同治法而不 偏治法為求 調生黃汁 酒服
一產婦患前證服峻厲之藥惡露隨下久而昏憤以手護其腹全 日此皮氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補 之而愈	起枕散 治產後惡血不行心腹及兒枕作痛甚危	當歸 白芍藥 酒炒各 川芎 錢 官桂 玄胡索	牡丹皮 蒲黃 炒 五靈脂 炒 沒藥 錢 白芷
右剉水煎入童便空心服	荷葉散 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶	乾荷葉 兩 鬼箭羽 桃仁 劉寄奴 蒲黃 各一	右為末每服三錢以童便一大盞薑二片生大黃一分棧碎
同煎至六分熱服	濟陰綱目 卷十一 惡露不下	通源飲 治產後惡露不通心慌昏沉寒熱交攻	歸尾 大黃 各三 白朮 木通 各一 紅花 五
桃仁 三十箇 另入	右用水一碗酒一小盞煎三沸入桃仁再煎一沸溫服	廣濟方 療產後惡露不下	川牛膝 大黃 各二 牡丹皮 當歸 各一 芍藥
蒲黃 桂心 各一	右為末以生地黃汁調酒服方寸七日二服血下愈	保命集方 治婦人惡血不下	當歸 羌花 炒等
右為細末每服三錢酒調下			

又用好墨醋末童便酒下 沒藥丸 治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆 痛如錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經 絡 當歸 兩 芍藥 桂心 各半 桃仁 去皮尖 沒藥 研各二 龜蟲 去翅 水蛭 炒焦各 三十枚 右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下三丸 黑龍丹 見前胎 治惡血不下雜方 一方用蒲黃三兩炒水三升煮取一升頓服 一方用益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合溫服 濟陰綱目 卷十一 惡露不下 五 天德堂 一方用麻子五升酒一升浸一宿明且去滓溫服一升不瘥再服 一升 ○血露不絕 大全云夫產後惡露不絕者由產後傷于經血虛損不足或分解 之時惡血不盡在于腹中而臟腑挾于宿冷致氣血不調故令惡 露淋漓不絕也 薛氏曰前證若肝氣熱而不能主血用六味地黃丸若肝氣虛而 不能藏血用逍遙散若脾氣虛而不能攝血用六君子湯若胃氣 下陷而不能統血用補中益氣湯若脾經鬱熱而血不歸源用加 味歸脾湯若肝經怒火而血妄行用加味四物湯若氣血俱虛用 十全大補湯若肝經風邪而血沸騰用一味防風丸 以下諸方失 載當立查 其方	再水蛭非真 不得已不敢 用		

<p>產後忌考藥 而此方用之 亦血崩者無 忌耳</p>		<p>有謂如豆汁 者溫紫黑者 熱又曰寒過 多者虛此方 不寒不熱不 燥故可通用</p>		<p>敗諸治多年 凝血產後諸 病腹痛則此 去故生新藥 也</p>	
<p>等歸加芍藥湯 治產後血崩眩暈不知人事</p>		<p>川芎 當歸 芍藥各等</p>		<p>右咬咀每服四錢水煎服○一方加黃芩白朮</p>	
<p>加味四物湯 治產後血崩如豆汁紫黑過多者</p>		<p>川芎 當歸 芍藥 生地黃 蒲黃 阿膠</p>		<p>右水煎服</p>	
<p>一方 癰疽後七八日惡露不止</p>		<p>敗醬草 當歸各六 芍藥 續斷各八 川芎</p>		<p>竹茹各四 生地黃 炒乾十</p>	
<p>右細剉以水二升煮取八合空心頓服</p>		<p>齊陰綱目 卷十一 惡露不止 未 天德堂</p>		<p>○已上補虛之劑</p>	
<p>加味四物湯 治產後月餘經血淋漓不止此陷下者舉之也</p>		<p>當歸 川芎 白芍 熟地 白芷</p>		<p>升麻 各一 血餘炭 另入</p>	
<p>右剉水煎服</p>		<p>千金方 治產後惡血不盡或經月或半歲者</p>		<p>升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再服</p>	
<p>○已上升提之劑</p>		<p>烏金散 治產後血迷血暈敗血不止淋瀝不斷臍腹痛頭目</p>		<p>昏眩多汗無力及崩中下血不止</p>	

<p>諸病皆能收 血不止來此 方之妙不在 止而在行行 之如經而止 矣治崩者最 得此言</p>		<p>妙在地黃為 君</p>		<p>餘血瘀血也 故用行法</p>	
<p>麒麟竭 男子亂髮灰 松墨 收膏 百草霜 當歸</p>		<p>肉桂 赤芍 延胡索 鯉魚鱗 各等分</p>		<p>右為末每服二錢空心溫酒調下</p>	
<p>一方 治產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣急</p>		<p>亂髮 燒一阿膠 二代赭石 乾薑 各三 乾地黃 四</p>		<p>馬蹄殼 燒一個 牛角觔 五兩 酥炙</p>	
<p>右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心水飲下日二服</p>		<p>豆淋酒 治產後猶有餘血水氣者</p>		<p>黑豆五升熬令烟盡投磁器內以酒一斗淬之飲盡豆淋酒</p>	
<p>治汚血又能發表也</p>		<p>齊陰綱目 卷十一 血崩不止 七 天德堂</p>		<p>蒲黃飲子 治新產壓血逐敗滋新此藥治血神效又非黑神散</p>	
<p>之可比也月內每日一二服尤良及癰一切惡露與血</p>		<p>真蒲黃不拘多少熬米醋令稠和藥成膏每服 湯子大食</p>		<p>前醋湯化開服</p>	
<p>一方用蒲黃二兩水煎頓服</p>		<p>一方 療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶</p>		<p>葶黃為末酒服方寸七日三四服</p>	
<p>胡氏曰葶黃治惡露不止</p>		<p>○以上行汚血之劑</p>		<p>牡蠣散 治產後惡露淋瀝不斷心悶短氣四肢之弱頭目昏重</p>	
<p>五心煩熱面黃體瘦</p>					

牡蠣粉各二錢 川芎 熟地 茯苓 龍骨各二錢

當歸各一錢 續斷 艾葉 人參 五味子

地榆各一錢 甘草五分

右剉分二帖。加生薑三片。棗一枚。水煎食前服。

○此收澁之劑。虛脫者宜用。

○血崩不止

陳氏曰。產後血崩者。何。答曰。產後傷耗經脈。未得平復。勞役損重。致血暴崩。淋瀝不止。或因酸鹹不節。傷氣。氣弱。亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。為難治。急服固經丸止之。

陳無擇評曰。血崩不是輕病。產後有此。是謂重傷。恐不止。酸鹹不節。而能致之多。因驚憂。悲。怒。臟氣不平。或產後服斷血藥。早

濟陰綱目 卷十一 血崩不止

本 天德堂

致惡血不消。鬱滿作堅。亦成崩中。固經丸自難奏效。不若大料煮芩薊湯。加芍藥。候定。續次。隨證諸藥治之。為得。

薛氏曰。前證若血滯。小腹脹滿。用失笑散。血少。小腹虛痛。芩薊湯。肝火血多。行加味逍遙散。脾鬱不統。血加味歸脾湯。脾氣虛。不攝血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。清胃散。加槐花。風熱相搏。傷血。四君子。加防風。枳殼。

見症在脾胃  
改用六君加  
炮姜

一產婦血崩。小腹脹痛。用破氣行血之劑。其崩如湧。四肢不收。惡寒嘔吐。大便頻瀉。余用六君加炮姜。乾薑。四劑稍愈。又以十全大補。三十餘劑而痊。

一產婦血崩。因怒其血。如湧。仆地。口噤。目斜。手足抽搐。此肝經血耗。生風。余用六味丸。料一劑。諸證悉退。但食少。嗜熱。佐以四君。柴

胡牡丹皮而愈。

芩歸加芍藥湯 治產後血崩。眩暈。不知人事。

方見前惡露不絕。

加味四物湯 治產後血崩。如豆汁。紫黑過多者。

方見前惡露不絕。

奇效四物湯 治產後血崩。素有熱者。

方見血崩門。

別久服者

人事

熟地黃 黃耆 伏龍肝 赤石脂各一兩 當歸七錢

川芎 阿膠 艾葉 白朮 人參 甘草各半兩

濟陰綱目 卷十一 血崩不止

丸 天德堂

右咬咀。每服四錢。生薑三片。水煎溫服。

阿膠丸 治產後崩中。下血不止。虛羸無力。

阿膠 赤石脂各半兩 續斷 川芎 當歸 丹參

甘草各一兩 龍骨 鹿茸 炙 烏賊魚骨 龜甲各一兩

右為細末。煉蜜丸。如桐子大。空心溫酒下。二三十九。

瑞蓮散 治產後惡血崩漏。狀如涌泉。

瑞蓮一百枚 棕櫚燒存性 常山各一兩 官桂半兩 枳殼二錢

川芎 鯉魚鱗各七錢 赤石脂一兩

右為細末。每服三錢。生薑酒調服。如未止。更進一服。或非時

血崩。無藥可治。但進三服。即止。

固經丸 治產後血氣未復。而有房事。及勞役傷損。致血暴崩。或



<p>因陽氣虛弱用四君當歸炮姜用六君當歸炮姜</p>	<p>發熱惡風虛用白虎加參湯云血虛忌白虎</p>	<p>因虛或虛因虛投補劑勿當發病者兩責之幸勿誤也</p>	<p>陶隱居虛宜以麻黃湯之</p>	
<p>惡食吞酸或腹痛手不可按此是飲食所致用二陳加山查白朮以消導若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣破傷宜補脾胃為主○若發熱腹痛按之痛甚不惡食不吞酸此是瘀血停滯用失笑散治之○若止是發熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此屬血虛用四物加炮薑參朮以補之○如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛則用當歸腹中痛則加芍藥宜詳察脈證而用之</p>	<p>一產婦腹痛發熱氣口脈大余以為飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜始悔問余曰何也余曰此脾虛之變證也法當溫補遂用六君子加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸症悉退再用補中益氣</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 腹痛 一 產婦腹痛發熱氣口脈大余以為飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜始悔問余曰何也余曰此脾虛之變證也法當溫補遂用六君子加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸症悉退再用補中益氣</p>	<p>之劑元氣遂復 一婦人產後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱久鬱患爾唇麻而盜汗如雨竟夜不敢寐神思消憊余曰氣血虛而有熱用當歸六黃湯內黃芩黃蘗炒黑一劑汗頓止再劑全止乃用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復而愈</p>	<p>一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血內滯為膿也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下臍而愈產後多有此病縱非難用之更效 一產婦小腹痛小便不利用薏苡仁湯二劑痛止更以四物加紅花桃仁下瘀血而愈夫此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若腹</p>

<p>口竟有塊想是寒氣乘虛而聚非真寒症也不然何</p>	<p>以羊肉羹愈哉</p>	<p>口竟有塊想是寒氣乘虛而聚非真寒症也不然何</p>	<p>既曰惡露不盡不大便而躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則讎語至夜即愈宜大承氣湯主之熱則裏結在膀胱也</p>	<p>者何益熱結在膀胱故宜大承氣也</p>
<p>脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟蜜丸太乙膏及托裏散 一產婦小腹作痛有塊脈亢而瀉以四物加玄胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈 一產婦後小腹患痛服瓜子仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多為敗證</p>	<p>一婦人寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人教以羊肉四兩熟地黃二兩生薑一兩水煎服之三次愈 大全云兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產後臍腹冷使血凝滯在于小腹不能流通則令</p>	<p>結聚疼痛名之曰兒枕 金匱云產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則讎語至夜即愈宜大承氣湯主之熱則裏結在膀胱也</p>	<p>大全云產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血壅滯所下不盡故令腹痛當審其因而治之 一產婦小腹痛甚牙關緊急此瘀血內停瀉以失笑散下血而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈</p>	<p>一婦人經水來比常度過多不止遂用瀉藥止之致腹作痛此乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈 以上數段言惡露不盡</p>

余按金匱所治重在傷寒裏實不重在惡露故其證皆指實熱言當以無太陽證句及結膀胱句玩之便得其意後案專主惡露言故與前方不同不可一律看也

大全云以惡露不盡腹痛及兒枕心腹刺痛小腹疼痛寒疝分為四門由母胎中宿有血塊產後不與兒俱下而仍在腹作痛謂之兒枕其惡露下不快而作痛者胎中原無積聚不為兒枕也若惡露已盡或由他故腹痛如仲景枳實芍藥散證或由血虛腹痛如仲景當歸生薑羊肉湯證自當別論故復臆列諸名方于後若服枳實芍藥散不愈仍當求責瘀血也故下瘀血諸方附焉而補虛諸方終之不復立寒疝條

加味四物湯 治產後惡露不盡腹痛  
濟陰綱目 卷十一 腹痛 諸 天德堂

當歸 川芎 芍藥 熟地黃各一 香附 天德堂

五靈脂 炒二味另為末各一錢臨服調入

右到一服水煎服○痛甚者加桃仁泥四分

海藏方四物湯加玄胡索沒藥白芷治產後敗血作痛

此所加八種藥少有者多在自擇之

一方四物湯加苦棟 一方四物湯加玄胡索

一方四物湯加蒲黃 治產後血塊作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸蒲延散 治產後血塊作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸 八分 桂心 芍藥 炒 血竭 蒲黃 炒各六分

延胡索 炒四分

右為末每服二錢空心酒調下

玄胡索散 治產後惡血攻刺腹痛及一切血氣刺痛不論新舊虛實皆可服之

當歸 酒 玄胡索 赤芍藥 蒲黃 炒 桂皮

乳香 沒藥 各等分

右研為細末每服三錢溫酒調空心服

延胡散 治產後兒枕腹痛

延胡索 當歸 各一 赤芍 錢五 肉桂 七錢 蒲黃 炒

琥珀 各二 紅藍花 二

右為末每服二錢童便酒調食前服

烏金散 治惡露敗血走刺心腹兒枕痛坐臥不得餘血不快

川芎 七錢半 燒熟 黑附子 半枚 炮 去皮 鹽 中 存 性

濟陰綱目 卷十一 腹痛 諸 天德堂

右為細末每三錢童便和酒調服痛止血下方佳服

地黃散 治產後惡血不盡腹中疝痛

生地黃 炒 當歸 炒 各 生薑 五錢 切 碎 新 瓦 上 炒 令 焦 黑

右為細末酒調下二錢空心服○一方加蒲黃為丸

四神散 治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾薑 炮 川芎 赤芍 炒 各 等 分

右為末每服二錢溫酒調下

黑神散 治產後血塊痛

熟地黃 一斤 陳生薑 半斤

右二味拌勻同炒乾為末每服二錢烏梅湯調下常服酒調

丹溪方 治產後血塊痛發熱

	<p>五靈脂<small>炒四錢</small> 牡丹皮 沒藥 滑石</p> <p>右研細分五帖豆淋酒下之食前服</p> <p>卷荷散 治產後血上冲心血刺血暈血氣腹痛惡露不快諸症治之</p>
<p>均足破血藥 而治煩渴 症則宜便生 地猶佳</p>	<p>初出卷荷 紅花 當歸各一 蒲黃<small>炒</small> 牡丹皮<small>各半</small></p> <p>右爲細末每服三錢空心鹽酒調下</p> <p>荷葉散 治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶</p> <p>乾荷葉<small>二兩</small> 劉寄奴 蒲黃<small>各一兩</small> 桃仁<small>去皮尖炒半兩</small></p> <p>右咬咀每服四錢童子小便一盞生薑三片生大黃一分煎至六分熱服不拘時○一方有鬼箭羽</p>
<p>澤蘭理血氣 聖藥</p>	<p>隱居澤蘭湯 治產後惡露腹痛或胸滿少氣</p> <p>澤蘭<small>炒</small> 生地黃 當歸 芍藥<small>炒</small> 生薑<small>各錢</small></p> <p>甘草<small>分五</small> 大棗<small>個四</small></p> <p>右剉水煎服</p>
<p>妙在加大黃 藥以對症者 佳</p>	<p>又方 治產後下血不盡腹內堅痛不可忍</p> <p>當歸 芍藥 桂心<small>各三兩</small> 桃仁<small>一百二十粒製</small></p> <p>右水六升煮二升溫分二服未差加大黃</p> <p>又方 治產後惡露不盡結聚小腹疼痛</p> <p>當歸<small>七錢</small> 香附<small>子製一兩</small> 赤芍 青皮 木香</p> <p>桂心 琥珀 沒藥<small>各半</small></p> <p>右爲細末以烏豆淋酒調服二錢</p> <p>產寶湯 治產後餘血作痛兼塊者</p>

	<p>桂心 薑黃<small>各等</small> 右爲細末酒調方寸七血下盡妙</p> <p>延胡索<small>一名三聖散</small> 治產後臍下痛並腰疼</p> <p>延胡索 桂心<small>各半</small> 當歸<small>一兩</small> 右爲細末熟酒調下二錢</p> <p>香桂散 治產後臍下疼痛不止</p>
<p>破血爲主</p>	<p>當歸 川芎<small>各二錢半</small> 桂心<small>半兩</small></p> <p>右爲細末分爲三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許煎至七分溫服甚者不過再服即愈</p> <p>當歸血竭丸 治產後惡露不盡結聚成塊心胸痞悶及臍下堅痛</p> <p>當歸 血竭 芍藥 蓬朮<small>炮各二兩</small> 五靈脂<small>四兩</small></p> <p>右爲細末醋糊和丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒送下</p>
<p>凡產後腹痛 或痛或澀血 未注者今人 不知往往誤 治而以大補 爲主遂至日 久不治又或 有惡寒之症 皆亦不可以 謂也此方行 最速去瘀生 新調和血氣 產後聖藥</p>	<p>當歸養血丸 治產後惡露不盡結聚成塊小腹疼痛及惡露不快臍下急痛連及腰脚疼痛</p> <p>當歸 赤芍 牡丹皮 延胡<small>各二兩</small> 桂心<small>一兩</small></p> <p>右爲末煉蜜丸如桐子大空心酒下三四十九丸痛甚者細嚼下</p> <p>紫金丸 治產後惡露不快腰腹小腹痛如刺時作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調亦可療心痛</p> <p>五靈脂<small>水淘去土石</small> 眞蒲黃<small>各等</small></p> <p>右以好米醋調五靈脂慢火熬成膏次以蒲黃末和如櫻桃大每服一丸水與童便各半盞煎至七分令藥化溫服之少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不和者並用酒磨下</p> <p>玉燭散 治產後惡露不盡臍腹疼痛大便燥結時發寒熱</p>

<p>此方治產後血暈 四物合承氣 主之發熱走 血之意</p>	<p>當歸 川芎 赤芍 熟地 大黃 朴硝 甘草 右作一服水煎食前溫服○諸方治敗血作痛皆是以通利其則 流通之理惟此一方却是涼劑蓋為敗血凝滯發熱大便燥結 者設也非大便秘結者慎不可用</p>	<p>枳實芍藥散 金匱云產後腹痛滿不得臥此方主之 枳實炒令黑 芍藥各等分 右杵為散服方寸七日三服並主癰腫以麥粥下之</p>	<p>下瘀血湯 產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹 中有乾血着臍下宜此方 大黃二兩 桃仁二十枚 蟅蟲二十枚 右三味末之煉蜜和為四九以酒一升煎一丸取八合頓服之</p>	<p>新血下如豚肝 保命方 治血暈血結或聚于胸中或偏于小腹或連于脇肋四 物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭羽紅花延胡各一兩同為末 加下四味煎調沒藥散服 蟅蟲二錢土 水蛭一錢 麝香許 沒藥</p>	<p>千金桃仁芍藥湯 治產後腹痛 桃仁 芍藥 川芎 當歸 桂心 乾漆 甘草各二兩 右細切水八升煮二升半分三服</p>	<p>○以上治瘀血腹痛之劑皆當劑宜斟酌用之</p>	<p>一貴內產後 腹滿不能食 此方三服而 愈 此仲景方也 又為逆少不 利藥 脈肝者即煎 血之下也新 血二字非</p>
--	--	---	---	--	--	---------------------------	--

<p>增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱惡露停滯亦令寒熱 但看小腹急痛為異</p>	<p>當歸 白芍 川芎 人參 甘草 乾薑二兩 右改咀每服四錢薑三片水煎無時熱服</p>	<p>獨聖散 治產後血虛腹痛 當歸一味為細末每服二錢水一盞煎七分溫服</p>	<p>當歸散 治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發熱腹痛或腹脇 脹滿 當歸 乾薑各等分 右剉每服三錢水煎服</p>	<p>定痛散 治產後惡血不止 當歸 芍藥各二錢 肉桂一錢 右切作一服水酒各一盞半加生薑五片煎一盞服</p>	<p>當歸中湯 治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣 或苦小腹中急痛引腰背不能飲食 當歸 芍藥 桂枝 甘草 生薑 大棗十二枚 右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡○若大虛加 飴糖六兩湯成內于火上緩令飴消○若去血過多筋傷內動 不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯內阿膠服之</p>	<p>羊肉湯 治產婦脾虛為寒邪所乘以致腹痛及寒月生產寒氣 內動不止加 地黃阿膠似 安但本方有 桂枝生薑得 此太熱乎請 酌之</p>	<p>此方簡易自 有獨見而當 歸又能治血 酒寒熱不已</p>
---	---	--	--	---	--	---	--



<p>人于產門臍下脹滿手不可犯</p> <p>精鷄羊肉<small>兩</small> 當歸<small>兩</small> 川芎<small>各半</small> 生薑<small>兩一</small></p> <p>右以水十盞酒三盞煎至四盞分四次空心服加葱鹽亦可</p> <p>衍義云一婦人產後寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此寒痼也醫當治之以抵當湯謂其有瘀血耳予教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減作二服愈</p>	<p>千金方 治產後餘疾腹中絞痛腹之不下食</p> <p>當歸 黃芪 芍藥<small>各六錢</small> 乾地黄 白朮<small>各八錢</small></p> <p>桂心 甘草<small>各四分</small> 大棗<small>十四枚</small></p> <p>右咬咀水二升煮八合空心服忌生冷</p> <p>○以上治虛寒腹痛之劑</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 腹痛</p> <p>生料五積散 治產後內有餘血外感寒邪相搏而腹痛</p> <p>蒼朮<small>二錢</small> 麻黃<small>去根</small> 橘紅 枳殼<small>各六錢</small> 桔梗<small>二錢</small></p> <p>厚朴 乾薑<small>剉各</small> 當歸 白芍 川芎</p> <p>白茯苓 半夏 白芷 肉桂 甘草<small>各三分</small></p> <p>右加薑蔥水煎服</p> <p>○右方治寒邪腹痛之劑非真受寒氣者不可輕用</p>	<p>○脇脹痛</p> <p>大全云產後兩脇脹滿氣痛由膀胱宿有停水因產後惡露下不盡水壅滯與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣與水相激故令痛也</p> <p>薛氏曰前症若肝經血瘀用玄胡索散若肝經氣滯用四君青皮</p>
--	---	--	--

<p>柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味先若肺金熱盛剋制肝木用瀉白湯仍</p> <p>參前論主之</p>	<p>一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以為氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施功而反助其脹矣</p>	<p>乾地黄湯 治產後兩脇滿痛兼除百病</p> <p>乾地黄 芍藥<small>各三兩</small> 當歸 蒲黃<small>各二兩</small> 桂心<small>六兩</small></p> <p>甘草<small>兩</small> 生薑<small>五兩</small> 大棗<small>二十枚</small></p> <p>右咬咀以水一斗煮取二升半分服日三</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 腹痛</p> <p>經效方 治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛或寒熱往來內熱喘熱</p> <p>當歸<small>一錢</small> 芍藥<small>五錢</small> 苦梗 枳殼<small>各八分</small></p> <p>桂心 青木香 柴胡<small>各六分</small></p> <p>右剉水煎服</p>	<p>蘇葛湯 療產後惡露不下血氣壅滯脇脹痛不下食</p> <p>蘇木 紫葛<small>各十</small> 芍藥 當歸<small>各八</small> 桂心</p> <p>蒲黃<small>各六</small> 生地黃<small>汁</small></p> <p>右咬咀以水二升煎七合下蒲黃分兩服</p>	<p>經效方 理血氣煩悶脇肋脹滿及痛</p> <p>芍藥<small>八</small> 當歸<small>六</small> 延胡索 蒲黃<small>各四</small> 荷葉蒂<small>枚三</small></p>
--	---	--	---	---	--

<p>右水二升煎取八合後入蒲黃空心分二服</p> <p>當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿</p>	<p>當歸 乾薑 各等分</p> <p>右爲末酒服三錢水煎入鹽醋少許食前熱服一方酒服</p>	<p>廣濟方 療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利</p> <p>厚朴 八分 人參 當歸 茯苓 甘草 各六分</p>	<p>陳皮 生薑 各四分</p> <p>右咬咀以水二升煎取八合去滓分溫服</p>	<p>抵聖湯 治產後腹脇悶滿或嘔吐者</p> <p>赤芍 半夏 澤蘭葉 陳皮 人參 甘草 各等分</p>	<p>右咬咀每服四錢薑五片水煎溫服</p> <p>濟陰綱目 卷十一 腰痛</p>	<p>○腰痛</p> <p>大全云腎主腰脚產後腰痛者爲女人腎位繫于胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒</p>	<p>冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎</p> <p>腎主腰故也</p>	<p>薛氏曰前證真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補湯爲</p> <p>主佐以寄生湯如不應用十全大補加附子</p>	<p>一產婦腰痛腹脹善噎諸藥皆咽余以爲脾虛血弱用白朮一味</p> <p>炒黃每劑一兩米泔煎飲時是許四劑後漸安百餘劑而愈</p>	<p>當歸黃芪湯 治產後失血過多腰痛身熱自汗</p> <p>當歸 黃芪 白芍 各二兩</p>	<p>此方治氣血虛弱胃不消化者尤宜</p> <p>以上七方並用川芎芍藥痛者不宜服要知此脈此</p>
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---

<p>右咬咀每服六錢加生薑五片水一盞半煎至一盞溫服不拘時</p> <p>玄胡四物湯 治血癖腹痛及血刺腰痛</p>	<p>當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各七錢半</p> <p>玄胡索 酒煮 右爲細末每服三錢酒調下</p>	<p>如神湯 治產後瘀血腰疼</p> <p>延胡索 當歸 桂心 各等分 右水煎服</p>	<p>又如神湯 即生料五積散加桃仁</p> <p>五積散方見前腹痛條</p>	<p>廣濟方 治產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉</p> <p>敗醬 當歸 各八分 川芎 芍藥 桂心 各六分</p>	<p>濟陰綱目 卷十一 腰痛</p> <p>右咬咀水二升煎取八合分溫二服忌葱</p>	<p>寄生防風湯 治產後風邪頭眩腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難</p> <p>獨活 川芎 芍藥 炒黃 桂心 續斷 各八分</p>	<p>生薑 桑寄生 各六分 當歸 防風 各八分</p> <p>右剉水煎服</p>	<p>桃仁湯 治產後惡露方行忽然漸少斷續不來腰中重痛或流注兩股痛如錐刺此由血滯于經絡不即通之必作癰疽宜桃</p> <p>仁湯恐有癰者預服五香連翹湯</p>	<p>桃仁 去皮 蘇木 生地 各半 蠱蟲 去翅 炒 各三錢</p> <p>右每服三錢水煎空心熱服惡露下即住服</p>	<p>此方治久痛之因外感者</p> <p>白凝者宜之</p>	<p>白凝者宜之</p>
--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--------------------------------	--------------

既為瘀血何以只用五香行氣藥為病血于氣也射者分兩也

五香連翹湯 治產後瘀血腰痛作癢

木香 丁香 沉香 乳香 射香 升麻

獨活 桑寄生 連翹 木通各二兩

右為麝末每服五錢水煎入竹瀝少許服

○頭痛

大全云夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不克穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上炎于頭陽實陰虛則令頭痛也○又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

薛氏曰前證若中氣虛用補中益氣湯加荳蔻子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

產後腹痛

天德堂

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不效已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而瘳

郭茂桐婢金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無聯息間每頭痛甚欲取大石

壓良久漸足心痛作則以十指抓臂血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剗取之如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疾少間

黑龍丹見脫衣不下停

中夜再服乃瞑目寢如平時至清晨下一行約三升許如蝗蟲子

三疾減已刻又行如前則頓愈矣此虫咬痛也不如用殺虫藥更神效

一奇散治產後血虛頭痛

服法佳

當歸 川芎各二錢半

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

普烏散 治產後氣滯頭痛

天台烏藥 大川芎各等分

右為細末每服三錢燒紅秤鍾淬酒調服

普附散 治產後氣虛頭痛及敗血作梗頭痛諸藥不效者

川芎 大附子一箇去皮臍切四片拌酒醋一

右為末每服二錢清茶調服

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛

蒼朮一兩 羌活 川芎 防風 香附炒

白芷各一兩 石羔二兩 細辛一兩 當歸 甘草各五

右到每服一兩水煎服無時○如有汗者知氣虛頭痛也加芍

藥三兩桂一兩半生薑煎○如熱痰頭痛加白芷三兩百病

兩知母一兩○如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑

片煎服

○遍身疼痛

大全云產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脈流散遇氣

弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脈急引

故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若鑒以為傷寒治

之則汗出而筋脈動傷手足厥冷變生他證但服起痛散除之

薛氏曰前證若以手按而痛甚者是血滯也用四物炮薑紅花桃仁

澤蘭補而散之若按而痛稍緩是血虛也用四物炮薑人參白朮

補而養之

一產婦身腹作痛。發熱不食。煩躁不寐。盜汗脇痛。服解散祛血之藥。不時昏憤。六脈洪大如無用。補中益氣加炮薑半夏一劑。頓退。二三又劑。寢食甘美。但背強而痛。用八珍散大補湯調理而安。一產婦遍身頭項作痛。惡寒拘急。脈浮緊。此風寒之證也。用五積散一劑。汗出而愈。但倦怠發熱。此邪風去而真氣虛也。用八珍湯調理而痊。

一婦六月產後。多汗入倦。不敢袒被。故汗出被裏。冷則浸漬。得風濕疼痛。遂以羌活續斷湯數服而愈。

逐痛散 治產後氣弱血滯。筋脈拘攣。要背強直。遍身疼痛。

當歸 官桂 白朮 黃芪 獨活 牛膝

濟陰綱目 卷十一 遍身疼痛 天德堂

此方根氣弱來故用藥末

生薑各五錢 甘草 非白各三錢 右咬咀。每服五錢。水煎服。加桑寄生半兩。九佳。

五積散 治產後身痛。兼感寒傷食。

方見前腹痛條。與四物湯各半服之。穩當。

加味四物湯 治產後血虛身痛。

當歸 川芎 人參 芍藥 熟地 白朮

乾薑 右剉作一服。水煎服。

大前方 治產後遍身青腫疼痛及眾疾。

牛膝 大麥蘖 各等分

右爲細末。以新瓦罐子中。填一重麥蘖。一重牛膝。如此填滿。用鹽泥固濟。火煨過。赤放冷。研爲散。但是產後諸疾。熱酒調下。二

此此四方類

令人心曠

錢

○脚氣

大全云。產後熱悶。氣上轉爲脚氣者。何。答曰。產臥血虛。生熱。復因春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之。所以着爲脚氣。其狀熱悶。凝驚悸。心煩。嘔吐。氣上。皆其候也。可服小續命湯。方見後。兩三劑。必愈。若盛名誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾愈增矣。

陳無擇評曰。脚氣固是常病。未聞產後能轉爲者。往讀千金。見產婦多有此疾之語。便出是證。文辭害意。蓋可見矣。設是熱悶。氣上。如何便服續命湯。此藥本主少陽經中風。非均治諸經脚氣。要須依脚氣方論。陰陽經絡調之。此涉專門。未易輕論。既非產後要病。更不繁引。

濟陰綱目 卷十一 脚氣 天德堂

準繩云。陳無擇雖有此論。然小續命湯。加減與之用。無不效。故百問云。寒中三陽所患。必小續命湯主之。加生薑汁。更快。暑中三陰所患。必熱小續命湯。桂附子減。大煩躁者。紫雪最良。予取百問中加減法。使後人得治。如無紫雪。用真薄荷煎冷水。嚼下。集云。諸方必與附子。薛氏曰。前證當補氣血爲主。佐以小續命湯。寄生湯。如不應。用大防風湯。

一產婦患前證。或用獨活寄生湯而痊。後復作。服前湯。其汗如水。更加口噤。吐痰。余用十全大補湯。倍養血氣。漸愈。後飲食日少。肌體日瘦。吐痰如湧。此命門火衰。脾土虛寒。用八味丸。及加味歸脾湯。諸證漸退。肌肉漸生。

獨活寄生湯 治肝腎虛弱。或久居濕冷之地。或洗足當風。濕毒

獨活寄生湯 治肝腎虛弱。或久居濕冷之地。或洗足當風。濕毒

內攻兩腰。縱變痛痺弱。或皮肉紫破。足膝重。又專治產後脚氣。

川獨活三兩 桑寄生如無以續斷代 杜仲炒 牛膝去蘆酒浸

細辛 官桂不見火 白茯苓 防風

川芎 當歸 人參 熟地黃酒洗

芍藥 秦艽各二兩

右咬咀每服四錢。薑五片水煎溫服。

大防風湯 治陰虛邪襲腿膝腫痛等證。

防風 附子炮 牛膝酒浸 白朮炒 羌活 人參

肉桂 黃芪炒各一錢 川芎 熟地黃各一錢 芍藥炒

杜仲姜汁炒五分 甘草各五分

濟陰綱目 卷十一 脚氣

右剉水煎服 卷下 終

濟陰綱目卷之十二

關中 武之望叔卿父輯著 武林 朱長春承家訓註

西陵 汪 洪瞻子箋釋 天都 查 望子 歸 蔡 闕

○外感風寒

李氏曰。產後外感。離牀太早。或換衣。或風冷。人下部。令人寒熱似

瘧。頭疼。不眠。血虛者。芍歸湯。加人參。紫蘇。乾葛。血氣虛者。補虛湯。

加陳皮。乾薑。寒熱甚者。熱料五積散。熱不止者。黃龍湯。主之。如體

盛發。熱惡寒。及瘧痢者。小柴胡湯。合四君子。四物湯。加黃芩。台三

分。散切。不可以傷寒治法。若誤服熱藥。過多。熱證大見。久而便閉

者。柴胡破瘀湯。或四物湯。加大黃。芒硝。暫服。即調補之。

良方曰。產後外感風寒。發熱。頭痛。身疼。雖如傷寒。時氣。當用麻黃

湯。陰綱目 卷十一 外感風寒 一 天德堂

亦不可輕易。如早起。勞動。為寒所傷。則漸漸惡寒。翁翁發熱。頭項

肩背骨節皆痛。至七八日。乃差。若大便堅。作嘔。不能食。用小柴胡

湯。加生薑。地黃。

吳氏曰。新產後患傷寒。不可輕易發汗。蓋有產時。傷力。發熱。去血

過多。發熱。惡露。不去。發熱。三日。蒸乳。發熱。或有早起。勞動。飲食停

滯。一皆發熱。熱煩。傷寒。要在仔細。詳辨。切不可輕便。發汗。大抵產

後。大血空虛。若汗之。則變崩。傷肉。咽。或傷胃。昏迷。而不省。或風搖

搦。而不足。或大便閉澀。而難去。其害非輕。切宜詳審。凡有發熱。且

與四物湯。以川芎。當歸。為君。最多。白芍。藥須炒過。酒蒸。熟地。黃佐

之。如發熱。加軟苗。柴胡。人參。乾薑。炮之。最効。蓋乾薑之辛熱。能引

血藥入血分。氣藥入氣分也。且能去寒。發汗。有陽生陰長之道。以

等分法乃著  
守法

仲景所謂中  
風即今人所  
謂傷風也  
傷者從仲景  
方也

以竹葉乾薑  
而喘也然不  
用血藥而用  
參桂中風  
也此雖大法  
用之亦須  
用

邪氣虛入外  
而也若中風  
更不可治矣  
即治亦須從

熱治熱。深合內經之旨。予嘗用之。取効如神。故錄以勸。如有惡露  
未盡者。益母丸。黑神散。必兼用之。若門虛少食者。必加白朮茯苓。  
有痰嘔逆者。必加陳皮半夏。其餘六經。各條治例。皆同。但藥中必  
加四物湯為主。乃養血務本之要也。

大全云。凡產後發熱頭痛身疼。不可便作感冒治之。此等多是血  
虛。或敗血作梗。宜以平和之劑與服。必効。如玉露散。或四物湯加  
北柴胡等分煎服。若便以小柴胡湯。及竹葉石膏湯之類。竟不救  
者。多矣。

產後中風。數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶乾嘔。汗出  
雖多。陽旦證耳。可與陽旦湯。即桂枝湯  
加味芍藥湯。治產後血氣虛。外感風寒。頭疼。增寒壯熱。

濟陰綱目 卷十二 外感風寒 二 天德堂

當歸 川芎 各二錢 人參 紫蘇 乾葛 各一錢

右劉加生薑三片。水煎服。

竹葉湯 治產後中風發熱面赤喘而頭痛。

竹葉一 葛根三 防風 桔梗 桂枝

人參 甘草 各一兩

右咬咀。每服五錢。棗一枚。薑五片。水一盞半。煎一盞。去滓服。溫

覆使汗出。若頭項強。用大附子半錢。煎藥。湯去沫。嘔者加半夏

一錢。

○中風

大全云。夫產後中風者。由產時傷動血氣。勞損臟腑。未曾平復。早  
起勞動。致使氣虛。而風邪乘虛入之。故風邪冷氣。客于皮膚經絡。

本氣爲主

但疼痺。風之不在少氣。大凡筋脈挾寒。則急。急則解。解則緩。緩  
虛弱。若入諸藏。恍惚驚悸。隨其所傷。肝臟經絡而生。皆焉。  
郭稽中論曰。產後中風者。何答曰。產後五七日內。強力下床。或一  
月之內。傷于房室。或懷憂怒。擾盪冲和。或因食生硬。傷助氣。得  
病之初。眼口噤。肌肉顫。漸至腰脊筋急。強直者。不可治。此乃  
人作非偶。臨中風所得也。

薛氏曰。前證果外邪所屬。形氣不足。病氣有餘。當補元氣。爲主。稍  
佐以治病之藥。若強力不休。月內入房。屬形氣俱不足。當純補元  
氣。多有復甦者。若誤投風藥。乃促其危也。

丹溪曰。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治痰。當以左右  
手脈分。其氣血多少。以治切。不可作中風治。而用小續命湯。及發

表治風之藥。

濟陰綱目 卷十二 中風 三 天德堂

大全云。產後下血過多。虛極生風者。何答曰。婦人以榮血爲主。因  
產血下太多。氣無所主。脣青肉冷。汗出。目眩神昏。命在頃刻。此  
虛極生風也。宜急服濟危上丹。若以風藥治之。則誤矣。

薛氏曰。前證若心脾血氣俱虛。用大補湯。如不應。加附子。鈞藤。鈞  
若肝經血虛。用逍遙散。加鈞藤。經云。脾之榮在唇。心之液在汗。若

心脾二藏虛極。急用參附湯救之。

一婦人患前證。用諸補劑。四肢逆冷。自汗泄瀉。腸鳴腹痛。余以陽

氣虛寒。用六君子加薑附各五錢。不應。以參附各一兩。始愈。良久

不服。仍腸鳴腹痛。復灸關元穴百餘壯。及服十全大補湯方効。

大全云。產後中風。口噤者是血氣虛。而風入于頸項。夾口之筋也。

手三陽之筋結入于頸。產則勞損。故胸仍于筋。脈風若卡之。其三陽之筋。則偏持之。筋得風。冷則急。故令口噤也。  
 大全云。產後角弓反張者。是體虛受風。風入諸陽之經也。人之陰陽經絡。周環于身。風邪乘虛入于諸陽之經。則腰背反折。變急如角弓之狀也。  
 薛氏曰。前證因氣血耗損。腠理不密。汗出多多而思者。虛象也。宜固氣血。為主佐以本方。丹溪曰。產後當大補氣血。為先。雖有他症。以未治之。如惡寒發熱等症。乃氣血虛甚之極也。宜大劑參耆歸朮肉桂以培養之。如不應。急用炮附子。再不應。用人參一兩。炮附子二三錢。名參附湯。倘有未應。乃藥力未能及也。宜多用之。  
 小續命湯 治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙齦閉。綱目。卷十七。中風。四。天德堂。

防風 錢 麻黃 節 黃芩 芍藥 人參 川芎 防己  
 肉桂 各七 附子 炮 杏仁 炒各五分 甘草 炙四  
 右剉加生薑水煎服。○有熱去附子減桂一半。○有汗去麻黃加葛根。○骨節煩疼去附子加芍藥。○精神恍惚加茯神。○志○煩心多驚加犀角。○嘔逆腹脹加人參半夏。○骨間疼痛加附子。○宮桂。○臍寒下痢去防風黃芩。加附子白朮。○煩悶大便澀去附子加芍藥入竹瀝。○盛冬初春去黃芩。

華陀愈風散 治產後中風口噤。牙關緊急。手足痠痲。如角弓狀。亦治產後血暈不省人事。四肢強直。或心眼倒。藥吐瀉欲死。此藥清神氣。通血脈。其効如神。

荆芥穗 指迷方加當歸等分  
 右為末。每服三錢。黑豆浮酒調服。或童子小便亦可。口噤者。開灌之。或吹鼻中皆効。○李時珍曰。此方諸書盛稱其妙。姚僧瑒集驗方以酒服。名如聖散。藥下可立効。陳氏方名如聖散。古拜散。通存敬方用古老錢煎湯服。各一捻。許叔微本方云。此藥委有奇効。神聖之功。一婦人產後睡久及醒。則昏昏如醉。不省人事。皆用此藥及交加散。云服後當醒。必以左手搔頭。用之果然。皆驗。產寶方云。此病多因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草受風。而成。宜服此藥也。戴氏證治要訣。名獨行散。實似道悅。隨抄。呼為再生丹。

血風湯 治產後諸風。變急。或痿弱無力。  
 秦艽 羌活 防風 白芷 川芎  
 芍藥 當歸 熟地 白朮 茯苓 各等  
 右為細末。每服三錢。溫酒調服。一半。煉密丸。如桐子大。每服五七十丸。溫酒下。

防風湯 治產後中風。背項強急。胸滿氣短。  
 防風 獨活 各去 葛根 各五 當歸 人參  
 白芍 甘草 炙各  
 右取咀。每服八錢。水一盞半。棗二枚。煎一盞。溫服。  
 雲岐方 治產後中風。半身手足不遂。言語蹇澀。恍惚多忘。精神不足。  
 獨活 當歸 芍藥 防風 川芎

玄參 天麻 各五錢 桂心 三錢

右取以水八升煮取二升半分為三服覺効更作一劑又作九每服二十九○如有熱加葛根五錢○有冷加白朮五錢○有氣證加生薑一兩半○手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃耆四錢○腹痛加芍藥當歸各七錢半○不食加人參五錢玄參一兩○若寒中三陰所患必冷小積命湯加薑煎○若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂一半加薄荷煎

防風羊角湯 治產後氣血不足風邪所襲肢體攣痛背項強直

防風 兩 赤芍 炒 桂心 各半 羚羊角 川芎

羌活 當歸 酸棗仁 炒 牛蒡子 炒各二錢

右剉每服四錢水煎服

濟陰綱目 卷十二 中風 六 天德堂

川芎散 治產後中風身背拘急有如繩束

川芎 羌活 羚羊角屑 酸棗仁 炒

芍藥 炒黃各 桑白皮 一兩 防風 去蘆一兩二錢

右剉每服一兩水煎日進三服

濟危上丹 治產後去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目

頭昏命在須臾此處極生風也急服此藥若以風藥治之則誤矣

乳香 五靈脂 硫黃 玄精石 以上各另研極細

阿膠 炒 蛤粉 卷柏 生 桑寄生 陳皮 去白

右將前四味同研勻入石臼內微火炒再研極細後入餘藥末用生地黃汁丸如桐子大每服五十丸食前溫酒或當歸湯下

此方以獨活一味而治風則妙矣于治虛則本也五

大豆紫湯 治產後風虛五緩六急手足頑麻氣血不調等證

獨活 兩半 大豆 升 酒 升

右先用酒浸獨活煎二三沸別炒大豆令極熟焦爛出以酒沃之去渣每服一二合許得少汗則愈日夜數服一以去風一以消血結如妊婦折傷胎死在腹中服此即產○一方無獨活只用大豆炒焦淋酒服

獨活酒 治產後中風

獨活 斤 桂心 兩 秦艽 兩五

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

雞矢酒 治產後中風及百病並男子中一切風神効

濟陰綱目 卷十二 中風 七 天德堂

烏雞糞 炒黃 大豆 一升 妙令

右二味以清酒三升乘熱先淋雞糞次淋大豆取汁每服一升溫服取汗病重者凡四五服無不愈

交加散 治產先後百病兼治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風並宜服之

生地黃 一升 研取 生薑 十二兩 研

右將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各稍乾焙為細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

一物獨活湯 治產後中風虛人不可服他藥者此藥及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煎服

川獨活 三兩 細切以水三升煮取一升分服飲酒者亦可酒



水煎○白鮮皮亦依獨活法

羌活散 治產後中風語澀四肢拘急

羌活三兩為末每服五錢水酒各半煮服

右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服之可也

○發瘧 一作瘧

郭稽中曰產後汗出多而變瘧者因產後血虛腠理不密故多汗出遇風邪搏之則變瘧也口噤不開背強而直如發瘧瘧者狀搖頭馬鳴身反折須臾又發氣息如絕宜速斅口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手撒空者不可治也

薛氏曰產後發瘧因去血過多元氣虧極或外邪相搏以致牙關漸降綱目 卷十二 中風 八 天德堂

緊急四肢瘧強或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔瘧無汗而惡寒者曰剛瘧由亡血過多筋無所養而致故傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也急以十全大補湯大補血氣如不應急以附子或保無虞若攻風邪死無疑矣

夷堅志云杜王治郝質子婦產四日瘧瘧眼弓背反張王以為瘧病與大豆紫湯獨活湯而愈政和間余妻方分娩猶在瘧中忽作此證頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拘之不直適記所云而藥草有獨活乃急為之召醫未至連進三劑遂能直醫至即愈矣更不須用大豆紫湯古人處方神驗屢矣 陳臨川曰凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰瘧又名曰瘧古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產後諸書有中風口噤

一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有煩傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之

按素問有瘧字而無瘧字仲景太陽經有瘧病而無瘧字則今書中瘧字乃瘧字傳寫之誤也夫勁瘧二字諸體諸聲而瘧之病狀有項背勁急反張之相則從瘧字無疑若瘧字于義莫解故當以瘧字為正且寒主收引風寒在太陽經而項背強直者太陽筋病也諸方皆主續命從仲景論矣郭氏不問產後虛實邪之有無而繫宗之似乎一偏至薛氏又為產後亡血過多非急用十全大補不可若攻風邪死無疑矣又一見也及夷堅志案以大豆紫湯獨活湯而愈者則又主于風矣是續命亦不為妄但本方有麻黃附子于氣血兩虛之人不可輕用而郭氏論瘧瘧綱目 卷十二 中風 九 天德堂

又有速瀉之說稍緩即汗出如雨反不以麻黃為忌何其語之切也二說均不可廢臨證之際詳之可也

小續命湯 治產後汗多變瘧口噤背強或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕

方見前中風 陳臨川云陳無擇評因產後汗出多變瘧亦令服小續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防已黃芩連不若大豆紫湯為佳局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二瘧小續命湯並可加減與之若柔瘧自汗者去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痲痺背強口噤直視煩熱服緊大者不治

方見前中風

大豆湯 治產後卒中風發痲倒悶不知人及娠姪挾風兼治在尋諸疾

大豆五升炒 葛根 獨活各一兩 防已六兩

右咬咀每服五錢酒二盞煎至一盞半去渣溫服不拘時日三服

一方 治產後中風諸弊痲痛自汗出者及餘百疾

獨活八兩 當歸四兩

右咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗

十 天德堂

若中氣者加桂心二兩不遑更作

羚羊角飲子 治產後氣實腹中堅硬兩脇脹滿心中煩熱渴欲飲水飲成剛症中風之疾

羚羊角半兩 防風 羌活 桔梗並去敗葉各八錢

桂心 柴胡 大黃酒浸過烟各一兩二錢

右咬咀每服五錢水一大盞半同煎至一盞去渣溫服不拘時

更服地黃酒用地黃切一升炒令黑甕瓶中下熱酒三升密封

口煮令減半任意服之

防風當歸散 防風 川芎 當歸 地黃各五錢

右剉每服一兩水三盞煎至一盞溫服

婁氏曰續命湯大豆紫湯舉卿古拜散太陽厥陰藥也邪實服

浮弦有力者固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風當歸散治之為妙

○瘕瘕

薛氏曰瘕者筋脈拘急也瘕者筋脈張縱也經云肝主筋而藏血

蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前證因產後陰血去多陽火熾

盛筋無所養而然耳故瘕瘕膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰

散亦多致此治法當用八珍加丹皮鈎藤以生陰血則陽火自退

諸證自愈如不應當用四君芍歸丹皮鈎藤以補脾土蓋血生于

至陰至陰者脾土也故少兒吐瀉之後脾胃虛損亦多患之乃虛

家也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加蒼桂

陽氣虛敗者用十全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體

痿痺脈微細者此為真狀若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當固

本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂

前藥辛香耗散真氣腹理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加

五味子補實勝理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸

愈用逍遙散大補湯調理而痊

一產婦先胸膈乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺

左三部脈弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養經先用加味

逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸證悉愈

一婦人發熱遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脈弦緊余曰

此肝經血燥風熱名瘕也肝主小便其色青入肝則赤法當滋陰

血清肝火。遂用加味逍遙散。不數劑。諸證悉退而安。  
一婦人產後。血風患此。以小續命湯。數服而安。  
產後因虛。傷風痰。同傷寒表證。未傳入裏。宜服防風湯。  
防風湯。治風。虛。發熱。項背拘急。肢體不隨。恍惚狂言。來去無時。  
不自覺悟。亦治脚氣。緩弱甚効。此藥溫和不虛人。

秦艽 獨活 麻黃 前半夏 湯洗防風 去芦各二兩 升麻

防己 白朮 石膏 白芍 黃芩 當歸 去遠志 骨

人參 甘草 各一兩

右為盆末。每服四錢。水二盞。生薑七八分。煎至一盞。去滓。取清汁六分。入麝香末少許。食後。臨臥。帶熱服。

華陀愈風散 方見前中風

治後中風。牙關緊急。不省人事。口吐涎沫。手足痲痺。

天德堂

當歸 荆芥 各等

右為細末。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎至半盞。灌之。如牙關緊急。掣開微灌之。但下咽即生。屢用。救人。大有神效。

增損柴胡湯 治產後感風。證手足牽搐。涎潮皆因。

柴胡 黃芩 人參 甘草 半夏 各一錢

黃芪 石膏 知母 各一錢

右咬咀。分二服。水二盞。生薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

秦九湯 前證已去。次服此藥。去其風邪。

秦艽 芍藥 柴胡 防風 黃芩 各一錢

人參 半夏 甘草 各一錢

此以小柴胡  
台白虎加黃  
芪治虛熱  
飲發瘧  
乃喝明少陽  
藥也。內充血  
藥亦有見  
此方采肝去  
風是肝胆二  
經寒熱藥

石改咀作二帖。每帖加生薑三片。水煎食遠服。

○拘攣

大全云。產後中風。筋脈四肢攣急者。是氣血不足。臟腑俱虛。月內未滿。起早勞役。傷傷臟腑。虛損未復。氣血所乘。風邪冷。初者。于皮膚經絡。則令人頑痺不仁。麻木。少氣。風氣入于筋脈。扶寒則攣急也。

薛氏曰。肝屬木而主筋。前證若肝經風熱。血燥。用加味逍遙散。如不應。當用六味地黃丸。以補腎水。經云。風谷搖氣。精乃亡。邪傷肝也。仍發前難證。諸風血方論治之。

一產婦。產後中風。筋脈攣急。此氣血虛。而自熱也。用十全大補湯而安。

治後中風。牙關緊急。不省人事。口吐涎沫。手足痲痺。

天德堂

一產婦。手麻。服愈風丹。遍身皆麻。神思倦怠。余謂氣血虛弱。用十全大補丸。連服數劑。新愈。其蓋又數劑。及逍遙散而痊。

治一切筋骨拘攣疼痛。蓋因風濕所傷。氣血凝滯。經絡不行。所敷其效如神。

羌活 片子薑黃 甘草 各一錢

當歸 赤芍 白朮 各一錢

右切作一服。加生薑三片。水煎去滓。磨沉香末少許。入內。溫服。上痛食後。服以下痛食前。

芳艽散 治產後中風。四肢筋脈疼痛。攣急。背項強急。

芳艽 羌活 當歸 酸棗仁 羚羊角屑 各七

防風 牛黃 桂心 赤芍 各半兩

此即防風湯  
主產後中風  
兩少風而牛  
其生去皮

利便也

親薛氏所言  
亦先治風后  
補要得其  
厥

右咬咀每服八錢水煎服不拘時

薛氏曰前方如不應當用八珍湯更不應用十全大補湯

防已膏 治產後中風四肢筋脈身骨麻痺

漢防已 半斤 茵芋 五兩

右咬咀用酒五升浸藥一宿取豬脂肪一斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以熱手不住摩膏上千遍

○不語

本論所重在  
散不用破血  
之味為其本  
于虛

大全云人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了又心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

薛氏曰經云大腸之脈散舌下又云脾之脈是動則病舌本強不

濟陰綱目 卷十二 拘攣 天德堂

能言又云腎之別脈上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前此石

心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加

防風白芷脾經風熱秦朮升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風

白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鈎藤鈎

脾受土侮六君加升麻白芷鈎藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛

用四君子氣血俱虛八珍湯如不應獨參湯更不應急加附子

補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱肺熱肢體倦怠飲食

不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口噤腰

背反張手足發搐或小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面

青肝之本也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈎藤

凡新產惡不  
可有

拘攣等遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

李氏曰有臨產服湯藥過多胃濕使然者熱料五積散六君子湯

○痰熱迷心不語者導痰湯或痰氣鬱滯閉目不語者用瓜風散

七珍散 治產後虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不明又心

氣通于舌心氣閉塞則舌亦強故令不語

人參 石菖蒲 生地黃 川芎 各一兩 細辛 錢一

防風 辰砂 五錢

右為細末每服一錢薄荷煎湯調服

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語

生白礬為末每服一錢熱水調下

一方 治產後不語

濟陰綱目 卷十二 拘攣 天德堂

人參 石蓮肉 各一錢 石菖蒲 各等

右剉每服五錢水煎服

逐血補心湯 產後失音不語者心肺二竅為血所侵又感傷風

故也

當歸 一錢 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉 前胡

茯苓 防風 牛胆南星 黃連 枳實 紅花 各一

人參 升麻 各七錢 半夏 二錢 甘草 五分

右剉加生薑三片水煎空心服

○狂言譫語

大全云產後語言顛倒或狂言譫語如見鬼神者其源不一須仔細辨證用藥治療產後驚風語言亂道如見鬼神精神不定者研

細辨證用藥治療產後驚風語言亂道如見鬼神精神不定者研

細辨證用藥治療產後驚風語言亂道如見鬼神精神不定者研



牛夏錢 白芷 陳皮 各一錢 人參 麥門冬 各一錢 牛膝  
 天麻 全蝎 各一錢 甘草 九分  
 右剉作二服 薑三片 葱三枝 入金銀同煎服  
 四物補心湯 治產後言語恍惚 顛倒錯亂  
 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 白朮  
 半夏 桔梗 茯神 各四錢 陳皮 三錢 甘草 一錢  
 右剉為散 分作六服 每用薑三片 水煎空心服 〇有熱加酒炒  
 黃連二錢 無熱不用  
 聖神膏 治失血過多 心神昏悶 言語失常 不得醒卧  
 辰砂 乳香 酸棗仁 炒 人參 茯苓 各一錢 琥珀 七錢  
 右為末 每服一錢 燈心末煎湯調服 或蜜丸 彈子大 薄荷煎  
 湯化下一丸  
 琥珀地黃丸 治心血虛 而言語謬妄  
 琥珀 玄胡索 糯米炒 當歸 各一錢 蒲黃 炒 四錢  
 生地黃 生薑 各二錢  
 右地黃生薑 各另搗汁 留渣 以生薑汁炒地黃渣 地黃汁炒生  
 薑渣 各乾與前四味俱為末 煉蜜丸 如彈子大 每服一丸 當歸  
 湯煎下  
 〇類症  
 大全云 痰產後因驚厥 血冲心 昏悶發狂 如有鬼祟 宜用局方大  
 聖澤蘭散 加好辰砂研令極細 每服加一字 許煎酸棗仁湯調下  
 一服可安

薛氏曰 前證乃血虛 神不守舍 非補養元氣不可 仍參後各門互  
 用  
 一產後患前證 或用大澤蘭湯而愈 後又怔忡 妄言 其症甚重 用  
 茯苓散 補其心虛 又用八珍湯 加好辰砂 而愈  
 一產婦亦患此證 用化痰安神等藥 病益甚 神思恍惚 用  
 脾而氣不足 用大劑參朮 歸茯神 酸棗仁 四斤餘而安 乃以歸  
 脾湯 五十餘劑而愈  
 大聖澤蘭散 治婦人血海虛冷 久無子息 及產後敗血冲心中  
 風口 噤子死腹中 劈開口灌藥 須臾生下 便得無恙 治產後  
 中攻刺疼痛 橫生逆產 胎衣不下 血暈血癖 血滯血崩 血入  
 肢一應血藏有患 及諸證風氣 或傷寒吐逆 咳嗽寒熱 往來  
 濟陰綱目 卷十二 狂言語 天德堂  
 身生瘡 頸痛惡心 經脈不調 赤白帶下 乳生惡氣 胎藏虛冷 數  
 曾墮胎 崩中不定 因此成痰 室女經脈不通 並宜服之 常服煖  
 子宮和血氣 悅顏色 退風冷 消除萬病 兼療丈夫五勞七傷 虛  
 損等病  
 澤蘭葉 石膏 研各二兩 生地黃 一兩 當歸 川芎 芍藥  
 燕莢 甘草 炙 各七錢 肉桂 一兩 厚朴 姜汁 白茯苓  
 防風 細辛 吳茱萸 湯洗 卷柏 柏子仁 微 枯梗 各一  
 黃芪 人參 白朮 丹參 五味子 川椒 去目 炒 白薇  
 川烏頭 炮去 乾薑 炮 藥本 白芷 各七錢 白薇  
 阿膠 碎炒 糯米 兩  
 右為細末 每服二錢 空心臨卧熱酒調下 若急疾 不拘時 日三

服

抱胎九 治產後過驚發狂或週經行發狂

水銀二兩 黑鉛一兩 硃砂一兩 乳香一兩

右將黑鉛入鉢內火鎔開下水銀攪結成砂子下硃砂乳香乘

熱用椰子槌研勻丸如雞頭質大每服一九空心薄荷湯下得

睡勿驚覺覺來即安○妙香散亦善

辰砂遠志九 治產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲 遠志 人參 茯神木 辰砂各三

川芎 山藥 鐵粉 細辛 麥門冬 心

大麻 半夏 南星 白附子 各一

右為末薑汁煮糊丸如菜豆大別以硃砂為衣每服三十九隔

濟陰綱目 卷十二 狂言詬詬 辛 天德堂

臥驚湯下 加味八珍湯 產後顛狂乃血虛神不守舍非補養元氣不可用

此或茯苓散歸脾湯 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎

芍藥 熟地黃 遠志 茯神各二

右剉加姜棗水煎服

○乍見鬼神 與前症狂語門參看

大全云心主身之血脈因產傷以耗血脈致心氣虛其敗血停積

上于于心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛

錯醫人不識呼為風邪如此為治必不得愈但服調經散每服加

龍腦一捻得睡即安

夢在加龍腦

薛氏曰前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八寶丹  
若心血虛損用聖仁散大抵此證皆心脾血少所致故用補血  
氣則痰清而神自安矣若果係見祟所附即灸鬼穴可愈其或不  
起多因驚悸降火攻伐之過也

一產婦患前證或用調經散愈而復作仍服前藥並建瓴湯上湯

胡寒暑熱余朝用八珍湯夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

雲岐治產後發熱狂言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加

甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

調經散乃見前狂言詬詬

琥珀散 治產後痰血攻心迷悶妄言見鬼

人參 茯神 生地黃 阿膠各七 硃砂 各一

濟陰綱目 卷十二 狂言詬詬 辛 天德堂

甘草 琥珀 鐵粉 麝香 各一錢

右為細末每服三錢用金銀煎湯調下

茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度坐卧不安

茯神 人參 黃芪 赤芍藥 牛膝

琥珀 龍齒 生地黃 桂心 各半

右為末每服三錢水煎服

一方 治產後血暈心迷狂亂恍惚如見鬼

生薑母草 三台根 生地黃汁 二 童便 合 雞子清 三

石同煎三四沸後入雞子清攪勻作一服

○驚悸 大全云產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪

所乘也。或恐懼憂怕。令心氣受于風邪。邪搏于心。則驚不自安。若驚不已。則悸動不定。其狀目睛不轉。而不能動。診其脉動而弱者。驚悸也。動則為驚。弱則為悸矣。  
薛氏曰。按人之所主者。心之所主者。血。血一虛。神氣不守。此驚悸所由作也。當補氣血為主。

一產婦患前證。二度服琥珀地黃丸。局方妙香散。隨效。再患服之。其證益甚。而脈浮大。按之如無。發熱惡寒。此血氣俱虛。用十全大補。加味歸脾二湯。各百餘劑。而愈。後遇驚恐。勞怒復作。仍服前藥。加味四物湯。治產後血少。怔忡無時。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 茯神 去木各一錢

遠志 去心 酸棗仁 炒各七分

濟陰綱目 卷十二 驚悸 主 天德堂

右咬阻水煎食遠服

白茯苓散 治產後心神驚悸。言語失常。

白茯苓 人參 熟地黃 各一兩半 黃芪 當歸

白芍藥 遠志 去心 麥門冬 去心 桂心 甘草 各一兩

石菖蒲 桑寄生 各七錢半

右咬阻。每服八錢。水一大盞。半生薑五片。棗三枚。竹葉三七片。煎至一大盞。去滓。溫服。無時。

熟地黃散 治產後心神驚悸。神思不安。

熟地黃 黃芪 白薇 龍齒 各一兩

茯神 去木 人參 羌活 遠志 肉桂 各七錢

桂心 防風 甘草 各半兩

熟地黃 黃芪 白薇 龍齒 各一兩

此藥有風邪

藥之師

右咬阻。每服五錢。水一大盞。半生薑五片。棗三枚。煎至一大盞。去滓。溫服。不拘時。一方無黃芪。有荆芥。  
產乳七寶散 初產後服之。調和血氣。補虛安心。神鎮驚悸。

當歸 川芎 人參 白茯苓 桂心

羚羊角 燒存 硃砂 水飛各一錢 乾薑 一錢

右為細末。每服一錢。用羌活豆淋酒調下。不飲酒。用清米飲調下。○如覺心煩。熱悶。以麥門冬去心煎湯調下。○若心下煩悶。而痛。用薑便調下。○若覺心煩。熱悶。即減薑。桂心。寒却加之。○腹痛。加當歸。○心悶。加羚羊角。○心虛氣怯。加桂心。○不思飲食。或惡心。加人參。○虛煩。加茯苓。○以意斟酌。日二夜一服之。

人參散 治產後臟腑虛。心怔驚悸。言語錯亂。

濟陰綱目 卷十二 驚悸 主 天德堂

人參 麥門冬 去心 茯神 遠志 去心 獨活

防風 生地黃 甘草 炙 天竺黃 另研 龍齒 另研

朱砂 水飛各半兩 白薇 各一錢 龍腦 另研 麝香 另研各一錢

右為細末。每服二錢。薄荷酒調下。不拘時。

琥珀散 治血虛驚悸。少寐。及產後敗血停留。少腹作痛。

琥珀 沒藥 硃砂 並研 當歸 分

辰砂 另研 沒藥 硃砂 並研 當歸 分

右為細末。每服二錢。空心。日午。臨臥。白湯調下。

茯苓散 治產後狂語。志意不定。精神昏亂。心氣虛。風邪所致。

茯苓 一方用 生地黃 各三錢 遠志 白薇 龍齒 各二兩

人參 防風 獨活 各一兩

右為末。以銀一斤。水一斗五升。煮取七升。下諸藥。煮取三升。溫

妙在月銀一



既不宜大汗  
何以用羌活  
二兩所來信  
也下竹瀝一  
升妙甚

分三服忌食豬肉生冷○一方加荆芥二兩甘草二兩緩半  
一方治產後多虛羸弱若大汗利皆至于死此重虛故也若中  
風語謬昏悶不知人者宜服此

人參 茯苓 羌活 遠志 大棗 各二兩 竹瀝 一升

右用水六升煮取二升下竹瀝更煎二升半分三服

歸脾湯 治產後血氣大虛心神驚悸怔忡不寐或心脾傷痛坐  
臥少食或憂思傷脾血虛發熱

人參 黃芪 炒 白朮 炒 白茯苓 龍眼肉

當歸 遠志 炒 酸棗仁 炒 各五 甘草 各五

右加薑棗煎服○如柴胡牡丹皮名加味歸脾湯

遠志丸 治產後臟虛不足心神驚悸志意不安腹中急痛或時  
驚悸綱目

卷十二 天德堂

怕怖夜臥不寧

遠志 去心 麥門冬 去心 黃芪 當歸 炒 人參

白朮 獨活 白茯苓 桂心 栝子仁

山茱萸 石菖蒲 熟地黃 鍾乳粉 阿膠 碎炒各

右為細末煉蜜和搗五七百下丸如桐子大每服三十丸溫酒  
送下不拘時日進三服

白茯苓丸 治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓 熟地黃 各一兩 人參 桂心 遠志 去心

石菖蒲 栝子仁 琥珀 另研各

右為細末煉蜜和搗二三百下丸如桐子大每服三十丸不拘  
時粥飯送下

此溫補法于  
虛寒者宜之  
然心虛則熱  
收于內明熱  
藥又當斟酌

○恍惚  
大全云產後中風恍惚者由心主血血氣通于榮衛臟腑通行經  
絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為風邪所乘則令心神  
恍惚不定也

薛氏曰前證當大補血氣為主而佐以後方為善蓋風為虛証之  
假象也固其本源諸病自退若專治風則速其厄矣

一產婦患前證盜汗自汗發熱喘熱面色黃白四肢畏冷此氣血  
俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始愈後因勞  
怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺余謂肝火熾盛用十  
全大補加鉤藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

千金方 治產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致  
故用如是耳

濟陰綱目 卷十二 恍惚

茯苓 三兩 芍藥 二兩 當歸 桂心 甘草 各

麥門冬 去心 生薑 一兩 大棗 三十

右為散用水三升煎取一升去滓分作兩服

經效方 療產後心虛恍惚志意不定煩躁恍惚

茯苓 當歸 芍藥 人參 麥門冬 去心

酸棗仁 炒 黃芩 甘草 白鮮皮 各二兩 大棗 七枚

右為散末水二升煮取七合去滓溫服

琥珀散 治產後中風恍惚語澀心神煩悶四肢不隨

琥珀 研 茯苓 去心 各一兩 遠志 心 石菖蒲 人參

黃芪 麥門冬 去心 芎藭 赤芍 防風

獨活 桑寄生 羚羊角屑 各半 甘草 炙二

真產後中風  
者且之苦曰  
虛風所為則  
不宜用風藥  
矣

此散前方不  
桂心故非與  
中風者不取  
肝肺與有云  
北方之人與  
中風者相宜  
一兩方之六  
其生風目如  
恍惚驚風  
因不安昏熱  
也何敢用焉

右咬咀每服五錢水煎溫服不拘時

遠志散 治產後中風心忪恍惚言語錯亂煩悶睡臥不安

遠志 去心 防風 去毒 各 當歸 茯神 木 酸棗仁 炒

麥門冬 去心 桑寄生 獨活 去 羚羊角 屑 桂心 各七錢半

甘草 炙 牛

右咬咀每服五錢水煎服

天麻丸 治產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻 防風 羌活 去 朱砂 水飛 各 僵蚕 炒 七

乾蝎 炒 五靈脂 炒 白附子 炮 各 雄雀 炒 牛黃 二錢半 另研 各

右為細末糯米飯為丸如梧子大每服三十丸薄荷酒送下日進二服

濟陰綱目 卷十二 恍惚 天德堂

辰砂遠志丸 主產後中風消風化痰安神鎮心

辰砂 遠志肉 甘草 石菖蒲 人參 茯神 去木 各

川芎 山藥 麥門冬 去心 細辛 天麻

半夏 南星 白附子 鐵粉 各一兩

右為末薑汁煮糊丸如大豆大別以碎砂為衣每服三十丸夜臥生薑湯下

濟陰綱目卷之十二

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文舉子垣氏訂正

西陵 汪 淇 詹子箋釋 天都 查 望子周父纂圖

產後下

虛煩

此產後血虛 虛煩 治法 大全云餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并解心下及臥

太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見

陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後

與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

濟陰綱目 卷十三 虛煩 天德堂

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索 黃芩 各半 桂心 二錢

右為細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散 療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉 一兩 延胡索 二兩 地黃汁 二合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食一日

川芎散 療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黃 白芍 枳殼 各等

右為末酒調方寸七日二服

集驗方 產後血氣煩悶

**右用水二鍾，粳米一合，竹葉十片，煎至一鍾，食遠服。**○**血執驚**

**者加生地黃二錢。**

**竹葉湯** 治產後短氣欲絕，心口煩悶。  
竹葉切細 麥門冬去心 小麥各升 甘草各生薑

**大棗** 十二枚

**右切以水一斗，煮竹葉、小麥至八升，去渣，納餘藥，煮取三升，去渣，溫服。**○**虛悸，加人參二兩。**○**少氣力，加糯米五合。**

**甘竹茹湯** 治產後內虛煩熱，短氣。  
甘竹茹升 人參 麥門冬去心 茯苓 甘草各一黃芩

**右咬咀，以水六升，煮取二升，去渣，分三服，日三。**

**薤白湯** 治產後胸中煩熱逆氣。  
**濟陰綱目** 卷十三 虛損

**薤白** 半夏 人參 甘草各一括攷根

**麥門冬** 半斤 熟甚，加知母、石膏。

**右咬咀，以水一斗三升，煮取四升，去滓，分五服，日三夜二。**

**芍藥梔子湯** 治產後虛煩不得眠。  
芍藥 當歸 梔子 香豉合牛

**白芍** 當歸 梔子 香豉合牛

**右用水二鍾半，先煮前三味，得二鍾，內香豉，煮取一鍾半，去滓，分二服，溫服。**此雖云政法不若仲景酸漿湯得當。

**○以上治血氣虛煩之劑。**

**仲景二物黃芩湯** 婦人在草蓐，自發露得風，四肢苦煩熱，頭痛者，與小柴胡湯，頭不痛，但煩者，此湯主之。

**黃芩** 苦參 乾薑 黃四

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲  
 竹皮大丸 治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣  
 生竹茹 石竹分 桂枝 白薇各一 甘草七  
 右五味為末棗肉和丸如彈子大以飲服一丸日三夜二服○  
 有熱倍白薇○煩喘加栝實一分  
 ○已上治中風煩熱之劑  
 經驗方 治產後煩躁此重可去怯之義  
 禹餘糧一枚狀如酸棗者入地埋一半四面緊築用炭一秤  
 發頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕土壘一宿方取出  
 打去外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再  
 研數千遍用甘草湯調二錢七只一服立効  
 濟陰綱目 卷十三 虛煩 四 天德堂  
 ○發渴  
 熊氏曰產後心煩發渴宜清心蓮子飲  
 薛氏曰前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白木麥  
 門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸身湯若血虛發熱用八珍加  
 麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中  
 益氣湯或七味白木散  
 一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣  
 俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補  
 血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復  
 李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門  
 冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參三錢麥門冬一

錢半熟地黃七分天花粉三錢甘草五分糯米搗碎煎服  
 千金竹葉湯 秦產後虛渴少氣力  
 竹葉升 人參 茯苓 甘草各一 小麥  
 麥門冬兩半夏 生薑兩各三 大棗十五  
 右咬咀以水九升先煮竹葉小麥棗取七升去滓入餘藥再  
 煎取二升每服五合日三夜一  
 竹葉歸身湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者  
 竹葉一錢 黃耆二錢 人參 白木 當歸各  
 麥門冬七分 甘草分五  
 右剉水煎服  
 熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味  
 濟陰綱目 卷十三 發渴 五 天德堂  
 熟地黃酒洗一 人參 麥門冬去心各 括蕒根錢  
 甘草分五  
 右咬咀作一服加糯米一撮生薑三片棗二枚水煎服  
 七味白木散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致  
 人參 白木炒 白茯苓 甘草 藿香  
 木香 乾葛各一  
 右剉一服水煎服  
 清心蓮子飲 治產後心煩發渴  
 麥門冬去心 黃芩 地骨皮 車前子  
 甘草錢半 人參 黃耆 白茯苓  
 石蓮肉分半 一方加遠志石菖蒲各一

方 治產後中風煩渴。

人全云凡產後忽冒悶汗出不識人。治用歸子及竹瀝二法見前血暈。

薛氏曰：前證曰大虛宜固元氣為主。其汗不止必變為癰疽。先服此藥。人分晚及半產。下昏目眩。蓋因血暴亡而火上熾。但補其血則神自安。若常時血下。當補而升。舉其氣陽得此而神安。則目明矣。今立一方以補手足厥陰之血。兼益陽氣。名曰全生活血湯。

**黃耆湯** 治產後虛汗不止  
黃耆 白朮 防風 熟地黃 牡蠣粉  
白茯苓 麥門冬 去心 甘草 各五分

右切作三服。加大棗一枚。水煎服。

**麻黃根散** 治產後虛汗不止  
當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣粉

**濟陰綱目** 卷十主自汗 八 天德堂

人參 甘草 各五分

右剉每服四錢。水煎服。

**止汗散** 治產後盜汗不止。一應汗多者。皆可服。  
牡蠣粉 小麥麩 各等分

右和勻。煮生豬肉汁。調下二錢。無時。

**黃歸二黃湯** 治產後自汗盜汗。胃氣虛弱。服別藥則嘔吐。不能食。  
當歸 黃耆 各一 麻黃根 半

右咬咀。每服三錢。水煎服。○一方無麻黃根。用白芍藥。

**黃歸六黃湯** 治血氣虛弱。盜汗不止。  
當歸 黃耆 熟地黃 生地黄 黃蘗 各二

黃芩 炒 黃連 炒 各一

右水煎服。○不應加入參白朮。○心血不足。加酸棗仁。

**人參湯** 治產後諸虛不足。發熱盜汗。  
人參 當歸 各等

右為末。以猪腰子一隻。去脂膜。切小片子。以水三升。糯米半合。葱白兩條。煮米熟。取清汁一盞。入藥二錢。煎至八分。溫服。不拘時。

**參附湯** 治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼痛。吃逆不食。或汗多發瘧等証。  
人參 附子 炮五錢

右作一服。加薑棗水煎。徐徐服。

**著附湯** 治陽氣虛脫。惡寒自汗。或口噤痰湧。四肢逆冷。或吐瀉。  
附子 炮五錢

**濟陰綱目** 卷十主自汗 九 天德堂

腹痛。飲食不入。及一切虛寒等証。  
黃耆 一兩 附子 炮五錢

右作一劑。加薑棗水煎。服如不應。倍加附子。方得全濟。

**千金方** 治產後風。虛汗出。小便短少。四肢拘攣。難以屈伸。  
甘草 兩 附子 炮 桂心 芍藥 各一

右剉。每服三錢。加生薑四片。棗二枚。水煎服。忌豬肉冷水生菜葱等物。

**全生活血湯** 治產後自汗盜汗。目眩。四肢無力。口乾。頭暈。行步艱側。  
升麻 芍藥 各三錢 當歸 柴胡 防風 羌活 獨活 葛根 甘草 各一錢 川芎

○發執

卷十三

十

天德堂

魂散一服得微汗而愈

產已十月矣于是請證悉平

狂言呼奔走

卷三

土  
天德堂

生蒲黃一錢服卽定惡露旋下而安

婦人發時發昏身熱汗多眩暈口

勿。京。血。之。一。兩。而。不。減。久。用。不。喪。用。兩。益。其。口。山。至。參。尋。亦。字。注。特。

中。淡。血。之。養。症。不。源。又。用。小。柴。胡。湯。至。山。至。高。存。服。治。洪。搏。

推下口庫後而得是脉又且汗多而脉不爲汗衰法在不治所幸

者不喘不泄耳其脉如是益涼藥所激也用人參三錢真蒼一錢

甘草黃歸各七分白朮明冬各一錢  
乾薑薑朮黃芩各五分煎服

五。水次所安。

五。用劍刺渾安。

王愈。宜人。產後因沐浴發熱。嘔惡渴飲。飲冷水瓜果。諸君狂

飲食不進體素豐厚不受暑邪用清涼之劑熱增甚診得六脉浮

大洪數王國產後暴損氣血脈弱外乎內寒而小兒熱且大補

氣血思入今易甲回毒入分此戰之所入以爲不其甚與

氣血異毛。沙力炮。五。八。分。當。加。力。生。招。人。自。以。毒。不。宜。參。清。不。

人平則氣平。宜再服過一日復大熱如火復與前劑。潛加參黃。連服二三服。熱退身涼而愈。

丹溪曰。產後發熱。用參木黃芪。陳皮當歸。川芎炙甘草。煎服。則加茯苓。淡滲之。其熱自除。重則加乾薑。或云大熱而用乾薑。何也。曰。此熱非有餘之邪。乃陰虛生內熱耳。蓋乾薑能入肺分。有肺氣又能入肝分。引衆藥生血。然不可獨用。必與補陰血藥同用。此造化自然之妙。非天下之至神。其孰能與於此耶。

王節齋云。凡婦人產後。陰血虛。陽無所依。而浮散於外。故多發熱。治法用四物湯補陰血。而以炙甘草。黃芪之類溫從。治收其浮散。使歸依於陰。然產後脾胃虛。多有過食飲食。傷脾而致發熱。在血虛則不効矣。但遇產後發熱。須審問。食何飲食。有無傷積。若有胸膈

濟陰綱目 卷十三 發熱 三 天德堂  
飽悶。噯氣。泄瀉等證。只作傷食治之。若發熱而飲食自調者。方用補血正法。

丹溪方 治產後發熱  
當歸 川芎 黃耆 人參 白朮

白茯苓 各一錢 甘草 各五分  
右剉水煎服。○熱甚加乾薑

加味四物湯 治產後陰虛血弱發熱  
當歸 川芎 白芍 熟地黃 白茯苓 各一錢

石水煎服。○熱甚加炒乾薑。○虛煩加茯神。遠志

抽薪散 治產後血虛發熱  
當歸 熟地黃 各四錢 乾薑 炒黑 一錢

少者則不惟從。右剉一劑水煎服。治產後諸虛不足發熱。盜汗

人參散 治產後諸虛不足發熱。盜汗  
方見前自汗

人參當歸散 治產後去血過多。血虛則陰虛。陰虛生內熱。令人心煩短氣。自汗頭痛

方見前虛煩  
加味逍遙散 治產後發熱。口乾作渴。唇裂生瘡

當歸 白芍 乾葛 各二錢 生地黃 四錢  
黃芩 各一錢 柴胡 一錢 人參 麥門冬 各九分 烏梅 二個

甘草 六分  
右剉散。分作二服。用水一鍾。煎七分。空心服

濟陰綱目 卷十三 發熱 三 天德堂  
犀角飲子 治產後亡津液。虛損時自汗出。發熱困倦。唇口乾燥

犀角 麥門冬 白朮 各半兩 枳殼 一錢  
地骨皮 生地黃 當歸 人參 茯苓

黃耆 黃芩 甘草 各七錢  
右咬咀。每服四錢。入生薑二片。浮麥七十粒。同水煎

三合散 治產後日久虛勞發熱。即四物四君子  
當歸 川芎 白芍 熟地黃 白朮

白茯苓 黃耆 各一錢 人參 柴胡 各錢 黃芩 半夏 甘草 各五分  
右作一服。加生薑三片。紅棗二枚。水煎食前服



何為敗血入肺  
則肺則寒  
郭稽中曰產後乍寒乍熱者何否曰陰陽不利敗血不散能令  
寒乍熱產後血氣虛損陰陽則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或  
寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺  
則熱入於脾則寒若誤作瘧疾治之則誤矣陰陽不和宜用桂枝四  
物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血  
也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減  
陳無擇評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止  
入脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱  
只可云敗血循環流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解  
則休過再會而復作太調經散五積散入煎煎佳  
薛氏曰產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之証經云陰  
濟陰綱目 卷十三 莊東來集 西 天德堂  
虛則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用  
發表降火若寸口脈微各陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒須  
用補中益氣湯尺部脈弱各陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱  
用六味地黃丸大抵陰不足陽在從之則陽內陷而發熱陽不足  
陰在從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故  
惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元  
氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若飢熱大渴引飲目赤面  
紅此血虛發熱用當歸補血湯若認爲實則誤矣  
一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢  
體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯惡惡寒發熱抽掣牙痛  
候其脈視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土  
欲飲內傷

飲食停滯而作用六君加木香一劑而安  
一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒  
用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛之不信仍服一劑不出  
止諸語不絕煩熱作渴肢體抽掣余用十全大補湯二劑並其脉  
洪大重按如無仍以附子四劑稍緩數劑而安  
吳夢山治一婦人產後去血過多食後有飽悶疼身痛寒熱如瘧  
左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食飲失火也二蒼因虛而得  
宜發正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃芩羌活黃芩皮芩三服汗  
出身涼其患漸差然後以八物湯調理半月後全愈一婦產後惡  
露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料五積散五帖惡  
露自下而寒熱除  
濟陰綱目 卷十三 莊東來集 五 天德堂  
又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊  
而弦以葱白散二帖安  
一少婦初產四日治物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少心煩  
滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽掣頭  
類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而  
行血以藥涼退實熱如此半月不効汪至見醫補虛亦謂補其  
脉而脈遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露  
已下未必還有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客於經  
絡所以發生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患  
方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗許臭不可近患人覺後病  
勢漸減然後以人參養榮湯數十帖月餘如初

此藥小柴胡湯而重加麻黃者所以散寒也若所以和血也本草以麻黃同芍藥不即產寒者辨正宜如何為不用宜思之

柴胡四物湯 治產後往來寒熱及日久虛勞微有寒熱脉沉而數

當歸 川芎 白芍 熟地黃 各一錢 柴胡 一錢

人參 黃芩 半夏 甘草 各三錢

右剉每服一兩水煎服

增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮

川芎 白芍 各等分

右咬咀每服八錢加生薑五片棗二枚水煎服

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

濟陰綱目 卷十 往來寒熱 夫 夫德堂

當歸 芍藥 川芎 人參 乾薑 各一兩

甘草 炙半兩 ○右咬咀每服四錢加生薑三片水煎服

釋曰此方治陰陽不和乍寒乍熱之寒熱不治惡露未盡血滯胞絡小腹急痛之寒熱宜詳之

更生散 治產後去血過多或不止或眩暈眼暗口噤發熱增寒

人參 當歸 熟地黃 各一兩 川芎

荆芥穗 香油炒上燒過 乾薑 炒黑各三錢

右剉水煎空心服 ○如血天下不止加龍骨赤石脂各火煨等分每二錢同煎藥調服外以五倍子末津調納臍中即止

天調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿背氣血未平之所為也

產後惡寒壯熱一夜三五度惡語口中生瘡時時乾嘔困之悶絕

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風

青竹茹 遠志 各一 茯神 二兩 白蘗 二兩半

玄參 三兩 竹瀝 一升

右取銀一觔水一斗五升煮取七升而諸藥重煮取三升分溫

三服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯脇心煩悶

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二 桂心 甘草 各一

右咬咀用水五升煮取二升半分三服○一方不用桂心用生

地黃

濟陰綱目 卷十三 瘧疾 六 天德堂

○瘧疾

更氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜紫胡四物湯

補道云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者清胃湯

不已者七寶飲截之

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒

傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮香如外邪多

而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯飲

食勢役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六

君加黃桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒氣血

則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉下食

腹痛煩渴發熱諸語或手足逆冷寒戰如慄雖見自證當補其病

自退若誤用清脾截瘧之類多致不起

一產婦患瘧熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸暖氣

此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作

酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計

進飲食七十餘碗腹始悶令用豬膽汁導而通之其熱不甚燥

伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脈證稍得又用參朮煎膏

佐以歸脾湯百餘劑而瘧

一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣煎服

百餘劑而愈一產婦久患瘧百餘劑世間豈有此治法此非藥之効

乃病久自息耳丹溪立齋用藥多如此殊為可笑

草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

半夏 炮 赤茯苓 甘草 炙 草果 炮去 川芎

陳皮 白芷 各二 青皮 白豆蔻 紫蘇 各二

乾薑 四錢

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎當發日侵早連服

二服無有不安者

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 生用 半夏 陳皮

甘草 大棗 核 生薑 各五

右八味剉碎和勻一半用生一半用熟紙裹煨令香熟去紙與

生者和勻每服五錢水煎食前一服食後一服



柴胡四物湯 治產後日久虛勞而脈浮大者  
 方見前往來寒熱  
 三合散 治產後日久虛勞。鍼灸服藥俱無効者  
 方見前發熱  
 雲岐熱地黃散 治產後勞傷皆由體虛。氣力未壯。勞復所起。四  
 肢煩疼。時發寒熱。不思飲食  
 熟地黃 八分 人參 白芍 白茯苓 白朮  
 續斷 各一兩 黃耆 當歸 川芎 五味子  
 桂心 各七錢半  
 右咬咀。每服四錢。生薑三片。棗一枚。水煎服。○大千方有麥門  
 冬七錢半。○一方無桂心。五味續斷有。柴胡黃芩半。夏各七錢  
 半。  
 黃耆丸 治產後勞傷寒熱進退頭目眩痛。骨節痠疼。氣力羸乏  
 黃耆 紫甲 當歸 各一兩 川芎 白芍  
 桂心 續斷 牛膝 菴菴 栝子仁  
 沉香 枳殼 各七錢半 五味子 熟地黃 各半  
 右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服四五十丸。食後粥飯下  
 石子湯 療產後虛羸喘乏。乍寒乍熱。如瘧。四肢疼痛。面色痿黃  
 名曰辟癆  
 猪石子 一雙。去脂。香豉 一方。無此。葱 切。粳米  
 當歸 白芍 各二兩  
 右咬咀。分兩劑。每劑用米三合。煮取一小碗。去滓。分三服。○廣

濟方無白芍有人參。○許仁則方無香豉。有生薑。二兩。桂心一  
 兩。葱白止一兩。  
 人參當歸散 治產後勞傷。皆由在產內未滿。白。體中虛損。血氣尚  
 弱。失於料理。或勞動作傷。致成羸勞。其狀虛羸。乍起乍臥。飲食  
 不消。時有咳嗽。頭中昏痛。發熱無常。夜自盜汗。寒熱如瘧。背膈  
 拘急。沉困在牀。服此大効。  
 黃耆 當歸 各一兩 牛膝 七錢 人參 白茯苓  
 當歸 白芍 桑寄生 麥門冬 熟地黃  
 桃仁 桂心 甘草 各半 續斷 二錢  
 右為細末。每服先以猪腎一對。去筋膜。以水兩大盞。生薑半兩。  
 棗三枚。煎至一盞。去渣。留汁。煎藥。末二錢。葱白三寸。烏  
 梅一箇。荆芥五穗。煎至七分。去滓。空心晚食前溫服。神効。  
 胡氏牡丹散 治產後虛羸。發熱自汗。欲變羸勞。或血不調。可  
 候不調。或寒熱羸瘦。  
 當歸 白芍 人參 五加皮  
 地骨皮 各半 牡丹皮 三錢 桂心 沒藥 各二錢  
 右為細末。每服二錢。水酒各半。蓋如不飲酒。只用水一盞。開元  
 錢一枚。麻油鹽之同煎七分。去滓。通口服。煎不得撻喫。不得吹  
 黃耆散 治產後勞傷。肌膚黃瘦。面無顏色。或憎寒壯熱。四肢  
 痠疼。心煩頭痛。  
 當歸 黃耆 牛膝 各七錢 當歸 白芍 熟地黃  
 人參 白茯苓 麥門冬 桑寄生 桂心 甘草 各半



黃雌鷄湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌鷄一隻去翅足頭 當歸 白朮 熟地黃

桂心 黃耆 各半兩

右先以水七鍾煮鷄至三鍾每用汁一鍾藥四錢煎日三服

產寶方 治產後虛羸不生飢肉

黃耆 當歸 白芍 人參 各三錢

甘草 川芎 生薑 各四錢 大棗 十二枚

右九味用水七升煮三升分溫三服

一方 治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不止

黃耆 當歸 人參 生薑 各二錢 淡豉 三合

豬膏 二斤 粳米 三升 薤白 三合

濟陰綱目 卷十三 三六 天德堂

右以水一斗五升先煮豬膏取六升下諸藥煮取二升分爲三服

又方 豬膏一雙煮入葱或作臘如常食之

○宿悶

郭稽中曰問產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定

食難太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上熏胸中是以口乾燥

渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服

見視丸則愈

釋曰爲食難者之戒南人甚少於諸飲食皆能致疾不必拘於

一麵也

陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩外

所不識者有傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四

物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱者屬何經當隨經爲治

難以備舉飲食所傷見視丸却能作湯

薛氏曰前證若宿食停滯用六君枳實神麴若因肉食所致更加

山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔

此脾胃受傷用六君子湯或噤酸噎腐加炮薑作湯更加升麻如

不應佐以四神丸或間用補中益氣湯

一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便若去不去服消導之藥不勝

飲食日減飢饉日瘦半年矣余謂此食積爲患用大酒麴炒爲末

溫酒調服二錢俄而腹鳴良久仍下痞而愈

一婦人食魚肝腹痛出痢諸藥不應用陳皮白朮等分爲末以陳

濟陰綱目 卷十三 三七 天德堂

皮湯送下數劑而愈

見視丸 治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛

黃耆 草澄茄 良薑 三稜 蓬朮 各等分

人參 陳皮 各半兩

右爲細末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛取餘汁煮麴丸如桐

子大每服三五丸蘿蔔湯或白湯下

○腹脹

郭稽中曰產後腹滿嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受

之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐

逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干更傷正

氣疾愈難治但服抵聖湯則愈



薛氏曰：前證若敗血傷於胃，宜用前方。若飲食停於脾，宜用之。  
 若加厚朴，若飲食傷於胃，宜用六君子湯。大凡損其脾胃，宜節其飲食為善。  
 一產婦患前證，或用抵當湯，敗血已下，前證益甚，小腹堅硬，似欲去後，余謂此脾氣虛而下陷，用補中益氣湯，加炮薑溫補脾氣，血脈如故，又用六君子湯而安。  
 抵當湯 治產後腹脹滿悶，嘔吐不定，蓋敗血入於脾胃，而脾不能運化，故胃不能納，以致嘔吐腹脹等症。薛氏曰：此方亦能治血立止，其功甚速，宜以有和胃益氣之物。  
 赤芍藥 半夏 澤蘭葉 陳皮 白人參 甘草 各五分  
 右作一服，加生薑三片水煎溫服。○惡露過多者，去澤蘭葉。  
 藥倍加陳皮生薑  
 濟陰綱目 卷十三 產後 天 天德堂  
 香砂養胃湯 治產後嘔吐，飲食不下，腹脹者，此敗血攻於脾胃之間，日久成反胃之症。  
 半夏 白朮 陳皮 茯苓 厚朴 香附子 各八分  
 人參 蒼朮 砂仁 檳榔 草果 各五分 甘草 四分  
 右剉如生薑三片，烏梅一箇水煎服。  
 如味六君子湯 治飲食停滯于脾，以致腹脹嘔吐。  
 人參 白朮 茯苓 甘草 炙甘草 陳皮 各白  
 半夏 湯泡厚朴 姜製各一錢  
 右剉如生薑三片水煎服。  
 治產後腹脹 治產後腹脹  
 厚朴 蒼朮 砂仁 陳皮 甘草 人參 各一

右剉水煎服  
 紫金丹 治產後衝胸中有物，狀如噎氣。  
 代赭石 礞石 各等分  
 右為細末，醋糊丸，如桐子大，每服三五丸，酒下，胸中痛加當歸湯下，久服治血癖。  
 又方  
 代赭石 桃仁 各等分 大黃 半兩  
 右為末，薄荷水打糊丸，如桐子大，每服三五丸，溫水下，無時。  
 白聖散 治產後腹大堅滿，喘不能臥。  
 樟柳根 二兩 大戟 一兩 甘遂 一兩  
 右為極細末，每服二三錢，熱湯調下，取大便宜利為度，此主水氣之聖藥也。此藥峻利，不可輕用。  
 ○浮腫  
 郭精中曰：產後四肢浮腫者，敗血乘虛停積，循經流入四肢，留注日深，却還不得，腐壞如水，故令面黃，四肢浮腫，醫人不識，便作水氣治之，投以甘遂大戟等藥，以導其水，夫產後必虛，又以藥虛之，是謂重虛，往往多致夭枉。但服小調經散，血行腫消，則愈。  
 陳無擇曰：產後浮腫多喘，有白懷胎，腫至產後不退者，亦有產後失於將理，外感寒暑，風濕內則喜怒憂驚，血與氣搏，留滯經絡，氣分血分，不可不辨。要當隨所因脈證治之，小調經散治血分固效，但力淺難憑，不若吳茱萸湯、枳朮湯、導滯散、大調經散，皆要藥也。又論曰：夫產後勞傷血氣，腠理虛，則為風邪所乘，邪搏於氣，不得



宜越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也

潔古云如產後風寒在表面四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度如浮腫至膝喘嗽如木香檳榔倍之謂氣多也如浮腫又頭痛昏目加羌活川芎謂風多也如只浮腫止七聖丸本方服

東垣云中滿分消丸見腫用四物湯吞之丹溪云產後腫必用大補氣血為主少助以蒼朮茯苓使水自利薛氏曰前證若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中益氣當參雜證本門主治

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足用補

中益氣湯方用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸此

為不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加

蒼湯而泄瀉愈用補中益氣而脾陽健

杜氏治張宜徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月

不差病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮

腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛寵小便不澀不作

咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用益血和氣

藥治之旬日病去七八經半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散

也其方云治血臟風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病如神

更名損金湯者是也杜升散

一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因敗血流入經絡滲入四肢氣

喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用桃仁化湯散汗清

腫服小調經散用澤蘭便煎湯調下腫氣漸消

大調經散 治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見前往來寒熱

小調經散 治敗血乘虛停積流入經絡四肢浮腫

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各二

細辛 麝香各五

右為細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

經驗方 治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

消陰綱目 卷十三 天德堂

乾漆 大麥芽 各等

右各為細末以新瓦礫子中鋪一重麥藥一重乾漆如此填滿

用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下

二錢

白木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實 兩 白木 三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服腹中更即滿

散也

正脾散 治產後遍身浮腫及治婦人大病後脾氣虛弱中滿腹

脹等症

蓬莪朮 香附子 童便 茴香 甘草 陳皮 各等

右爲細末每服二錢燈心草木通湯下

小調中湯 治產後一切浮腫但用此藥無不效者

茯苓 當歸 白芍藥 陳皮 白米 一錢

右切作一劑煎湯調後藥末

沒藥 琥珀 桂心 細辛 麝香 各五分

橘皮酒 治產後肌浮以此行氣

橘皮爲末每服二錢酒調服

丹溪方 婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行氣可也

白木 二兩 陳皮 兩 川芎 半 木通 六 茯苓 三

右用水煎下與麝香二十五丸

濟陰綱目 卷十三 浮腫 三 天德堂

李觀政 治產後虛腫滿促利小便則愈

生薑 三兩 白麵 三 大半夏 七

右以生薑汁搜麝香半夏爲七餅子煨熟爲末水調一盞小便利爲效

張氏方 治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防己 各等分

右爲末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防己散 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防己 獨活 枳殼 桑白皮 各一兩 商陸 甘草 各七

右爲末每服四錢生薑三片水煎空心溫服

七聖丸 治產後風氣壅盛面目四肢浮腫涕唾稠粘咽乾口燥

心脇脹滿大便秘小便赤 不安

肉桂 去 川芎 大黃 檳榔 木香 各半

羌活 郁李仁 去皮各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後溫湯下○山嵐瘴地最宜服量虛實加減○如浮腫又頭痛骨痛加羌活川芎謂風多也○如只浮腫此用本方

加味吳茱萸湯 治婦人臘氣本虛宿挾風冷胸膈痛脇腹絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產臘氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸 一兩 乾薑 桂心 防風 細辛 當歸 牡丹皮 赤茯苓 半夏 桔梗 麥門冬 甘草 各半

濟陰綱目 卷十三 浮腫 三 天德堂

右爲末每服四錢水煎食前熱服

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參 白茯苓 熟地黃 小茴香 各三 白木 錢 各四 當歸 白芍 香附子 各五 柴胡 黃芩 甘草 各一

右剉散分作六七服每服如生薑三片水煎空心熱服盡此藥方服調經丸○若肚痛加延胡索乾漆枳殼各三錢○若嘔吐惡心加良薑砂仁各二錢○若手足麻痺加肉桂一錢半○若咳嗽加五味子款冬花杏仁

加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰痛重脚腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱脹其効如神此證多因脾胃虛

而命門之氣  
藏於腎中  
土之居主化  
津液以和  
就故腎氣盛  
則土旺而水  
有所滋白無  
之滋之患若  
火實則氣不  
化而水液凝  
則上焦不  
而下行其  
有水虛之  
此方無性  
大以生土  
能化氣以  
水此所以  
為滋陰之  
藥也若於  
脈又非而  
濟陰綱目

弱治失其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

熱地黃 四兩酒 白茯苓 三山藥 山茱萸 澤瀉

牡丹皮 牛膝 車前子 官桂 附子 附子 附子

右為求和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空心白湯下

○積聚 血積即見枕宜察看

大全云夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲

食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部

聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其

部聚兼陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑虛

弱為風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也

薛氏曰前證乃真氣虧損邪氣乘之況產後得之尤當固其氣為

主若求旦夕之效而改其邪則速其危矣當於前難証積聚諸方

論治之

一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛

則皎白脉浮而澀余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破血行氣

痛益甚轉動無常又認以為血虛專用破血馳逐之藥痛攻兩脇

肚腹尤甚益信為血虛確服下血等藥去血甚多形氣愈虛肢節

間各結小核隱於肉裏以為贅子畏藥而走於外余曰肝藏血而

養諸筋此因肝血復損筋涸而變結耳蓋肢節胸膈皆肝膽部

分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸

脾湯加減調治而愈

一婦月經不調兩脇腫脹小便澀難腹中一塊作痛或上攻脇腹

或下攻小腹發熱熱惡寒肌膚消瘦飲食無味殊類癆症久

不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而

愈

大全云新產後有血與氣相搏而痛者謂之癥瘕之言似也謂其

痛浮散無定處也此由風有風令血氣不流而血下則少故致

此病不急治則多成積結妨害月水輕則前證重則不通也

薛氏曰前證乃寒邪乘客氣血凝結此因產後血虛也當補養

胃氣調和月經寬緩盡養為善難經云任脈之病男子為七疝女

子為瘕瘕當於前後各論治之

河間乃藥湯 治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥 黃芩 茯苓 各六

濟陰綱目 卷十三 積聚 天德堂

右劉散每服半兩水煎溫服日三

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸 去蘆 川芎 赤芍藥 乾薑 各

右為細末每服二錢食前同溫酒調服

一方 治血虛作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸 芍藥 桂心 血枯 蒲黃 各

立胡索 右為末每服二錢空心熱酒調下

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢

麻痺煩疼

桂心 當歸 赤芍 牡丹皮 沒藥 檳榔

乾漆 青皮 厚朴 三稜 玄胡索 大黃

桃仁 去皮 微甲 一兩

右為細末，煉蜜丸，如桐子大，每服三四十九，食前溫酒下。

產後方 瘀血腹痛無定處

童便三升

生地黄汁

生薑汁

生甘草汁

生黃連汁

生白朮汁

生白芍汁

右先煎前三味，約三分減，二次下，薑汁慢火煎，如稀飴，每服取一合，煖酒調下。

于金方 療血瘕

生乾地黄

烏賊魚骨

右為細末，空心溫酒調服二錢七。

○產後

大全云：產後霍亂，氣血俱傷，臟腑虛損，或飲食不消，胸胃風冷，所

濟陰綱目 卷十三

三六

天德堂

錢陰陽不順，清濁相干，氣亂於腸胃之間，其邪相搏，冷熱不調，上

吐下痢，故曰霍亂也。經云：渴而飲水者，五苓散；寒而不飲水者，理

中丸。大段虛冷者，加附子來復丹亦妙。

薛氏曰：一產婦停食霍亂，用霍香正氣散之類，已愈後，胸腹膨脹，

飲食稍過，即嘔吐，或作瀉。余謂此脾胃俱虛，用六君子湯，加木香

治之，漸愈。後因飲食失調，兼患霍亂，胸腹大痛，手足逆冷，用

附子散，又用八味丸以補土母而康。設此痛無補法，而用辛散，或

用平補之劑，必致不起。

一產婦吐瀉，酸面目浮腫，此脾氣虛寒，先用六君子湯，益氣為主，

佐以越鞠丸而嘔噎愈，又用補中益氣加半夏，而脾胃康。

四生散 治一切霍亂吐瀉極效

方見胎前霍亂

五苓散 治霍亂渴而飲水者

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

桂

右剉作一服，水煎服。

理中丸 治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉，飲食少，懸肚腹膨脹

人參

白朮

乾薑

甘草

右為末，米糊丸，如桐子大，每服一丸，嚼細白湯下。

白朮散 治產後霍亂吐瀉，腹痛煩渴，手足逆冷，或大便不實

白朮

橘紅

麥門冬

去心人參

乾薑

甘草

右剉，每服四錢，水煎服。

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

濟陰綱目 卷十三

人參

白朮

當歸

草豆蔻仁

乾姜

厚朴

右為末，每服三錢，水煎服。

附子散 治產後霍亂不止，手足逆冷

附子

桂心

吳茱萸

丁香

當歸

白朮

人參

橘紅

甘草

右為細末，每服二錢，粥飲調服。

高良薑散 治產後霍亂吐利，腹中疝痛

高良薑

當歸

草豆蔻仁

白朮

右為細末，每服二錢，用粥飲調下。

○右二方，非真寒不可用。

有虛寒者  
之別焉  
主治的症  
為有虛寒

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭眩寒熱或霍亂吐瀉  
作瘧疾

藿香一錢 桔梗炒 大腹皮 紫蘇 茯苓 白朮 炒  
白芷 半夏 陳皮 厚朴 各一錢 甘草五分  
右剉加薑棗水煎服

來復丹 治伏暑吐瀉身熱脈弱其效如神當卒間須用此藥

硝石 一兩同硫黃火上微炒用柳木條攪拌砂子不可火大 舶上硫黃

太陰玄精石 各一兩 五靈脂 砂 青皮 陳皮 各二兩

右為末醋糊丸如小豆大每服三十丸空心米飲下○易簡方

云硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫黃性熱若作煖藥以

止瀉誤矣蓋用啖食生冷或胃暑熱之氣中脫閉結揮霍變亂

濟陰綱目 卷十三 天德堂

非此藥不能通利三焦分理陰陽其功甚效而速

一方 治吐逆不受湯藥者

伏龍肝為細末每服三錢米飲下

○嘔吐

夫全云大胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則

臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故

嘔逆不下食也

薛氏曰前證若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯

飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯

脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用黃黃

散肝木侮脾土用六君子升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸

嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯  
養有生者

此病應生  
一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食  
日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝  
夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次  
調理而痊

香薷丸 治產後嘔不止者

丁香 辰砂 另研各五靈脂一錢

右香脂先研後入砂再研勻用狗膽或豬膽丸如鷄頭大每服

一丸生薑陳皮湯磨下

蒲黃散 治產後三四日惡露不下嘔逆狂熱

濟陰綱目 卷十三 天德堂

芍藥二兩 當歸 知母 生薑 蒲黃 各二兩

紅花 荷葉心中蒂 生地黃汁 一盞

右咬咀水二升煎至一升去渣下蒲黃煎數沸空心分三帖

橘紅半夏湯 治產後胃虛嘔逆

橘皮 半夏 甘草 各一兩 藿香 三兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

人參 訶子 甘草 各一兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

薑朮散 治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮 一兩 生薑 半兩

右剉作一服酒水各二升煎取一升分三服  
 石蓮散 治產後胃寒咳嗽嘔吐不食或腹作脹  
 石蓮肉 半兩 白茯苓 兩 丁香 半兩  
 右爲細末每服三錢用薑湯或米飲調下日三服  
 錢氏益黃散 治脾胃虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚腹作  
 痛或大便不實手足逆冷等症  
 陳皮 兩 青皮 兩 訶子肉 兩 甘草 錢 丁香 各二錢  
 右爲細末每服四錢水煎服  
 加味四君子湯 治產後嘔逆不已  
 人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮  
 藿香 砂仁 各等分  
 濟陰綱目 卷十三 婦人 天德堂  
 右剉每服四錢加生薑三片棗一枚水煎溫服  
 ○吃嘔  
 大全云夫五臟六腑俱稟氣於胃而肺爲主氣之總司若產後致  
 傷氣血則肺氣損而風冷搏之肺因氣逆而上則吃逆矣又脾  
 虛氣冷胃中伏寒因食熱物冷熱相擊氣厥而不順則吃逆也脾  
 者主中焦爲三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮  
 衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噎者胃寒所生服藥無效者參  
 朮門三壯必愈期門穴乃胃之大絡  
 薛氏曰前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦  
 有復生者  
 丁香散 治產後心煩咳噎不止

丁香 白豆蔻 伏龍肝 一兩  
 右爲細末每服一錢煎桃仁吳茱萸湯調下如人行五里再服  
 薑桂散 治產後嘔逆三日不止欲死  
 肉桂 五錢 薑汁 三合  
 右剉同煎服三合以大火炙手摩令背熱時時塗藥汁盡妙  
 羌活散 治吃逆  
 羌活 附子 炮 茴香 炒 各 白豆蔻 各二錢  
 石爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱服一服止  
 一方 治產後吃逆  
 乾柿一個切碎以水二盞煎六分熱呷  
 一方 治產後吃逆三五日不止  
 陳壁壘三五個水煎呷瘥即瘥子窠  
 補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆效  
 右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂散實者宜  
 竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子佐之誤施則噎  
 膈之悔慎之  
 ○咳嗽  
 大全云肺主諸氣產後肺虛外邪易感少有微邪便成咳嗽故或  
 風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後咳嗽雖太早而咳嗽者  
 難治  
 郭稽中曰產後血氣不運咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱過  
 壅滯或熱病或有氣塊以時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口

乾或時頃睡醒氣虛肢體無力宜服局方黑神散五錢  
加煎煎服

薛氏曰產後咳嗽若因陰血虛者用四物加參朮陳皮枳梗若因  
肺氣傷者用四君加司歸桔梗因陰火上炎者六味地黃丸加參  
朮因風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘兼口  
鼻出血氣或鼻出血者急用二味參蘇散亦有得生者然所患  
悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本胃氣一虛五臟失所百病生  
焉但患者多謂脾虛不密所致殊不知經云肺屬辛金生于巳土  
若脾土一虛則不能生金故脾理不密外邪易感法當壯土金生  
腎水以制火獨善若不補其虛而直治其病則誤矣

李氏曰產後咳嗽多是瘀血入肺二母散加杏仁杏仁入參茯苓  
湯陰綱目卷十三  
聖 天德堂

旋覆花湯 治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞聲重有  
汗者不其服

旋覆花 麻黃 赤芍藥 荆芥穗 前胡 茯苓  
半夏 五味子 甘草 杏仁 炒各等分

右咬咀每服四錢生薑三片棗二枚水煎食前溫服  
集驗方 療產後感冒風寒咳嗽多痰

甘草 桔梗 各一錢 款冬花 一錢 麥門冬 一錢 生地黃 一錢  
豆豉 一錢 葱白 一握

右咬咀水煎服取八合去滓食後分兩服  
二母散 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參 各二錢 桃仁 去尖 各一錢  
右咬咀作一服水煎食後服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿不食而浮  
氣逆等證

人參 白朮 炒 白茯苓 甘草 炙 陳皮 各二錢  
右剉一劑加薑水煎服

經效方 治咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母 各二錢 桑白皮 各二錢  
茯苓 各二錢 淡竹葉 二十片

右咬咀水二升煎取八合去滓食後分兩服  
濟陰綱目卷十三  
聖 天德堂

方 治產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗 各六分 桑白皮 二十分 乾百合 赤茯苓  
右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

釋曰以上六方先以散邪為第一以散中兼涼血清心為第二  
清肺補氣利氣行瘀為第三補土生金為第四而第五第六一  
則散而收之一則清而飲之較方之內治嗽之法初中末三治  
補瀉兼施先後不紊能推廣之以治雜症之咳嗽亦無不可集  
方者其藥上藥王歟

○喘急

郭稽中曰產後喘極危多死也

此散實神也

行脉中。衛行脉外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血虛。衛氣無主。獨聚肺中。故令喘也。此名孤陽。絕陰。為難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。但服奪命丹。見喘去。喘自定。

陳無擇曰。產後喘急。固可畏。若是敗血上薰於肺。可貴效。奪命丹。若感風寒。或因憂思。飲食鹹冷。等致病者。奪命丹未可均濟。况孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料黃蘗。芍藥湯。亦可救傷風寒。宜旋覆花湯。性理。變發宜小調。經散。用桑白皮。杏仁。煎湯調下。傷食宜服見現丸。五積散。等藥。

薛氏曰。前證若脾肺氣虛。弱用六君。桔梗。若兼外邪。更加紫蘇。若中氣虛寒。用補中益氣。加炮薑。肉桂。若陽氣虛脫。更加附子。若喘入肺急。用二味參蘇飲。

一產婦喘促。自活手足俱冷。常以手護臍腹。此陽氣虛脫。用參附湯四劑而愈。

浦江吳輝妻。孕時足腫。七月初旬產後。二日洗浴。即氣喘。但坐不臥。臥者五個月。惡風得燥。稍寬。兩關脉動尺寸皆虛。百藥不效。用牡丹皮。桃仁。桂枝。茯苓。薤白。厚朴。桑白皮。紫蘇。五味。瓜。仁。煎湯服之。即愈。三服得臥。其家如失。蒸作汚血。感寒治之也。

奪命散 治產後敗血衝心。胸滿上喘。合在須臾。方見前血暈。

一產婦蘇侯 治產後血入於肺。而喘欲死者。

右用水二碗。煎蘇末。取汁一。碗。調入參末。隨時加減。服旋覆花湯。治產後傷風寒喘嗽痰涎壅盛。

方見前咳嗽。見現丸 治產後傷風。飲食而喘者。

方見前痞悶。五味子湯 治產後喘促。脈浮而厥。

五味子湯 人參 杏仁 各二錢 麥門冬 去心 陳皮 各一錢 右加生薑三片。棗三枚。水煎服。

六君加失笑散 治產後喘急。不能臥。痰與血雜湧而上。此脾胃氣虛。而敗血乘之也。服此立止。

六君子料六錢。加生薑三片。水煎服。調入蒲黃五錢。脂各炒。

五分攪勻。溫服。少頃。再服。再入蒲黃末。服神效。余一日。生兩門。京想。道其妻產後。數喘。促不能臥。痰與血交湧。而上。日夜兩入。共坐。經側身。壅絕。乞救。察之。無暇。檢方。書以意。度之。新產後。血氣。脾胃。大虛。頭眩。故虛。痰壅。盛而敗血。乘之。羣角六君子。加失笑散。一服。痰血。俱下。喘亦立止。次日。日來。調云。諸病皆去。止不能食。再與參。苓。白朮。散。二帖。全愈。對症之藥。神効。如此。故特附於此。

大補湯 治產後百日外。面青浮腫。唇口氣急。有汗。乃大虛之證。急宜服此。

當歸頭 大川芎 大白朮 白芍藥 白茯苓 人參多 黃芪多 五味子 熟地黃 乾薑 上甘草少

右剉散。水煎服。此帖不退。即加川芎。白朮。香另。磨入服。有動加訶子肉。豆蔻。粟殼。



郭稽中曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之府起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及鼻衄也此緣產後虛熱變生此症胃絕脈脈不可治○經脈方云急取滄線一條并產婦頂心髮兩條繫繫中指節上即止無藥可治亦滄脈之一端也

再良法也諸病之胸中

益母草便妙治此熱

薛氏曰按胃脈俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔屬肺金謂胃虛肺損氣脫血死之證急用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者汪石山治一婦人產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血上升遂用益母丸二丸童便化下鼻衄漸止血漸通

李氏曰此產後虛熱所致犀角地黃湯救之

加味參蘇飲

天德堂

此治虛熱亦良妙

人參二兩

蘇耒二兩

附子五錢

右剉水煎服

濟陰綱目卷之十三

濟陰綱目卷之十四

關中 武之望叔卿父著輯 武林 薛 芳汝撰  
西陵 汪 洪權稿子箋評 天都 查 望子周撰

○泄瀉

郭稽中曰產後腹痛及泄利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於胃膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤白肛腸脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則不旋踵謹之謹之

陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風則所傷在胃乘虛襲留於胃膜散於腹脇則所傷在腸喜怒憂思遷徙內性犯勞役饑飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白帶下非此能愈各隨門類別有三方

天德堂

此法中再舉實乃當此十一法須體酌施然只用八方如

薛氏曰產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當雷而治之若米食所傷用六君加穀朮若麪食所傷用六君子加麥朮若肉食所傷用六君加山查神麴九兼嘔吐皆加藿香若兼嘔酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便滴瀝肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若腎

數。洒淅惡寒。懷懷不樂。此肺與脾胃俱虛。而陽氣虛寒。不伸也。用升陽益胃湯而痊。

以米飲調服下咽渴即  
吐真起死還生之藥也

大全云產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或

黃赤為熱  
之病此古  
人之論自  
問出而不  
五色均不  
為熱也今  
同歟大藥  
於傷冷久  
為熱故為  
多而寒者  
未可執以  
求之為請

若果厥大無  
力可不溫  
而乃用黃  
極虛極痛  
去也故從  
不從厥為  
凡聖藥不  
能治此以  
黃連一兩  
本藥代茶  
庶無水腫  
患

勞動太早或誤食生冷。若行起太早則外傷風冷。乘虛入於腸胃。若誤食生冷。則難化之物傷於脾胃。皆令洞泄水瀉。甚者變為痢也。若血滲入大腸。則為血痢。難治。世謂之產子痢也。得令則白。或如魚腦。得熱則赤黃。或為膿血。若令熱相搏。則下痢赤白。或膿血相雜。若下痢青色。則極冷也。若飲食不進。便利無常。日夜無度。產後本虛。更加久痢不止。無力瘦乏。愈見虛弱。謂之虛痢。下痢又有溫之冷熱相搏。則調之滑者。澀之虛者。補之。水穀不分者。當利小便。若產婦情性執着。不能寬解。須當順其氣。未有不妥者也。

薛氏曰。前證白屬氣分。而赤屬血分也。其論詳見瀉利。一產婦食雞子。腹中作痛。面色青黃。服平胃二陳。更下痢腹脹。服

濟陰綱目。卷十。瀉利。四。天德。流氣飲子。又小腹一塊。不時上攻。飲食愈少。此脾胃虛寒。肝木剋侮所致。用補中益氣。加木香。吳茱萸。漸愈。又用八珍大補。兼服調

理。尋愈。一婦產後。痢未至。月滿。因食冷物及酒。冷熱與血交擊。滯下純血。極虛極痛。其脈大無。力口乾。用黃芩芍藥湯。三服而安。

產後下痢。作渴者。水穀之精化為血。氣津液以養臟腑。臟腑虛燥。故痢而渴。若引飲則難止。反溢水氣。脾胃既虛。不能剋水。水自流

溢。浸漬皮膚。則令人腫。但止其渴。痢則自痊。薛氏曰。痢證若渴而不喜飲食。屬胃氣虛。不能生津液。宜用七味

白朮散。夜間發熱。口渴。屬腎水弱。而不能潤。宜用六味丸。並佐以

益氣湯。以滋化源。

此以四物湯  
五川為加  
膠所以止  
血而歸甘  
用三兩為  
所以和氣  
而止腹痛  
妙在甘以

救急散 治產後赤白痢腹中絞痛  
白芍 阿膠 艾葉 熟地黃 各一 當歸  
甘草 各三  
右咬咀水煎。分二服。空心飲。  
加味四君子湯 治產後赤白痢神効。  
人參 白朮 白茯苓 甘草 各一  
黃耆 各一  
聖藥穀 各一  
右剉水煎。  
以上二方治虛滑。

白頭翁加甘草阿膠湯 治產後下痢虛極。脈經作熱。痢重。下新產虛極者。

白頭翁 甘草 各一 阿膠 二錢 黃連 黃蘗 各一  
秦皮 去皮 各三錢  
右剉作二服。水煎。納膠令消盡。溫服。

槐連四物湯 治產後熱滑血痢。臍腹疼痛。

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 槐花 炒  
黃連 一錢 御米殼 去蒂 各五分  
右剉水煎服。

黃連丸 治產後熱滑赤白痢。腹中攪痛不可忍。

黃連 四兩 黃芩 黃柏 各二兩 梔子仁 阿膠  
蒲黃 各一 當歸 二兩  
右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服六七十九。米飲下。日三夜一。

以上三方治熱滑。

神功參香散 治痢疾日久 積積已少 腹中不痛 或微痛不發 但滑瀉不止 乃收功之後藥也

方見前泄瀉

一方 治產後血瀉不禁 傷血作痛 兼塊 以寒清

桂心 乾薑 各等

右爲末 空心酒調服方寸七

以上三方 治寒滑

神仙感應丸 產後固無積 痢多有因 食草味早 亦作瀉痢者 百無一生 非此方不能救之 三二服立止 不然荏苒日月 致不救也 如不因食草者 不可服

神麴 一人參 枳殼 乾薑 去積 赤石脂 熟地

濟陰綱目 卷十四 泄瀉 太 天德堂

白米 各二

右爲細末 每服三錢 空心米飲調下

連翹丸 治產後久病 赤白痢 蓋因脾胃不和 氣滯積聚所致 心腹脹滿 乾嘔酸心 飲食不下 胸膈噎塞 腸肋疼痛 危困者

連翹 陳皮 法 京三稜 各錢 肉桂 不見 檳榔

牽牛子 取頭 蓬朮 青皮 去白 各 肉豈 乾薑 好墨 各半

右爲細末 麴糊丸如桐子大 每服三十丸 米飲下 或用水煎服亦可

以上三方 治積痢

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨 燒綿灰 血餘灰 各等分

右爲細末 每服一錢 煎石榴皮湯調下 熱服

一方 治產後痢日五十行者

取木裏黃 糞炒黃 急以水沃之 令稀 調得所服之即愈

治產後諸痢雜方

取君耳葉 搗汁半盞 日三四溫服

一方 煮雞白食之

一方 羊腎脂 炒雞白 空心食之

一方 敗龜板一枚 米醋炙研爲末 醋湯調下

治產後血痢雜方

一方 用阿膠二兩 以酒一升 半煮一升 頓服

一方 用生馬齒莧 搗汁二大合 煮一沸 下蜜一合 調頓服

以上雜治方

必効方 療產後痢而渴 飲無度 數

麥門冬 兩 烏梅 二十

右細剉水一升 煮取七合 細呷

經効方 療產後久痢 津液涸渴 不止

龍骨 十二 厚朴 茯苓 黃耆 麥門冬 人參 各八

生薑 六 大棗 十四

右細剉以水一大斗 煮取七合 空心分兩服

錄驗方 療產後痢日久 津液枯竭 四肢浮腫 口乾舌燥

冬瓜一枚 黃泥糊厚五寸 煨爛 熟去皮絞汁服之 痊

七味白朮散 治產後痢津液竭渴不止

方見前湯  
以上治痢疾發渴

○大便秘澀

郭稽中曰產後大便秘澀者何答曰產後水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃屎在臍間以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則腸消陰衰變證百出性命危矣

薛氏曰前證因去血過多失腸乾澀不可計其日期飲食數多而用藥通之必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪膽汁瀉之若服苦寒疎通之劑反傷中氣或愈加難通或通而不止或成痞證也若去血過多者用十全大補湯若血虛火燥者用加味濟陰綱目

卷十四 痢疾

八

天德堂

四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則誤矣

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起

一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等藥致吐瀉不食腹中如故

余用六君子加木香炮薑治之而愈

一婦人大便秘澀諸藥不應苦不可言令飲人乳而安

李氏曰產後大便閉者芎歸湯加防風枳殼甘草秘澀者麻仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多則鬱冒鬱胃則汗多汗多則大便閉皆血虛也

調導散 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼各四

右咬咀每服一兩用生薑三片棗一枚水煎溫服忌動風物

麻仁丸 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大便閉澀

大麻仁 研如 枳殼 剉碎 入參 各一 大黃 兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九空心溫酒米飲任下

濟陰綱目 卷十四 大便秘澀

九 天德堂

通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利者百無一生去血過多臟燥大便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯慈涎調服茶為丸復以臘茶下之必通

產後固不可輕用大黃然大腸秘結不通或惡露不出不得大黃以宣利之勢必不通但利後即當以參善日米甘草及芎歸等藥大劑調補之不然元氣下脫後將不可救矣

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁 去皮 桃仁 如土製 各一兩 柏子仁 五錢 松子仁 一錢

郁李仁 各一兩 橘紅 四兩

一方加當歸稍五錢

右五仁另研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如桐子大每服

三十丸加至五六十丸食前清米飲下

阿膠枳殼丸 治產後大便秘澀

二味有見

阿膠 枳殼各等分

右為末煉蜜丸如桐子大滑石末為衣溫水下二十九未通再服

麻蘇粥 婦人產後有三種痰鬱胃則多汗汗多則大便秘故難

蘇子 大蘇子各等分

右研極細用水再研取汁一盞分三次煮粥啜下

本事方云此粥不惟產後可服夫老人諸虛風秘皆宜服之

備有一人每年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食召醫數十

天德堂

皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不入食其

憂惶余辯說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚於

胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於顙則頭痛神不清也若

臟腑流暢諸疾悉去矣予命作此粥兩服而氣泄先下結糞如

胡桃者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

兵部手集方 治產後秘結不通膨滿氣急坐卧俱難

用大麥蘖炒黃為末酒下一台神効

○大小便不通

大全云產後大小便不通者本腸胃挾熱因產後血水俱下津液

燥竭腸胃痞澀熱氣內結於腸胃故令大小便不通也

薛氏曰治一婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍

通三日而產人乳尤善

通氣散 治產後大小便不通

陳皮 蘇葉 枳殼各等分 木通各等分

右剉散每服四錢水煎溫服立通

桃仁散 治膀胱氣滯血澀大小便閉

桃仁 葵子 滑石 檳榔各等分

右為細末每服二錢空心葱白湯調下

枳殼丸 治產後大小便澀滯

枳殼 枳殼 蘇子 麻仁 炒 大黃各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫水送下食後如飲食

不化亦宜服之

濟陰綱目 卷十四 大便秘澀

一方 治產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 生地黃

芍藥各一兩

右為細末空心米飲調服方寸七忌麵蒜

金鑰匙散 治產後大小便不通腹脹等證

滑石 蒲黃各等分

右為細末酒調下二錢

○遺尿

薛氏曰產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯為主

寒加肉苁蓉補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用八味丸兼四神

丸仍佐以前二方按證後遺尿乃腎氣不固宜五味子散主之

一產婦大便不實。飲食少思。五更或清晨遺尿。此中氣虛寒。脾胃  
不足。用補中益氣。送四神丸而痊。

一產婦小便出黃。名大小腸交。乃氣血俱虛。失行常道。先用六君  
子二劑。又用五苓散一劑而痊。尋常腸交亦可用。

補遺方 療產後遺尿不知亦治遺尿。

白蘇 芍藥各七

右為末酒調服方寸七。

集驗方 療產後遺尿亦治男子。

枯礬 牡蠣各七

右為末酒調服方寸七。日三服。

加味補中益氣湯 治脾胃虛寒大便不禁。

黃耆 人參 白朮 甘草 當歸 主 天德堂

陳皮 升麻 柴胡 肉苁蓉 補骨脂 各五

右剉一劑水煎服。

還少丹 治脾胃虛弱遺精。

肉苁蓉 遠志 茴香 巴戟 乾山藥

枸杞子 熟地黃 石菖蒲 山茱萸 牛膝

杜仲 五味子 白茯苓 各三

右為末用棗肉百枚同煉蜜丸如桐子。每服五七十丸。空心溫

酒或鹽湯下。日三服。

四神丸 治脾胃虛弱。大便不實。或五更作瀉。

破故紙 吳茱萸 肉豆蔻 五味子 各一

右為末用大紅棗四十九枚。生薑四兩。切碎。同煎用水煮。其  
姜取棗肉和藥。九桐子大。每服五十九丸。空心鹽湯下。

五味子散 治腎泄。

五味子 兩一 吳茱萸 兩半

右炒香熟。研為細末。每服二錢。陳米飲調下。

廣濟方 治產後遺尿亦治男子。

取故燕窩中草燒為末。以酒調下。半盞。

○淋濁 大全云。產後諸淋。因熱氣客於脬中。內虛則頻數。熱則小便澀痛。

故謂之淋。○又有因氣虛挾熱。熱邪搏血。滲入胞中。血隨小便而

出。為血淋者。

三因論曰。治諸產前後淋。其法不同。產前當安胎。產後當去血。

如其令熱。當用氣淋等。為治則一。但量其虛實而用之。精麥酒。

最是產後要藥。雖當究其所因。則不失其機要矣。

薛氏曰。按前證若膀胱虛熱。用六味丸。若陰虛而陽無以化。用滋

腎丸。蓋土生金。金生水。當滋化源也。仍於淋瀝頻數。門調治。

一產婦小水淋瀝。或時自出。用分利降火之劑。二年不愈。余以為

肺腎之氣虛。用補中益氣湯。六味地黃丸而痊。

牙根湯 治產後諸淋。無問冷熱。膏石氣結。悉主之。

白茅根 瞿麥 白茯苓 各二 葵子

人參 各一錢 蒲黃 桃膠 滑石

甘草 各六分 紫貝 一箇 石首魚腦 砂二箇

治石淋要藥。

割分二貼，加生薑三片，燈心二十根，水煎服，或為末，每服一錢，木通煎湯調下，如氣壅閉，木通橘皮煎湯調下。

滑石散 治產後熱淋

滑石 一兩二錢 通草 車前子 葵子 各一

右為末，以漿水調服，方寸七，至三七為妙。

滑石通淋散 產後小便澀澀不通者，因血熱積於小腹，經水不利，忿食熱毒之物而成淋澀，故也。

赤茯苓 澤瀉 木通 黃連 滑石 各八

白木 瞿麥 山梔子 車前子 各等分 滑石 分

右剉，加燈心十二莖，水煎，空心熱服。

石韋散 治婦人小便卒淋澀

濟陰綱目 卷十四 淋濁

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子

瞿麥 甘草 各等分

右咬咀，每服八錢，加生薑三片，水煎，食前溫服。

加味四物湯 諸淋皆屬於熱，用此累効。

當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 甘草梢

杜牛膝 木通 各一 桃仁 五箇 滑石 半 水香

右剉，水煎服。

一方 產後後淋，小便痛及血淋。

白茅根 瞿麥 車前子 各二 鯉魚齒 一百根

通草 冬葵子 各一

右以水三升，煮取一升，入魚齒末，空心服。

張氏方 療產後小便不通，淋澀。

陳皮一兩，去白為末，空心溫酒調下二錢，一服便通。

療卒不得小便方

杏仁十四枚，去皮尖炒為末，和飲頓服。

灸臍法 治產後小便不通，腹脹如鼓，悶亂不醒，蓋緣未產之前，內積冷氣，遂致產時，尿胞澀，功不順。

用鹽填臍中，却以葱白和去鹽皮十餘根，作一縛，切一指厚，安臍上用大艾炷，滴葱餅上，以火灸之，覺熱氣入腹內，即時便通神驗。

積冷者用此所謂氣化則能出矣

○小便數 大全云：夫產後小便數者，乃氣虛不能制故也。

濟陰綱目 卷十四 淋濁

薛氏曰：前證若因惡露不盡，以致胞損，而小便淋澀者，用八珍湯以補氣血。若因膀胱氣虛，而小便頻數，當補脾肺。若膀胱陰虛，而小便淋澀者，須補脾腎。

一產婦小便頻數，時忽寒戰，乃屬脾肺虛弱，用補中益氣，如山藥、山藥為主，佐以桑螵蛸散而愈。後患發熱，晡時盜汗，自汗，月水不調，用加味逍遙散而安。

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸 鹿茸 黃耆 杜仲 人參

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸 鹿茸 黃耆 杜仲 人參

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。

桑螵蛸 鹿茸 黃耆 杜仲 人參

一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後，小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛，用煎湯及八味丸而愈。

桑螵蛸散 治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。



此治虛熱

此命門藥也  
專主補小便  
虛寒者宜之

妙在有破血  
之藥

厚朴 赤石脂

右為末每服二錢空心粥飲調下

外臺方無厚朴石脂有甘草生薑

栝蒌湯 療產後小便數兼渴

栝蒌根 人參各三兩 黃連 桑螵蛸 甘草炙 生薑各二兩

右細切用水七升煮二升半分三服忌猪肉冷水

補遺方 療產後小便數及遺尿

益智仁為末米飲調服

○小便不禁

陳氏曰婦人產後產理不順致傷膀胱遺尿無時

齊陰綱目

卷十四 小便不禁

天德堂

丹溪云嘗見收生者不謹損破產婦尿將致病淋瀝遂成廢疾一  
日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者宜可補完胞雖  
在腹恐亦可治遂診其脈虛甚予曰難產之由多是氣虛產後血  
氣尤虛試與峻補因以參耆為君芎歸為臣桃仁陳皮黃耆茯苓  
為佐煎以猪羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用一兩至一月而  
安益令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

薛氏曰前證若脾肺陽虛用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛用  
六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸

一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血  
熱用加味逍遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便  
自遺大便不實左目頻緊面色頻赤仍用前散佐以六君子湯以

清肝火生肝血培脾土而痊

以下七方悉  
有聖理效之  
本草乃良方  
不虛立舉矣  
有條能心會  
意者當自得  
之

千金方 治產後小便不禁 白薇 芍藥各等

右為末溫酒調下方寸七日三服

又方 治產後小便不禁 桑螵蛸生兩 龍骨一兩

右為末每服二錢粥飯調下

雞內金散 治產後溺淋失禁

用雄雞膽一具並腸洗燒為末溫酒調服方寸七

黃濟方 療產後小便不禁

用雞尾毛燒灰存性酒調下一錢七日三服

黃耆當歸湯 婦人產後尿不禁面微浮略發熱於午後此膀胱  
為坐婁所傷

齊陰綱目

卷十四 小便不禁

天德堂

黃耆 歸身尾 芍藥各一兩 白朮一兩 人參

陳皮各五錢 甘草炙少許

右水煎熱服之

固脾散 治婦人臨產時傷手脾破小便不禁

黃絲絹自然黃者染黃者不用取三尺以黃  
黃絲絹灰汁煮極爛以絹水洗去灰令淨 黃蠟半兩

蜜兩 白茅根 馬尾勃二錢

右用水二升再煎至二盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲  
如作聲無効

補脾飲 治產後傷動脾破終日不小便但淋瀝不乾

生熟絹黃色者 白牡丹根皮 白朮各二錢

右用水一碗煎至絹爛如錫服之勿作聲作聲無効

丹皮破血白  
散調飲

○小便出血

大全云產後小便出血者因氣血虛而熱乘之血得熱則流散於胞內故血隨小便出

以歸脾而愈  
聖氏血亦為  
腫不痛血聚  
臨症須酌之

薛氏曰一產婦尿血面黃腸脹少食此肝木乘脾土也用加味道遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈或於衆論服犀角地黃湯諸證復作仍服前湯而愈

血餘散 治產後小便出血

亂髮不拘多少湯洗淨燒灰研為末米飲調服方寸匕

滑石散 治產後小便出血

滑石 研 髮灰 分等

右為末每服一錢生地黃汁調下

天德堂

崔氏方 療產後血滲入大小腸

合一大 車前草 一升

右相和煎沸分兩服

補遺方 治產後小便出血

川牛膝去蘆水煎服

又方

生地黃汁 升 生薑自然汁 合

右相和服之

○大便出血

薛氏曰產後便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧損腸絡

外傷治法若因膏梁積熱用加味清胃散若因醇酒積熱為花柳

醒湯若因怒動肝火如味小柴胡湯若因鬱結傷脾如味歸脾湯

若因思慮傷心妙香散若因大腸風熱四物加側柏槐花若因大

腸血熱四物加蒼連槐花若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡若因

腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中益氣加茯苓半

夏若因胃氣虛弱用六君升麻若因血虛用四君子若因氣血

俱虛用八珍柴胡升麻大凡元氣虛弱而發熱者皆內真寒而外

假熱也但用六君子或補中益氣如炮姜溫補脾氣諸證悉退若

四肢畏冷屬陽氣虛寒急加附子病因多端當臨症制宜庶無誤

矣 一產婦產後下血諸藥不愈飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用

補中益氣加吳茱萸炒黃連五分四劑頓止用歸脾湯治之而愈

一婦人怒則便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痛悶此肝木乘

脾土用六君子加山梔柴胡而愈又用補中益氣加味逍遙二藥

而不復作 一婦人久下血在產前屬脾胃虛寒用補中益氣湯加連炒吳茱

加味清胃散 治因膏粱積熱便血

當歸身一錢 黃連 生地黃 升麻各一錢

牡丹皮一錢 石膏三錢

右剉水煎服。一方無石膏有犀角連翹甘草。的奇散。治產後惡露不行餘血滲入大腸洞瀉不禁下青黑物亦驗。

用荊芥大者四五穗於盞內燃火燒成灰。不得犯油火入。研香少許研勻。沸湯一兩呷調下。此藥雖微能愈大病幸勿忽之。

產後陰下有物脫出產腸不收

三因方云。婦人產後勞力努極。致陰下脫。若脫肝狀及陰下延。

濟陰綱目 卷十四 大便出血

主 天德堂

遍迫腫痛或舉動房勞。皆能發作。清水續續。小便淋瀝。

丹溪云。一婦人三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有帕尖。約重一觔。予思之。此因胎前勞之傷氣。或肝後所致。邪毒血

不甚虛耳。其時將天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆半錢。人參一錢。

白朮五分。當歸一錢半。升麻五分。三帖連服之。即收上。得汗通身

乃安。但下齋沾腐處。乾者落一片。約五六兩重。益脂膜也。食進得

眠。診其脈皆瀟。左暑弦。視其形却實。與白朮芍藥各半錢。陳皮一

錢。生薑一片。煎二三帖以養之。

一婦人產子後。陰戶中下一物。如合鉢狀。有二岐。其夫來求治。予

思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆大料。一帖

與之。半日後。其夫復來曰。服二次後。覺響一聲。視之已收。陰戶訖

但因經宿乾着席上破一片。如掌心大。在脣其妻在家哭。謂

破不可復生。予思之。此非腸胃乃脂膏也。肌肉破尚可復完。脂

血充盛。必可生滿。遂用四物湯。加入人參與一百帖。三年後復有子。

治子宮下。用黃耆一錢半。人參一錢。當歸七分。升麻三分。甘草二

分。作一帖。水一鍾。煎至五分。去滓。食前服。却用五倍子末。泡湯洗。

又用末傳之。如此數次。宜多服藥。永不下。

一婦產後。水道中出肉線一條。長三四尺。動之則痛。欲絕。先服失

笑散。數次。以帶皮姜二觔。研爛入清油二觔。煎油乾。為度。用絹兜

起肉線。出於水道。以前薑煎之。冷則製之。六日後。縮其大半。

二六日。即盡入。再服失笑散。芍歸湯。調理之。如肉線斷。則不可治。

吳

濟陰綱目 卷十四 大便出血

主 天德堂

當歸黃耆散 治產後陰脫。謂陰戶脫下也。

當歸 白芍 黃耆 人參各二錢 升麻五錢

一方有甘草無芍藥

右剉作一劑。水煎。食前溫服。外用五倍子。泡湯洗。又用末傳之。

加味八珍湯 治產後生腸不收

八珍湯 黃耆 防風 升麻各五錢

右剉。一服。水煎。服外。以荊芥黃耆。搗皮煎湯。薰洗。

加味四物湯 治因產用力過多。陰門突出

四物湯 龍骨 防風 升麻各五錢

右剉。水煎。服。○陰痛者。加藥本。防風。去龍骨。

當歸散 治陰脫。又名癰疽

法 妙在加一 去有本來升

<p>當歸 黃芩 各二兩 白芍 一兩 明皮 錢半 牡蠣 二兩</p>	<p>右為末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重</p>	<p>硫黃散 治產後努力太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出通</p>	<p>山腫痛舉動房勞皆能發作清水續續小便淋瀝</p>	<p>硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 二錢</p>	<p>右為末搽患處日三易</p>	<p>烏椒湯 治陰下挺出</p>	<p>蜀椒 一方 用此味 烏頭 白芨 各半</p>	<p>右為末以方寸七綿裹納陰中入三寸腹中熱易之一日一度</p>	<p>明且乃復着七日愈</p>	<p>千金散 治婦人子腸下不收</p>	<p>濟陰綱目 卷十四 大便出血</p>
<p>蛇牀子 韶腦 葫蘆巴 紫稍花 各等</p>	<p>右為末每服五七錢煎水半碗淋洗之三二遍為効</p>	<p>復元湯 治產後子宮不收</p>	<p>荊芥穗 藿香葉 臭椿皮 各等</p>	<p>石咬咀煎湯薰洗子宮即入</p>	<p>一方 有臨產子腸先出產後腸不收名曰盤腸瘰癧花瘰</p>	<p>治法命產母仰臥却用好米醋半盞和新汲水七合攪勻忽</p>	<p>與產母面或背每一嚥令一縮三嚥三縮腸則盡收此良法也</p>	<p>一方 產腸出俗用冷水吸母面其腸自收此法虛弱之人切不可用恐驚怯成病或即脫絕以此方治之</p>			

<p>用草麻子四十粒<small>一方云去殼研爛塗產母</small></p>	<p>知收子即以水洗去頂上草麻</p>	<p>又方 治腸出久而不收為風吹乾不能收者</p>	<p>以磨刀水少許火上溫過以潤盤腸仍煎好磁石泥一杯</p>	<p>產母飲之自收</p>	<p>丹溪方 產後腸不收</p>	<p>用香油五筋煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一頓食時以皂角</p>	<p>末吹入鼻中噤作立上妙</p>	<p>雜方 治盤腸產</p>	<p>半夏為末搗鼻中腸自上</p>	<p>一方全蝎不拘多少為末口噙水鼻內搯之立効</p>	<p>濟陰綱目 卷十四 大便出血</p>
<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>	<p>天德堂</p>

一法婦人陰挺出四肢注滿身少海主之一作  
一法婦人胞胎門各頻不收常濕後神開玉泉身交

五

又法五泉房開三寸多隨年

女人陰門令腫炙飯來壯

○產門不開腫痛

薛氏曰玉門不開氣血虛弱也用十全大補湯腫脹痛肝經虛  
熱也加味逍遙散若因憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若因暴  
怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯

一產婦玉門不開發熱惡寒用十全大補加五味子數劑而聚熱  
退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉

濟陰綱目 卷十 婦人經水

天德堂

一婦人脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不食  
外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臂諸證蜂起此真氣虛而  
邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補中益氣以升陽氣不致  
劑而全愈

一產婦患此失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗  
盜汗半年矣用補中益氣湯加茯苓半夏膿水漸少飲食漸進又  
用歸脾湯共五十餘劑而愈

一產婦玉門不開小便淋瀝腹內一塊攻走腸下或脹或痛用加  
味逍遙散加車前子而愈

一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類猪肝面黃體倦飲食  
無味內熱補熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈

復生

十全大補湯 治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒

本方加五味子水煎服

硫黃湯 治產後玉門開而不閉

硫黃四兩 吳茱萸 皂莢子 各一兩 蛇床子

右剉每服四錢水一碗煎湯類洗之白効

飲陰法 治新產後陰腫下脫及產門不合

新石灰半升先放在腳盆內後以沸湯衝入乘熱於上薰之

候溫用手搦清者沃淋之未効日再用

當歸湯 治產後臍中風冷腫痛

當歸 獨活 白芷 地榆 各三兩 敗醬 各二兩

右剉碎以水一斗半煮取五升適冷暖洗陰日三

方 治婦人子宮大痛不可忍並產後生腸不收

五倍子 白礬 各等分

右為末溫酒泡洗乾粉亦可

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁去皮 五倍子 枯礬 各等分

右為末研桃仁膏拌勻傳

一方單用桃仁去皮尖研細四五次抹之

萬應丸 治產後小戶痛不可忍

知母 味去皮炒為末煉蜜丸如彈子大每服一丸清酒一盞

兩傍痛陰  
其通也  
此入理之方  
請試思之

化下

一方 治產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸者用四季葱入乳香同搗成餅安於陰戶兩傍良久即愈

乳病

乳汁不行

大全云婦人乳汁乃氣血所化其或不行者皆由氣血虛弱經絡不調所致凡乳汁勿令投於地重蟻食之令乳無汁若乳盈溢可潑東壁土作或產後乳漲或滑作者此年少之人何經產乳內有風熱也須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須服滋陰之藥以助之若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以養血引之若婦人之乳資以衝脈衝與胃經通故也

產後諸病

卷十

產後諸病

產後諸病

有婦經產而乳汁常多者亦婦人血氣不長使然若婦人素行在衝任乳汁少而色帶黃者生子則怯弱而多疾

三因方云產婦有二種乳脈不行有血氣盛而壅閉不行者有血少氣弱而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土

瓜根輩虛者當用煉成鍾乳粉諸蹄鯽魚之屬藥可見矣

薛氏曰前證若氣血虛弱而不能生化者宜壯脾胃助肝膽而

乳腫汁出者宜清肝火夫乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經

若產後無乳或大便澀滯常滋化源

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴余謂血氣虛以

主露散補之而愈

通草散 治產後血氣盛實乳汁不通

以五方

各有經絡

桔梗

瞿麥

柴胡

天花粉

連翹

木通

甘草

青皮

白芷

赤芍藥

連翹

木通

甘草

右到一劑水煎細飲更摩乳房

漏蘆散 治婦人肥盛氣脈滯滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆散 治婦人肥盛氣脈滯滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆

半兩

蛇退

瓜蒌

木通

甘草

右為末每服二錢酒調下仍食猪蹄羹助之○經驗方有牡蠣

燒存性○一方只用牡蠣煨末酒調下

秘傳湧泉散 治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶乳脹痛或作癰腫

王不留行

白丁香

漏蘆

天花粉

僵蠶

夫

末

此散結通瘀

治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶乳脹痛或作癰腫

王不留行

白丁香

漏蘆

天花粉

僵蠶

夫

穿山甲

火炮黃色各等

右為末每服四錢用猪蹄羹煮汁調下

羅氏湧泉散

治氣滯少乳

瞿麥穗

麥門冬

王不留行

龍骨

穿山甲

通草

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服此藥服後以木梳刮左右乳房三十餘下日三服○忌食薑椒辛辣之物

穿山甲

白僵蠶

肉豆蔻

麝香

皂角

胡桃仁

去皮

為主而此以  
王瓜根桂心  
通血脈有令  
氣血之虧而  
甘草一味又  
起於法外矣

上瓜根 漏蘆各三 通草兩 甘草二  
右剉碎以水八升煎取二升分溫三服○一方加桂心並為末  
酒服方寸七

胡桃散 治婦人少乳及乳汁不行

核桃仁 去皮十 穿山甲 一錢

右搗和一處黃酒調服

皂角散 治乳汁不通及乳結硬疼痛

皂角 粉 蛤粉

右為末每服二錢熱酒調服○歌曰婦人吹乳意如何皂角燒

灰蛤粉和熱酒一杯調八字須臾核散笑呵呵

張氏方 滋益氣脈藥行津液

桑子 炒 縮砂 各等

右為細末每服二錢熱酒調下

雜方 下乳汁

栝蒌子洗淨炒令香熟瓦上揀令白色為末酒調下一錢合

面臥少時再服

一方瓜蔓一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫飲一升日三

一方土瓜根為末酒調下一錢日三服

一方三稜三箇水二碗煮散一碗洗之取汁下為度妙

一方穿山甲洗淨一兩灰炒燥為細末酒調服方寸七治產乳無

汁亦治乳結癰腫

○已上治乳滯不行之劑

以洗法通氣  
又是一法

加味四物湯 治氣血虛乳汁不通

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 木通

王不留行 天花粉 各等

右剉一劑同獐蹄肉四兩煎湯二鍾入藥同服先將葱湯

煎洗乳房

玉露散 治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便滯

此藥涼膈壓熱下乳

人參 白茯苓 當歸各五 芍藥七 川芎

桔梗 炒 白芷 各一甘草五分

右咬咀水煎食後服○如熱甚大便秘加大黃炒三分

當歸補血加葱白湯 治產後無乳

當歸 二 黃芩 一 葱白 根十

右剉水煎服

通脈散 治女人乳少

當歸 天花粉 木通 牡蠣 穿山甲

右為細末用猪蹄湯入酒少許調服

通乳湯 治乳後氣血不足經血衰弱乳汁澀少

猪蹄下節 通草二 川芎一 穿山甲 十四片 甘草一

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夜即不宜失熱更以葱

湯頻洗乳房

一方治乳汁不通

當歸 穿山甲 五錢 天花粉 王不留行

甘草各三錢

右爲細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

猪蹄湯 治婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄一雙 通草四兩

右將猪蹄淨洗依食治法次用水一斗同通草浸煮得四五升

取汁飲之未作二料

立効散 下乳汁

粳米 糯米各半 高菰子一合煎 生甘草兩

右研細用水二升煎取一升去淨分三服立下

又方 治乳汁少

瓜蒌根 薄荷幹身各等

羊肉補形湯 引經通滯

右爲末先啖羊蹄汁一碗次服藥後再啖葱絲羊羹湯少許

立効

鍾乳散 治乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少成鍊鍾乳粉研

細濃煎漏蘆湯調下二錢

雜方 有人乳汁不行已十七日請藥無効遇有人送赤豆一斗

送時常煮粥食之當夜乳脉通行

一方麥門冬不拘多少去心焙爛末以酒磨犀角約一錢許煖調

二錢服之不過兩服乳汁便下

○已上治乳少不行之劑

○乳汁自出

大全云產後乳汁自出者乃是胃氣虛所致宜服補藥以止之若

以論虛實

乳多溢滿急痛者溫昂熨之產寶有是論却無方以治之

有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及

薛氏曰前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散

肝經怒火用四物柴梔梔連肝脾鬱怒用加味歸脾湯

一產婦勞役怒乳汁如湧昏眩吐痰此氣虛而嗽也誤以湯藥

湯而避更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹

或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗

散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之

漏蘆散 方見前

免懷湯 欲摘乳者用此方通其月經則乳汁不行

當歸尾 赤芍藥 紅花酒 牛膝酒浸各五錢

右剉水煎服

一方 治婦人血氣方盛乳房作脹或無兒食乳要消者服此立

消

麥芽二兩炒熟水煎服○一方炒爲末煎四物湯調服即止

○吹乳癰腫

大全云產後吹奶者因兒喫奶之次忽自睡着爲兒口氣所吹令

乳汁不通蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道傷結疼痛亦有不疼不

痛腫硬如石者總名曰吹奶若不急治腫甚成癰連有至死者連

服皂角散括膿散傳以天南星散更以手揉之則散

薛氏曰前證用藥切不可損其氣血



立方有法用  
聚有訣不可  
不達

丹溪云乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養或  
忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故痰不通而  
汗不得出陽明之熱滯騰故熱甚而化濃亦有所乳之子胸有滯  
痰口氣熾熱含乳而腫熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛  
揉令稍軟吮令汁透自可消散矣此不治必成癰疽治法疎厥陰  
之滯以青皮清陽明之熱以細研石膏行汚濁之血以生甘草節  
潤腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或  
湯或散加減隨意消息然須少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫  
處其功尤捷彼柯工書於自衛便棄用鍼刀引惹拙病良可哀憫  
李氏曰婦人之乳男子之腎皆性命根也

初起煩渴嘔吐者應胃熱也甚則毒氣上衝咽膈妨礙寒熱者  
寒陰綱目

卷十 癰疽乳癰

玉德堂

肝邪也此皆表證宜不換金正氣散如天花粉能止渴嘔定寒熱  
咽隔有碍者甘桔湯加生薑或護心散如潰後見此四證為虛  
飲食厚味忿怒憂鬱以致胃火上蒸乳房乳汁化為濁濃肝經氣  
滯乳頭竅塞不通致令結核不散痛不可忍初起便宜隔蒜灸法  
切忌鍼刀能飲者一醉膏加葛歸各一分一服兩服即効不能飲  
者瓜蒌散  
結核亦有因氣血虛弱致外感內傷以致痰瘀凝滯而成核者俱  
以正貝散為主血虛合開物湯更加參朮柴胡升麻氣虛合四君  
子湯更加芍藥歸朮胡升麻思傷脾者歸脾湯加瓜蒌根貝母白  
芷連翹甘草水酒各半煎服  
有肝火結核應痛甚者清肝解鬱湯

吹乳因乳子膈上有痰口氣熾熱含乳而腫熱氣吹入乳房凝滯  
不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散不散宜益  
元散冷湯或井水調一日一夜服三五次自解重者解毒湯  
煎服之挾氣者正貝散單青皮湯外用漏蘆為末水調敷之又有  
乳汁不行奶乳脹痛者湧泉散

核久內服作痛外腫堅硬手足不近謂之乳癰十之九為乳  
散內托升麻湯或復元通氣散加漏蘆虛者托裏消毒散將酒  
乳間出黑頭瘡頂下作黑眼者內托升麻湯已潰寒熱者內托  
宣散少食口乾者補中益氣湯熱內熱者八物湯加五味子  
虛嘔者六君子湯加香附砂仁胃寒嘔吐或瀉者六君子湯加乾  
薑藿香遇勞腫痛者八物湯倍參蒼歸木過怒腫痛者八物湯加  
山梔

癰疽綱目

玉德堂

王揭菴曰隆慶庚午予自秋間歸則亡妹已病蓋自七月乳癰  
不散八月用火鍼取膿醫以十全大補湯與之外敷鐵符散不効  
反加喘悶九月產一女潰勢益大而乳房爛盡迺及胸腋濃水稠  
粘出膿幾六七升略無飲食十一月始歸就醫改用解毒和平中  
劑外搽生肌散龍骨寒水石等劑膿出不止流膿所及即腫泡潰  
膿兩傍紫黑瘡口十數胸前腋下皆腫潰不可動側其勢可畏余  
謂產後毒氣乘虛而熾宜多服黃蘗解毒補血益氣生肌而醫不  
敢用十二月月中旬後益甚瘡口愈餘諸藥及試不効始改用尋藥  
時腰微粘滯黃檗葉煎湯沃之頓爽乃治一方名黃蘗托裏湯  
黃蘗之甘溫以排膿益氣生肌為君甘草補胃氣解毒為歸身印

血生血爲臣升麻爲根。爲足陽明本經藥。及連翹防風皆散結疎經。瓜蒌仁單子解去腫。皂角刺引至潰處。白芷入陽明。排膿長肌。又用川芎三分及白桂枝爲引。用每劑入酒一盞煎。送白芷霜九。腫膿解。時藥水補粘方。盛未已。不可遽用收澀。藥理宜追之。以聖膏鏡子外。按明白膿水。頻稀痛定。膿解。始有向安之勢。至辛未新正。患處皆生新肉。有紫腫處。俱用忍製法。隨手消散。但近腋足少陽分。尚未軟。乃加柴胡一錢。青皮三分及信川。膏。膿水將淨者。即用搜風散。搜之。元膏後。遂至安。

康熙爲廣德幸。事張王甚謹。後授溫停。左乳生癰。繼又胸膈間結。核大如拳。堅如石。在再半載。齒癢莫効。已而牽掣臂腋。微於肩。痛延特甚。急禱王祠下。夢聞語曰。若要安。但用生薑自然汁。製香附。膏。陰綱曰。香附。乳。香。附。子。二。物。治。證。相。符。訪。醫。者。亦。云。有。理。遂。用。香。附。子。去。毛。薑。汁。浸。一。宿。爲。末。二。錢。米。飲。調。方。數。服。膿。膿。流。出。腫。硬。漸。消。自。是。獲。愈。

一婦人稟質性燥。懷妊。乳內結。一核。按之微痛。以連翹飲。子二十餘劑。少退。更以八珍加青皮香附。梧梗。貝母二十餘劑。而消。

消毒散。治吹乳吹癰。并便毒。如增寒壯熱。或頭痛者。先服人參。敗毒散一二劑。方可服此藥。如無前證。即服此二三劑。或腫不消。宜服托裏藥。

當歸 白芷 青皮 法 貝母 柴胡  
天花粉 僵蠶 金銀花 各三

總解毒藥。加大黃以治便毒者。亦行。脈陰汚濁之血也。此專行厥陰氣血凝滯之藥。

連翹飲子 治乳癰

連翹 瓜蒌仁 川芎 皂莢刺 橘葉  
青皮 甘草節 桃仁 各二

右作一服。水煎食遠服。如已破者。加參黃。當歸未破者。加柴胡升麻。

一方 治血脈凝注不散。結成吹乳。乳癰。痛腫不可忍者。

天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 當歸尾  
白芷 稍 瓜蒌仁 貝母 甘草節

右到酒煎服。

方 治婦人乳中結核。

升麻 連翹 青皮 甘草節 瓜蒌仁  
右作一服。水煎食後細細咽之。

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭。瘡頂陷下。作黑眼。並乳癰。初起亦治。

升麻 當歸身 葛根 連翹 黃蘗  
黃蘗 牛旁子 甘草 各一錢 肉桂 五分

右作一服。水一鍾。酒半鍾。煎食後服。

清肝解毒湯 治肝經血虛風熱。或肝經鬱火傷血。乳內結核。或爲腫潰不愈。凡肝經血氣不和之證。宜用此藥。

人參 茯苓 熟地黃 芍藥 貝母 心  
山梔 白木 當歸 各一錢 柴胡

<p>此方在破 用乳藥 白木非氣 者不宜 此方在破</p>	<p>世丹皮 川芎 陳皮 各八分 甘草 五 右水煎服 一方 乳藥破則少有生者必大補或庶幾耳 人參 黃耆 白朮 當歸 川芎 連翹 白芍 甘草節 右到水煎服○一有青皮瓜其無白朮○乳岩小破加柴胡 一方 治乳硬痛 當歸 甘草 各三錢 沒藥 一錢 右作一服水煎入酒少許飲 金銀花散 治乳腫不行結成癰腫疼痛不可忍者 金銀花 當歸 黃耆 甘草 各二錢 丹溪方 治乳腫痛 青皮 石膏 連翹 皂角刺 炒 黃藥子 當歸 木通 各一錢 生甘草 三分 右作一帖水煎入好酒些少同煎服 一方 治乳癰癰勢欲膿 石膏 煨 樺皮 煨 瓜蒌 青皮 甘草節 右到水煎服 一方 治乳有核 南星 貝母 甘草節 瓜蒌 各一錢 連翹 兩 右以水煎入酒服</p>
---	---

<p>復元通氣散 治婦人乳癰及一切腫毒 木香 茴香 青皮 穿山甲 陳皮 白芷 甘草 漏蘆 貝母 各等分 右為細末每服三錢好酒調下</p>	<p>治乳癰方 青皮 瓜蒌 樺皮 連翹 桃仁 皂角刺 甘草節 右水煎服○如破後加參耆 神效瓜蒌散 治婦人乳癰乳岩神效 黃瓜 煨 皮 煨 當歸 生甘草 各五錢 乳香 沒藥 各三錢 右作一劑用好酒三碗於磁石器中慢火熬至碗半分為 食後服如有乳岩使服此藥可杜絕病根如毒氣已及 為黃水毒未成則內消疾甚者再合一服以愈為度○立 與此間服神効但於瓜蒌散方減去當歸加紫色皂角刺一兩 六錢是也 究源五物湯 治癰疽發背乳癰通用 括葉 皂角刺 煨 沒藥 乳香 甘草 各一錢 右到用酒三升煎取二升時時飲之痛不可忍立止 括葉散 治吹乳 乳香 括葉 各一錢 右到用酒煎服或為末酒服二錢外用南星生薑湯洗</p>
--	---

摘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍也

夜神驗因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之

陳皮去白乾麝香 麝香一分

右研勻酒調下二錢被蓋汗出即愈

補遺方 治吹乳結實腫痛

陳皮二錢 甘草一錢

右剉水煎分兩次服用荆芥羌活獨活煎湯熏洗即愈

一方 治乳癰

夜明砂 瓜蒌炒 阿魏

右爲末飯丸酒吞下

通和湯 治婦人乳癰疼痛不可忍者

清陰綱目 卷十四 吹乳癰腫 亮 天德堂

穿山甲炮 木通各 自然銅半兩 礬石七次

右爲末每服二錢熱酒調下食遠服

二灰散 治產後乳汁不泄結滯不消熱毒

蔓荊子燒 皂角刺燒各

右爲末每服二錢溫酒調下無時

夜陰散 治吹乳乳癰

蜘蛛三枚 紅棗三枚 去核

右每棗一枚入蜘蛛一箇夾於內炒熟口嚼喫用燒酒送下未

成者立消已成者立潰

獨勝散 治婦人吹乳初覺身熱頭疼寒熱及胸乳腫硬是其候

也服之能令下乳汁通血脈立能自消

白丁香真者

右爲末每服二錢酒調服腫硬立消甚者不過三服

一方 治婦人吹乳硬腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者服之良驗

鹿角一兩 炭火煨存性研細分作二服先將末藥五錢入鍋

次下無灰酒一碗滾數沸倒碗內乘熱盡飲臥服汗出即

安

一方用鹿角剉爲細末酒調二三錢服亦効

一方用鹿角於礬石上磨取白汁塗之乾又塗

勝金丹 治吹乳結核不散腫痛者神効亦治乳岩

百齒霜煎洗

清陰綱目 卷十四 吹乳癰腫 天德堂

右用無根水尤如雞頭子大以黃丹爲衣每服一丸或二丸好

酒下如不飲酒白湯下不可化開亦不可令病人知極有効驗

一方 治乳癰及無名腫毒初起

用五葉藤一名五龍爪不拘多少生薑一塊好酒一碗搗爛

去渣熱服汗出爲度仍以渣敷

敷乳方

天南星 皂角刺燒 半夏生各 白芷 草烏

直鹽一分

右爲細末多用葱白研取汁入蜜調敷若破唇口用膏藥貼

葱熨法 治吹乳乳癰登時立消

用連根葱一大把搗爛成餅一拃厚攤乳上用瓦罐盛灰火

覆忍上須更汗出即愈

一方 治吹奶

金銀花 天蕎麥 紫葛藤各等分

右以醋煎洗患處立消如無蕎麥葛藤二味只金銀花亦可

一方 治乳癰

大黃 鼠藥新者各一分 黃連二分

右三味搗爲末以黍米粥清和傳乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

柳根製法 治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青

用柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛若練囊中熨乳上乾則易之一宿即愈

濟陰綱目 卷廿四 吹乳癰腫

雜方 治吹乳乳癰

用新栢葉一握洗淨以朴硝一勾同入臼內杵之旋加清水紐取自然汁半碗先以病人飲三兩口仍用鷄翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方用生地黃搗汁塗之一日三五次立効

一方用生山藥搗爛敷上即消消即去之遲則肉腐

一方採嫩桑葉研細米飲調攤紙花貼患處

一方用蒲公英搗爛會患處神妙

一方用天南星爲末以溫酒調塗

一方以益母草爲末調塗或生搗爛用之

一方治吹乳用桑樹蛙屑飯搗成膏貼之

一方用遠志酒煎服浮傳患處

一方用野椒桑和藥一同搗膏敷患處

一方用厚朴子加射干酒吞下

一方治乳癰用人牙齒燒存性研爲細末以醋調塗貼乳上

一方治吹乳初覺用白紙一小塊寫山田火三字如左乳患處貼於右鞋底右乳患處貼於左鞋底神効忌金石採熨

一方治乳癰初發用貝母爲末每服二錢溫酒調下即以兩手覆按於桌上垂乳良久自通

一方用真麻皮爲末酒服方寸七睡醒已失

一方用蒲公英忍冬藤酒煎服即欲睡是其効也

一方用蒲公英煮汁飲及封之立消

濟陰綱目 卷十四 吹乳癰腫

雜方 治吹乳用猪牙皂角去皮弦蜜炙爲末酒調服之

一方用大車頭燈油垢丸如桐子大每服五十九溫酒下

一方螞蟥去足用盡燒存性爲末每服二錢黃酒下

一方用黍子一合黃酒下即散

一方治吹乳未成膿者用鼠糞二十一粒研爲細末冷水調服効

○妬乳

夫妬乳者由新產後見未能飲致乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆

令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲半強掣痛手不得近

是也初覺便知以手捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有

膿其勢盛必成癰也輕則爲吹乳妬乳重則爲癰雖有專門不

可不知

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡瘡之黃汁出者新起

如乳

百療不差動經年月名爲妬乳宜以赤龍皮湯天麻湯洗之  
物湯飛鳥膏及飛鳥散始作者可傳以黃茶漏散黃連胡

自餘有馬之

連翹散 治產後妬乳并癰實者下之

連翹 升麻 玄參 芍藥 白欬 防風 射干

杏仁 芒硝 大黃 甘草 各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

瓜蒌散 治乳初結脹不消令敗乳自退

瓜蒌 生半個 粉草 生薑 生半塊 生半塊

右到用酒二碗煎服少頃痛不可忍即搜去敗乳臨臥再一服

濟陰綱目

卷十四

天德堂

一方 治乳妬

黃芩 白欬 芍藥

右爲末以漿水飲服半錢七日三若至乳汁結者即持去左乳

汁若右乳汁結者可將去右乳汁

赤龍皮湯 治妬乳

謝皮三升水一斗煮五升夏冷洗秋冬溫之分以洗乳

天麻湯 治妬乳亦洗浸淫黃爛熱瘡痒疽漏陰蝕小兒頭瘡

天麻草五升以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒

也洗畢傳膏散

飛鳥散 治乳頭生瘡及諸熱浸淫丈夫陰蝕痒熱小兒頭瘡疳

蝕等瘡並以此傳之

維粉 燒砂作水銀上黑 枯礬 三兩

右二味篩爲細末以油煎和之令如脂以薄乳膏日三有汁可

乾疹

黃連用分膏 治乳瘡並諸濕痒黃爛肥瘡

黃連 二兩 胡粉 二兩 水銀 一兩 同研

右三味相和皮異然按之自和合也雖不成一家且得水銀細

散入粉中以傳乳瘡

一方 治妬乳生瘡

蜂房 猪甲中土 車轍中土 各等

右二味爲末苦酒和傳之

鹿角散 治婦人乳頭生瘡汁出疼痛欲灰不可忍

濟陰綱目

卷十四

天德堂

鹿角 分三 甘草 分一

右二味爲末和以鷄子黃於銅器中置溫處炙上傳之日再即

愈神驗不傳

雜方 治妬乳乳癰

燒白蛇爲灰和以猪膏塗之太良

一方 葵莖及子搗篩爲末酒服方寸七即愈

一方 鷄屎乾爲末酒服方寸七須與三服愈

一方 馬溺塗之立愈

一方 取楊米搥二枚炙令熱以絮及故帛糊乳上以搥更互熨之

瘡止已用立効

一方 皂角十條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傳之

一方蔓荊子搗爛酒服仍以洋敷患處

一方用赤小豆酒研爛溫服洋封患處

一方仙人草草一握小酒糟一塊生薑一大塊同研爛入桂末少許炒酒服洋毒患處

一方治乳頭裂破

用丁香爲末傳之○一方用秋茄子裂開者陰乾燒存性水調塗之

補遺方 治婦人乳頭小淺瘡爛痒

用芙蓉花或葉乾爲末搽之

○乳巖

○丹溪云婦人不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累肝氣消沮肝氣積逆遂成隱核如盤棋子不痛不痒十數年後方爲患

卷十四 乳巖

天德堂

陷名曰乳巖以其痛形嵌凹似巖穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理○其症婦年十八歲時曾得此證審其形脉皆實但性急躁使便自街所難者從姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安

此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與帶乳相搏而成又有滯乳因見口氣吹噓而成又有拘急氣凝滯而生者般石膏燒爛皮瓜裏子甘草節青皮皆神效藥也婦人此病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無月經時不可作輕易看也

一婦年六十厚味積氣而形實多妬夏無汗而性急忽左乳結一

清黃

小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食味幾半月以人參調青皮甘草末入生薑汁細細呷一日夜五六次至五七日消矣此乃妬岩之始不早治隱至五年十年已後發不痛不痒必如乳下潰一瘻如巖穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫爲天失於所天乃能生此此謂之巖者以其如穴之嵌岬空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

○魏氏曰婦人乳巖始有核腫如盤棋子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胸腹氣攻疼痛

卷十四 乳巖

天德堂

用五灰膏去蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積念中半婦人未破者尚可治成瘡者終不可治宜服十六味流氣散○薛氏曰乳巖乃七情所傷肝經血氣枯稿之證大抵鬱悶則肝氣阻肝氣逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最難治療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養血氣之藥治之庶可保全否則不治惟一婦服益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更以木香餅炙之喜其謹疾年餘而消餘不信乃服剋伐行氣之劑如流氣飲敗毒散反大如覆碗自出清膿不飲而斃

○李氏曰有鬱怒傷肝脾結核如盤棋子大不痛不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖滴盡氣血方外患用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清脾解鬱湯或十全大補湯更加

清心靜養。可延歲月。經年以後。必於乳下。潰一穴。出膿及出。年無夫。婦人來。尤速。惟初起。不分通何經絡。急用葱白。寸許。生半。夏一枚。隔爛。為丸。如芡實大。以綿塞之。如患左塞。右鼻患右塞。左。鼻二宿而消。

青皮散 治乳巖初起如驚。棋子不痛。不痒。須趁早服之。免致年久潰爛。

青皮 甘草

右為末。用人參煎湯。入生薑汁。調細細呷之。一日夜五六次。至消乃已。○年少婦人。只用白湯調下。

十六味流氣飲 治乳岩

當歸 川芎 白芍藥 黃耆 人參 官桂

濟陰綱目 卷十四 乳巖

厚朴 桔梗 枳殼 烏藥 木通 檳榔

白芷 防風 紫蘇 甘草

右剉一劑。水煎。食遠。臨臥。頻服。外用五灰膏。去其毒。肉生。漸收。飲五灰膏見。○乳癰如青皮。

益氣養榮湯 治抑鬱及勞傷血氣。頸項兩狹。或四肢腫硬。或軟而不赤。不痛。日哺微熱。或潰而不斂。並皆治之。

人參 白朮 炒各 茯苓 陳皮 貝母 香附子

當歸 酒 川芎 黃耆 鹽水 熟地黃 酒 芍藥 枳梗

甘草 炒各

右剉一劑。加生薑三片。水煎。食遠服。○胸痞。或人參。熟地黃。各三分。○口乾。加五味子。麥門冬。○往來寒熱。加軟柴。胡地。骨皮。

○膿清。加人參。黃耆。○膿多。加川芎。當歸。○膿不止。加人參。黃耆。歸。○肌肉遲生。加白芷。官桂。

木香餅 治一切氣滯結。腫或痛。或閃胸。及風寒所傷。作痛。並治。

木香 五 生地黃 兩

右木香為末。地黃。梓膏。和勻。量患處大小。作餅。置腫處。以熱熨。

火熨之

○乳癰

芎歸湯 治產後瘀血上攻。忽兩乳。伸長。細小。如腸直。過小腹。痛不可忍。名曰乳癰。危證。

川芎 當歸 各一

右用水煎。濃湯。不時溫服。再用二劑。逐旋。燒烟。安在病人面前。

濟陰綱目 卷十四 乳巖

桌子下。令病人。曲身。低頭。將口鼻。及兩乳。常吸。烟氣。未甚。痛。再

用一料。則瘀血。消而。乳頭。自復。矣。若更不復。痛。用。此。貼。頂。上。片。時。收。即。洗。去。

濟陰綱目 卷之十四 終



濟陰綱目十四卷

大學士英廉家藏本

國朝武之望撰汪淇箋釋之望字叔卿自署闕中人

淇字澹漪一字右子錢塘人是書所分門目與證

治準繩之女科相同文亦全相因襲非別有所發

明蓋卽王肯堂書加以詳釋圈點以便檢閱耳

# 保生碎事一卷

〔清〕汪淇輯

中國科學院圖書館藏清雍正天德堂刻濟

陰綱目附

附《四庫全書總目·保生碎事

一卷》提要

保生碎事 濟陰慈烈外編

西陵 詹淵子汪 撰石于氏論定

姪 汪開楚友熊氏 全叅

汪 鏞鎮如氏

詹淵子曰。嘗觀刻女傳曰。古之婦人。妊子坐立寢食。視聽言動。皆要循術合矩。如太任之性端一。誠莊惟德之行。及娠文王。未嘗不以胎教爲重生。子卒爲周宗。其理可不驗歟。今之孕婦。未諳古法。爲夫者。情以胎教之理論之。俾婦善調。固其本以達其支。非惟無墮失之患。抑且生子形容端正。才器過人矣。

又曰。人稟陰陽之氣以生。藉父精母血以成其形。人始胎一月如露珠。二月似桃花。三月男女分。四月形象具。五月五臟生。六月

保生碎事 保嬰經驗方

一書陰慈烈外編天德堂

六。胎成七月。闕緩通八月。遊其魂。九月三轉身。十月受氣足。始生。所以古人云。有孕不再房。養子痘疹稀。以慎重其胎也。世人可不謹歟。今幼科醫書多種。自有尚門。余集祇錄。唯地時至七日內之事。採其最要者。簡而當詳。而明有先後。原委切要。著明其良法實質。可防患于未然耳。朽泐年已踰甲。志在守庚。往鄰家緣。遙倚山寺。向梓證道。并地理碎事諸刻。以求政四方。此亦不過切吾初之婆心焉耳。

保嬰經驗方

夢生方

○初生不能發聲。謂之夢生。切不可斷臍。以綿衣包兒。用大油紙。擦煖。騎待。熱回方可斷也。

○將胞衣連帶用火炙令煖氣入兒腹取一箇用青布裹頭口令一伶俐女人拿住貓頭向兒耳邊以口咬破貓耳猶大母一聲兒即醒矣

○初生無啼是肛門爲脂皮所塞用簪通開  
○外感痰涎云兒生不啼由產難少氣也取脂帶向身却將之令氣入腹仍呵至百度白啼矣又以葱白徐徐鞭之亦妙

○高蒲搗生汁入口即活  
○生兒啼聲不出及聲不轉者舌下有膜如石榴子或口中上腭有泡速以指爪摘斷之用葦刀子割之亦可微有血出即活若血出過多者燒斷髮同猪脂塗之

○小兒因產難產下不哭微有氣者以本父母真氣度之即活  
保生碎事 保嬰經驗方 二 胎前產後切要 天德堂  
試口法

○嬰兒在胎口有熱物蓋胎毒也生下啼聲未出急用軟帛拭綿裹指拭盡貴在神速遲則嚙下伏之於心過天行時氣久熱不除乃乘于心心主血脉得熱而流溢于胃胃主肌肉發出于外成瘡疹之毒世之小兒無可免者不知病源在此若依此法庶可免矣

○產家要訣云予見有挖出血餅切開色成五彩舉家大喜謂必無痘患矣而竟以患痘死者且口血雖嚙必入腸胃大便一通其血亦去豈有徑投極下之處伏于裏大石腎之中藏蓄不動久而後發者哉太醫院友收齊先生辨之甚悉謂痘之所主皆屬心火斯言足破千古疑案及思古方用黃連甘草

抹兒口以解胎毒者豈非瀉心之藥也乎

甘草法  
○凡妊娠臨月預辦好甘草指許一節拍碎以水二碗煮煎一蠅殼以綿裹蘸令兒吮之若吐出惡物爲佳服一蠅殼不吐即不須服不問小兒虛實皆可服之

黃連法  
○臨產時先以黃連五錢甘草二錢五分熬濃汁生下即與二三匙再加硃砂細末調汁抹兒口中打盡腹中舊屎次用硃砂硃蜜法

○葛氏明後方云先用甘草黃連拭口吐其惡汁稍定更與硃蜜安神定魄用好硃砂一大豆許細研水飛過煉蜜一蠅殼許和硃砂成膏旋抹口中非獨鎮心安神亦解惡毒若面色青白啼聲不響即不須服

藏衣法  
○凡年遊自虎殺神在太歲後一位如太歲在卯則白虎在寅若產及藏衣犯之子母皆不利

斷臍法  
○產家要訣云兒出胎洗後方斷臍帶則不傷水生癰斷臍須持汁令盡否則寒濕入腹或作臍風又須于近臍四五寸處以線繫以帛包裹以口咬斷蓋緊緊則見血不貫于胞衣自然縮而腸而易下即或延緩數日亦無大害口咬則斷臍不犯乎刀剪自無冷氣內侵可免腹中帶痛之虞如或天時

寒濕坐草艱難母子勞傷元氣者先焚臍帶以消濕熱火  
燒斷令氣緩入兒腹中此又為同生起死之妙法近用新艾  
炙臍亦妙所留臍帶不可太長太長則難乾而傷肌且恐引  
外風為臍風亦不可太短太短則通內而傷臟或致成腹瀉  
而夜啼只以兒之足掌長短為度乃酌中之法千金論云須  
令至兒足趾上為度

○遺道集云兒始生宜淨洗則燥血不留于指路之間可令皮膚  
光澤然後剪臍帶乃初生之帶也剪之宜長一尺有二用粗  
線縛緊剪不長多生臍風縛不緊陰間虛腫

○繆仲淳廣筆記云兒初生不可剪臍帶三朝用麪和水成薄餅  
置兒腹穿臍帶於麪上將新艾火炙臍帶近臍處或三炷或

保生粹事 保嬰秘訣方

五七炷須下帳避風灰畢仍將臍帶紮好聽其自脫至七日  
方脫者元氣足也

○凡兒生下每日夜將湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有  
白點即以指爪或細針挑破取桑樹內汁瀉清塗之永無驚  
風撮口之患

製臍法

○千金論云臍臍須令白練探軟方四寸新綿厚半寸與烏等同  
合之緩急得中急則令兒吐乳不可輕解解時開戶下帳冬

間用火令帳內溫暖仍以溫粉敷之若臍不乾燒絳帛敷之  
○枯礬五龍骨黃丹麝香少為末敷之  
○亂髮燒灰敷之亦可或云黃柏末敷妙

臍風方

○張機論云嬰兒斷臍後宜用厚帛裹臍若乳母不慎或因浴水  
久或兒尿糊中未換濕氣所侵或當風解視七日內遂有此  
疾令兒臍腫多啼不能乳哺即成臍風也

○臍腫當隨輕重重者灸二三十次輕者但汁出多啼用當歸末  
和胡粉敷之常用熱絮熨之

○初生七日內面赤喘急啼聲不出名曰撮口臍風齒齦上有小  
泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛或綿裹指輕輕擦破即開  
口不須服藥

○白爛垂者四枚炒去絲嘴為末密調敷臍內即愈

○繆仲淳云撮口之症必先大便熱須用生犀角及真羚羊角磨  
和藥汁飲之有功效助用太黃錢甘草二煎服

口噤方  
○葱白一寸破四片乳汁蒸灌之

浴兒方  
○北方生子多不洗浴初生下但以舊綿拭淨直至三四歲出痘  
後方浴或大小便處略以水指抹之故北方人較南方壯實

不徒風氣然也若畢竟欲浴取益母五兩剉細煎滾溫溫浴  
之不生瘡疥又可祛寒氣風濕

○產家要訣云兒初出胎浴洗湯內宜入食鹽少許洗畢拭乾以  
膩粉一錢許研細摩其遍身及兩脇然後襁裹既不畏風又  
散諸氣今南方三朝方洗將襁裹之兒又復解開多致感冒

驚風蓋洗三雖云古禮而防患實在變通只依前法出胎便洗自是穩當

○保生要方云小兒初生候浴水不得且以綿絮包裹大入懷中暖之浴後仍當如此雖暑月綿絮亦宜漸漸去之乍離母腹未可冒寒氣也預煎湯湯以漸貯之臨時熱洗不犯生水則兒不生瘡

### 乳兒方

○保生要方云小兒初生若多睡勿強與乳自然長而少病

○顛顛經云夏中盛熱時乳母浴後便與兒乳使兒成胃母亦白痢定息良久熟揉乳之可也

○千金論云乳兒不可過飽滿而溢則成嘔吐大飽以空乳吮之保生要方云保嬰經論方云小兒初生不可過飽

即消若乳來猛取出再乳凡初乳時須常捏去宿乳夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去冷乳令兒咳嗽母與兒臥以臂枕之令乳與頭平則兒不噎母欲寐即奪其乳恐睡熟則不知飽足而成嘔吐也

○小兒精要云夜間乳兒須乳母起坐抱兒乳之

○母有娠乳兒必患胎黃母大醉乳兒必患驚熱母傷飽乳兒必患喘急母新房乳兒必患泄瀉母大怒乳兒必患癲狂母新吐乳兒必患虛羸

○瑣碎錄云兒睡忌乳母鼻風吹額門成風疾

### 哺兒方

○葛氏肘後方云兒生三日應開腹助穀神壯胃氣用粟米煮熟

研如乳汁與兒大豆許慎不可與雜藥

○乳者如也哺者食也乳後不得與食哺後不得與乳乳食相格難以克化大則成癖小則成積疳氣自此始矣

○或云小兒無傷乳法即乳滿而溢亦不為害惟與食相併則乳裹食不化遂結成痰癖是傷食非傷乳也故小兒以乳為主三歲後方可食糕粥五歲外方可食葷腥則一生永無脾胃之疾而孫真人葛氏巢氏聖濟經皆云三日即當用哺以助穀神導腸胃是在為母者細審兒之虛實而調劑之

### 乳兒方

○巢氏病源云小兒始生肌膚未實宜單衣不宜暖衣暖則筋骨緩弱易發瘡瘍宜舊絮不宜新綿新則汗出表虛易受寒邪保生要方云保嬰經論方云小兒初生不可過飽

即地氣尤宜見風日不見地氣風日則肌膚柔軟易得損傷嘗見富貴之家重襁褓被日在懷抱中雖數歲亦不能行而田舍小兒終日暴露或飢或寒絕無他病譬如草木生於深山峻谷及大澤中容易合抱至園圃奇材具并縱加培壅多有秀而不實者豈貴賤之理有異哉

○小兒精要云初生小兒不得用油膩手糊嬰唇忌覆頂嬰足忌飲冷食水冬忌火炙衣被要得小兒安常受飢與寒真至言也

○又云小兒腸胃脆窄若稠粘乾硬酸鹹辛辣一切魚肉水果蟲麪燒炙燥炒煎燂俱是發熱難化之物皆宜禁絕婦人無知畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及語云惜兒須惜食

記之記之

○養子其訣云吹熱莫喚冷喚軟莫喚硬喚少莫喚多其妙法也  
○又云乳子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食舊即傷脾食厚

非為益衣車政所宜無風煩見日寒暑順天時

夜啼方

○雞蕪塗兒臍中極佳男雌女雄

○初生夜啼用燈花燒灰塗乳或用燈花四五丸捻爛以燈心湯  
化下即安

○井邊草或雞窠中草安母臥席下勿令母知極妙

○牛甲為末調敷臍上即安

○黃連五分人參五分甘草五分竹葉二十

保生粹事保嬰經方八八濟陰慈幼外編天樞堂

作二劑每劑加薑一片水煎服

○兒月內啼者用真牛黃飛神砂極細末各五厘塗兒舌上立止

稀痘方

○脂帶乾落安淨瓦上四圍以炭炙之止令烟盡勿使成灰取起

以碗覆地上良久出炭弄研極細每二分加辰砂半分共研

次日以乳汁調敷乳上令兒食乳隨一日內作二三次服盡

永不生瘡疹即生亦少或云兒生一十三日服之未知何說

○產家要訣云早嘗得方士秘傳出胎稀痘小金丹一方不惟鍊

心解毒痘瘡必稀更能助胃辟邪斷除百病予曾製而試驗

矣方用箭頭砂一兩五錢微如茶豆粒大以黃連甘草各二

兩河水五碗於新砂鍋內文武火同煮一日水乾則旋添之

煮乾研末更煎甘草湯飛去黑脚止取隨水過者一兩半黃

三錢此藥市賣多假須看真者其藥輕鬆而有香氣者乃真川

大黃錦紋者切大片以粗紙厚裹於高酒內泡過略洗或

團塊灰火中烘乾又泡又烘如此七次取出以紙攤淨地上

一宿出火氣研末三錢燈心白色者以水和漿粉揉濕曬乾

或焙乾急研為極細末入水再研加水漂取浮者晒乾用二

錢粉草去皮研末二錢右五味共研勻煉蜜和劑分作三十

丸乘濕以金箔為衣黃蠟為槌母令泄氣可以久收凡嬰兒

出胎未曾吃乳之先用江西淡豆豉以河水熬取濃汁少許

用前丸一粒指研如稀糊盛以小杯坐於湯碗中不時抹兒

口內既吃乳後即抹乳上亦可只用一丸胎毒盡從大小便

保生粹事保嬰經方九九濟陰慈幼外編天樞堂

消癰而去其聖藥也但苦牛黃難得真耳此而不真雖用弗

効矣

○又方云小兒能吃食取冷舊糞水以頭真雞子每日投一個在

內七日投完第八日取第一個起來洗淨煮熟與小兒吃依

次吃完不特稀痘竟可不出矣

○又曰隨有濟陽綱目及慈幼綱目即錯行世謹此預白

保生碎事一卷

大學士英廉家藏本

國朝汪淇撰是書又名濟陰慈幼外編錄小兒墮地時至七日內醫療之事如拭口斷臍浴兒稀痘各法寥寥數則大約取其便於檢用非保嬰之全書也卷末一條云隨有濟陰綱目及慈幼綱目卽鐫行則是書之成猶在濟陰綱目之前其慈幼綱目自謂卽證治準繩之幼科加以評釋今未見其本

# 成方切用二十六卷

〔清〕吳儀洛輯

山東省圖書館藏清道光二十七年瓶花書

屋刻本

附《四庫全書總目·成方切用

十四卷》提要

原序

內經醫之奧旨也諸方醫之粗迹也近代時醫相率以方授受而求經論者無之舍奧旨而務粗迹安望其術之神良乎雖然方亦何可廢也方以立法法以制宜譬之工倕匠心獨創斷未有備規矩而爲之者特神而明之存乎其人焉耳古昔方書得人乃傳扁鵲倉公皆稱禁方秘不輕授所以漢時以前成方絕少而仲景爲方之祖也仲景以後方書充棟無如製方者日益多而註方者不少槩見宋成無己始將仲景一百十三方論而註之使觀者知其端緒漸得解會但循文訓釋仲景之良法精義不能盡徹迄明興始有吳鶴臯之醫方考因病分門詞旨明成方切用

原序

爽海內盛行但搜採不無闕略近日汪訥菴倣成氏吳氏之意而擴充之採輯古方名曰集解先詳受病之由次解用藥之意碩論名言採搜甚富然不能無承訛襲愆之說且於新方總未採錄均未可以語全書也洛不揣愚陋取吳氏汪氏所輯而增改之得古今良方凡一千三百餘首稟諸經以觀其合訂之證以發其微題其端曰成方切用以所錄皆取切於時用之方而尤期用方者之切於病情也何則邇來風氣寢薄人之稟受遠不及古故方有宜古不宜今者設起仲景於今日將必有審機察變損益無已者而謂錄方可不切於時用乎且病有標本先後治有緩急逆從醫貴通變藥在合宜苟執一定之方以應無



窮之證未免實虛虛損不足而益有餘反致殺人者多矣用方之切於病豈易易哉然則如之何而後可曰研窮乎靈樞素問而經義無不通也詳求夫望聞問切而證因莫能遁也深悉於氣味陰陽而藥性剖其微也夫然後經之以法緯之以方從斯集而合離變化焉自迎刃而中其肯綮矣

乾隆辛巳中冬月長至日漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂

成方切用

原序

十二

凡例

古人因病立方加減出入俱有深意若不明其受病之由與用方之所以能治其病之故而槩執方以治之其不至於誤世殃人者幾希茲集病情方意互相闡發庶便資用若每方皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見詳略不一或釋制方之意或擬加減之法讀者彙觀而統會之可也

人身一小天地也當天地初開氣化濃密則受氣常強及其久也氣化漸薄則受氣常弱嘗考五帝之壽咸踰百歲三王之後及百者鮮矣故東漢之世仲景處方輒以兩計宋元而後東垣丹溪不過錢計而已豈非深明造化與時偕行者與

成方切用

凡例

一

今去宋元又遠元氣轉薄所以臨證施治多事調養專防尅伐多事溫補痛戒寒涼此今時治法之變通也若執成方或矜家秘惟知盡劑不顧本元惟知古法不審時宜則輕病即重重病即死矣有利濟之心者宜加戰兢焉

一或無已所註仲景之方不過循文訓釋而已近世如方中行喻嘉言周揚俊輩於仲景傷寒論俱有發明而喻氏尤能闡發其精義故本集採錄獨多

一吳鶴臯之醫方考門分七十則嫌其多方凡七百首每證不過數方則嫌其少如五積散逍遙散皆不入選不無闕略近日汪詡菴醫方集解門分二十有一正方三百有奇附方之

數過之但專錄古方未及新方茲集門分二十有六古方新方共一千三百餘首似已足盡醫療之法其有未備學者其神明而推廣之比例而善用之得矣

一集中所分門類醫學始於靈素故首列內經之方而人之由生全賴夫氣故先治氣血者所以配氣故次理血今人血氣虧者甚多故次補養而大虛者防滑脫故次瀉固及受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏又有宜緩攻者故次消導若病在半表半裏法當和解故次和解又有表證未除裏證又急者當表裏交治故次表裏而受病之因多起於六淫故次風寒暑溼燥火而病有因痰者故次除痰有因蟲者故

成方切用

凡例

二

次殺蟲至於婦人小兒癰瘍眼目各有顓科茲集欲便於用

故每科略取數方以備採擇又錄救急之方以應倉卒未附勿藥元詮以為衛生之方使人知病有勿藥之治真有方而具無方之妙已

### 方制總義

靈樞刺節真邪篇曰真氣者所受於天與穀氣并而充身也真氣即元氣也人稟陰陽五行以生氣以成形是所受於天者也而所受於天之真氣必與後天未穀日生之氣合并以充周於身然後得以運行而不息焉是故上有膻中之氣所以通呼吸而統攝諸氣以主一身之治節者也此其運布在肺中有水穀之氣所以轉輸在脾胃下有丹田之氣所以吸引胸中之氣下行以歸於宮而精氣互根以爲三焦之本者也此其藏納在腎氣聚則生氣散則死醫欲活人當先識此爲第一義耳

素問疏五過論曰治病之道氣內爲寶循求其理求之不得過

在表裏凡治病者當先於元氣之在內者而珍重之循法度以後察其過之在表在裏以治之斯無誤也○按氣有外氣天地之六氣也有內氣人身之元氣也唯元氣充實則六淫之外邪不能侵犯故人之所賴唯斯而已即如本篇始末所言及終始等篇皆倦倦以精氣重虛爲念先聖惜人元氣至意於此可見矣

成方切用

總義

一

素問陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化

之父母生殺之本始神明之府也治病必求其本萬事萬變皆本陰陽而病

機論治爲尤切故凡治病者必求其本或本於陰或本於陽知

病所由生而直取之乃爲善治所以凡因病而致逆因逆而致

變因寒熱而生病因病而生寒熱者但治其所生之本原則後

生諸病不治自愈所以得陰脈而見陽證者本陰標陽也得陽

脈而見陰證者本陽標陰也若更治其標而不治其本則死矣

○先病爲本後病爲標脈爲本證爲標○白病多生於本六氣

之用則有生於標者有生於中氣者太陰寒水本寒標熱少陰

君火本熱標寒其治或從本或從標審寒熱而異施也少陰

火從火化爲本太陰濕土從濕化爲本其治但從火溼之本不

從少陽太陰之標也陽明燥金從燥化爲本陽明爲標燥

陰風木本從風化爲本厥陰爲標其治不從標本而從乎中

中者中見之氣也蓋陽明與太陰爲表裏其氣互通於中故燥

金從濕土之中氣爲治與少陽爲表裏其氣互通於中故燥

之氣以定治術若太陽少陰亦互為中見之氣者然其或寒或熱標本甚明可以不求之於中而治其標者皆治其本惟中滿與大小便不通治其標蓋中滿則藥食之氣不能行而臟腑皆失所稟故無暇治其本先治其標二便不通乃危急之候諸病之急無急於此故亦先治之舍此則無有治標者矣至於病氣之標本又自不同病發而有餘必受他臟他氣先治其本不使標不使累及本臟本氣為善也。凡病有標本更有似標之本似本之標若不辨陰陽逆從指標為本指本為標指似標者為標似本者為本迷亂經常倒施藥殺人如麻矣

素問至真要大論帝曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大

小願聞其約奈何 五運六氣各有太過不及故曰氣有多少人

大小亦必隨其輕 岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有

輕重通其至所為故也 上下則病有遠近在裏日中在表日外

必及於病至之所而不可過亦不可不及也 大要曰君一臣

成方切用 總義

土

二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣

六偶之制也 大要大約也主病之謂君君當倍用佐君之謂臣

即古所謂複方也故君一臣二其數三君二臣三其數五皆奇

之制也君二臣四其數六君三臣六其數八皆偶之制也奇方

為陽而輕偶方為陰而重故曰近者奇之遠者偶之汗者不以偶下者不以

奇用偶方上為陽故用奇方用其輕而緩也遠者為下為陰故

不以奇陽升不能降下也汗者不以偶陰沉不能達表也下者

之概則氣味之陰陽又豈後於奇偶哉故下文復言之此其微

意正不止於品數之奇偶而實以發明方制之義爾。舊本云

汗者不以奇下者不以偶而王太僕註云表汗藥不以偶方泄

下藥不以奇制是註與本文相反矣然王補上治上制以緩補

註得理而本文似誤今改從之。奇音其補上治上制以緩補

下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也

補上治上制以緩欲其雷布上部也補下治下制以急欲其直

達下焦也故欲急者須氣味之厚欲緩者須氣味之薄若制緩

方而氣味厚則峻而人患用急方而氣味薄則柔而不前病所

唯緩急厚薄得其宜則其病至之所而治得其要矣

遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也 言病所有深遠

設用之無法則藥未及病而氣味在中道而止矣故當以食為

助而使其無遠弗達是過之也如飲酒吸粥以助藥力之類由

此類推則服食之疾徐根柢之升降以及湯膏丸散各有宜

故云無越其制度也王冰曰假如病在腎而心氣不足服藥宜

急過之不以氣味飼心腎藥凌心火復益其心氣上下遠近例

同完素曰聖人治上不犯下治下不犯上治中不犯上下遠近例

故曰味伐無過命曰大惑好古曰治上必妨下治中必妨下治下必

黃帝以治肺必妨脾用從容以治腎必妨心服乾薑以治中必

皆受納於胃胃氣散精於脾脾復傳精於肺肺主治節然後分

布臟腑是胃乃人身分金之運也未有藥不入胃而能入於肺亦

必藉滋補氣以上蒸於肺未聞心藥飲至心間而始入於肺藥

欲至肺間而始入於肺也若上膈之藥食後服之胃氣先為別食

所填塞必待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈

成方切用 總義

土

在肉理之中藥之精粕如何得到其所到者不過氣味爾若云

上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須在

頭治足之藥必須在足乎此理之是故平氣之道近而奇偶制

小其服也遠而奇偶制大其服也大則數少小則數多則九

之少則二之 平氣之道平其不平之謂也如在上為近在下為

各存奇偶相兼之法如方奇而分兩偶方偶而分兩奇皆互用

之妙也故近而奇偶制小其服小則數多而遠而奇偶制大其服

分兩輕分兩重則性力薄而化及近處也遠而奇偶制大其服

大則數少而止於二蓋少則分兩重分兩重則性力專而直達

深遠也無過病遠而小其制則藥不及病亦猶風馬牛不相及

謂誅伐無過病遠而小其制則藥不及病亦猶風馬牛不相及

爾上文云近者奇之遠者偶之常法也此云近而奇 奇之

偶遠而奇偶言用之變也知變知常則其應用不窮矣

不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫

涼反從其病也 此示人以圓融通變也如始也用奇奇之而病

不去此其必有未合乃當變而為偶奇偶迭用



寒者熱之熱者寒之

者從之

治也病之甚者如熱極反寒寒極  
當從之從卽下文之反治也○王

火也遇草而熇得木而燔可以溼折之攻之病之大甚者猶龍火也

性以水折之適足以光燄詣天物  
理以火逐之則燔灼自消燄火撲

攻寒從之調攻以寒熱須從其性  
正治從者反治從小從多觀其

勞者溫之結者散之留者攻之燥

損者益之逸者行之驚者平之上

開之發之適事爲故也溫之溫養之也逸者奔逸

木

之安之也上之吐之也摩之按摩

逆者正治從者反治從少從多觀

逆其病者謂之正治以寒治寒以

有逆從者以病有微甚病有微甚

熱之眞假者眞寒則脈沉而細或

而沉寒在內也眞熱則脈數有力

此皆眞病眞寒者宜溫其寒眞熱者

力或沉而鼓擊或身寒惡衣或便

陰也假熱者陰證似陽水極以

辭語雖謬妄而聲則微或虛狂起倒

反兼熱化亦曰陰盛格陽也此皆假  
則浮陰退舍矣假熱者溫其真陽中

治者也。又如虛實之治。實則瀉之。虛至虛有盛候。則有假實矣。大實有羸

正氣虛也爲色慘形疲爲神衰氣怯或夢遺精滑或嘔吐隔塞或病久攻

度或暴困失志或外證雖實而脈弱  
實者邪氣實也或外開於經絡或內

或血留而凝滯必脈病俱盛者乃實  
問最多疑似有不可不辨其真爾如

實正氣奪則虛此虛實之大法也設  
將顧其正而補之乎抑先其邪而

係之此所以宜慎也夫正者本也邪氣雖盛亦不可攻蓋恐邪未去而

手無及故治虛邪者當先顧正氣正  
白有攻意蓋補陰卽所以攻熱補陽

復而邪不退者亦未有正氣竭而命  
可量緩急暫從權宜從少從多寓戰

七

也若正氣無損者邪氣雖微自不宜  
反盛適足以藉寇兵而資盜糧故治

方是實證實者可攻何慮之有不能

多見而假實之證最多也假寒之證

也然實者多熱虛者多寒如丹溪曰寒而不知氣不足便是寒故虛能受

治謂何岐伯曰熱因寒用寒因熱用

其所主而先其所因其始則同其終

可使氣和可使必已

前則以熱藥治陽下陷之後冷體弱  
致大益此熱因寒用之法也寒因熱

治則不以熱攻治則病增乃以寒  
消寒性遂行情且協和而病以減

用熱因寒用之義塞因塞用者如下

氣虛之中焦氣壅欲散則更虛其下欲補下則滿甚於中治  
不知本而先攻其滿藥入或減藥過依然氣必更虛病必漸甚  
乃不知少服則資壅多服則宣通峻補其下以疎散其中則下  
虛自實中滿自除此塞因塞用之法也如大熱內蓄或大寒內  
凝積聚壅滯瀉利不止寒滯者以熱之熱滯者以寒之此  
通因通用之法也以上四治必伏其所主者制病之本也先其  
所因者求病之由也既得其本而以真治真以假對假其始也  
治類以同其終也病變則異矣是為反治之法故可使破積潰  
堅氣和而病必除帝曰善氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆  
已也○塞入聲帝曰善氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆  
而從之從而逆之疏氣令調則其道也氣調而得者言氣本調  
言其治法亦無過逆之從而已其間有宜主治逆而佐從之  
者有宜主治從而佐逆之者皆所以疏泄其邪氣而令其調和  
此治氣調而病  
於中者之道也

素問至真要大論帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君  
佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也主病者對證之  
要藥也故謂之

成方切用

總義

八

若君者味數少而分兩重賴之以為主也佐君者謂之臣味數  
稍多而分兩稍輕所以匡君之不逮也應臣者謂之使數可出  
入而分兩更輕所以備通行向導之使也此則君臣佐使  
之義非上下三品如下文善惡殊貴之謂也○使去聲帝曰  
三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貴也前言方制言處方之  
言藥性善惡故有上中下之殊神農云上藥為君主養命以應  
天中藥為臣主養性以應人下藥為佐使主治病以應地故在  
本草經有上中下三品之  
分此所謂善惡之殊貴也

素問至真要大論帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調

其內從外之內者治其外從內之外者內為本從外之內

之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內

者先治其外而後調其內病雖盛於標治必先其本而後可愈

本中外不相及則治主病也此猶律家二罪俱發科其重也○

按此篇即三因之義也如金匱要略曰千般疾難不越三條一  
者經絡受邪入臟腑為內所因也二者四時氣候九氣傷人傳  
寒不通為外皮膚所中也三者房室金刃蟲獸所傷也故無擇  
著三因方為內有內因有外因有不內外因蓋本於仲景之三條  
而仲景之論實本諸此帝曰善病之中外何如答以前問病之中外  
陰陽治法之詳也岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守  
其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之  
下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利方法也陰陽三陰三陽也  
鄉各安於其所也微者謂之調小寒之氣和之以溫小熱之氣  
和之以涼也其次平之謂大寒之氣平之以熱大熱之氣平之  
以寒也盛者奪之謂邪之甚者當直攻而取之如甚於外者汗  
去之是謂隨其所利也○別必列切

素問五常政大論帝曰有毒無毒服有約乎約度也禁服篇曰  
夫約方者猶約囊

成方切用

總義

九

也囊滿而弗約則輸泄岐伯曰病有新久方有大小有毒無毒  
方成弗約則神與弗俱岐伯曰病有新久方有大小有毒無毒  
固宜常制矣病重者宜大病輕者宜小無毒者  
其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去  
其九藥性有大毒常毒小毒無毒之分去病有六分七分八分  
於病則反傷其正而生他患矣故當知約制而進止有度也○  
王氏曰大毒之性烈其為傷也多小毒之性平和其為傷也少常  
毒之性滅大毒之性烈一等加小毒之性一等所傷可知也故至  
約必止之以待來證爾然無毒之藥性雖平和而久之則氣  
有偏勝必有偏絕久攻之則臟氣偏弱穀肉果菜食養盡之無  
既弱且困不可長也故十去其九而止穀肉果菜食養盡之無  
使過之傷其正也病已去其六七八九而有餘未盡者則當以  
也如臟氣法時論曰毒藥攻邪五穀為養五果為助五畜為益  
五菜為充者是也然毒藥雖有約制而飲食亦貴得宜不可使  
之太過過則不盡行復如法如此而猶有未盡則再行前  
反傷其正也不盡行復如法以漸除之寧從乎慎也必先



歲氣無伐天和五運有紀六氣有序四時有令陰陽有節皆歲  
歲氣變遷而妄呼寒熱則邪正盛衰無所辨無盛盛無虛虛而  
未免犯歲氣伐天和矣天枉之由此其甚焉無盛盛無虛虛而  
遺人天殃邪氣實者復助之盛其盛矣正氣奪者復攻之虛其  
真氣日消則病氣日甚無致邪無失正絕人長命盛其盛是致  
遺人天殃醫之咎也無致邪無失正絕人長命盛其盛是致  
是失正也重言之所以深戒夫伐天和而絕人長命以見歲氣不可不慎也

厥陰風木司天巳亥風淫所勝平以辛涼王註云厥陰氣未為佐  
以甘苦以甘緩之以酸瀉之風為木氣金能勝之故平以辛涼  
苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之○清反勝之治以酸溫  
以酸瀉之者木之正味其瀉以酸也○清反勝之治以酸溫  
左以甘苦或氣有不及則金之清氣反能勝之故當治以酸溫  
急苦以酸求木之同氣溫以制清也佐以甘苦甘以緩肝之  
急金也

成方切用

總義

十

少陰火君天午熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之熱  
火氣水能勝之故平以鹹寒佐以苦甘以酸收之熱  
也苦能泄所以去熱之實也熱盛於經而不散者以酸收之過  
○寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛或氣有不及則水之寒氣  
甘能勝水溫能制寒也佐以苦酸辛寒得苦而溫得  
辛而散且火為水勝則心苦緩故宜食酸以收之  
太陰土司天丑未溼淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以  
淡泄之溼為土氣燥能除之故平以苦熱酸從木化制土者也  
苦從火化也以淡泄之者淡能利氣也鹹上甚而熱治以苦  
氣法時論曰脾苦溼急食苦以瀉之是也溼上甚而熱治以苦  
溫佐以甘辛以汗為故而止溼鬱於上而成熱者治以苦溫苦  
以和中辛以散鬱也則溼熱之在上以微汗如故而止矣○熱反勝之治以苦寒佐以苦酸  
苦寒所以散熱熱勝則亡陰液故佐以苦酸

少陽火相司天寅申火淫所勝平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以  
苦發之以酸復之熱淫同水能勝火故平以鹹冷苦能瀉火之  
而散越者以酸收之火鬱而雷伏者以苦發之然以發○寒反  
去火未免傷氣故又當以酸復之而火熱二氣同治也○寒反  
勝之治以甘熱佐以苦辛或氣有不及與上  
陽明燥金司天卯酉燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之燥  
金氣火能勝之平以苦溫苦從火化也佐以酸辛酸能  
生津辛能潤燥也燥結不通則邪實於內故以苦下之○熱反  
勝之治以辛寒佐以苦甘辛寒所以瀉火生金

太陽水司天辰戌寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之辛  
是以散寒苦甘可以勝水以鹹○熱反勝之治以鹹冷佐以苦  
辛或氣有不及則熱反勝之故治以鹹冷抑  
辛大邪也佐以苦辛苦能泄熱辛能散熱也

成方切用

總義

士

厥陰風木在泉寅申風淫於內治以辛涼佐以甘苦以甘緩之以  
辛散之治以辛散之者所謂肝欲散急食辛以散之也○清  
反勝之治以酸溫佐以甘苦以辛平之治以酸溫佐以甘苦俱  
平之者木之正味其補以辛也  
少陰火在泉卯酉熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以  
苦發之治以鹹寒佐以甘苦以酸收之俱與上文司天治○寒  
反勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之此與上文司天反勝大  
味其補以鹹水之  
正味其瀉以鹹也  
太陰土在泉辰戌溼淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以  
淡泄之此與司天○熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之

或氣有不及則火之熱氣反能勝之故當治以苦冷抑火邪也佐以鹹甘鹹寒制熱甘溫補土也以苦平之即苦冷之義

**少陽相火在泉** 巳亥 火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以苦發之火相

畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散火故用 ○寒反勝之

以爲佐以酸收之以苦發之義與上文熱淫治同

**治以甘熱佐以辛苦以鹹平之** 或氣有不及與上文

**陽明燥金在泉** 午 燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之燥

金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受金傷以

甘緩之金之正味以辛瀉之也燥結不通則邪實於內故當以

苦下之按上文燥淫所勝佐以酸辛與此甘辛稍異又如六元

正紀大論子午年陽明在泉亦云下酸溫皆與此不同考之藏

氣法時論曰肺苦氣上逆急食苦以 ○熱反勝之治以平寒佐

泄之用酸補之辛瀉之正此之謂也

**以苦甘以酸平之以和爲利** 或氣有不及則熱反勝之治以平

寒必助其慘故但宜平寒抑其熱爾佐以苦甘所以瀉火也以

酸平之金之正味其補以酸也以和爲利戒過用也即平寒之

**成方切用** 總義

**太陽寒水在泉** 丑未 寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以

**辛潤之以苦堅之** 寒爲水氣土能勝水熱能勝寒故治以甘熱

氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲 ○熱反勝之治以鹹

**堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之也**

**治佐以甘辛以苦平之** 或氣有不及則熱反勝之故治以鹹冷

也以苦平之者水之正味其補以苦也 ○王氏曰此六氣方治

與前淫勝法殊貫其云治者瀉客邪之勝氣也云佐者皆所利

所宜也云平者補已弱之正氣也 ○時珍曰司天主上半年天

氣司之故六淫謂之所勝上淫於下也故曰平之在泉主下半

年地氣司之故六淫謂之於內外淫於內也故曰治之當其時

而反得勝已之氣謂之反勝 ○按六氣盛衰不常有勝時有

所復王氏亦曰凡先有勝後必復詳見至真大要論欲深達者

當究心焉 ○按以上所論乃五運六淫之氣每歲年辰而變

遷者也又凡一歲之主氣始於大寒日交厥陰風木之初氣次

至春分日交少陰君火之二氣次至小滿日交少陽相火之三

氣次至大暑日交太陰濕土之四氣次至秋分日交陽明燥金

之五氣次至小雪日交太陽寒水之六氣次至冬至日交

氣分主四時歲氣如常故曰主氣客氣布行天令以加臨於土

氣之上斯上下相召而病變生矣 ○時珍曰經云必先歲氣毋

伐天和又曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜加

辛溫之藥以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥以順夏浮之氣

長夏宜加甘苦辛溫之藥以順化之氣秋月宜加酸溫之藥

以順秋降之氣冬月宜加苦寒之藥以順冬沉之氣所謂順時

養肺氣長夏省甘增酸以養腎氣秋省辛增酸以養肝氣冬省

鹹增苦以養心氣此則不伐天和而防其太過所以體天地

之大德也味者捨本從標春用辛涼以伐木夏用鹹寒以抑火

秋用苦溫以泄金冬用辛熱以潤水謂之知時藥殊背素問逆順

之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣雖然月有四時日有

四時或春得秋病夏得冬病皆由明之

**成方切用** 總義



成方切用總目

內經方 靈樞方五 附方六 素問方七 附方五

寒痹方

季春痹方

目不瞑方

猛疽方

萬氏方

肘後方

千金二方

陳文中方

心鏡方

敗疵方

成方切用

總目

鼓脹方

范汪方

普濟方

何大英方

正傳方

醫鑑方

脾痺方

血枯方

陽厥方

酒風方

尸厥方

五疫方

治氣門 正方一十三 附方二十七

栝樓薤白白酒湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

四獸飲

十味人參散

又六君子湯

七味白朮散

三白湯

六神散

八珍湯

十全大補湯

大防風湯

成方切用

總目

溫經益元散

補中益氣湯

益胃升陽湯

升陽順氣湯

參朮益胃湯

調中益氣湯

調營養衛湯

順氣和中湯

補中益氣加黃蘗生地湯

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

橘皮竹茹湯

又橘皮竹茹湯	丁香柿蒂湯	丁香散	四磨湯	五磨飲	舉元煎	獨參湯 見救急門	保元湯 見嬰兒門	參朮膏 見補養門	成方切用 總目	理血門 正方二十一 附方三十四	四物湯	知藥四物湯	坎離丸	三黃四物湯	元戎四物湯	補肝丸	神應養真丹	四神湯	婦寶丹
	又丁香柿蒂湯										滋陰降火湯	二連四物湯	三黃補血湯	治風六合湯	治氣六合湯	防風當歸散	艾附暖宮丸	歸芎湯	

生地黃連湯	抵當湯	抵當丸	桃仁承氣湯	桃仁承氣對子	蒼朮地榆湯	芍藥地榆湯	芍藥湯	導滯湯	秦朮白朮丸	成方切用 總目	秦朮當歸湯	秦朮防風湯	麻黃人參芍藥湯	當歸補血湯	槐花散	加減四物湯	又槐花散	欬血方	龍腦雞蘇丸	犀角地黃湯
玉燭散		代抵當丸									秦朮羌活湯	秦朮蒼朮湯				槐角丸	當歸和血散			

六味地黃丸

五

五福飲

未

七福飲	黑地黃丸	大營煎	小營煎	虎潛丸	補益丸	參朮膏	兩儀膏	天真丸	貞元飲	成方切用	三才封髓丹	三才湯	當歸地黃飲	人參固本丸	地黃醴	參乳丸	頓乳取粉法	歸腎丸	天王補心丹	贊化血餘丹
					龍虎濟陰丹					總目		鳳髓丹								
										七										

孔聖枕中丹	養元粉	大補陰丸	斑龍丸	又斑龍丸	元武豆	龜鹿二仙丹	一至丸	蟠桃果	扶桑丸	成方切用	羊肉湯	益氣聰明湯	秦朮鼈甲散	黃耆鼈甲散	人參黃耆散	秦朮扶羸散	百合固金湯	補肺湯	補肺阿膠散	紫苑湯
										總目										
										八										

王母桃

玉屏風散

黃耆湯

川芎湯

妙香散

參苓白朮散

休癰飲

何人飲

四君子湯

見治氣門

歸脾湯

見理血門

人參養營湯

見理血門

成方切用

總目

九

十全大補湯

見治氣門

八珍湯

見治氣門

生脈散

見消暑門

當歸補血湯

見理血門

牆固門

正方二十四

附方四

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

訶子散

河間訶子散

鞏隄丸

真人養臟湯

脫肛方

牡蠣散

柏子仁丸

固真丸

金鎖固精丸

珍珠粉丸

豬苓丸

苓朮菟絲丸

治濁固本丸

祕元煎

成方切用

總目

十

固陰煎

茯菟丹

菟絲煎

水陸二仙丹

黏米固腸糕

惜紅煎

桑螵蛸散

人參檮皮散

玉關丸

四神丸

見祛寒門

二神丸 見祛寒門

如聖散 見經帶門

撲汗法

表散門 正方二十七 附方三十八

桂枝湯

疏邪實表湯

桂枝甘草湯

桂枝加附子湯

桂枝附子湯

桂枝新加湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加厚朴杏仁湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝二麻黃一湯

成方切用 總目

十一

桂枝二越婢一湯

桂枝加黃耆湯

桂枝五物湯

栝樓桂枝湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃加朮湯

麻黃附子湯

甘草麻黃湯

三拗湯

大青龍湯

小青龍湯

小青龍加石膏湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

葛根解肌湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

升麻葛根湯

柴葛解肌湯

柴胡升麻湯

九味羌活湯

十神湯

成方切用 總目

十二

神朮散

白朮湯

大無神朮散

局方神朮散

許學士神朮散

九製蒼朮散

葱豉湯

連鬚葱白湯

人參敗毒散

倉廩散

硝黃敗毒散

敗毒加黃芩湯

連翹敗毒散

荆防敗毒散



當歸承氣湯	大黃甘草湯
破棺丹	
大陷胸湯	
白散	
小陷胸湯	
大陷胸丸	
十棗湯	
三化神佑丸	小胃丹
赤金豆	
三物備急丸	
成方切用	總目
備急散	圭
太平丸	
礪砂丸	
敦阜丸	
木香檳榔丸	
木香導氣丸	
百順丸	
枳實導滯丸	
倒倉法	
霞天膏	

蜜煎導法	
豬膽導法	
鹽合草烏導法	嚙薑導法
大螺着小腹法	
冠傷寒結胸法	又法
附子瀉心湯	見瀉火門
大黃黃連瀉心湯	見瀉火門
抵當湯	見理血門
桃仁承氣湯	見理血門
感應丸	見祛寒門
成方切用	總目
久痛丸	見祛寒門
天台烏藥散	見祛寒門
竹葉薰法	
蘿蔔菜薰法	
消導門	正方一十九 附方三十三
枳朮丸	
枳朮湯	半夏枳朮丸
橘半枳朮丸	橘皮枳朮丸
木香枳朮丸	香砂枳朮丸
木香乾薑枳朮丸	木香人參乾薑枳朮丸



消飲丸	三黃枳朮丸
麴蘖枳朮丸	
平胃散	
除溼湯	和解散
藿香平胃散	人參養胃湯
加味平胃散	厚朴溫中湯
對金飲子	
和胃飲	
保和丸	
小保和丸	大安丸
成方切用	總目
芍藥枳實丸	
痞氣丸	
伏梁丸	肥氣丸
息賁丸	賁豚丸
十香丸	
枳實消痞丸	
廓清飲	
健脾丸	
益氣健脾丸	養榮健脾丸
理氣健脾丸	舒鬱健脾丸

化痰健脾丸	清火健脾丸
和中健脾丸	妙應丸
寬中進食丸	
解肝煎	
排氣飲	
葛花解醒湯	
大和中飲	
小和中飲	
鼈甲飲	
小分清飲	方見燥溼門
成方切用	總目
資生丸	
神香散	
佐關煎	見祛寒門
抑扶煎	見祛寒門
和解門	正方二十九 附方二十二
小柴胡湯	
柴胡去半夏加栝樓根湯	柴胡桂枝乾薑湯
柴胡合桂枝湯	柴胡加龍骨牡蠣湯
厚朴生薑半夏甘草人參湯	柴胡飲子
柴胡桔梗湯	柴平湯

清鎮丸	柴胡四物湯
調經湯	小前胡湯
柴胡雙解散	
芍藥甘草湯	
白朮芍藥湯	
黃芩湯	
黃芩加半夏生薑湯	黃芩芍藥湯
外臺黃芩湯	
黃連湯	
溫膽湯	
成方切用	總目
十味溫膽湯	九
越鞠丸	
逍遙散	
八味逍遙散	黑逍遙散
藿香正氣散	
藿薷湯	
六和湯	
三解湯	
清脾飲	
薑茶飲	

梅蜜飲	
痛瀉方	
甘草黑豆湯	
正柴胡飲	
柴陳煎	
柴芩煎	
一柴胡飲	
二柴胡飲	
三柴胡飲	
四柴胡飲	
成方切用	總目
五柴胡飲	干
歸柴飲	
蘆根湯	
陰陽水	
栝樓薤白白酒湯	見治氣門
半夏瀉心湯	見瀉火門
甘草瀉心湯	見瀉火門
生薑瀉心湯	見瀉火門
表裏門	正方一十四 附方六
大柴胡湯	

風引湯	侯氏黑散	祛風門 正方七十一 附方二十二	四逆散	柴苓飲	茵陳丸	冰解散	麻黃白朮湯	三黃石膏湯	香蘇飲	成方切用	扶苓補心湯	參蘇飲	五積交加散	五積散	雙解散	防風通聖散	桂枝加大黃湯	葛根黃連黃芩湯	柴胡加芒硝湯	大前胡湯
										總目	芎蘇飲				祛風至寶丹					
										三										

牽正散	三生飲	活絡丹	稀莖丸	天麻丸	地黃飲子	大秦朮湯	千金大續命湯	羌活連翹續命湯	附子續命湯	成方切用	白虎續命湯	麻黃續命湯	小續命湯	越婢加朮湯	朮附湯	礬石湯	烏頭湯	桂枝芍藥知母湯	頭風摩散方	防已地黃湯
										總目										
										圭	葛根續命湯	桂枝續命湯								

改容膏

獨瘰湯

門風湯

東垣胃風湯

解風散

愈風丹

清空膏

消風散

轉舌膏

正舌散

成方切用

二丹丸

排風湯

涼膈散

清心散

滌痰湯 方見除痰門

稀涎散

竹瀝湯

貝母栝樓散

青州白丸子

星附散

總目

重

治風六合湯 方見理血門

三聖散

加味六君子湯

葱苡仁湯

人參補氣湯

烏頭粥

桂枝五物湯 方見表散門

十味劉散

通痹散

史國公藥酒方

成方切用

三因白散子

獨活湯

防風通聖散 方見表裏門

祛風至寶丹 方見表裏門

獨活寄生湯

羌活續斷湯

養壽解語湯

不換金丹

搜風順氣丸

順風勻氣散

總目

重

攝生飲調蘇合丸	烏藥順氣散	八味順氣散	通頂散	瀉青丸	舒筋保安散	加味羚羊角散	如聖飲	上中下通用痛風方	三化湯	方見攻下門	成方切用	總目	血痺湯	三痹湯	千金地黃湯	烏梅擦牙關方	許盾宗方	王克明方	清震湯	祛寒門	正方五十三	附方四十	理中湯	附子理中湯	桂枝人參湯

枳實理中丸	理中安蚘丸	溫胃湯	黃耆湯	溫中湯	補中湯	連理湯	理陰煎	六味回陽飲	四逆湯	四逆加人參湯	芍藥甘草附子湯	白通湯	茱萸四逆湯	茯苓四逆湯	甘草乾薑湯	當歸四逆湯	苗陳四逆湯	漿水散	回陽返本湯	當歸四逆湯	四逆加吳茱萸生薑湯	眞武湯	附子湯	吳茱萸湯	吳茱萸加附子湯	大建中湯	小建中湯



半硫丸	靈砂丹
二氣丹	返陰丹
破陰丹	百問方
黑鉛丹	
黑錫丹	
五德丸	
七德丸	
唐鄭相國方	
青娥丸	喝起丸
復陽丹	
成方切用	總目
三氣飲	羌
壽脾煎	
一炆丹	
九炆丹	
聖朮煎	
消暑門	正方二十 附方二十四
消暑丸	
黃連消暑丸	
小半夏茯苓湯	方見燥淫門
四味香薷飲	

黃連香薷飲	二香散
三物香薷飲	五物香薷飲
六味香薷飲	十味香薷飲
縮脾飲	
大順散	
來復丹	方見祛寒門
枇杷葉散	
冷香飲子	
桂苓甘露飲	
又桂苓甘露飲	
成方切用	總目
清暑益氣湯	補肝湯
黃耆人參湯	
清燥湯	
二妙散	三妙散
六一散	
益元散	雞蘇散
碧玉散	清六丸
溫六丸	三生益元散
吳萸六一散	黃耆六一散
五苓散	方見燥淫門
	幸

竹葉石膏湯 方見瀉火門

人參白朮湯 方見瀉火門

生脈散

五味子湯

補氣湯

水瀉散

大黃龍丸

瀉火散

總論消暑諸方

燥溼門

正方二十七

附方二十九

成方切用

總目

五苓散

四苓散

蒼朮五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

茯苓白朮湯

春澤湯

二朮四苓湯

茯苓琥珀湯

藟苓湯

補氣丸

茯苓湯

圭

豬苓湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

越婢湯

加味腎氣丸

防己黃耆湯

防己茯苓湯

成方切用

總目

舟車丸

滑川散

疏鑿飲子

實脾飲

五皮飲

麥門冬湯

大分清飲

小分清飲

革解分清飲

縮泉丸

大半夏湯

圭



琥珀散	
茵陳蒿湯	
茵陳三物湯	茵陳將軍湯
升陽除溼防風湯	
禹功散	
羌活勝溼湯	升陽除溼湯
羌活除溼湯	
東垣升陽除溼湯	
大橘皮湯	
八正散	
成方切用	總目
防己飲	
當歸拈痛湯	
蒼朮丸	
平胃散	見消導門
潤燥門	正方二十八 附方七
麥門冬湯	
炙甘草湯	
清燥救肺湯	
通幽湯	
當歸潤肺湯	

濟川煎	
潤腸丸	
活血潤燥丸	潤燥湯
又潤腸丸	
決津煎	
韭汁牛乳飲	
活血潤燥生津湯	
甘露飲	
桂苓甘露飲	小甘露飲
消渴方	
成方切用	總目
地黃引子	
治久嗽方	
瓊玉膏	
麻仁蘇子粥	
桑白皮等汁十味煎	
滋燥養營湯	
白茯苓丸	
文蛤散	
黃耆湯	
宜明黃耆湯	







截瘧七寶飲

滌痰湯

星香散

牛黃丸

貝母丸

清肺飲

清氣化痰丸

蘇子降氣湯

定喘湯

七氣湯

成方切用

總目

三因七氣湯

四七湯

白金丸

百花膏

加味百花膏

六君子湯

見治氣門

六味地黃丸

見補養門

八味地黃丸

見補養門

殺蟲門 正方一十

烏梅丸

溫臟丸

集効丸

蠟蟲丸

使君子丸

癩肝丸

掃蟲煎

化蟲丸

消渴殺蟲方

雄檳丸

經帶門 正方二十一 附方七

成方切用

總目

溫經湯

膠艾湯

方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

四物加芩朮湯

熱六合湯

四物加芩連湯

寒六合湯

氣六合湯	風六合湯
正氣天香散	
調經飲	
毓麟珠	
啟宮丸	
抑氣散	
五物煎	
牡丹皮散	
芎歸六君子湯	
逍遙飲	
成方切用	總目
如聖散	聖
人參荆芥散	
固下丸	
白芷散	
當歸煎丸	
婦寶丹	見理血門
胎產門	正方三十七 附方二十一
膠艾湯	
又方	又膠艾湯
當歸芍藥散	

桂枝茯苓丸	
乾薑人參半夏丸	
橘皮湯	
半夏茯苓湯	
釣藤湯	
當歸貝母苦參丸	
羚羊角散	
天仙藤散	
紫蘇飲	
白朮散	
成方切用	總目
鯉魚湯	罌
竹葉湯	
紫苑湯	
安榮散	
胎元飲	
固胎煎	
涼胎飲	
參朮飲	
表實六合湯	
表虛六合湯	風溼六合湯

升麻六合湯	柴胡六合湯
大黃六合湯	人參六合湯
朴實六合湯	梔子六合湯
石膏六合湯	茯苓六合湯
膠艾四物湯	附子六合湯
四物大黃湯	
當歸散	
達生散	
東胎丸	枳殼散
殿胞煎	
成方切用	總目
豬蹄湯	
當歸補血湯加葱白方	聖
參朮膏	
黑神散	
九蜜煎	古黑神散
清化飲	
失笑散	
通靈散	
清魂散	
當歸羊肉湯	

當歸生薑羊肉湯	
返魂丹	
免懷湯	
艾附暖宮丸	見理血門
佛手散	見理血門
歸芎湯	見理血門
嬰孩門	正方四十九 附方五
初生拭口法	
甘草下胎毒法	
豬乳法	
成方切用	總目
襁褓法	
乳哺法	
乳兒法	
哺兒法	
雞將護法	
柴歸飲	
升麻葛根湯	方見表散門
疏邪飲	
柴葛煎	
參蘇飲	方見表裏門

惺惺散

透邪煎

麻黃湯 方見表散門

加味葛根湯

# 紅花湯

## 桔梗湯

五味異功湯

羌活透肌湯

透肌散

紫草化毒湯

搜毒煎

成方切用

# 總目

涼血養營煎

甘桔湯 方見漁火門

消毒飲

加味如聖散

前胡化斑湯

活血散

犀角地黄湯 方見理血門

四順清涼飲

**黃連解毒湯** 方見瀉火門

人參白虎湯 方見瀉心門

七正散

加味導赤散

辰砂益元散

退火回生散

當歸黃連湯

保元湯

十一味異功散

九味異功煎

六物煎

六氣煎

成方切用

總目

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯 方見治氣門

四物湯 方見理

當歸活血湯

內托散

八珍湯 方見治氣門

附子理中湯 方見祛寒門

十全大補湯 方見治氣門

止痛活血散

治痘瘡溼爛方

興



痧證初起方

癰瘍門 正方二十六 附方七

早筴丸

早蛤丸

桔梗杏仁煎

腸癰秘方

金銀花酒

回毒金銀花酒

長春藥酒

真人活命飲

成方切用

總目

癰

托裏散

芍藥痰藜煎

當歸痰藜煎

灸法

芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

百草煎

蠟礬丸

雄礬丸

托裏十補散

托裏散

托裏溫中散

托裏黃耆湯

蝶蛸散

槐花蕊

棉花瘡點藥

又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方

十全大補湯 方見治氣門

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

成方切用

總目

平

降癰散

後方

止痛當歸湯

眼目門 正方一十九 附方六

人參益胃湯

雞子黃連膏

羊肝丸

濟生羊肝丸

圓明膏

兔矢湯

本事方

滋陰地黃丸	消風養血湯	金露散	補陽湯	益陰腎氣丸	駐景丸	加味駐景丸	定志丸	張子和定志丸	地芝丸	成方切用	眞人明目丸	防風飲子	神效明目丸	二百味草花膏	飛絲芒塵入目方	明目六事方	目疾者戒沐頭宜濯足	益氣聰明湯	救急門	六君子加天麻方
				方見補養門						總目			又法					見補養門	正方三十	附方二十三
										至										

四君子加薑汁竹瀝方	獨參湯	五磨飲	火醋熏鼻法	禮拜法	附子理中湯	生脈散加香薷方	脫陽脫陰	縊死	溺死	成方切用	中惡	蠱毒	鹽鹵毒	服鉛粉	蛇蟲犬咬傷	蛇傷三方	壁虎咬	瘋狗咬	湯泡傷
	方見治氣門				方見祛寒門					總目									
										至		礪毒	諸菌草毒及蟲蟻入腹			蜈蚣傷一方	蝎子螫	常犬咬	



陰陽應象大論	吳氏論
又四氣調神論	
藏器法時論	又藏器法時論
又藏器法時論	又藏器法時論
老子論	
又四氣調神論	
扁鵲論齊侯疾	
刺法論	
悟真篇	古歌
晉道成長生養性論	蔣氏調氣篇
成方切用	總目
蘇氏養生訣	李氏十六字訣
彭祖論	
調息	
莊子南華經	王龍溪論
李東垣論	
調息之法	
勞心勞力人須調息以保元氣	
讀書家宜習養生法	醫家尤須愛養精力
小週天	
道經六字訣	

一秤金訣	
金丹祕訣	
按摩導引諸法	
羅先生論	
養生宜節飲食	
瘧疾尤宜節飲	
脾胃爲養生之本	
草頭藥汁不可服	
痰飲痞積等證宜灼艾	
素有溼熱飲食宜清勝	
成方切用	總目
蟲疳酒癰諸病初愈時不可驟服滋補藥	
臥病常存退步心	
眞空寺老僧論鄭子元心疾	
病中不可偏信師巫	
問疾來者勿得與之相接	
病加於小愈	
素不服藥不爲無見	

成方切用卷一目錄

內經方 靈樞方五 附方六 素問方七 附方五

寒痺方

季春痺方

目不眠方

猛疽方

萬氏方

肘後方

千金三方

陳文中方

心鏡方

敗疵方

成方切用

目錄

內經方

鼓脹方

范汪方

普濟方

何大英方

正傳方

醫鑑方

脾癰方

血枯方

陽厥方

酒風方

尸厥方

五疫方

成方切用卷一

內經方

內者性命之道經者載道之書其書乃黃帝與岐伯見鬼區伯高少師少俞雷公六臣講求而成其方高簡奧妙不易測識今人罕能用之者然既為古聖之神方自不得不錄之以冠於卷首

用醇酒二十觔蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔漬酒中浸以綿

絮布巾用生桑炭炙中以熨寒痺所刺之處 靈樞壽夭剛柔

篇 靈樞之體要足謂靈樞按漢靈文志曰黃帝內經十八卷蓋

靈樞九卷素問九卷內經也二經各載八十一篇皆合黃

鐘九九之數而天黃帝曰余聞刺有三變何謂三變 按史記黃

帝本紀有熊國君少典之子神農而有 伯高答曰有刺營者

天下都刺之即以上德王故號黃帝 刺營者刺其陰刺衛者刺其陽

有刺衛者有刺寒痺之雷經者 刺寒痺者溫其經三刺不同故

成方切用 寒痺方

變 黃帝曰刺三變者奈何伯高答曰刺營者出血刺衛者出

氣刺寒痺者內熱 調經論亦曰取血於營取 黃帝曰營衛寒痺

之為病奈何伯高答曰營之生病也寒熱少氣血上下行 營主

氣也病在陰分則陽勝之故為寒熱往來陰病則陰虛則

無氣故為少氣邪在血故為上下妄行所以刺營者當刺其血

分 衛之生病也氣痛時來時去 佛音 戲音 責響風寒客於腸胃

之中 衛屬陽為水穀之悍氣病在陽分故為氣痛氣無定形故

之病風寒外襲而客於腸胃之間以六 寒痺之為病也雷而不

去時痛而痺不仁 寒痺久留不去則血脈不行或凝滯 黃帝曰

刺寒痺內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焯之刺大人者以

藥熨之 內熱謂溫其經也布衣血氣虛弱故當以火焯之刺黃

帝曰藥與奈何伯高答曰用淳酒二十觔蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一觔細白布四丈并納酒中置酒馬矢煨音溫中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晡音暮其日乃出乾乾并用洋子音音與綿絮複音音布為複巾長六七尺為六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出以巾拭身亦三十徧而止咬咀者謂碎之如咀嚼之又吹去細末然後煎之取其清汁也漬浸也馬矢煨中者燒乾馬屎而煨之也此西北方所常用者塗鹽泥封固也周也復布為複巾者重布為巾如今之夾袋所以盛綿絮藥滓也洋相也桑布以生桑炭者桑能利關節除風寒淫痺諸病也大人血氣清滑故當於未刺之先及既刺起步內中無見之後但以藥製則經通汗出而寒痺可除矣

成方切用 寒痺方 二 內經方

風每刺必熨如此病已矣此所謂內熱也刺後起步於密室內中欲其氣血行而風避風寒也凡此者皆所謂內熱之法

治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤鉤之

治季春痺 靈樞經筋篇曰足陽明之筋病足中指支脛轉筋脚跳堅本經之筋起於中指結於膝上邪外上行加於轉骨上結於膝外廉其直者上循肝結於膝也跳者跳動堅者堅強伏兔轉筋脾前腫癢癢同痠痠腹筋急其直者上循伏兔結於也引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻僻音斜也其筋自缺盆上頰頰挾口上合於太陽太陽為目上綱陽明為目下綱故凡目之不合不開口之急縱至僻者皆足陽明之筋病寒則急而熱則緩治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤

鉤之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒音音嗽音音美炙肉不飲酒者自強也為之三拊音音而已馬音馬脂也日頰也

酒嗽音音乃風中血脈也手足陽明之筋絡於口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則通熱於右右中寒則通熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑癢營衛滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痹以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其營衛以通其經絡桑炭能治風痺通節竅以桑鉤鉤之者鉤正其口也復以生桑水炭置之也坎之中高下以坐等者欲其深淺適中便於坐而得其暖也然後以前膏熨其急頰且飲之也雖不善飲亦自強之三拊而已言再三拊其患處則病自已矣

治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名曰季春痺也足陽明正氣也

以千里水煮秫米半夏湯治目不瞑 靈樞邪客篇黃帝問於成方切用 季春痺方 目不瞑方 三 內經方

伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不臥出者何氣使然邪氣感入令人寐無從生故云不臥出也 伯高曰五穀入於胃也其糟粕音音津液宗氣分為三隧音音故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉陰道也糟粕之道出於下焦津液之道出於中焦宗氣之道出於上焦故分為三隧喉嚨為肺之系而下貫於心故通宗氣而營氣者必其津液注之於脈化以爲血以榮四末內行呼吸營氣者必其津液注之於脈化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉營氣出於中焦中焦受水穀之氣泌而臟腑無所不至故其運行之數與衛氣者出其悍氣之慄疾而數皆相應焉○泌音祕泉水貌 衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑衛氣慄疾滑利不能入於分肉皮膚之間而不休者也晝行於陽常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六

腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽  
氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不瞑邪氣逆於陽蹻則  
分故偏盛於陽陽偏盛則陽蹻陷者受傷之謂陽蹻黃帝曰善  
盛陰虛故目不瞑○陽蹻有五音說較奇又虛處切黃帝曰善  
治之奈何伯高曰補其不足寫其有餘此刺治之補寫也補其  
陰之照海也寫其有餘即陽蹻所出足太陽之申調其虛實以  
脈也若陰盛陽虛而多臥者自當寫陽蹻陰蹻矣謂其既  
通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至謂既  
營虛者多屬內因此半夏湯一法蓋專為邪實者設爾黃帝  
曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯  
高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升  
煮之炊以葦薪古今量數不同大約古之黍量一斗合今之鐵  
成方切用目不瞑方 猛疽方 四 內經方  
合六勺云五升者即火沸置稗音米一升治半夏五合徐炊令  
今之一升六合許爾火沸置稗米一升治半夏五合徐炊令  
竭為一升半火沸者先以火沸其水而後置藥於中也稗即黃  
陽盛陰虛夜不得眠半夏味辛性溫能和胃散邪除腹脹目不  
得眠故並用之稗米一升約今之三合二勺半夏五合約今之  
一合六勺炊至一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知為  
度故其病新發者覆杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也  
合豕膏冷食治猛疽 靈樞癰疽篇黃帝曰願盡聞癰疽之形  
與忌曰名岐伯曰癰發於喉中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿  
不寫塞咽半日死其化為膿者寫則合豕膏冷食三日已猛疽  
害之急也若膿已寫當豕膏可以愈之即脂之煉淨者也  
謂萬氏方治肺熱暴癰用豬脂一動燒過入白蠟一動再煉少  
頭濾淨冷定不時挑服一匙即愈又肘後方治五種瘡疾用豬  
脂一動溫熱服日三當利乃愈千金方治小便不通豬脂一動

水一升煎三沸飲之立通謂開胃寒諸指灌注各二升飲火  
或至二升下酒五合和而飲之謂開胃寒諸指灌注各二升飲火  
腫一塊水煮熱切如豆大與食自然脫落謂開胃寒諸指灌注各二升飲火  
於兒心鏡方治上氣咳嗽喘滿四肢百沸切和醋將食之若  
無痰服此最能潤肺潤腸即是豕膏之屬  
老人咳嗽不利及大腸秘結者尤宜用之  
劉棗連草根各一升煮飲治敗疵 靈樞癰疽篇岐伯曰癰發  
於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰膿治之其  
中乃有生肉大如赤小豆劉棗音連草根各一升以水一斗  
六升煮之竭為取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗出至足已  
後更也連連翹也二草之根俱能解毒故各用一升大約古之  
一升得今之三合有零以水一斗六升煮取三升其折數類此  
以連翹及草根煮汁以強飲之  
雞矢醴治鼓脹 素問腹中論是謂素問 黃帝問曰有病心  
成方切用 敗疵方 鼓脹方 五 內經方  
腹滿且食不能暮食此為何病岐伯對曰名為鼓脹心腹留滯  
再食其脹如鼓帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二  
劑已一劑已知其效二劑可已其病王冰云本草雞屎利小便  
於溼熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓  
脹有殊功此岐伯神方也禮者一宿初來之酒醉也又按范汪  
方云宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾一臂偏痛一人令穿地  
作坑取雞屎剉葉然之宋醴入坑中熏之有長蟲出遂愈也普  
濟方云治鼓脹且食不能暮食由脾虛不能制水水反勝土水  
穀不運氣不宣流故令中滿其脈沉實而滑宜雞矢醴主之何  
大英云諸腹脹大皆屬於熱精氣不得滲入膀胱別走於腑溢  
於皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬全不  
傳之寶也用臘月乾雞矢白半動袋盛以酒醋一斗漬七日溫  
炒三孟日三或為末服二錢亦可正傳云用雞矢一升研細  
炒焦色地上出火毒以百沸湯淋汁每服一大盞調木香檳榔  
末各一錢日三服以平為度又按醫鑑等書云用乾雞矢八  
合炒微焦入無灰好酒三碗共煎乾至一半許用布濾取汁五  
更熱飲則腹鳴辰巳時行三次皆黑水也次日覺是面漸有

竊又欲一次則漸趨至時上而愈矣。凡鼓脹由於停積及淫熱有餘者宜用之。按虛者禁之。吳鶴皋曰：朝實暮急，病從陰化，可入營血。帝曰：其時有復發者何也？反復也。岐伯曰：此飲食不節，故時有病也。故脹之病本因停滯，雖然其病且已時，故不可復縱飲食也。雖其病且已時，故當病氣聚於腹也。言雖是飲食不節，時有病者，又有病且已，之後其根未盡，故除病氣重聚於腹，亦復發焉。

治之以蘭除陳氣也。治脾瘕。素問奇病論帝曰：有病口甘者，病名謂何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾瘕。五氣五化也。瘕，病也。夫五味入口，藏於胃，脾為之行，其精氣津液在脾，故令人口甘也。津液在脾，脾屬土，其味甘，脾熱則口甘爾。此肥美之所發也。此人必數食甘美而多肥也。肥者，令人內熱，甘者，令人成方切用。

脾瘕方  
六 內經方  
中滿故其氣上溢，轉為消渴。肥者，味厚助陽，故能生熱。甘者，性傳陰，其氣上溢，故治之以蘭除陳氣也。蘭，草性味甘寒，能利水，其氣清香，能生津止渴，潤肌膚，故可除陳積蓄熱之氣。按蘭草俗名省頭草，即澤蘭之一類。二種有以爲即山蘭葉，李時珍辨正之詳載本。

以四烏鰂骨一蘆茹二物合并丸，以雀卵飲以鮑魚汁治血枯。草從新澤蘭下。

素問腹中論帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩時時前後血病，名謂何？何以得之？

岐伯曰：病名血枯，此得之年少時有所大脫血，

月信反無期矣。

若醉入房，中氣竭，肝傷，故月事衰少不來也。血枯者，月水斷絕，有二者：一則以少時有所大脫血，如胎產既多，及崩淋吐衄之類，一則以醉後行房，血盛而熱，因而從肝則金精盡，泄精去則氣去，故中氣竭也。夫腎主閉藏，肝主疏泄，則金精盡而傷肝，及至其久，則三陰俱虧，所以有先見諸證，如上文所云而終必至於血枯，則月事衰少不來也。此雖以女子爲言，若丈夫有犯前證，亦不免爲精枯之病，則勞損之屬皆是也。帝曰：治之奈何？復以何術？

岐伯曰：以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之，丸以雀卵，大如豆，以五丸爲後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。

烏鰂，即烏賊也。骨名海螵蛸，氣味鹹溫，而瀉主女。甘溫能補益精血，主男子陰痿不起，故可使多精有子。及女子帶下，便溺不利，後飯者，先藥後飯也。鮑魚，即今之淡乾魚也。諸魚皆可爲之。惟石首鮑魚者，爲勝其氣味，辛溫無毒，魚也。諸女子血閉也。以上四藥皆通血脈，血主於肝，故凡病傷肝者，亦成方切用。

血枯方  
七 內經方  
皆可用之。蘇頌曰：本草諸藥，立不治血枯，而經法用之，是攻其所生，所起爾時，珍曰：今人知雀卵能益男子，陽虛不知能治女子。血枯蓋雀卵益精血爾。按：蘆茹，甲乙經及太素新校正，李氏曰：俱作蘆茹，獨張景岳以爲即茜草也。以茜草一名茹，蘆能止血，治崩漏，又能活血通經，脈也。存之以備參考。

以生鐵洛爲飲，治陽厥。素問病能論帝曰：有病怒狂者，此病安生？

岐伯曰：生於陽也。生於陽氣之逆也。帝曰：陽何以使人狂？岐伯曰：陽氣者，暴折而難決，故善怒也。病名曰陽厥。善怒而狂，三陽之氣脈逆上行，故名曰陽厥。帝曰：何以知之？岐伯曰：陽明者，常動，巨陽少陽不動，而動大疾，此其候也。陽明常動者，謂如下關地會大迎，人迎氣衝衝陽之類，皆有也。脈常動者，也。巨陽少陽不動者，謂巨陽惟委中，少陽惟聽會，懸鐘其脈雖微動，而不甚也。於其不甚動者，而動且大疾，則其常動者，更甚矣。此則陽厥怒狂之候。帝曰：治



之奈何岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已五味入口而化於脾食入於陰也藏於胃以養五臟氣長則陽厥怒也食少則氣衰故節奪其食不使胃火復助陽邪狂者可已使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也生鐵即爐冶間鑄落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平木火之邪故可以下氣疾除怒狂也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵縮水之類皆同此意

以澤瀉尤各十分麋銜五分合以三指撮為後飯治酒風素問病能論帝曰有病身熱解憤汗出如浴惡風少氣此為何病

岐伯曰病名曰酒風此即風論中所謂漏風也酒乃麴蘖熱藥所成故令身熱濕熱傷筋縱而不收持故懈惰溼得熱而蒸故多汗多汗則氣屢泄而衛虛故惡風而少氣因酒得風而病故曰酒風帝曰治之奈何

岐伯曰以澤瀉尤各十分麋銜五分合以三指撮為後飯澤瀉味甘性微寒能滲利溼熱尤甘苦氣溫能補中燥溼止汗麋銜即鹹性微寒能滲利溼熱尤甘苦氣溫能補中燥溼止汗麋銜即

成方切用酒風方 戶賦方 八 內經方

翳其左角之髮方一寸燔治飲以美酒治尸厥素問繆刺論曰邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上

絡左角邪客於手足少陰心經足少陰腎經手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經此五絡皆會於耳中上絡於左耳之

角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸故曰尸厥

五絡俱竭陰陽離散也身脈皆動筋惕肉瞤也上下經竭厥逆氣亂昏無知故名尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉

足中指爪甲上各一病足陽明之井厲兌穴也後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心主手厥陰之井中衝穴也上文五絡未及手

心主而此刺少陰銳骨之端各一痛立已謂神門穴手少陰之端也竹管吹其兩耳以竹管納對耳孔用力吹之勿令氣泄所以謂吹其左耳極三度翳其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已翳刺同左角之髮五絡之血餘也燔治也補以其類故可使尸厥立已

小金丹治五疫素問遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相傳易無問大小病狀相似不施救療如何可得不可移易者

五疫即五運疫癘之氣如何可得岐伯曰不相染者正氣內存不相移易者謂欲禁止其傳染也

邪不可干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦即不邪干疫癘乃天之邪氣若吾身正氣內固則邪不可干故不相染也天牝鼻也鼻受天之氣故曰天牝老子謂之玄牝是亦此義氣

成方切用五疫方 九 內經方

自空虛而來亦欲其自空虛而去故曰避其毒氣天牝從來復得其往也蓋以氣通於鼻鼻連於腦中流布諸經令人相染矣

氣出於腦為嚏或張鼻泄之氣出於腦即先想心如日陽之氣則邪從鼻出毒氣可令散也

應人之心想心如日即所以存吾欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木心之所至氣必至焉故存想之則神有所注而氣可至矣左行於東

所以壯肝氣也次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲壯肺氣也次想赤氣自心而出南行於上化作燄明所以壯心氣也次想黑氣

自腎而出北行於下化作水所以壯腎氣也次想黃氣自脾而出存於中央化作土脾氣也五氣護身之畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室煌煌煌煌耀耀天行疫癘傳染最速故當謹避之如此又一法於立春之日日未出而吐之舊註曰吐逆志去心以水煎之飲二匙吐之不疫又一法於雨水日

後三浴以藥泄汗謂以祛邪散毒之藥煎湯三浴以泄其汗也 又一法小金丹方辰砂二兩水磨雄黃一兩葉子雌黃一兩紫金半兩以金箔同研之可爲細末 同人合中外固了地一尺築地實不用爐不須藥制用火二十觔煨之也七日終常令火不斷 候冷七日取次日出合子埋藥地中七日取出順日研之三日煉白沙蜜爲丸如梧桐子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣嚥之服十粒無疫干也合子即磁罐之屬順日研之謂左旋也。按此遺篇之言乃出後人增附法非由古未足深信。避疫之法必節慾節勞仍勿忍飢以近其氣自可無慮

成方切用

五疫方

十

內經方  
卷一

成方切用卷二目錄

治氣門 正方二十三 附方二十七

栝樓薤白白酒湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

四獸飲

十味人參散

又六君子湯

七味白朮散

三白湯

六神散

八珍湯

成方切用

目錄

十全大補湯

大防風湯

溫經益元散

補中益氣湯

益胃升陽湯

升陽順氣湯

參朮益胃湯

調中益氣湯

調營養衛湯

順氣和中湯

補中益氣加黃蘗生地湯

代赭旋覆湯

升陽益胃湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

治氣門  
卷一

橘皮竹筴湯

又橘皮竹筴湯

丁香柿蒂湯

丁香柿蒂竹茹湯

又丁香柿蒂湯

丁香散

四磨湯

五磨飲

舉元煎

獨參湯

保元湯

成方切用

參朮膏

見補養門

目錄

十二

治氣門

成方切用卷二

治氣門

天積氣爾地積形爾人氣以成形爾惟氣以成形氣聚則  
形存氣散則形亡氣之關於形也豈不鉅哉然而身形之  
中有營氣有衛氣有宗氣有臟腑之氣有經絡之氣各為  
區分其所以統攝者衛氣也衛氣之於人身猶如氣之於  
息通體節節皆靈者不賴胸中大氣為之主持大氣一衰  
則出入廢升降息神機化滅氣立孤危矣金匱曰營衛相  
得其氣乃行大氣一轉其氣乃散見營衛兩不和諧氣相  
痺而難通必先令營衛相得其氣始散然則大氣之關於  
大氣一轉其氣乃散見營衛相痺而難通必先令營衛相  
若此金匱獨龍其微舉胸痺短氣心痛獨發其義於一門  
而治法以通胸中陽氣為主蓋陽主開陽盛則有開無塞  
爾若胸中之陽不舒可損其有餘則用枳朮湯足矣用枳  
必與朮各半可過損乎識此以治胸中之病寧不思過半  
乎今人多暴其氣而不顧逆病成復損其氣以求理習用  
枳實枳殼砂仁香附橘皮蘇子沉香山查檳榔厚  
朴之屬總由未識胸中大氣為生死第一關爾

成方切用

栝蒌薤白白酒湯

金匱

治氣門

治胸痺喘急欬唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數

徐忠可曰人之胸中如天陽氣用事故清肅時行呼吸往還  
不愆常度津液上下潤養無壅痹則虛而不充其息乃不勻  
而喘唾乃隨欬而生胸為前背為後其中氣痹則前後俱痛  
上之氣不能常下則下之氣不能時上而短矣寸口主陽因  
虛伏而不鼓則沉而遲關主陰陰寒相搏則小緊而數數者  
陰中挾燥火也故以栝蒌開胸中之燥痹為君薤白之辛溫  
以行痹著之氣白酒以通行營衛為佐其意謂胸中之陽氣  
布則燥自潤痰自開而諸證悉愈也○寸口脈沉而遲關上  
小緊數既為胸痹主脈又云陽微陰弦即胸痹而痛數為是  
乎曰此正見仲景斟酌證之妙蓋胸痹證陽微陰弦則不  
運不運則津液必凝滯而為痰故胸痹本與支飲痰飲相類  
但支飲痰飲乃飲重而滯氣胸痹則由陽虛而氣削痰飲相  
之故仲景既不列胸痹於支飲痰飲中即胸痹內亦不黏然  
一脈為言而曰夫脈當取太過不及陽微陰弦即胸痹而痛  
又註云責其極虛見胸痺證當全責陽虛既非表證外入之  
疾亦非痰飲內積之比故以栝蒌薤白潤燥通陽為主未嘗

不取消痰下氣而意實不同於治飲也故細分寸口凡通者約略言其脈之在陽者為微細分關上小緊數者約略言其脈之在陰者為弦當取太過不及者約略之辭也今以陰陽繁審關前關後使人認定上焦陽虛而胸痹一證與支飲痰飲等病因治法判然矣○彼支飲云飲逆倚息氣短不得臥其形如腫此胸痹云喘息欬唾胸背痛短氣彼邪重故不得臥此虛故前後胸背應痛是大別異

### 栝蒌薤白三白酒

此上焦膈中藥也膈中兩乳中間經曰膈中者臣使之官喜樂出焉喻嘉言曰胸中

陽氣如離照當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加故知胸痹者陰氣上逆之候也仲景微則用薤白白酒以益其陽薤葉光滑露亦難於故曰薤露其性滑泄能通氣滯故胸痹下重並用之甚則用附子乾薑以消其陰世醫不知胸痹為何病習用豆蔻木香訶子三稜神麴

### 成方切用

栝蒌薤白白酒湯

二 治氣門

麥芽等藥坐耗其胸中之陽亦相懸矣

加半夏名栝蒌薤白半夏湯金匱治胸痹不得臥心痛徹背徐忠

可曰胸痹而加以不得臥此支飲之兼證又心痛徹背支飲原不痛飲由胸痹而痛應背故即前方加半夏以去飲下逆○此條若無心痛除白酒加枳實厚朴桂枝名枳實薤白桂

枝湯金匱治胸痹心中痞氣結在胸胸滿脇下逆搶心徐忠

胸痹而加以心中痞胸滿似病與結胸之象乃上焦陽微而客氣動膈也註云雷氣結在胸即客氣也更膈下逆搶心是不獨上焦虛而中焦亦虛陰邪得以據之為逆為搶故於薤白栝蒌又加枳朴以開其結桂枝行陽以疏其肝又曰人參

湯亦主之者病由中虛去其太甚即可補正以化邪也胸痹之虛本陽氣微非營氣虛也陽無取乎補宣而通之即陽暢暢則陽盛矣故薤白方以行陽為主不取補也此曰人參湯等分而用乾薑者爾

### 四君子湯

治一切陽虛氣弱脈來虛軟脾衰肺損飲食少思體瘦而黃或痰白皮聚毛落言語輕微四肢無力及脾胃不和洩痢虛飽

人參 白朮土炒 茯苓錢 甘草錢 加薑棗

人參甘溫大補元氣為君白朮苦溫燥脾補氣為臣茯苓甘淡滲溼瀉熱為佐甘草甘平和中益土為使氣足脾運飲食倍進則餘臟受蔭而色澤身強矣

加陳皮以理氣散逆名異功散錢氏調理脾胃再加半夏以燥溼除痰名六君子湯治脾胃氣虛飲食不進致成痰癖不時

### 成方切用

四君子湯

三 治氣門

欬唾或胃氣虛寒動成嘔惡凡虛癰及諸病後惟真陰虧損培土之劑加香附砂仁名香砂六君子湯治虛寒胃痛或腹

痛泄瀉六君子加竹瀝麥冬治四肢不舉脾主四肢六君子加烏梅草果等分薑棗煎名四獸飲三因和四臟以輔脾故名治五臟氣虛七

情兼併結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾亦治瘡癰六君子加柴胡葛根黃芩白芍名十味人參散治虛熱潮熱身體倦

怠加黃耆山藥亦名六君子湯為病後調理助脾進食之劑

加棗仁炒治振悸不得眠胡治加薑汁竹瀝治半身不遂在

右者屬氣虛亦治痰厥暴死加木香藿香乾葛名七味白朮散錢氏治脾虛肌熱泄瀉虛熱作渴參朮乾葛皆能生津楊仁齋再加五

味柴胡治消渴不能食除人參加白芍名三白湯調理內傷

外感治虛煩或渴或泄加山藥藕豆薑棗煎名六神散

治小兒表熱去後又發熱者世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或謂不治此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再熱非熱證也宜此湯加梗米和其胃氣則收陽歸內而身涼矣

四君合四物名八珍湯治氣血兩虛及胃損飲食不為肌膚若傷之重者真陰內竭虛陽外鼓諸證蜂起則於四物

四君之中又加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元名十全大補湯

羌活附子杜仲牛膝名大防風湯治鶴膝風十全大補去川

芎加陳皮名溫經益元散治汗後頭眩心悸筋惕肉瞤或

成方切用 四君子湯 補中益氣湯 四 治氣門

汗出不止或下後下利不止身體疼痛 太陽宜汗汗多則亡

證陽明宜下下多則亡 陰故有下利身痛之證

補中益氣湯 東垣

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脈洪大而虛氣

短而渴或陽虛自汗 宜本湯加麻黃根浮小 或氣虛不能舉

元致瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之證

而皆病矣陽氣下陷則陰火上乘故熱而煩非真熱也頭者

諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作或止非

如外感常痛不休也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶

言脾虛故惡食脾虛則火上升肺故短氣火冠金不能生

水故渴脾虛不能升舉則降多而升少致清陽下陷則為瀉

痢正虛邪陷則瀉不止李東垣內傷外感辨傷於飲食勞

役七情六慾為內傷傷於風寒暑溼為外感內傷發熱時熱

時止外感發熱熱甚不在內傷發熱得暖便解外感惡寒雖

厚衣烈火不除內傷惡寒不惡風反惡風外感惡風見

風便惡內傷內傷有淫或不止外感頭痛連痛無休待表邪

傳裏方罷內傷有淫或不止外感頭痛連痛無休待表邪

須二三日外感邪傳裏方罷內傷有淫或不止外感頭痛連痛無休待表邪

無力倦怠嗜臥外感則風傷筋寒傷骨一身筋骨疼痛四肢沉困

則短氣不足以息外感則喘滿氣盛有餘內傷則心熱外

感則手背熱天氣通於肺鼻者肺之外候外感傷寒則鼻塞

傷風則流涕然能飲食則知味腹中和二便如常地氣通於

脾口者脾之外候內傷則懶言惡食口不知味小便黃赤大

便或秘或泄內傷證不足宜溫宜補宜和宜外感證屬有餘

宜汗宜吐宜下若內傷證作外感又宜發散為急此湯唯上焦痰

反掌故立補中益氣湯主之又有內傷發熱者宜養陰忌服此

重者宜補養為先外感者宜發散為急此湯唯上焦痰

中焦熱傷食腦滿者不宜服陰虛發熱者宜養陰忌服此

湯宜遵丹溪及養榮之法若虛虛兼外感者宜用補陰益氣

法煎等

黃耆 錢半 人參 甘草 炙 白朮 土 陳皮 醋 當歸 五 升 麻

成方切用 補中益氣湯 五 治氣門

柴胡 三 薑三片 棗二枚 東垣原方黃耆止有一錢其餘各

歸一錢陳皮七分升柴五分如病甚者參耆錢半白朮當

隨證加用○東垣取輕清上升故數分少立齋每以三錢五錢隨

汗出不止者但用本方加白芍一錢內傷感證及暑月勞倦發熱

止是脾氣下陷也加酒炒白芍三錢瘧疾發久形體羸瘦未

中有痰飲者加半夏一錢或內有火熱可加黃芩一錢凡婦

女胎前氣虛以致胎動不安小產崩漏或產後血虛發熱但

加酒炒白芍二錢此方凡婦中虛損病後失調無不相宜

倪氏曰七情內傷脾胃先 如血不足加當歸精神短少加

人參五味肺熱欬嗽去人參乾薑加葛根 風藥多燥葛根獨

升胃中清氣入 頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細

辛風溼相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃寒

氣滯加青皮蔻仁木香益智腹脹加枳實厚朴木香砂仁腹

理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛爲陰火傷其生發之氣營血亦虧血減則心無所養致令心滿而煩病名曰憊

上部渴甚躁極或飲而反吐卽加肉桂五味甚則加附子

飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡之旨也張景岳曰補中益氣湯之用原以治勞倦內傷發熱等症雖曰為補氣也非發汗也然實有不散而散之意故於勞倦感寒或氣虛痰喘及脾氣下陷等證則最所宜也若全無表邪寒熱而但有中氣虧損者則升柴之類大非所宜蓋以升柴味皆苦寒性專疏泄雖曰能引清氣上升然非所宜者固可因升而散之使或無邪能不因散而愈耗其中氣乎即此湯以補劑為主而唯藉升柴以引達清氣不知微虛者猶可出入大虛者必難假借當此之時即純用培補猶恐不及而再兼疏泄安望成功且凡屬補氣之劑無不能升正以陽主升也其升而不散者其散斯得補陽之大法又奚必升柴之是賴乎故於諸證之中凡其不宜用此者則有不可不察如表不固而汗不斂者不可用外無表邪而陰虛發熱者不可用陽氣無根而格陽戴陽者不可用脾肺虛甚而氣促似喘者不可用命門火衰而虛寒泄瀉者不可用肺虛火亢而吐血衄血者不可用四肢厥逆而陽虛欲脫者不可用總之元氣虛極者不可用四散陰陽下竭者不可用升火虧敗者不可用清涼今人但知補中益氣湯可以補虛一槩倚之而不知病當緊急則此時幾微關係判於一舉指之間而纖微不可紊誤者正此類也

成方切用

補中益氣湯

八

治氣門

加炒芩神麴名益胃升陽湯治婦人經水不調或脫血後食

少水瀉東垣曰脫血益氣古聖之法也故先補胃以助生發之氣去白朮加草薢神麴半

夏黃蘗名升陽順氣湯治飲食勞倦所傷滿悶短氣不思食

不知味時惡寒東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行於實腠理使衛外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸風

藥是也此助春夏之升浮者也此便是溫秋收冬藏之藥也

在人之身乃肝心也但言瀉之以酸味寒涼之劑並淡味滲

泄之藥此助秋冬之沉降者也此便是溫春生夏長之藥也

在人之身肺腎是也吳鶴皋曰升柴辛甘升其清降其濁

氣順矣藥皮苦寒降其濁潤降則陰氣順矣參耆當歸甘草

補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順

矣豆蔻神麴消其食加蒼朮倍分半夏黃芩益智各三分名

參朮益胃湯治內傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃除

當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯治脾胃不調胸滿肢

倦食少短氣東垣曰不知味及食入反出加白芍五味亦名調中

益氣湯以上俱治氣虛多汗餘治同前本方純用甘溫所謂

此加白芍五味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎

加羌活防風細辛川芎名調營養衛湯治勞力傷寒頭痛身熱惡寒微渴

汗出身痛脈浮無力加白芍細辛川芎蔓荊名順氣和中湯

實治清陽不升頭痛惡風脈弦微細加黃蘗生地名補中益

氣加黃蘗生地湯治陰火乘陽發熱晝甚自汗短氣口渴無

味

代赭旋覆湯仲景

成方切用

補中益氣湯

代赭旋覆湯

九

治氣門

治傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣未除汗吐下後

胃氣弱而不和虛氣上逆故痞鞭噫氣即俗所謂噯氣也并善治反胃噎食氣逆不降

旋覆花 甘草兩三半夏兩半人參兩二代赭石兩一生薑兩五大棗兩二

枚

喻嘉言曰此亦伏飲為逆但因胃氣虧損故用法以養正而

兼散餘邪大意在噯氣不除上既心下痞鞭更加噯氣不除

則胃氣上逆全不下行有升無降所謂弦絕者其聲嘶土敗

者其聲嘶也故用代赭領人參納氣歸元海以鎮安其逆微

加散邪滌飲而痞自開爾成氏曰噯則氣堅旋覆之鹹以軟

逆辛者散也生薑半夏辛以散也散者散也人參大棗

甘草之甘以補胃弱弱則胃氣自和後痞鞭噯氣不下利者用



此湯下利者生薑瀉心湯活人云有旋覆代赭證或欬逆氣虛者先服四逆湯胃寒者先服理中湯後服此湯為良

升陽益胃湯

治脾胃虛弱怠惰嗜臥時值秋燥令行溼熱方退體重節痛口苦舌乾心不思食食不知味大便不調小便頻數兼見肺病瀝漸惡寒慘慘不樂乃陽氣不升也

黃耆二兩半 甘草 人參 白朮 羌活 獨活 防風 五錢 以其秋旺 陳皮 白朮 茯苓 小便利用 澤瀉 勿用 故以辛溫瀉之 柴胡 黃連 每三錢 薑黃 煎 此方殊為不合

六君子助陽益胃補脾門之上藥也加黃耆以補肺而固衛芍藥以斂陰而調營羌活獨活防風柴胡以除溼痛羌活除芍藥以斂陰而調營羌活獨活防風柴胡以除溼痛

成方切用

升陽益胃湯

十

治氣門

而升清陽茯苓澤瀉以瀉溼熱而降濁陰少佐黃連以退陰火補中有散發中有收使氣足陽生自正旺而邪服矣東曰此治脾胃兼肺病也何故秋旺用參朮芍藥之類反補脾為脾胃虛則肺受病故因時而補易為力也又曰子病脾胃久衰一日體重肢節痠痛大便泄下小便閉塞思內經云在下者因而竭之是利小便也又治諸瀉小便不利者先分利之治溼不利小便非其治也當用淡滲之劑又思聖人之法雖布在方策其未盡者以意求之今寒溼客邪自外入裏而甚暴若用淡滲以利之病雖即已降之矣又降復益其陰而重竭其陽也治以升陽風藥是為宜爾羌活獨活之勝風以平之又曰下者舉之聖人之法一劑而愈百矣東垣又曰藥中但凡澤瀉茯苓木通通草淡味滲洩之類皆從時令之旺氣以泄脾之邪邪去而補金水之不足也或小便已數肝腎不受邪者而誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也又云虛損者頭有痰取之足謂陽病取陰也足有痰取之是陰病取陽也中者脾胃也旁者少陽甲膽也甲膽風大也東方春也胃中穀氣者便是風

化也胃中溼勝而成瀉瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助胃氣上行之法也

補脾胃瀉陰火升陽湯

治飲食傷胃勞倦傷脾火邪乘之而生大熱右關脈緩弱脾或弦木尅或浮數東垣曰溼熱相合陽氣日虛不能上升脾

升發則陰火升陽氣用味薄風藥黃耆 蒼朮 甘草 羌活 獨活 防風 柴胡 黃連 每服三錢或五錢

柴胡升麻羌活助陽益胃以升清氣人參蒼朮黃耆甘草益氣除溼以補脾胃黃芩黃連石膏涼心清熱以瀉陰火東垣

乃脾之剛脾乃胃之柔飲食不節則胃先病脾無所稟而後病勞倦則脾先病不能為胃行氣而後病胃為十二經之海

成方切用

補脾胃瀉陰火升陽湯

十

治氣門

脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削此本病也右關脈緩而弱本脈也或本脈中兼見弦脈證中或見四肢滿悶淋瀝便難轉筋一二證此脾胃兼肝病也當加風藥以瀉之脈中兼見洪大證中或見肌熱煩熱面赤肉消一二證此脾胃兼心病也當加瀉心火之藥脈中兼見浮滑證中或見短氣氣上喘欬痰盛皮澀一二證此脾胃兼肺病也當加泄肺及補氣之藥脈中兼見沉細證中或見善欠善恐一二證此脾胃兼腎病也當加瀉腎水之浮及瀉陰火之藥蓋百病皆從脾胃生也處方者當從此法加時令藥

橘皮竹筴湯

金匱

治久病虛羸嘔逆不已胃寒則嘔胃熱亦嘔有停痰有積飲者亦治吐利後胃虛嘔逆皆作嘔此為久病虛火上逆而乾嘔

橘皮 竹筴 升 甘草 人參 生薑 大棗 徐忠可曰此胃虛而沖逆為嘔然非真元衰弱之比故以參



甘培口中元氣而以橘皮竹筴一寒一溫下其上逆之氣以  
薑棗宣其上焦使胸中之陽漸暢而下達謂上焦固受氣於  
中焦而中焦亦稟承於上焦上焦既宣則中氣自調也加半  
夏麥冬赤茯苓枇杷葉亦名橘皮竹筴湯

丁香柿蒂湯 嚴氏

治久病呃逆因於寒者 呃在中焦穀氣不運其聲短小得食  
等長大不食亦然為胃呃久呃則胃腎俱寒者為多此病有  
因寒阻氣滯者有因瘀血者有因火鬱者有因胃實失下者  
此皆屬實有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上逆者  
者此皆屬虛寒熱虛實治法不一古方以此湯治寒呃

丁香 柿蒂 人參 生薑 片 一 方加陳皮半夏茯苓甘

草良薑

成方切用

丁香柿蒂湯

主

治氣門  
卷二

丁香泄肺溫胃而暖腎生薑去痰開鬱而散寒柿蒂苦澀而  
降氣人參所以輔真氣使得展布也 朱丹溪曰人之陰氣因  
火直沖清道而上作呃逆古人以為胃寒用丁香柿蒂不能  
清痰利氣惟助火而已李時珍曰朱氏但執以寒治熱矯枉  
之過矣按古人治陰呃每用桂附乾薑吳茱萸丁香茴香諸辛  
熱藥多有收效者治陽呃用橘紅竹筴湯玉機微義曰呃逆  
本由陰氣已虛陽火暴甚直衝而上出於胃入於肺而作聲  
東垣用涼藥者所以瀉熱降火也若陰證呃逆以陰氣先消  
陽火亦竭浮於胸中亦欲散也故不用寒藥而反以溫  
藥養胃蓄其陽氣胃氣和則愈陽生則陰長之說也

除人參生薑加竹筴橘紅名丁香柿蒂竹筴湯又名橘紅竹

筴湯治陽呃 或問治陽呃者何以不用知藥吳鶴皋曰此少

之若知藥味厚則益其非實邪也故用柿蒂竹筴之味薄者土

寒不益甚乎古人蓋深權之矣 除人參生薑亦名丁香柿  
蒂湯 嚴氏 寶鑑去人參加青皮陳皮三因去人參加良薑甘草

名丁香散

四磨湯 嚴氏

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食 怒則氣上思則氣結憂愁  
輕則上氣喘 急滿悶妨食 不已氣多厥逆重則肢仆

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三四沸溫服

一方人參易枳殼一方去參加枳實木香白酒磨名五磨飲

治暴怒卒死 名曰 氣厥

氣上宜降之故用檳榔沉香 檳榔性如鐵石沉香入 氣逆宜  
順之故用烏藥加入人參者降中有升瀉中帶補恐傷其氣也

舉元煎 景岳

成方切用

四磨湯

舉元煎

獨參湯

主

治氣門  
卷二

治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等證有不利於歸熟等劑  
而但宜補氣者以此主之

黃耆 人參 炙 白朮 甘草 炙 升麻 炒 五 如兼陽氣

虛寒者桂附乾薑隨宜佐用如兼滑脫者可加烏梅二箇或

文蛤七八分

獨參湯

諸虛氣弱脈微危急及大失血者此方主之 血脫者須益其  
不能速生無形之氣所有痰者加薑汁 煩躁者加童便 虛而  
當急固陽生則陰長也 或竹瀝 煩躁者加童便 有火  
身寒者加附子

人參得天地沖和之氣以成形故用之以補沖和之氣使其

一息尚存則可以次第而療諸疾是以病之危急而虛者良醫以氣爲首務也

卷之四

獨參湯

一可

治氣門

成方切用卷三目錄

理血門 正方二十一 附方三十四

四物湯

知葉四物湯

滋陰降火湯

坎離丸

二連四物湯

三黃四物湯

三黃補血湯

元戎四物湯

治風六合湯

補肝丸

治氣六合湯

神應養真丹

防風當歸散

四神湯

艾附暖宮丸

成方切用

目錄

一

理血門

婦寶丹

歸芎湯

生地黃連湯

玉燭散

抵當湯

抵當丸

代抵當丸

桃仁承氣湯

桃仁承氣對子

蒼朮地榆湯

芍藥地榆湯

芍藥湯

導滯湯

秦艽白朮丸

秦朮當歸湯

秦艽羌活湯

秦艽防風湯

秦艽蒼朮湯

麻黃人參芍藥湯

當歸補血湯

槐花散

加減四物湯

槐角丸

又槐花散

當歸和血散

# 欬血方

龍腦雞蘇丸

成方切用

三

三

卷三

犀角地黄湯

加味犀角地黄湯

歸脾湯

酸棗仁湯

人參養營湯

養心湯

還元水

迴輪酒

獨聖散

清咽太平丸

小薊飲子

復元羌活湯

補陰益氣煎

四生丸

當歸六黃湯

成方切用

目錄

— 3 —

門

成方切用卷三

理血門

人有陰陽即為血氣陽主氣故氣全則神旺陰主血故血盛則形強人生所賴惟斯而已蓋其源頭而來生化於心總統於脾藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身凡為七竅之靈為四肢之用為筋骨之液得此以通行二陰得以條暢凡形質所在無非血之用也人有此形惟賴此血故血衰則形萎血敗則形壞矣然血化於氣而氣成於陰陽虛則不能生血所以血宜溫而不宜寒氣充則最能傷陰所以血宜靜而不宜動此血虛之理也後世醫家其精義而治得其宜又何血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

黃血虛所宜生地黃芍藥阿膠歸身白芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

熱所宜地黃芍藥阿膠歸身白芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

夢所宜地黃芍藥阿膠歸身白芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

川芎白芷血虛所宜地黃芍藥阿膠歸身白芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

乳酪酥油治子仁從蓉血虛所宜地黃芍藥阿膠歸身白芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必血病之足患如熱者宜歸芍地黃湯而治其宜又何必

血黃者甘草氣虛不能生血及不能攝血所宜荷能補類

四物湯

而成之可以應無窮之變矣

治一切血虛及婦人經病月經先期為熱後期為寒為虛為

必從陽故其色紅上應於月其行有常故名曰經為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血俱虛也色淡亦虛也錯經妄行者氣之亂紫者氣之熱黑則熱之甚也今人見紫黑作痛成塊者指為風冷乘之而用溫熱之劑禍不旋踵矣經曰亢則害乘乃制熱極則乘水化所以熱則紫甚則黑也若曰風冷必須外得設或有之十不一二也玉機微義曰寒則凝而

當歸酒洗生地三芍藥錢二芩薊半如涼血心加黃連肝條芩

肺枯芥大腸實芩膳黃連腎膀胱黃蘗脾生地胃大黃三焦地骨心包絡丹皮小腸梔子木通如清氣心與包絡加麥冬

肺枳殼肝柴胡青皮脾白芍胃乾葛石膏大腸三焦連翹小

腸赤茯苓膀胱滑石琥珀血虛加龜板血燥加人乳血瘀加桃

仁紅花韭汁童便行之暴血加薄荷元參散之血不止加炒

蒲黃京墨久不止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脈數為

熱加芩連血淡脈遲為寒加桂附人肥有痰加半夏南星橘

紅人瘦有火加黑梔知母黃蘗者加木香砂仁蒼朮神麴

瘀滯加桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參耆氣實加枳朴以上

時加用法

當歸辛苦甘溫入心脾生血為君生地甘寒入心腎滋血為

臣芍藥酸寒入肝脾斂陰為佐芩薊辛溫通上下而行血中

成方切用

之氣為使也

散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能

和血治血虛腹痛也此特血病而求血藥之屬者也若氣虛

血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺即能生陰血也丹

溪治陰虛發熱於血藥四物湯亦分陰陽血之動者為陽歸

芍土之血之靜者為陰地黃主之血之陰不足雖芍歸辛溫

亦不用血之陽不足雖地黃辛溫亦用之與陽火之法正治

從治相同吳鶴皋曰地黃養五臟之陰芍歸調營中之氣陰

陽調和而血自生若失血太多氣息微之際慎勿與之蓋

四物陰類非所以生血者也當重用參耆以固欲絕之氣故

曰脫血者先益其氣否則川芎香薷反能耗氣氣血雙亡而

死矣故凡胃虛氣弱之人皆不宜服丹溪謂產後忌用芍藥

恐後與代生之氣然芍藥能治血虛氣痛新產正血虛氣

花名元戎匹物湯治血結便秘撲損瘀血加羌活防風秦艽

等皆可作各半湯此藥老用藥大略也加大黃芒硝甘草

時和氣謂之  
王燭之義也

抵當湯 仲景

治太陽病六七日表證仍在發熱惡寒脈微而沉反不結胸

其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利者必有畜

血令人善忘所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也

為腑此太陽熱邪隨經入腑熱與血搏故為畜血脈沉為在

裏表證仍在則邪氣猶淺不結於胸中而發狂經曰熱結勝

利其人如狂又曰血併於下亂而善忘小腹硬滿而小便不

利者為溺澀澀滿而小便利者為畜血準繩曰玩仍在二字

則邪氣為不傳裏非猶淺也勝勝為太陽本經曰熱結下焦

也在裏二字乃隨經勝勝之裏非三陰之裏也按太陽

在陽在表縱有沉緊沉滑之脈皆不得以裏陰名之

水蛭三十箇猪蠶蟲頭足翅 桃仁二十枚去大黃酒浸

成方切用 抵當湯 五 理血門

苦走血鹹滲血蠱蟲水蛭之苦鹹以除畜血甘緩急苦泄熱

桃仁大黃之甘苦以下結熱 程郊倩曰表證仍在脈微而沉

可知非桂枝所能散桃仁所能攻綠熱結勝勝與瘀

熱在裏邪有淺深故桃仁承氣與抵當湯攻有緩急

減水蛭十箇蠱蟲桃仁各減五箇分為四丸每水煮一丸名

抵當丸治本病無喜忘如狂之證者 附代抵當丸大黃兩

生地歸尾桃仁穿山甲元明粉各一 桂心三錢蜜丸桃仁歸尾

通之桂心熱以動之大黃元明粉苦寒鹹寒

以推蕩之加穿山甲引之以達於瘀所也

桃仁承氣湯 仲景

痢疾畜血急痛 熱邪自下不解傳入膀胱之府與血相搏

焦故小腹急脹皮見青紫筋大便秘者瘀血也小便不利者

病而氣不病也小便利而少腹仍急故知為畜血心主血邪

熱在上心君不寧故照腹語而如狂瘀血聚於陽明則胃

病在上心則腹脹在厥陰則脇痛瘧疾夜發者熱入血分也活

人云不當汗而汗之亡其津液陽證之極則侵陰也少陽證

畜於胸中也李挺曰太陽證則如狂陽明證則善忘少陽證

則寒熱如瘧傷寒有用大承氣不解反便堅善食者瘀血也

凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中滿者或燥矢或宿食少腹

滿者或濁或下或故下滿者為血多俱是熱病惟冷結勝勝少

腹滿一證為寒有手足厥冷為

可辨一證為寒有手足厥冷為

桃仁五十枚去大黃兩芒硝 甘草 桂枝二

大黃芒硝蕩熱去實甘草和胃緩中此調胃承氣湯也熱甚

則搏血血聚則肝燥故加桃仁之甘苦以潤燥而緩肝加桂

成方切用 桃仁承氣湯 蒼朮地榆湯 木 理血門

枝之辛熱直達瘀所而行之也 櫻寧生曰血溢血泄諸畜妄

血破瘀之劑折其銳氣然後區別治之或問失血復下虛何

以當伊畢曰血既妄行迷失故道不去畜利瘀則以妄為常

仁以達血所加桂枝以解外邪亦猶大柴胡湯用柴胡解外

相似益見太陽隨經之邪非桂枝不解爾程郊倩曰五苓散

與桃仁承氣均為太陽犯府之藥一利前而主氣分一利後

而主血分

治各不同

節菴加青皮枳實當歸芍藥蘇木汁柴胡名桃仁承氣對子

蒼朮地榆湯 潔古

治脾經受溼痢疾下血

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

治脾經受溼痢疾下血

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

蒼朮 地榆 炒黑 每一兩煎

若此燥溼強脾升陽而開鬱地榆清熱涼血酸收而斷下為

治血痢腸風之平劑初起者勿用加芍藥阿膠卷柏名芍藥

地榆湯治泄痢膿血乃至脫肛阿膠補血與液為肺

芍藥湯潔古

治下痢膿血稠黏腹痛後重下痢皆屬溼熱赤為傷血白為

痛後重氣血皆滯也劉河間曰行

芍藥歸尾黃芩黃連大黃此為實熱者言也然木香甘草家檳榔

桂枝錢半每服五錢痢不減加大黃今之實熱者鮮矣

芍藥酸寒瀉肝火斂陰氣和營衛故以為君大黃歸尾破積

而行血木香檳榔通滯而行氣黃芩黃連燥溼而清熱痢由

成方切用

芍藥湯 秦朮白朮丸

七 卷理血門

溼熱積於腸胃不得宣通故大便重急小便赤澀也辛以散

之苦以燥之寒以清之甘以調之加肉桂者假其辛熱以為

反佐也

除桂甘草加枳殼名導滯湯一作導治前證兼渴者此方今

用之禍不旋踵矣

秦朮白朮丸

東垣

治痔瘡痔漏有膿血大便燥結痛不可忍手陽明大腸庚金

津液以從足陽明胃土之化旺則生化萬物人或醉飽入房

酒熱雷著忍精不泄流注莫問前陰之氣歸於大腸木乘火

勢而侮燥金火就燥則大便閉而痔作矣受病者燥氣也為

病者胃溼也溼熱風燥四氣合邪法當瀉火潤燥疏風和血

止痛二除

桃仁研歸尾酒洗秦朮白朮枳實炒皂角子燒存澤瀉五

地榆錢三麴糊丸

秦朮歸尾桃仁潤燥和血秦朮為風皂角仁以除風燥地榆

以破血止血枳實苦寒以泄胃實澤瀉瀉濕使氣歸於前陰

以清溼邪也白朮之苦甘以瀉火而益元氣故曰甘寒瀉火

乃假枳實之寒也大便祕澀以大黃推蕩之其津液益不足

用當歸和血加油潤之劑自然輟利矣

除地榆加大黃紅花名秦朮當歸湯治痔漏大便燥結疼痛

用秦朮一味加羌活防風麻黃升麻柴胡黃耆黃耆炙

草紅花名秦朮羌活湯治痔漏成塊下垂不任其癢除皂角

成方切用

麻黃人參芍藥湯

入 卷理血門

枳實地榆加防風升麻柴胡陳皮大黃黃蘗紅花炙草名秦

朮防風湯治痔漏大便時疼痛東垣曰如無痛除白朮枳實

地榆加蒼朮黃蘗大黃檳榔防風名秦朮蒼朮湯以上俱治

同東垣曰腸頭成塊者淫也作大痛者風也大便燥結者兼

受火熱也是溼熱風燥四氣合邪當去四者以破氣藥兼

之治法

麻黃人參芍藥湯東垣

治吐血外感寒邪內虛蘊熱

麻黃去外黃耆實表甘草炙白芍藥安太陰人參益元氣

麥冬保肺氣五味子益衛肺氣當歸和血桂枝和營衛熱服

綱目曰觀此一方足以為萬世模範矣蓋取仲景麻黃湯與

補劑各半服之但凡人當服仲景方者宜以此為則東垣  
貢士病脾胃虛弱與補藥愈後居臥熱炕而吐血東  
垣謂此久虛弱冬居暖室衣單薄是重虛其陽表而大寒  
虛熱因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之  
遂成衄血卻與麻黃湯立愈與  
此甚同因作此湯一服而愈

當歸補血湯 東垣

治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脈大而虛血盛則身涼血  
機飽勞役傷其陰血虛陽勝故肌熱煩渴與陽明白虎證  
無異但白虎證得之外感實熱內盛故脈大而長按之有力  
此證得之內傷血虛發熱脈洪大而無力內  
經所謂脈虛血虛是也誤服白虎湯必斃

黃耆 當歸 酒洗 空心服

當歸滋陰養血黃耆乃補氣之藥何以五倍於當歸而云補  
成方切用 當歸補血湯 槐花散 九 理血門

血湯乎蓋有形之血生於無形之氣又有當歸為引則從之  
而生血矣經曰陽生則陰長此其義爾

槐花散 本事

治腸風臟毒下血 血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流  
居於絡脈順守臟腑滋養神氣濡潤筋骨若感內外之邪而  
受傷則或循經之陽血至其傷處為邪氣所阻滯泄經外或  
居絡之陰血因風名之邪風裂而六淫之入腸胃而泄矣  
世俗率以腸風名之不知風乃六淫之入腸胃而泄矣  
二淫與寒燥濕熱其氣及飲食勞力傷其陰絡之血者亦  
可謂之腸風乎誠經曰陽絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則  
血內溢而便溺戴氏以陽感而見色鮮者為腸風積久而發  
色淡者為臟毒又云色鮮為熱自大腸氣分來色淡為寒自  
小腸血分來或曰腸風者風邪淫胃臟毒者淫邪注胃○臟  
毒腸風之血出於腸腸之開五痔之血出於肛門此孔處治  
各不同

槐花 炒 側柏葉 柃 枳殼 炒 等分為末每服三錢米  
飲下

側柏養陰燥溼最清血分槐花疏肝瀉熱能涼大腸荆芥散

瘀搜風 為風病血 枳殼寬腸利氣 此病多由溼熱風燥之邪

涼須兼溫補及升舉藥大法涼血用槐角地榆制柏條等妙

連梔子生地和血用阿膠當歸川芎白芍風溼用秦艽防風

荆芥蒼朮升麻補氣生血加人參黃耆白朮甘草

加當歸生地川芎入烏梅生薑煎名加減四物湯 治同 補

血除柏葉荆芥加當歸黃芩防風地榆酒糊丸名槐角丸 局

治同 疏風除柏葉枳殼加青皮等分亦名槐花散 治血痢

腹不痛不裏急後重除柏葉枳殼加當歸川芎熟地白朮青

成方切用 效血方 十 理血門

皮升麻亦名槐花散又名當歸和血散 東垣治腸澼下血溼毒

下血經驗方單用槐花荆芥炒黑為末酒服亦治下血

效血方 丹溪

治欬嗽痰血 欬者有聲無物嗽者有物無聲欬嗽者有聲有

肺主氣氣逆為欬肺為華蓋至清之臟有火則欬有痰則嗽

支者從肺絡心屬胸中故病則俱病也涎唾中有少血散漫

者此腎從相火炎上之血也若血如紅縷從痰中欬出者此

肺絡受熱傷之血也若欬出白而淡紅者此肺中血故必死

○凡唾中帶血咯出者或血或血絲屬腎經鼻衄出血故也自

血屬肺經經吐血或成碗或成盞屬胃經鼻衄出血故也自

兩脇逆上吐血者屬肝經經渴血屬小腸膀胱經下血屬大腸

經牙宣出血屬胃經腎虛火舌血謂之舌衄汗孔出血謂之肌

衄心與肝也又驚而動血者屬心怒而動血者屬肝憂

而動血者屬肺思而動血者屬脾勞而動血者屬腎

青黛 水 枯槁仁 油 海石 山梔 訶子肉 等分為末蜜丸



肝火上逆能燔肺金故欬痰血青黛瀉肝而理血散五臟

鬱火梔子涼心而清肺使邪熱下行一者所以治火

燥滑痰爲治嗽要藥  
俞潔上魚翅少  
蕩除鬱熱垢膩  
海石軟堅止嗽清水之

上源肺爲水之上源一者降火而兼行痰加訶子者以

能斂肺而定痰喘也不用治血之藥者火退則血自止也

龍腦雞蘇丸

治肺有鬱熱欬吐血衄血下血

下血  
熱淋  
消渴  
口臭  
有熱

苦有熱 清心明目

成方切用

雞蘇葉一名龍胆生地錢麥冬錢蒲黃阿膠木通

銀柴胡錢二 甘草錢半 黃耆 人參錢一 先將木通柴胡浸二日

熬汁地黃浸汁熬膏再用蜜三兩煉過和丸梧子大每服一

十丸細嚼湯下一方有黃連

肺本清肅或受心之邪燄或受肝之亢害故見諸證雞蘇輕

揚升發瀉肺搜肝散熱理血故以爲君生地涼血炒蒲黃止

血以療諸血柴胡平肝解肌熱木通利水降心火麥冬阿膠

潤燥清肺參耆甘草瀉火和脾此亦爲熱而涉虛者設故少

佐參耆也  
解氣分血分之熱

犀角地黄湯

治傷寒胃火熱盛吐血衄血  
衄血曰吐血衄血曰衄血  
衄行清道喉與咽二管不同也

清道上腦而出於鼻爲衄其從肺竅而出於咽者則爲瘀血

爲大逼故嘔吐從胃而出也吐血之熱在腑衄血之熱在經

胃也。在經肺也。裏熱臟腑也。表熱太陽也。嗽血便血。心移。

熱二證傷寒便血爲傳經熱邪畜血如狂漱水不欲嚥

血發燥而內不渴故雖漱水而不欲飲海藏曰大凡血證皆

衄傷寒當發汗而不發汗邪熱入裏逼血妄行故見諸證

下早熱毒乘虛入胃則發斑下遲熱雷胃中亦

輕而斑重色紫黑者熱極而胃爛也多死凡斑疹慎不可汗

不可遽下恐斑毒內陷也

成方切用

生此半白之兩眉角是也作器物者多被蒸煮不堪入藥

丹皮半 每用五錢 煮甚如狗脊加黃芩一兩 因熱至

者加枳于柴胡 焦之火 柴胡平少陽厥陰之火

正胤附之南曰言終久遠送之至其位而聖行厥角乃冕饗

胃熱而消水少者藥醕藥和而止而消止少之母 九月三

也海藏曰血分三部藥有輕重犀角地黃湯治上血如吐衄

當湯丸治下血如畜血如狂之類又曰此證足太陰所主脾

嘔吐血者咸用芍藥主之故知大陰藥也醫貫曰犀角地黃

血從任督而至顙頂入鼻中惟犀角能下入腎水引地黃滋

子 52—521

皆可借用成功若陽虛勞瘵及脾胃虛者皆不宜活人書言  
瘵血入裏吐衄血者犀角湯乃陽明聖藥如無犀角代  
以升麻二藥性味相遠何以爲代蓋以升麻能引諸藥同入  
陽明也朱二允曰升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其  
下降之氣清心肝之火使血下行歸經而後用升麻升血隨  
氣升不愈湧出不止乎。犀角能通頂而又下降。傷寒汗出  
不微能運動經血誤發其汗亦動經血二者不同陶尚文治  
一入傷寒四五日吐血不止醫以犀角湯黃芩湯治之  
反劇陶切謂其脈浮數而緊遂用麻黃湯汗出而愈此取脈不  
取證也可謂得仲景心法矣設脈不浮緊而數其可用乎經  
曰傷寒發熱身無汗因致衄者麻黃湯主之又曰太陽病  
脈浮發熱身無汗因致衄者麻黃湯主之若全未發汗致衄者仍須  
解表則熱隨血散俗名紅汗故愈若在經鬱而爲熱不得汗  
用麻黃發之成無已曰傷寒衄者爲邪氣不得發散甚於  
經逼迫於血也桂枝麻黃湯治衄者非治衄也即是發散經  
中邪氣爾血鬱於上而吐血者謂之薄厥雷於下而瘀者謂  
之畜血此由太陽隨經瘀熱在裏血爲  
熱所搏結於下焦少腹當鞭小便自利

成方切用

當歸引血歸經藕汁涼血散瘀桔梗以利上焦陳皮以導中焦紅花以行下焦  
歸脾湯濟生

歸脾湯

圭理血門卷三

節菴加當歸紅花桔梗陳皮甘草藕汁名加味犀角地黃湯

治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘上氣不足下氣有餘陽驚  
悸有觸而心動曰驚無驚盜汗汗爲心液。心藏神而生血  
見前發熱脾主體倦四肢食少健運不眠思而藏血脾傷故  
諸證或脾虛不能攝血致血妄行及婦人經帶或心脾傷痛  
嗜臥肢體作痛大便不調或癰癤流注不能消散潰斂

黃耆蜜酒洗龍眼肉二棗仁研炒白朮土炒人參茯神一  
遠志八分木香沖甘草五分薑煎  
醫貫曰心生血脾統血肝藏血凡治血證須按三經用藥遠

志棗仁補肝以生心火茯神補心以生脾土參耆甘草補脾

成方切用

歸脾湯

圭理血門卷三

以固肺氣木香香先入脾總欲使血歸脾爾治實火之血順  
血自歸經治虛火之血養正爲先氣壯則自能攝血。高  
峰曰心火衰甚不能生土以致土困金敗外兼咳嗽吐痰  
熱往來盜汗急以此方去木香加白芍以治之凡見脾胃衰  
弱飲食不思大便泄瀉總屬君火不旺所致此補本法也凡  
各種虛證補中益氣所不效者投以此方如肺腎受傷再加  
麥冬五味如肝腎受傷則芍藥更爲有益如從佛鬱而起則  
加柴胡丹皮山梔如非二陽之病至怔忡則去木香加枸杞  
麥冬五味之屬如夢遺則加熟地五味白芍牡蠣之屬如怔  
忡而實挾包絡一種有餘之火兼痰者則加黃連生地貝母  
之類以清之夢遺而挾相火者加黃藥知母麥冬以清之陽  
虛盜汗脈四至以內奄奄不起遲遲不寐此方亦是對證要  
藥亦可變爲養營加減。按歸脾湯乃有宋嚴用和所創以  
治二陽之病發心脾內遠志當歸乃薛新甫所加以治血虛  
手變化通於各證無不神應曰歸脾者從肝補心從心補脾  
率所生所藏而從所統所謂隔二之治蓋是血藥非氣藥也

去白朮木香龍眼加茯苓陳皮入蓮肉薑棗煎名酸棗仁湯  
治虛煩不眠金匱酸棗仁湯亦  
人參養營湯

治脾虛食少無味身倦肌瘦肺虛色枯氣短毛髮脫落小便  
赤澀營血不足驚悸健忘寢汗發熱經曰脾氣散精上輸於  
肺此地氣上升也肺主

治節通調水道下輸膀胱此天氣下降也脾肺虛則上下不交而為不營血無所藉以生諸種虛證亦治發汗過多身振脈搖筋惕肉瞤汗為心液汗即血也發汗過多則血液枯涸筋肉無以榮養而然也

人參 白朮 白芍 黃耆 當歸 茯苓 熟地 甘草 陳皮 桂心 遠志 五味 加薑棗煎

熟地歸芍養血之品參耆苓朮甘草陳皮補氣之品血不足而補其氣此陽生則陰長之義也且參耆五味所以補肺脾氣能甘陳扶朮所以健脾脾統血熟地所以滋腎腎藏精生血遠志能通腎氣上達於心桂心能導諸藥入營生血五臟交

養互益故能統治諸病而其要則歸於養營也薛立齋曰氣血兩虛而變

成方切用

人參養營湯 養心湯

幸

卷三

現諸證莫能名狀勿論其病勿論其脈但用此湯諸證悉退此十全大補對子也十全大補但分氣血此則五臟皆補無平不到虛寒甚者高氏常加附子以治之三陰虛更妙

養心湯

治心虛血少神氣不寧怔忡驚悸心主血而藏神經曰靜則神藏躁則消忘心血虛則易動故怔忡驚悸悸不得安寧也

黃耆 茯苓 茯神 當歸 川芎 半夏 薊 甘草 柏子仁 油 棗仁 遠志 五味 人參 肉桂 每服

五錢

參耆以補心肺之氣肺為心之華蓋芎歸以養心肝之血肝木能生心火

茯遠志以泄心熱柏仁酸棗以寧心神五味收神氣之散越

半夏去擾心之痰涎甘草補土以培心子赤桂引藥以入心經潤以滋之溫以補之酸以收之香以舒之則心得其養矣

還元水

治欬血吐血及產後血運陰虛久嗽火蒸如燎血生於心統於脾藏於肝宣布於肺靜則歸經熱則妄行火傷肺絡血隨欬出或帶痰中

童便 取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹如水者去頭尾熱飲冬則用湯溫之或加藕汁阿膠和服有痰稍加薑汁

童便鹹寒降火滋陰潤肺散瘀故治血證火嗽血運如神北齊

褚澄曰喉不容物毫髮必欬血既滲入愈滲愈欬愈滲飲淡粥百不一死服寒涼藥百不一生李時珍曰小便飲之入胃隨脾之氣上歸於肺下通水道而入膀胱乃其舊路故能治肺病引火下行其味鹹而走血故治血病當熱飲則

成方切用

還元水 獨聖散

未

卷三

真氣尚存其行自速冷則唯有鹹寒之性而已李士材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便遠矣。飲自己溺名迴輪

獨聖散

治多年欬嗽肺痿咯血紅痰

白芨 為末每服二錢臨臥糯米湯下

人之五臟唯肺葉壞爛者可以復生白芨苦辛收澇得秋金之令能補肺止血故治肺損紅痰又能蝕敗疽死肌為去腐生新之聖藥

清咽太平丸

治膈上有火早間咯血肺屬金肅清之藏也木火焚灼肺金受刑故咯血早間寅卯木旺生火之

時兩頰常赤之部咽喉不清二經脈唯足太陰在表不隱

而君相二火爲尤甚諸火上逆故咽喉不清

薄荷兩川芎防風犀角枯霜甘草二桔梗三兩蜜

丸

薄荷辛香升浮消風散熱消風故疏肝散熱故清肺是以能治血病防風血藥之

使瀉肺搜肝防風瀉肺火散肝火爲上部血藥之使川芎血中氣藥升清散瘀

柿霜生津潤肺犀角涼心清肝甘草緩炎上之火勢桔梗載

諸藥而上浮又甘桔相合爲清咽利膈之上劑也

小薊飲子

治下焦結熱而成血淋心主血小腸其腑也熱甚搏血流入胞中與便俱出病者爲血淋不痛者

成方切用

清咽太平丸

小薊飲子

卷三

爲瀉血蓋心熱者小腸必熱經所謂胞移熱於膀胱則癰弱血是也然熱必兼溼戴氏曰血鮮者心小腸實熱血瘀者腎膀胱虛冷準繩曰多有熱極而

小薊蒲黃黑藕節滑石木通生地梔子炒淡竹

葉當歸甘草梢各五分

小薊藕節退熱散瘀生地涼血蒲黃止血木通降心肺之火

下達小腸梔子散三焦鬱火由小便出淡竹葉草清心而利

小便心與小腸相爲表裡滑石瀉熱而滑竅當歸能引血歸經草梢能

徑達莖中也

復元美活湯

湯名美活而方內無之疑缺誤

治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍者不渴傷在何經惡血必留於脇

下以肝主血故也

柴胡五錢當歸錢枳椇根穿山甲炮甘草紅花二錢桃仁五錢

去皮尖研大黃酒浸每服一兩加酒煎以利爲度

原文曰肝膽之經行於脇下屬厥陰少陽故以柴胡引用爲

君以當歸活血脈以甘草緩其急爲臣以穿山甲花粉桃仁

紅花破血潤血爲佐以大黃蕩滌敗血爲使惡血去而痛自

除矣

補陰益氣煎景岳

治勞倦傷陰精不化氣或陰精內乏以致外感不解寒熱瘧

瘧陰虛便結不通等證

成方切用

復元美活湯

補陰益氣煎

太

卷三

人參一錢熟地三錢五錢或當歸二錢山藥二錢酒炒甘草一錢陳皮一錢柴胡一錢外邪不用升麻三錢五分火浮於上不用薑棗煎

此補中益氣湯之變方也凡氣虛感邪者宜補中益氣湯精

虛感邪者宜此張景岳曰補中益氣湯乃東垣獨得之心法

此是顯者在賴其發生之氣運而上行故由胃達脾由脾達

肺滋潤一身即如天地之土其氣皆然凡春夏之土能生能

長者以得陽氣而上升則何生也秋冬之土不生不長者

以得陰氣而下降則何死也今本方以升柴助升氣以參

耆歸助陽氣此東垣方之意誠盡善矣第助升氣以參

本象地地天既交所以成泰然不知泰之前猶有臨之前

助臨復之氣庶乎得根本之道而足補東垣之未備也

四生丸

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行此方甚良然但可暫用而已

生荷葉 生艾葉 生地黃 生側柏葉 四仲爛搗丸如雞子大每服一丸滾湯化服

統而論之生之則寒則四生皆能去火析而論之則荷艾輕香去火於氣地柏質實瀉火於陰火去則血歸經而吐衄愈矣

當歸六黃湯

治陰虛有火盜汗發熱心之所藏在內者為血發於外為汗之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾之處泄而為汗汗者心之陽氣者腎之陰陰虛睡熱陽必湊之故汗出也有火者謂有面赤口乾唇燥便赤音重脈數諸證

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃藥 黃連等黃耆加倍

成方切用

四生丸 當歸六黃湯

本

理血門

加麻黃根

本湯加麻黃根治盜汗甚捷蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也

陰虛有火睡去則衛外之陽乘虛陷入陰中表液失其固衛故澀澀然而汗出及覺則陽用事衛氣復出於表表實而汗

即止歸地所以養陰芩連所以去火生地黃藥可以養陰亦

可以去火而倍用黃耆所以補衛固表也

準繩曰陰虛陽必

當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發熱盜汗宜中湯甚者加附子或黃附湯有淫熱合邪汗出不休以風藥勝其淫甘藥泄其熱羌活勝濕湯有痰證冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有汗證用固真藥汗愈不收止可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血故溢而為汗宜大補黃耆湯加棗仁有微熱者加石斛。土材曰六黃湯唯火實氣強者宜之不然苦寒損胃禍彌深爾

成方切用卷四目錄

補養門 正方六十 附方二十七

八味地黃丸

十補丸

右歸丸

右歸飲

六味地黃丸

知藥八味丸

都氣丸

八仙長壽丸

成方切用

目錄

一

補養門

滋腎生肝丸

滋陰腎氣丸

人參補氣湯

加味地黃丸

抑陰腎氣丸

九味地黃丸

疏肝益腎湯

滋水清肝飲

左歸丸

左歸飲

一陰煎

加減一陰煎

二陰煎

三陰煎

四陰煎	五陰煎	七寶美髯丹	大補元煎	滋陰大補丸	打老兒丸	五福飲	七福飲	黑地黃丸	大營煎	成方切用	小營煎	虎潛丸	補益丸	參朮膏	兩儀膏	天真丸	貞元飲	三才封髓丹	三才湯	當歸地黃飲
										目錄			龍虎濟陰丹						鳳髓丹	
										二										
										補養門										
										卷四										

人參固本丸	地黃醴	參乳丸	頓乳取粉法	歸腎丸	天王補心丹	贊化血餘丹	孔聖枕中丹	養元粉	大補陰丸	成方切用	斑龍丸	又斑龍丸	元武豆	龜鹿二仙丹	二至丸	蟠桃果	扶桑丸	羊肉湯	益氣聰明湯	秦艽鱉甲散
										目錄										
										三										
										補養門										
										卷四										

黃耆鼈甲散

人參黃耆散

秦艽扶羸散

百合固金湯

補肺湯

補肺阿膠散

紫苑湯

王母桃

玉屏風散

黃耆湯

成方切用

妙香散

參苓白朮散

休癰飲

何人飲

四君子湯

歸脾湯 見理血門

人參養營湯 見理血門

十全大補湯 見治氣門

八珍湯 見治氣門

生脈散 見消暑門

目錄

川芎湯

四 補養門

當歸補血湯 見理血門

成方切用

目錄

五 補養門

成方切用卷四

補養門

凡氣虛者宜補其土人參黃耆之屬精虛者宜補其下熟地枸杞之屬陽虛無火者宜補而兼暖桂附乾薑之屬陰虛有火者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬此固陰陽之治法也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以甦垂寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不竭是故以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合也大凡陽虛多寒者宜補而兼溫而清潤之品非所宜陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知避則不惟用補而力制皆可通矣

崔氏八味丸 金匱

成方切用

八味地黃丸

補養門

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思泄瀉腹脹或元陽虛憊陽痿精寒臍腹疼痛夜多漩溺膝痠腰輭目昏等證王冰所謂益火之原以消陰翳也尺脈弱者宜之 亦有

力者服之亦效○仲景云氣虛有痰宜腎氣丸

熟地黃 用懷生地水洗去砂土柳木甌砂鍋上蒸一山萸肉

陳者 日曬乾再蒸再曬九次為度臨用搗膏入兩 酒潤懷山藥 兩茯苓 丹皮 澤瀉 三肉桂 皮 熟附子 兩

蜜丸 洛謂蜜性甘緩易得 空心鹽湯下

吳鶴皋曰腎中水火俱虧者此方主之 李士材曰腎有兩枚

之別仙經曰兩腎一般無二樣中間一點是陽精兩腎中間穴名命門相火所居也一陽生於二陰之間所以成乎坎而位乎北也越養葵曰君子觀象於坎而知腎中具有一火之道焉夫一陽居於二陰為坎此人生與天地相似也今人入

成方切用

八味地黃丸

補養門

房甚而陽事易舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則陰虛不寒真火息則陽事不熱是方也六味皆瀉以能益火之原水不寒其主桂附辛潤之物能於水中補火所以宗筋弛緩者不可不知○喻嘉言曰金匱用八味丸治脚氣上入少腹不仁者脚氣即陰虛少腹不仁即攻心之漸故用之以驅逐陰邪也其虛勞腰痛少腹拘急小便不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹腰過勝脫之氣化小陰類阻其胸中故陽自致短氣故用此腎氣之引飲下出以安胸中也消渴飲水之勢故急用此以逆折其水也夫腎水下趨則消源泉有立竭則治消渴之聖藥得此其旨矣按八味地黃丸從治後人謂八味丸即坎卦之一陽蓋得其旨矣按八味地黃丸從治後人謂八味丸附即坎卦之一陽蓋得其旨矣按八味地黃丸從治後人謂八味丸藥而辛熱純陽通行諸經走而不守桂附為少陰之藥宜通血脈以爲之導而後能納之九淵而無震盪之虞今人不明此義直以桂附爲補而後能納之九淵而無震盪之虞今人不明此義燥烈三陰爲補非也或曰仲景法任意而雜用之附者十之二成方切用 八味地黃丸 二 補養門



致津液通氣道據其窟宅而招之誘之同氣相求火必下降矣然則桂附者固治相火之正藥歟○八味丸用澤瀉冠宗爽謂其接引桂附歸就腎經李時珍曰非接引也伏苓澤瀉皆取其瀉勝於之邪氣也古人用補必兼瀉邪去則補藥得力一闢一闢此乃元妙後世不知此理專一於補必致偏勝之害矣洛按此亦為虛中挾邪滯者設爾若純虛之證而兼以滲利未免減去藥力

微弱陰陽俱虛

加五味鹿茸名十補丸治兩尺

右歸丸 景岳

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或反胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹疼痛或大便不實瀉痢頻作或小水自遺虛淋寒疝或寒侵谿谷而肢節痛痺或寒在下焦而水邪浮

成方切用

右歸丸

三 補養門 四

腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不寧或四肢不收或眼見邪祟或陽衰無子等證速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣八味丸治之不愈者宜服此或用右歸飲凡八味右歸用桂附等方唯肺陰有飲者宜之否則助火燥金反生肺病

大懷熟兩山藥 山萸肉 枸杞 兔絲 杜仲 鹿角

膠四兩當歸三兩便附子 肉桂二兩 右丸法如前或丸如

彈子大每嚼服二三丸白湯下其效尤速 如陽衰氣虛必加人參以為之主或二三兩或五六兩隨入虛實以為增減蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入陰分欲補命門之陽非加人參不能捷效 如陽虛精滑或帶濁便溏加補

骨脂酒炒三兩 如殭泄腎泄不止加五味子三兩肉豆蔻

三兩麩炒去油用 如飲食減少或不易化或嘔惡吞酸皆

脾胃虛寒之證加乾薑三四兩炒黃用 如腹痛不止加吳

茱萸二兩湯泡半日炒用 如腰膝痠痛加胡桃肉連皮四

兩 如陰虛陽痿加巴戟肉四兩肉蓯蓉三兩或加黃狗外

腎一二副以酒煮爛搗入之

右歸飲 景岳

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減主之如治陰盛格陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

成方切用

右歸飲

四 補養門 四

熟地三四錢或加 山藥 杜仲 薑 枸杞 炙甘草 肉桂

一二錢 製附子一二錢 黃肉 錢一 水二盞煎七分食遠服 如氣

虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參

白朮隨宜用之 如小腹多痛加吳茱萸六七分 如火衰

不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑二三錢 如陽衰中寒泄

瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之 如淋帶不止加破故紙

一錢 如血少血滯腰膝痠痛者加當歸二三錢

六味地黃丸 仲陽

治肝腎不足真陰虧損精血枯竭憔悴羸弱腰痛足疲自汗

盜汗水泛為痰 丹溪曰久病陰火上升津液生痰不發熱欬

嗽腎虛則移熱於肺而欬嗽按之至頭運目眩直指方云注不能歸元此氣虛頭運也吐衄崩漏耳鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失血失音舌燥喉痛虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍

等證諸證皆由腎水不足虛火上炎所致

熟地八兩 山茱肉酒潤 山藥四兩 茯苓乳 丹皮 澤瀉三兩 右丸法

如前空心鹽湯下

腎中水虛不能制火者此方主之今人足心熱陰股熱腰脊

痛率是此證乃欬血之漸也熱地滋陰補腎生血生精山黃

溫肝逐風瀉精氣壯丹瀉君相之火火涼血退蒸時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃藥治相火不知丹山藥皮之功更勝○丹皮能入腎瀉陰火退無汗之骨蒸

成方切用 六味地黃丸 五 補養門 卷四

清虛熱於肺脾補脾固腎能清 茯苓滲脾中溼熱而通腎交

心澤瀉瀉膀胱水邪而聰耳明目壯水之主以制陽光即此

方也六味地黃丸純陰重潤下之方也純陰腎之氣重味

地一味為本藏之主然遇氣藥則運用於上遇血藥則流走

於經不能制其一錢入腎也故以五者佐之山藥陰金也坎

中之艮堅凝生金故入手太陰能潤皮膚水發高源導水必

自山山藥堅少腹之土真水之原也水土一氣鎮達臍下必

榮莫陰木也肝腎同位乎下借其酸澀以斂泛溢水火升降

必由金木為道路故與山藥為左右降下之主以制其旁軼

二陰之藥能降心火達於膀胱水火對居瀉南即益北而又

有茯苓之淡泄以陽陽澤瀉之鹹泄以降陰疏瀉決排使無

不就下入海之水此制方之微旨也仲景原方以此六者駕

馭桂附以收固腎中之陽至宋錢仲陽小兒行逐逐逐陽

之法乃用此方去桂附用之應手神效明薛新甫因恒大方

為補陰之神方矣趙養葵得力於薛氏醫案而益闡其義觸處旁通外邪雜病無不貫攝而六味之用始盡矣○趙氏作

腎胃脾消耗津液故渴渴病且云即即傷寒口渴渴之邪熱入

於胃脾消耗津液故渴渴病且云即即傷寒口渴渴之邪熱入

但云欲飲水者不可不與不可多與別無治法縱有治者徒

知以沃無形之火安能滋腎中之真陰乎若以六味地黃

大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而成燥實堅之證乎

加黃藥知母各二兩名知藥八味丸治陰虛火動骨痿髓枯

因下焦尺脈旺者宜之朱丹溪曰君火者心火也人火也可

之相火者天火也龍雷之火也陰火也可以水溼折之屬可以制

從其類而伏之唯黃藥之屬可以降之醫賈曰左尺脈虛細

數者是腎之真陰不足宜六味丸以補之右尺脈沈細數者

是命之相火不足宜八味丸以補之右尺脈沈細數者

俱虛宜十補丸此皆滋先天化源自世之補陰者率用知藥

反戕脾胃多致不起不能無憾故特表而出之又曰王節齋

云凡酒色過度損傷肺腎真陰者不可過服參耆服多者死

蓋恐陽旺而陰消也自此說行而世之治陰虛者服參耆

成方切用 六味地黃丸 六 補養門 卷四

者如雞鳴以知藥為靈丹使患此證者百無一生良可悲也

蓋病起房勞真陰虧損陰虛火上故效當先以六味丸之類

補其真陰使水升火降隨用參耆救肺之品補腎之母使金

水相生則病易愈矣世之用寒涼者固不足齒開有知用參

使陽火旺而金益受傷此不知後先之著者也 加桂一兩

名七味地黃丸引無根之火降而歸元治肝經氣虛筋無所

養變為寒證以致筋骨疼痛腳軟懶行及傷寒服涼藥過多

木中無火手足牽引肝經血虛以致火燥筋變為結核瘰

癧等證經曰辛以潤之此方是也加五味名都氣丸治勞嗽

益肺之源以 加肉桂一兩五味二兩名加減八味丸治腎水

不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛

或形體憔悴汗發熱五臟齊損加五味二兩麥冬三兩名

八仙長壽丸治虛損勞熱加杜仲炒牛膝酒洗各二兩治腰膝痠痛去澤瀉加益智仁三兩治小便頻數益智辛

固用熟地二兩山藥山黃丹皮歸尾五味柴胡各五錢茯苓熱瀉精

澤瀉各二錢半蜜丸硃砂為衣名益陰腎氣丸即明目地黃丸東垣治

腎虛目昏加柴胡者所以升陽於上也加柴胡五味白朮當歸甘草名滋

腎生肝飲治血虛氣滯或肩背絆痛或胃脘當心而痛或肝

火鬱於胃中以致倦怠嗜臥飲食不思口渴咽燥及婦人小

便自遺頻數無度凡傷寒後熱已退而見口渴者用之薛氏

用治婦女鬱怒傷肝脾以致小便淋瀝不利月經不調兩脇

脹悶小腹作痛寒熱往來胸乳作痛左關弦洪右關弦數此

成方切用

六味地黃丸

七

補養門

鬱怒傷肝脾血虛氣滯為患高鼓峰曰六味地黃丸一變而為滋腎生肝

兩而加柴胡五味白朮當歸甘草合逍遙而去白芍加五味

合都氣意也以生肝故去芍藥而留白朮甘草以補脾補脾

者生金以制木也以制去山黃而加柴胡歸尾生地五味辰

砂為衣名滋陰腎氣丸治目神水寬大漸散或如霧露中行

漸觀空中有黑花視物二體久則光不收及內障神水淡白

色高鼓峰曰又一變而為滋陰腎氣丸獨去山黃而加柴胡歸尾生地五味仍令逍遙都氣腎肝同治用歸尾生地

者行瘀滯也柴胡疎木氣也去芍藥恐妨於行之疎之也名

滋陰者厥陰也皆用五味者雖合都氣然實防水之反尅瀉

丁之義也去山黃去澤瀉而用參耆歸朮陳皮甘草五味麥

冬名人參補氣湯治腎水不足虛火上炎欬嗽膿血發熱作

渴小便不調等證高鼓峰曰又一變而為人參補氣湯其義愈變化無窮真有游龍戲海之妙夫白朮

之與六味其功相反焉得合之曰從合生脈來則有自然相

通之義借茯苓以合五味異功之妙用歸者以合養血之奇

其不用澤瀉者蓋為發熱作渴小便不調則無再竭之理理

無再竭便當急生生脈之所由來既當生脈異功之可以轉

入也且水生高原氣化能出肺氣將敗故作渴不調此所以

急去澤瀉而生金滋水復崇土以生金其苦心不可不知哉

加生地柴胡五味復等其分名加味地黃丸又名抑陰地黃

丸治肝腎陰虛耳內痒痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澀等

證高鼓峰曰又一變而為加味地黃丸真愈出而愈奇矣柴胡從逍遙來生地從固本來五味仍合都氣其曰耳內痒

痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澀而總為肝腎陰虛則知陰

虛半由火鬱而致也故用柴胡以疎之鬱火非生地不能涼

故用生地用五味仍瀉丁以補金補金以生水也曰抑陰為

鬱火太盛非疎之不可疎之所以抑之生地涼血便有瀉義

抑之也所以加五味生地當歸名抑陰腎氣丸治諸臟虧損胸

膈痞悶發熱潮熱晡熱或寒熱往來五心煩熱或口乾作渴

月經不調或筋骨痠倦飲食少思或頭目不清痰氣上壅欬

嗽喘甚或小便赤數兩足熱痛或腰膝痠軟肢體作痛等證

高鼓峰曰又一變而為抑陰腎氣丸加五味仍合都氣生地當歸二味則從四物湯來何也其列證有發熱潮熱晡熱肝

血虧矣焉可再以柴胡疎之哉最妙在胸膈痞悶一句緣此

證之悶是肝膽燥火閉伏胃中非當歸生地合用何以消胸

中之火而生胃陰若用柴胡便為逍遙入肝膽不能走胃陰

矣一用柴胡一不用柴胡流瀉潤燥之義判若天淵微乎微

乎去澤瀉加川棟子當歸使君子川芎以赤茯苓換白茯苓

名九味地黃丸治腎疳高鼓峰曰又一變而為九味地黃丸

風木之藥仍是肝腎同治之法緣此疳必有蟲皆風木之所化是肝有可攻之理但伐其子則傷其母故用六味以補其

六味加減法須嚴其善用六味雖薛氏取其悟端而以上變  
化藥未透其根底故盡廢而不能用見其能合當歸柴胡而  
去芍藥則反用芍藥為疎肝益腎此則其聰明也乃謂白朮  
與六味水土相反人參脾藥不入腎其論亦高簡嚴密然細  
參薛氏畢竟趙氏拘泥薛氏諸變法似乎寬活然其實嚴密  
學者當善悟其妙而以意通之大旨以肝腎為主而旁救脾  
肺脾肺安頓則君相二火不必提起而自然帖伏矣  
水清肝飲治胃脘燥痛氣逆左脇上嘔吐酸水忽熱忽止等  
證鼓峰造滋水清肝飲取地黃丸之探原而不隔於中取生  
黃湯之降火而不犯於下真從來所未及也○按六味乃  
純陰藥唯陽氣有餘胃強脾健者宜之氣虛脾弱者服之必  
食減增病

左歸丸

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或虛熱往來自  
汗盜汗或神不守舍血不歸原或遺淋不禁或口燥舌乾或

成方切用

左歸丸

補養門  
卷四

腰痠腿軟或昏運眼花耳聾凡精髓內虧津液枯竭等證俱  
宜速壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣此方主之  
大懷熟兩山藥 黃肉 枸杞 菟絲子 鹿角膠 珠四兩  
牛膝 酒洗蒸熟三兩 龜膠 無火者不用 丸法如前每食  
前滾清湯或淡鹽湯送下百餘丸 如純陰失守虛火上炎  
者宜用純陰至靜之劑於本方去鹿膠枸杞加女貞子麥冬  
三兩 如火燥肺金乾枯多嗽者加百合三兩 如氣虛者  
加人參三四兩 如大便燥結去菟絲子加肉蓯蓉三兩如  
血虛微滯加當歸四兩 如腰膝痠痛加杜仲三兩鹽水炒  
用 如臟平無火而腎氣不充者加破故紙三兩蓮肉去胡

桃肉各四兩龜膠不必用 右凡五液皆主於腎故凡屬陰  
分之藥無不皆走腎有謂必須導引者皆見之不明爾

左歸飲

治腎水乾枯虛火上蒸脾胃陰土受虧以致飲食不進大梗  
燥結甚至三陽癰閉將成噎膈治之於早無不愈也嘗以此  
方加歸芍治傷寒舌黑唇焦大渴引飲此必服攻伐寒涼之  
藥過多也此方救之治瘧疾而兼燥證熱重寒輕者此方更  
宜

成方切用

左歸飲

補養門  
卷四

皮二錢 心熱而躁者加元參二錢 血熱妄動者加生地  
三四錢 陰虛不寐者加女貞子二錢 上實下虛者加牛  
膝二錢以導之 血虛而燥滯者加當歸二錢 脾熱易饑  
者加芍藥二錢 腎虛骨蒸多汗者加地骨皮二錢 此壯  
水之劑乃一陰煎四陰煎之主方也 按六味乃虛中挾濕熱  
無取澤瀉之泄丹皮之涼也 宜以此甘純之劑平補之  
一陰煎 景岳  
此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損而脈證多  
陽虛火發熱及陰虛動血等證或瘧疾傷寒屢散之後取汗  
既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰水

虧而然也皆宜用此加減主之

熟地錢三五 生地 白芍藥 麥冬 丹參錢二 杜仲錢半 甘草錢一

如火盛躁煩者入真龜膠二三錢化服 如氣虛者間用

人參一二錢 如心虛不眠多汗者加棗仁當歸各一二錢

如汗多煩躁者加北五味十粒或加山藥山茱萸 如見

微火者加女貞子一二錢 如虛火上浮或吐血或衄血不

止者加澤瀉一二錢茜根二錢或加川續斷一二錢以清之

亦妙 去杜仲丹參加知母地骨皮各一錢名加減一陰煎

治證如前而火之甚者

二陰煎

成方切用 二陰煎 三陰煎

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言

多笑或癆疹煩熱失血等證此方主之

生地錢四 麥冬錢二 棗仁錢二 茯苓 木通錢半 黃連錢一

生甘草錢一 加燈心二十根或竹葉亦可 如痰勝熱甚

加九製膽星一錢或天花粉一錢五分

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等證故曰三陰凡中

風血不養筋及瘡疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽

厥陰陰虛血少之病微有火者宜一陰煎無火者宜此方主

之

當歸錢二 熟地錢三五 芍藥錢二 棗仁錢二 人參錢一 炙甘草錢一 如

嘔惡者加煨薑三五片 汗多煩躁加五味子十四粒 汗

多氣虛者加黃耆一二錢 小腹隱痛加枸杞一二錢 如

有眼悶加陳皮一二錢 如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

四陰煎

此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩

渴欬嗽吐衄多熱等證

生地錢四 麥冬 芍藥 百合錢二 生甘草錢一 沙參錢二 茯苓錢半

如夜熱盜汗加地骨皮一二錢、如痰多氣盛加貝母二

三錢阿膠一二錢或天花粉亦可 如金水不能相滋而乾

成方切用 四陰煎 五陰煎

燥者加熟地三五錢、如多汗不眠神魂不寧加棗仁二錢

、如多汗兼渴加五味十四粒 如熱甚者加黃蘗一二錢

鹽水炒用或元參亦可但分上下用之 如血少經遲枯澀

不至者加牛膝二錢 如血熱吐衄加茜根二錢 如多火

便燥或肺乾咳咯者加天冬二錢或加童便亦可、如火載

血上行者去甘草加炒山梔一二錢

五陰煎

凡真陰虧損脾虛失血等證或見溇泄未甚者所重在脾故

曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地錢五 芍藥錢五 山藥錢二 糯豆錢二 茯苓錢半 甘草錢二 五

味二十人參隨宜白朮炒一錢加蓮肉去心二十粒

七寶美髯丹 邵應節

治精血不足羸弱周痺腎虛無子消渴淋瀝遺精崩帶癰瘡

痔腫等證 周痺周身痠痺也由氣血不足無子由腎冷精衰消渴淋瀝由水不制火遺精由心腎不交崩帶瘡

痔由營血不調

何首烏 大者赤白各一觔去皮切白茯苓 乳牛膝酒浸同首

蒸至第 片黑大豆拌九蒸九曬當歸 洗酒杞子 酒浸蒸破故紙 黑芝蘇拌

蜜丸鹽湯或酒下並忌鐵器

何首烏滋精固氣補肝腎為君茯苓交心腎而滲脾溼牛

膝強筋骨而益下焦當歸辛溫以養血枸杞甘潤而補水菟

成方切用

七寶美髯丹 大補元煎

主

補養門

絲子益三陰而強衛氣補骨脂助命火而暖丹田此皆固本

之藥使營衛調適水火相交則氣血太和而諸疾自已也 何

烏龍傳雖久服者尚宜明察時問方士邵應節進此方世宗服之連生皇子遂盛行於世

大補元煎 景岳

治男婦氣血大壞精神失守急劇等證此回天贊化救本培

原第一要方 本方與前右歸飲出入互用

人參 補氣補陽以此為主少則熟地補精補陰以此為主少

則山藥 炒杜仲二錢多則用一二兩熟地則用三四錢多則用一

錢二三錢 甘草二錢如元陽不足多寒者加附子肉桂炮薑之

屬隨宜用之、如氣分偏虛者加黃耆白朮胸口多滯者不

必用 如血滯者加川芎去黃肉 如滑泄者加五味故紙

之類

滋陰大補丸 丹溪

溫補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰腳沈重肢

體倦怠血氣羸乏瘦弱食減發熱盜汗遺精白濁牙齒浮痛

等證

熟地 兩二牛膝 酒浸杞子 酒浸山藥 兩半茯苓 乳牛膝小茴香 杜仲

遠志 心五巴戟天 酒浸肉苁蓉 酒浸黃肉 一石菖蒲 五錢

加棗肉蜜丸鹽湯或酒下

兩腎中間有命火乃先天之真陽人之日用云為皆此火也

成方切用

滋陰大補丸 五福飲

主

補養門

此火衰微則無以薰蒸脾胃飲食減少而精氣日衰矣菟蓉

巴戟能入腎經血分茴香能入腎經氣分同補命門相火之

不足火旺則土強而脾能健運矣熟地枸杞補水之藥水足

則有以濟火而不亢不害矣杜仲牛膝補腰膝以助腎茯苓

山藥滲溼熱以助脾山藥五味生肺液而固精遠志菖蒲通

心氣以交腎 遺精白濁由大棗補氣益血潤肺強脾此陰陽

平補之劑而曰滋陰者腎為陰臟也 此即楊氏還少丹去橘

氏用之甚妙丹後載之五福飲 景岳

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參 熟地隨宜當歸二三錢白朮炒錢甘草錢一加薑棗

凡氣血俱虛等證以此為主或宜溫者加薑附宜散者加柴  
麻升葛左右逢源無不可也宜涼者亦當隨宜加之 加棗  
仁二錢遠志三五分製用名七福飲治氣血俱虛而心脾為  
甚者

黑地黃丸

治脾腎不足房室虛損形瘦無力面色青黃此脾腎兩傷之證亦治

血虛久痔

氣不攝血則妄行淫熱下流則成痔潔古曰此治血虛久痔之聖藥

蒼朮

熟地 助 五味 助 乾薑 春冬一兩秋七錢夏五錢

棗肉丸米飲或酒下

成方切用

黑地黃丸 大營煎

圭 補養門 卷四

喻嘉言曰此方以蒼朮為君地黃為臣五味為佐乾薑為使  
治脾腎兩臟之虛而去脾淫除腎燥兩擅其長超超元著視  
後人之脾腎雙補藥味麗雅者相去不已遠耶

大營煎

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或血氣  
虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢熟地三五錢枸杞 杜仲二錢牛膝錢肉桂 炙甘

草一二錢如帶濁腹痛者加故紙一錢炒用 如氣虛者加

白朮人參 中氣虛寒嘔惡者加炒焦乾薑一二錢

小營煎

治血少陰虛此性味和平之方也

當歸錢二熟地錢三芍藥酒炒山藥 枸杞錢二炙草錢一如營虛

於上而為驚恐怔忡不眠多汗者加棗仁茯神各二錢如  
營虛兼寒者去芍藥加煨薑 如氣滯有痛者加香附一二  
錢引而行之

虎潛丸

治精血不足筋骨痿弱足不任地及骨蒸勞熱肝主筋血不足則筋骨不

主骨精不足則骨痿故步履艱難也

黃藥酒洗知母炒熟地酒虎脰骨酥炙龜板酥炙瑣陽酒

當歸酒洗牛膝酒白芍酒陳皮鹽水羯羊肉酒煮燻

成方切用

小營煎 虎潛丸

圭 補養門 卷四

搗丸鹽湯下冬加乾薑一兩丹溪加乾薑白朮茯苓甘草五  
味堯絲紫河車名補益丸治痿一方加龍骨名龍虎濟陰丹  
治遺洩

知藥熟地所以壯腎水而滋陰歸芍牛膝所以補肝陰而養

血牛膝又能引諸藥下行以壯筋骨蓋肝腎同一治也龜得

陰氣最厚故以補陰而為君虎得陰氣最強故以健骨而為

佐用脰骨者虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脰故用以入

足從其類也瑣陽益精壯陽養筋潤燥然數者皆血藥故又

加陳皮以利氣加乾薑以通陽羊肉甘熱屬火而大補亦以  
味補精以形補形之義使氣血交通陰陽相濟也名虎潛者

虎陰類潛藏也一名補陰丸蓋補陰所以稱陽也凡陽勝者只補其陰以配陽使水火均平自無偏勝之患矣

### 參朮膏

治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白朮 等分水煎稠湯化服之

### 兩儀膏

治精氣內虧諸藥不應或以尅伐太過耗損真陰者凡虛在

陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰分而精不化氣者

莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用此調元尤稱神

### 成方切用

參朮膏 兩儀膏 天眞丸

七 補養門 卷四

妙

人參

八兩或四兩

大熟地

一

二味用好甜水或長流水十五碗

浸一宿以桑柴文武火煎取濃汁若味有未盡再用水數碗

煎渣取汁并熬稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入上白蜜四兩

或半觔收之每以白湯點服若勞損咳嗽多痰加貝母四兩

亦可

### 天眞丸

治一切吐血過多形體羸瘦飲食不進腸胃滑泄津液枯竭

久服益氣生血暖胃駐顏

精羊肉

七觔去筋膜脂皮

肉苁蓉

一

山藥

一

十兩

當歸

十二兩

西洗

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

### 貞元飲

之首

治氣短似喘呼吸促急提不能升嘔不能降氣道噎塞勢劇

垂危者常人但知爲氣急其病在上而不知元海無根肝腎

### 成方切用

貞元飲 三才封髓丹

大 補養門 卷四

虧損此子午不交氣脫證也常見婦人血海常虧者最多此

證宜以此飲濟之緩之散之神劑凡診此脈必微細無神若

微而兼緊尤爲可畏儻庸衆不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘇

合及青陳枳殼破氣等劑則速其危

熟地

七八錢

當歸

二錢

炙甘草

一二錢

如兼嘔惡或惡寒者

加煨薑

三五片

如氣虛脈微至極者急加人參隨宜

肝腎陰虛手足厥逆加肉桂一錢

### 三才封髓丹

按萃

降心火益腎水滋陰養血潤而不燥

天冬

熟地

人參

五錢

黃藥

酒炒

砂仁

二兩

甘草

炙七

麝香

半兩

麝香

半兩

麝香



丸用磁器五錢切片酒一大盞浸一宿次日服湯送下

天冬以補肺生水人參以補脾益氣熟地以補腎滋陰以藥有天地人之名而補亦在上中下之分使天地位育參贊居中故曰三才也喻嘉言曰加黃蘗以入腎滋陰砂仁以入脾行滯甘草以少變天冬黃蘗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩之權殊非好為增益成方之比也 除後三味等分煎名三才湯治脾肺虛勞咳嗽 除前三味名鳳髓丹 治心火旺盛腎精不固易於施泄

當歸地黃飲

治腎虛腰脚疼痛等證

成方切用

當歸地黃飲 人參固本丸

補養門 卷四

當歸二錢 熟地三錢 山藥 杜仲二錢 牛膝半錢 山萸一錢 炙甘草

分 如下部虛寒加肉桂一二錢甚者加附子 如多帶濁

去牛膝加金櫻子二錢或補骨脂一錢 如氣虛者加人參

一二錢枸杞子二三錢

人參固本丸

治肺勞虛極 肺主氣氣者人身之根本也肺氣既虛火又

人參二錢 天冬 麥冬 生地 熟地四錢 蜜丸肺主氣而氣

根於丹田故肺腎為子母之臟必水能制火而後火不刑金

也二冬清肺熱二地益腎水人參大補元氣氣者水之母也

且人參之用無所不宜以氣藥引之則補陽以血藥引之亦

補陰也

地黃醴

治男婦精血不足營衛不充等證宜製此常用之

大熟地八兩 曬乾 枸杞四兩 用肥極者 沈香一錢或白檀

右約每藥一觔可用高燒酒十觔浸之不必煮但浸十日之

外即可用矣凡服此者不可過飲服完又加酒六七觔浸半

月再用

參乳丸

大補氣血

人參末 人乳粉 等分蜜丸頓乳取粉法取無病年少婦

成方切用

地黃醴 參乳丸 歸腎丸

補養門 卷四

人乳用銀瓢或錫瓢傾乳少許浮滾水上頓再浮冷水上立

乾刮取粉用如攤粉皮法 按人乳乃陰血所化服之潤燥降

能滋脾滑腸膩膈久服亦有不和宜者唯製為粉則有益無

損須用一婦人之乳為佳乳雖則其氣難又須旋用經久則

人參大補元氣人乳本血液化成用之以交補氣血實平淡

之神奇也

歸腎丸

治腎肝真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴遺泄痿弱

等證 此左歸右歸二方之次者也

熟地八兩 菟絲子 杜仲 枸杞子 茯苓 黃肉 山藥四

當歸<sup>三</sup> 煉蜜同熟地搗為丸桐子大每服百餘丸饑時淡

鹽湯送下

天王補心丹 終南宣律師撰勞心夢天王授以此方故名

治思慮過度心血不足怔忡健忘心口多汗大便或或或

口舌生瘡等證心者君主之官神明出焉思慮過度耗其心

心之液心煩熱故多汗心主血血不足故大便燥而閉或時

滑者心火燥肺金肺熱而心水不制也舌者心之苗虛火上

炎故口舌生瘡怔忡者心惕惕然動不自安也丹溪曰怔忡

大抵屬血虛與痰經曰血并於下氣并於上亂而善忘又曰

盛怒傷志志傷善忘又曰靜則神藏躁則消忘人不耐於事

物之長擾其血氣之陰者將竭故失其清明之體而善忘也

夫藥固有安心養血之功不若

寧心而慮返觀內守為尤得也

生地<sup>四</sup> 柏子仁<sup>炒研</sup> 當歸<sup>酒洗</sup> 棗仁<sup>去心</sup> 天冬<sup>去心</sup> 麥冬<sup>去心</sup> 五味<sup>兩</sup>

成方切用 天王補心丹 圭 補養門 卷四

人參 元參 丹參 桔梗 茯苓<sup>一用</sup> 遠志<sup>肉錢五</sup> 蜜丸

彈子大硃砂為衣臨臥燈心湯下一丸或噙含化一方有石

菖蒲四錢菖蒲辛香 無五味子一方有甘草

生地入心腎滋陰而瀉火故以為君養陰所以配陽 丹參當

歸所以生心血血生於氣人參茯苓所以益心氣人參合麥

冬五味又為生脈散蓋心主脈肺為心之華蓋而朝百脈百脈

皆賴補肺生脈血也 所以使天氣下降也天氣下降地氣上騰萬物乃生 天

冬元參苦寒而瀉火與麥冬同為滋水潤燥之劑遠志棗仁

柏仁所以養心神而棗仁五味酸以收之又以斂心氣之耗

散也桔梗清肺利膈取其載藥上浮而歸於心故以為使硃

砂色赤入心寒瀉熱而重寧神讀書之人有宜常服者今聲

有謂此方可廢不如以都氣統之亦屬臆見爾

贊化血餘丹

此藥大補氣血故能烏髮壯形體其於培元贊化之功有

不能盡述者

血餘 熟地<sup>八兩</sup> 何首烏<sup>小黑豆汁拌蒸七次如</sup> 胡桃肉

茯苓<sup>酒洗去</sup> 茯苓<sup>乳拌</sup> 小茴香<sup>略炒</sup> 巴戟肉<sup>酒浸剝</sup> 杜仲<sup>鹽水</sup>

菟絲<sup>製</sup> 鹿角膠<sup>炒當歸</sup> 枸杞<sup>兩四</sup> 人參<sup>無隨宜用</sup> 煉蜜丸每

服三五錢食前白湯下 精滑者加白朮山藥各三兩 便

溲者去菟蓉加補骨脂酒炒四兩 陽虛者加附子肉桂

成方切用 贊化血餘丹 孔聖枕中丹 圭 補養門 卷四

孔聖枕中丹 千金

治讀書善忘久服令人聰明讀書易忘者心血不足

敗龜板<sup>酥炙</sup> 龍骨<sup>研末入酒</sup> 遠志 九節菖蒲 等分為末每

服酒調一錢日三

龜者介蟲之長陰物之至靈者也龍者鱗蟲之長陽物之至

靈者也假二物之陰陽以補吾身之陰陽假二物之靈氣以

助吾心之靈氣也又人之精與志皆藏於腎腎精不足則志

氣衰不能上通於心故迷惑善忘也遠志苦泄熱而辛散鬱

能通腎氣上達於心強志益智菖蒲辛散肝而香舒脾能開

心孔而利九竅去溼除痰菖蒲為水草之精 又龜能補腎元

英神仙之靈藥

龍能鎮肝 使痰火散而心肝寧則聰明  
開而記憶強矣

養元粉 景岳

大能實脾養胃氣

糯米一升水浸一宿

山藥 芡實 蓮肉 三川椒

未三錢 共為末每日饑時以滾水一碗入白糖三匙化開

入藥一二兩調服之 或加使君子查肉各一兩亦可

大補陰丸 丹溪

治水虧火炎耳鳴耳聾欬逆虛熱耳為腎竅耳鳴耳聾皆屬

熱腎脈洪大不能受峻補者

成方切用 養元粉 大補陰丸 斑龍丸

黃檗 鹽酒 知母 鹽水炒 熟地 敗龜板 酥炙 豬脊髓和蜜

丸鹽湯下

四者皆滋陰補腎之藥補水所以降火所謂壯水之主以制

陽光也加脊髓者取其能通腎命以骨入骨以髓補髓也

斑龍丸

治虛損百病駐顏益壽

鹿角膠 鹿角霜 菟絲子 柏子仁 熟地黃 等分為

末酒化膠為丸一方加補骨脂一方加鹿茸肉蓯蓉陽起石

附子黃耆當歸棗仁辰砂亦名斑龍丸

鹿角膠霜菟絲熟地皆腎經血分藥也大補精髓柏子仁入

心而養心氣又能入腎而潤腎燥使心腎相交心志旺而神

魂安精髓充而筋骨壯去病益壽不亦宜乎 鹿一名斑龍

通腎脈是以多壽頭為六陽之會茸角鍾於鹿首豈尋常含

血之屬所可擬哉成都道士常貨斑龍丸歌曰尾間不禁滄

海竭九轉靈丹都說唯斑龍頂上珠能補玉堂閣下穴

元武豆

補腎之功甚大

羊腰子 五十 甘枸杞 二 補骨脂 一 大茴香 小茴香 六 肉蓯蓉

蓉 十二兩大便 青鹽 八兩如無從蓉 大黑豆 圓淨者一 右

用甜水二斗以砂鍋煮前藥七味至半乾去藥渣入黑豆勻

成方切用 元武豆 鹿二仙膏

火煮乾為度如有餘汁俱宜拌滲於內取出用新布攤涼曬

乾磁瓶收貯日服之若陽虛者加附子一二兩更妙

鹿二仙膏

治瘦弱少氣夢遺泄精口視不明精極之證 五勞之外又有

虛損極少氣弱則不能生神故目眊不明精氣不固水不

能制火故遺洩而精愈耗也

鹿角 十 龜板 五 枸杞 一 人參 一 先將鹿角龜板鋸截刮淨

水浸桑火熬成膠再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢

龜為介蟲之長得陰氣最全 介類鹿角遇夏至即解稟純陽

之性 陰生 且兩月長至一二十筋骨之速生無過於此者

人骨難長故能峻補氣血兩者皆用氣血以補氣血所謂補之  
以其類也人參大補元氣枸杞滋陰助陽此氣血陰陽交補  
之劑氣足則精固不遺血足則視聽明了久服可以益壽豈  
特已疾而已哉李時珍曰龜鹿皆靈而壽龜首常藏向腹能  
通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰  
也鹿首常返向尾能通督脈故取其角以補命補精補氣以養陽也

### 二至丸

補腰膝壯筋骨強腎陰烏鬚髮價廉而功大

冬青子即女貞實冬至日採不拘多少陰乾蜜酒拌蒸過一  
夜粗袋擦上皮曬乾為末瓦瓶收貯或先熬旱蓮膏  
旋配旱蓮草夏至日採不拘多少搗  
汁熬膏和前藥為丸臨臥酒服一方加桑  
葉乾為丸或桑葉熬膏和入

### 成方切用

二至丸 蟠桃果 扶桑丸

重

補養門  
卷四

女貞甘平少陰之精隆冬不凋其色青黑益肝補腎時珍曰  
女貞上  
品妙藥古方  
罕用何哉旱蓮甘寒汁黑入腎補精故能益下而榮上強  
陰而黑髮也

### 蟠桃果

治遺精虛弱補脾滋腎最佳

芡實 蓮肉去心 膠棗肉 胡桃肉去熟地 等分以豬腎六

箇摻大茴香蒸極熟同前藥末搗成餅每日服一箇空心食  
前用滾白湯或好酒一二鍾送下此方凡人參附子俱可隨  
意加用

### 扶桑丸

胡僧

除風溼起羸疴駐容顏烏鬚髮卻病延年

嫩桑葉去帶洗淨暴乾一觔為末 巨勝子即黑芝蘇  
子淨四兩 白蜜一觔 將脂麻搗

碎熬濃汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末為丸一方桑葉為

末脂麻蒸搗等分蜜丸早鹽湯晚酒下

桑乃箕星之精其木利關節養津液其葉甘寒入手足陽明

涼血燥溼而除風巨勝甘平色黑益腎補肝潤臟腑填精髓

陶隱居曰八穀之中唯此為良夫風溼去則筋骨強精髓充則容顏澤卻病

烏髭不亦宜乎歌曰扶桑扶桑高入雲海東日出氣氣氤氳  
忽如黍綠葉英英翠可掬真人採擷天地氣雷與紅霞共吐  
吞濯磨入鼎即靈藥芝朮區區未可羣餐松已有神仙去我  
今朝夕從此君葉今葉今  
願王汝綠陰裏面有桃津

成方切用 羊肉湯 益氣聰明湯

羊肉湯 韓祗和

### 成方切用

羊肉湯 益氣聰明湯

重

補養門  
卷四

治傷寒汗下太多亡陽失血惡人踈臥時戰如瘧及產脫血

虛韓祗和曰若止救逆效必速矣與羊肉湯為效甚速病人  
色雖見陽是熱客上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦  
有陽則上焦陽氣下  
降丹田知所歸宿矣

當歸 白芍 牡蠣一枚 龍骨一枚 附子一枚 生薑二兩 桂枝七錢

每服一兩羊肉四兩加葱白煮服

當歸芍藥以補其陰附子薑桂以復其陽龍骨牡蠣以收其

脫羊肉大補以生其氣血

益氣聰明湯 東垣

治內障目昏耳鳴耳聾五臟皆稟氣於脾胃以達於九竅煩  
勞傳中使沖和之氣不能上升故目

昏而耳聾也李東垣曰胃不理脾胃及  
養血安神治標不治本是不明理也

黃耆 人參 錢五 葛根 蔓荊子 錢三 白芍藥 黃蘗 二錢 如有

月漸加夏倍之如脾 升麻 錢一 炙甘草 錢一 每四錢臨臥服五

更再服

十二經脈清陽之氣皆上於頭面而走空竅因飲食勞役脾

胃受傷心火太盛則百脈沸騰邪害空竅矣參耆甘溫以補

脾胃甘草甘緩以和脾胃乾葛升麻蔓荊輕揚升發能入陽

明鼓舞胃氣上行頭目中氣既足清陽上升則九竅通利耳

聰而目明矣白芍斂陰和血黃蘗補腎生水蓋目為肝竅耳

為腎竅故又用二者平肝補腎也

成方切用

秦艽 龜甲散

毛

補養門

秦艽 龜甲散

謹市

治風勞骨蒸午後壯熱欬嗽肌瘦煩赤盜汗脈來細數風陽

在表則表熱在裏則裏熱則骨蒸午後甚者陰虛也風

火相搏則欬嗽久血枯則肌瘦虛火上炎則煩赤睡而汗

出曰盜汗陰虛也脈 細為虛脈數為熱

龜甲 柴胡 地骨皮 秦艽 知母 當歸 烏梅 青

蒿 五 汗多重用黃耆

風生熱而熱生風非柴胡秦艽不能驅之使出陰類用甲

者骨以及骨之義烏梅酸澀能引諸藥入骨而斂熱青蒿苦

寒能從諸藥入肌而解蒸 柴胡青蒿皆感少陽生發之氣凡

人脾獨宜於血 知母滋陰當歸和血地骨散表邪兼清裏熱

又去汗除蒸之上品也 地骨退有 汗之骨蒸

黃耆 龜甲散 謹甫

治男女虛勞客熱五心煩熱四肢怠惰欬嗽咽乾自汗食少

或日晡發熱 五心煩熱 五心煩熱 五心煩熱 五心煩熱

虛也欬嗽肺火也咽乾腎水不足相火上炎也 自汗陽虛也食少脾胃弱也日西潮熱肺虛也

黃耆 龜甲 天冬 錢五 柴胡 秦艽 地骨皮 茯苓 桑

白皮 紫苑 半夏 芍藥 生地黃 甘草 知母 三錢

人參 桔梗 肉桂 錢半 每一兩加薑煎衛生減桂芍地骨

名人參黃耆散治同

龜甲天冬芍地知母滋腎水而瀉肺肝之火以養陰 地黃知

成方切用

黃耆 龜甲散 秦艽 扶羸湯

毛

補養門

水天冬瀉肺火 龜甲 黃耆 人參 桂枝 甘草 固衛氣而補脾肺之

虛以助陽桑皮桔梗以瀉肺熱半夏紫苑以理痰嗽 紫苑潤

半夏化痰利咽故全置治喉痛 痛皆用半夏蓋辛能散亦能潤也 秦艽地骨以散內熱而除

蒸柴胡以解肌熱而升陽此表裏氣血交治之劑也

秦艽 扶羸湯 直指

治肺痿骨蒸或寒或熱成勞欬嗽聲啞不出體虛自汗四肢

倦怠 肺痿有火熱傷肺而得之者有肺氣虛寒而得之者骨

陰陽不和也聲啞火熱在肺也或寒或熱 汗倦怠心脾虛而衛氣不充也

柴胡 錢二 秦艽 人參 當歸 龜甲 錢五 地骨皮 甘草 紫

苑 半夏 錢一 加薑煎此方加當歸去黃耆茯苓生

柴胡秦艽散表邪兼清裏熱

退骨蒸地骨皮涼血參草補氣當歸和血紫苑理痰嗽潤肺

半夏發聲音肺屬金聲之所從出也有物實之則金不鳴燥

肺已損表裏交治氣血兼調為扶羸良劑透肌解熱柴胡秦

也難治方中多用之寇宗奭曰柴胡本經本無一字治勞瘵權

大明並言補虛勞家執而用之貽害無窮時珍曰勞有五

若勞在肝膽心包有熱或少陽經寒熱則柴胡乃手足厥

陰必用之藥唯勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡為退熱升

通論○大抵柴胡能退熱升清宣暢氣血昔孫思邈治勞瘵而

胡有在皮膚在骨節在骨髓者非柴胡不除則柴

胡亦有退熱升清之功況有補之藥以輔之乎直指方又

云柴胡退熱不及黃芩不知黃芩乃寒能勝熱

折火之木也柴胡乃苦以發之散火之標也

百合固金湯趙叢庵

成方切用百合固金湯

治肺傷咽痛喘痰血肺金受傷則腎水之源絕腎脈挾咽

痰因火生虛火上炎故咽痛火上薰肺故喘咳

血因火逼

熟地錢三生地錢二麥冬錢半百合錢半芍藥炒生甘草當歸貝

母錢一元參桔梗分八

金不生水火炎水乾故以二地助腎滋水退熱為君肺腎為

臟故補肺者百合保肺安神麥冬清熱潤燥元參利咽喉而

降火貝母散肺鬱而除痰歸芍養血兼以平肝肝火盛桔梗

清金功成上部戴諸華皆以甘寒培元清本不欲以苦寒傷

生發之氣也李士材曰葦庵此方殊有卓見熟地為金母清

飲嗽吐血未必成痰也服西物知藥之類不能足也醫賈曰

滿腹脹飽不快未必成痰也服西物知藥之類不能足也醫賈曰

成矣而目浮腫小便澀澀未必成水也服滲利之藥不止則

小成矣氣滯喘塞未必成噎也服青皮枳殼寬快之藥不止

成矣

補肺湯

治肺虛欬嗽有聲無痰曰欬蓋傷於肺氣也有痰無聲曰嗽

因痰因溼因食因虛之異此為肺虛不能生腎水虛火上炎

而欬嗽也○欬嗽脈浮為客邪宜發散脈實為內熱宜清利

脈濡散為肺虛宜溫補久嗽曾經解外以致

肺胃俱虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥

桑皮蜜熟地人參黃耆五味紫苑入蜜少許

和服

肺虛而用參耆者脾為肺母氣為水母也虛則補用熟地者

腎為肺子子虛必盜母氣以自養故用腎藥先滋其水且熟

地亦化痰之妙品也丹溪曰補水以制欬則氣傷五味酸溫

能斂肺氣欬由火盛桑皮甘寒能瀉肺火紫苑辛能潤肺溫

能補虛合之而名曰補肺蓋金旺水生欬嗽自止矣此治肺

若實火嗽者禁用劉宗厚曰因勞而嗽則非嗽為本也故此

湯與金匱腎氣丸為少陰例藥仁齋直指曰肺出氣也腎納

氣也肺為氣主腎為氣本凡欬嗽暴重自覺氣從臍下逆上

者此腎虛不能收氣歸元當用地黃丸安腎丸母徒從事於

肺此虛則補子之義也醫賈曰五行唯肺腎二臟母病而子

受邪何則肺主氣肺有熱氣得熱而上蒸不能下生於腎而

腎受傷矣腎傷則肺益病蓋母藏子官子隱母胎凡人肺金

之氣夜臥則歸藏於腎水之中因肺受心火之邪欲下通水

中而腎水乾枯有火無可容

之地由是復上而為病矣

補肺阿膠散錢乙

治肺虛有火嗽無津液而氣哽者火盛則津枯津枯則氣哽

阿膠蛤粉炒 馬兜鈴焙 甘草炙 牛蒡子炒香 杏仁去皮尖 糯米一兩

馬兜鈴清熱降火兜鈴象肺 牛蒡子利膈滑痰潤肺解熱 杏仁潤燥散風故入肺 阿膠清肺滋腎益血故治火嗽 補陰氣順則不嘔液補則

津生阿膠補 火退而嗽寧矣土為金母故加甘草糯米以益 脾胃時珍曰補肺阿膠散用馬兜鈴非取其補肺取其清 熱降氣而肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

紫苑湯海藻

治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血氣極六極之一也肺主氣 元氣虛則陰火盛壯火食

嗽不已甚則通血上行也 及肺痿癰癰

紫苑洗淨 阿膠蛤粉炒 知母 貝母 錢 桔梗 人參 茯苓

成方切用

紫苑湯 王母桃

辛 補養門 卷四

甘草五 五味十二

勞而久嗽肺虛可知即有熱證皆虛火也海藏以保肺為君

故用紫苑阿膠二藥潤肺補 以清火為臣故用知母貝母二藥

燥消痰以參苓為佐者扶土所以生金以甘桔為使者載藥

上行脾肺桔梗載諸藥上行而能 五味滋腎家不足之水收

肺家耗散之金久嗽者所必收也

王母桃景岳

培補脾腎功力最勝

白朮味甘者佳苦者勿用 大懷熟蒸搗二 何首烏九 巴戟甘草

湯米泔浸一宿切片炒 剝炒減半 右為末煉蜜丸龍眼大每服三四丸饑時

嚼服滾湯送下或加人參其功尤大

玉屏風散

治自汗不止氣虛表弱易感風寒陽也者衛外而為固也陽 固而易洩且畏風也此與傷風自汗不同

彼責之邪實此責之表虛故補為各異

黃耆多 防風一兩 白朮炒二 為末每服三錢

黃耆補氣固肌表故以為君白朮益脾脾主肌肉故以為

臣防風去風為風藥卒徒而黃耆畏之故以為使以其益衛

固表故曰玉屏風李東垣曰黃耆得防風而功益大取其相

不因其氣不遇而病者故黃耆為必用之君藥防風為必用

之臣藥黃耆助真氣者也防風載黃耆助真氣以過於身者

也亦有治風之功焉黃耆治王太后 前藥等分煎名黃

中風口噤煎二藥煎之而愈況服之乎

成方切用 玉屏風散 妙香散

王荆公

者湯潔古用代桂枝湯治春夏發熱有汗脈微弱惡風寒者

惡風甚加桂枝又用川芎蒼朮羌活等分名川芎湯以代麻

黃湯治秋冬發熱無汗惡風寒者惡寒甚加麻黃

妙香散 王荆公

治夢遺失精驚悸鬱結腎主藏精心主藏神邪火妄行心腎 擾故多驚悸憂思

氣滯則成鬱結 不交上實下虛則夢中遺失心虛神

山藥薑汁炒 人參 黃耆 遠志炒 茯苓 茯神一 桔梗三

木香二錢 辰砂另 甘草錢二 麝香錢一 為末每服二錢酒下

之初起亦有不在于肝腎而在心肺脾胃之不足者然必傷  
肝腎而精乃走也又曰心腎是水火之藏法天地施生化成  
之道故藏精神為五臟之宗主若由他臟而致腎之泄者必  
察四屬以求其治大抵精自心而泄者血脈空虛本經不收  
自肺而泄者皮槁毛焦喘急不利自脾而泄者色黃肉消四  
肢懈怠自肝而泄者筋痿色青自腎而泄者色黑髓空而骨  
墮即脈亦可辨也丹溪曰上閉藏者腎也司疏泄者肝也二  
臟皆有相火而其系上屬於心君火也為物所感則易於  
動心動則相火翕然隨之雖不交會而精亦暗流而山藥益  
滲漏矣所以聖賢只是教人收心養性其旨深矣

陰清熱兼能瀉精故以為君人參黃者所以固其氣遠志二  
茯所以寧其神神寧氣固則精自守其位矣且二茯下行利  
水又以泄腎中之邪火也桔梗清肺散滯木香疎肝和脾氣  
故疎肝肝疎則水不剋土而脾和丹砂鎮心安魂麝香通竅解鬱二藥又能  
辟邪亦所以治其邪感也加甘草者用以交和乎中猶黃婆

成方切用

參苓白朮散

重

補養門  
卷四

之媒嬰姪也

黃婆脾也嬰兒  
姪女心腎也

是方不用固瀉之劑但安神正

氣使精與神氣相依而自固矣以其安神利氣故亦治驚悸

鬱結

妻全善曰詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫  
不知其鬱但用瀉劑固脫愈瀉愈鬱其病反甚矣

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

上為萬物之母脾土受傷  
則失其健運之職故飲食

不消兼寒則嘔吐兼瀉則濡泄也飲食既少  
眾藏無以稟氣則虛羸日甚諸病叢生矣

人參

白朮

炒土

茯苓

甘草

山藥

扁豆

薏仁

蓮肉

去陳皮

砂仁

桔梗

為末每三錢東湯或米飲調服

治脾胃者補其虛除其滯行其滯調其氣而已參朮苓草山  
藥薏仁扁豆蓮肉皆補脾之藥也然茯苓山藥薏仁理脾而

兼能滲溼砂仁陳皮調氣行滯之品也合參朮苓草暖胃而  
又能補中陳皮砂仁入  
補藥而宜滯桔梗苦甘入肺能載諸藥上浮又能  
通天氣于地道肺和則天  
氣下降使氣得升降而益和且以保肺防  
燥藥之僭上也

休癰飲

此止瀉最妙之方也若汗散既多元氣不復或以衰老或以  
弱質而癰有不能止者俱宜用此化暴善後之第一方也  
人參 白朮 炒 當歸 各三錢 何首烏 製 炙甘草 八分 用陰陽  
水各一盞煎七分露一宿次早溫服 如陽虛多寒宜溫中  
散寒者加乾薑肉桂之類甚者或加製附子 如陰虛多熱

成方切用

休癰飲

重

補養門  
卷四

煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或

加黃芩 如腎陰不足水不制火虛煩虛餒腰痠脚軟者加

熟地山藥杜仲之類 如邪有未盡而留連難愈者于此方

加柴胡麻黃細辛紫蘇之屬自無不可 如氣血多滯者或

加酒水各一盞煎服藥後飲酒數杯亦可

去白朮甘草加生薑陳皮名何人飲治同



成方切用卷五目錄

瀉固門 正方二十四 附方四

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

訶子散

河間訶子散

鞏隄丸

真人養臟湯

脫肛方

牡蠣散

成方切用

目錄

柏子仁丸

固真丸

金鎖固精丸

珍珠粉丸

豬苓丸

苓朮菟絲丸

治濁固本丸

秘元煎

固陰煎

茯苓丹

菟絲煎

水陸二仙丹

黏米固腸糕

惜紅煎

桑螺蛸散

人參樗皮散

玉關丸

四神丸

二神丸

如聖散

撲汗法

成方切用

目錄

工

瀉固門 五

成方切用卷五

瀉固門

十劑曰瀉可去脫壯氣龍骨之屬是也如久嗽為喘而氣  
泄於上者宜固其肺尤宜固其腎所謂上病下取也久  
遺成淋而溺尿於下者宜固其腎尤宜固其氣所謂下  
病上取也小便不禁者宜固其皮毛血泄不止者宜固其  
腸臟汗泄不止者宜固其氣溫補有火而滑者當佐以清涼總  
凡因寒而脫者當重溫補有火而滑者當佐以清涼總  
之在上在表者皆宜固精氣主在肺也  
在下在裏者皆宜固精氣主在腎也

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥

下之利不止治之誤醫以理中與之利益甚誤也理中者

理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當

成方切用

赤石脂禹餘糧湯

瀉固門

利其小便難經曰中焦中脘主腐熟水穀下焦者當膀胱上

穀者常并居於胃中成精而後下於大小腸而成下焦滲  
而俱下瀉則別計循下焦而滲人膀胱焉然則利在下焦者  
甘溫固陽虛而收滑脫也餘糧甘平消痞硬而鎮臟腑石脂  
分也利小便者導其水而分消  
之使膀胱各行其事也

赤石脂禹餘糧湯 水六升煮二升去渣分三服

瀉可去脫重可達下二物瀉以止脫重以固下甘以益氣

知云下焦有病人難  
會須用餘糧赤石脂

桃花湯

治少陰病二三日至四五日腹痛小便利不利下利不止便膿

血者喻嘉言曰腹痛小便利不利少陰熱邪也而下利不止便  
膿血則下焦滑脫矣不可用寒藥故取乾薑

脂之辛溫以溫經固脫而如梗米之甘以益中州益  
治下利必先中氣不下者則滑脫無源而自止也

赤石脂 一劑一升 乾薑 一升 梗米 一升 水七升煮米熟去渣

內石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

此少陰傳經熱邪也陰經循行於裏故腹痛下利仲景反用

石脂乾薑之溫濕何意蓋下利至於不止熱勢已大衰而虛

寒滋起矣故非固脫如石脂不可且石性最沉味溫易滯故

稍用乾薑之辛散佐之用梗米獨多者取其和中而養胃也

石脂用半全半末以全用則氣味不出純末又難於下咽所

以斟酌其當而為之者也傷寒便膿血皆是傳經熱邪成無

非之是也程郊倩以為大衰不能生土母乃迂乎汪詒菴  
未經臨證所見每隔一層其是成程而非王吳無足怪也

成方切用

桃花湯 訶子散

瀉固門

訶子散

治虛寒泄瀉水穀不化腸鳴腹痛脫肛及便膿血日夜無度

御米穀 炒五分 訶子 七分 乾薑 炮六分 橘紅 五分 右末空心

服

御米穀酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸澁苦溫收脫住瀉炮薑

辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調氣共以固氣脫亦可

收形脫也 泄瀉為氣脫  
脫肛為形脫

河間訶子散 訶子 一兩半 木香 錢五 甘草 錢二 黃連 錢三 為末每服

三錢用白朮芍藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此

止之如不止加厚朴一兩竭其餘邪 唯積滯未  
清者宜之

鞏隄丸

治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水不禁等證

熟地 菟絲酒製 白朮炒 韭子炒 破故紙酒炒 益智仁酒炒 北五

味 熟附子 茯苓兩 爲末山藥糊丸桐子大每服百餘

丸空心滾湯或酒下 如氣虛加人參一二兩更妙

眞人養臟湯

治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛肛門爲大腸之使大腸受

者傳導之官腎者作強之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺

衰皆易 亦治下痢赤白臍腹疼痛日夜無度

罌粟殼去蒂蜜炙 訶子麩裏煨 肉豆蔻麩裏煨 木香二兩

成方切用

肉桂八錢 人參 白朮炒 當歸六錢 白芍炒 生甘草一兩

每服四錢臟寒加附子一方無當歸

脫肛由於虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂肉蔻以祛其

寒木香溫以調氣當歸潤以和血芍藥酸以收斂訶子罌殼

則瀉以止脫也 此虛寒脫肛故宜大補氣血或加川芎以調

挺出者宜用芩連槐藥或

四物加升柴芩防之類

牡蠣散

治陽虛自汗醒而汗出曰自汗

牡蠣煅 黃耆 麻黃根錢一 浮小麥百 煎服

陳來章曰汗爲心之液心煩熱則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

柏子仁丸

治陰虛盜汗睡而汗出曰盜汗

柏子仁炒研去油 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣 麻

黃根兩 麥麩錢五 棗肉丸米飲下五十丸日三服

陳來章曰心血虛則睡而汗出柏子仁之甘辛平養心寧神

爲君牡蠣麥麩之鹹涼靜躁收脫爲臣五味酸斂收瀉半夏

和胃燥溼爲佐溼能作汗 麻黃根專走肌表引人參白朮以固衛

成方切用

氣爲使

固眞丸

治夢遺精滑

菟絲子一助淘洗淨用 好酒浸三日煮極熟 牡蠣煅 金櫻子

熟茯苓酒拌蒸 蜜丸空心好酒送下三錢或鹽湯亦可

金鎖固精丸

治精滑不禁精滑者火炎上而水

沙苑蒺藜 芡實蒸 蓮鬚二兩 龍骨酥炙 牡蠣鹽水煮一日 蓮

肉粉爲糊丸鹽湯下

茯苓補腎益精蓮子交通心腎牡蠣清熱補水芡實固精補

脾合之蓮鬚龍骨皆精氣之品以止滑脫也法有遺精大  
神浮越者辰砂慈石龍骨之類鎮之痰飲擾心者豬苓六之  
類導之思想傷陽者謙甫鹿茸從蓉菟絲等補陽陰陽俱虛者丹  
火思想傷陽者謙甫鹿茸從蓉菟絲等補陽陰陽俱虛者丹  
溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附本事豬苓丸豬苓  
末二兩先將一半炒半夏黃取半夏爲末糊丸更用豬苓  
末一半同炒微裂砂微養之中未間空心酒鹽湯任下釋曰  
半夏有利性豬苓導水蓋腎閉導  
氣使通之意也定志丸見眼目門

苓朮菟絲丸

治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困倦等證

菟絲子

酒蒸或五六兩或七八兩

蓮肉

去心

茯苓

四兩

杜仲

酒炒三兩

山藥

二兩

五味

一兩

炙甘草

五錢

右用山藥末以陳酒煮糊爲丸桐子

大空心白滾湯或酒下百餘丸如氣虛不能收攝者加人

成方切用

苓朮菟絲丸

治濁固本丸

五

瀉固門

參三四兩尤妙

治濁固本丸

治胃中溼熱滲入膀胱下濁不止

淋病在溺竅屬肝膽部濁病在精竅屬腎膀胱部或由溼熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣或由敗精瘀血壅塞竅道痛澀異常非是熱淋不宜用淋藥治

甘草

炙三兩

豬苓

黃連

蓮鬚

黃蘗

益智仁

砂仁

半夏

製茯苓一兩

精濁多由溼熱與痰黃連瀉心火黃蘗瀉腎火所以清熱二

苓所以利溼半夏所以除痰溼熱多由於鬱滯砂仁益智辛

溫利氣又能固腎強脾既以散留滯之氣且稍濟連蘗之寒

甘草和中而補土唯蓮鬚之瀉則所以固其脫也

朱丹溪曰果氏原病

候論曰白濁者田勞傷腎氣虛冷故也歷代宗其說不確  
白濁之理不明所治之法亦悞不思內經本無白濁之名惟  
言窮入房太甚發爲白濁與脾移熱於腎出白濁二者皆隨波  
而下夫非白濁之源乎原病式因舉內經謂諸病水液渾濁  
皆屬於熱言天氣熱則水渾濁寒則清濁可謂諸病水液渾濁  
以正千載之誤矣予嘗問先生論赤白濁多由濕熱下流勝  
氣使成即靈樞所謂中氣不足溼便爲之變是也必先補中  
所傷固在瀉熱補虛設腎氣虛甚或火熱充極者則不宜過  
用寒涼必以反佐治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺精多  
作腎虛補證之而後治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺精多  
輸於腎若脾胃受傷溼熱內鬱使其精木於脾胃飲食生化而  
而安靜故令遺精也

秘元煎

治遺精帶濁等證此方專主心脾

成方切用

秘元煎

固陰煎

木

瀉固門

金櫻子

去核

棗仁

研

山藥

炒

白朮

炒

茯神

錢

炙甘草

錢

遠志

八分

五味子

十粒

水煎食遠服

此治久遺無火不痛而滑者可用之如尙覺有火熱者加

苦參一二錢如氣大虛者加黃耆一二錢

固陰煎

治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證此方專主肝

腎

熟地

三五錢

菟絲子

炒二錢

山藥

炒二錢

黃肉

錢

甘草

炙一錢

分

五味子

十四粒

人參

錢

水煎食遠服

如虛滑遺甚者加

金櫻二三錢或醋炒文蛤一錢或烏梅一個如陰虛微熱

而經血不止者加川斷續二錢 如下焦陽氣不足而兼腹  
痛泄瀉者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用之 如肝腎血虛  
而小腹痛血不歸經者加醋炒當歸二三錢 如脾虛多溼  
或兼嘔惡者加白朮一二錢 如氣陷不固者加炒升麻一  
錢 如兼心虛不眠或多汗者加棗仁二錢炒用

扶菟丹 局方

治遺精白濁及強中消渴 心腎為水火之臟法天施地生之  
水受傷腎主藏精所受五臟六腑輸至之精皆不得藏而時  
下矣及為遺精夢泄或氏曰遺精有因用心過度心不攝腎  
以致失精者有思色慾不遂致精失位輸泄而出者有慾  
太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤  
濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣由肺大腸屬金也渴  
證下消者莖長與盛不交精出名強中腎水虧心火亢也

成方切用

扶菟丹 菟絲煎

七 清固門

菟絲子 十五味子 八山藥 六白茯苓 三石蓮肉 三將菟絲

用酒浸浸過餘酒煮山藥糊丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下

白濁茯苓湯下消渴米飲下

菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒淋渴五味滋腎生津石

蓮清心止濁山藥健脾利溼皆溫精固氣之品也茯苓能通

心氣於腎利小便而不走氣取其淡滲於補正中能泄腎邪

也

菟絲煎

治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此主之

山藥 炒二棗仁 炒茯苓 一錢當歸 人參 二三製菟絲子 四

炙甘草 一錢或五分 遠志 肉 製四分 鹿角霜 為末每用加 水煎

水陸二仙丹

治遺精白濁 精與濁所出之竅不同便濁即是膏淋肝膽之  
火也精濁乃精氣滑出不便亦然此腎水不足

浮火蒸故  
清離其位也

金櫻膏 取半黃者熬膏一觔 芡實 一觔蒸 和丸鹽酒下

山故名水陸二仙丹

黏米固腸糕

治脾胃虛寒或因食滯氣滯腹痛泄瀉久不止者多服自效

成方切用 水陸二仙丹 黏米固腸糕 桑螵蛸散 入 清固門

成方切用

白糯米滾湯淘洗炒香熟為粉每粉一兩加乾薑炒熟者二

分半白糖二錢拌勻於饑時用滾水調服一二兩如帶微滯

者加陳皮末二分或砂仁一分 一法用陳老米粉亦妙

桑螵蛸散 寇氏

治小便數而欠 數便頻也欠便短也溺雖出於膀胱然泌別  
者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便短

能安神魂補心氣療健忘

人參 茯苓 一用 遠志 石菖蒲 鹽炒 桑螵蛸 鹽水 龍骨 煅

板 酥炙一用 當歸 等分為末臨臥服二錢人參湯下

虛則便數故以螵蛸龍骨固之 並能補 腎經熱則便欠故以當歸

龜板滋之人參補心氣萬蒲開心竅茯苓能通心氣於腎遠

志能通腎氣於心並能清心解熱心者小腸之合也心補則小腸不虛心清則小腸不熱矣

惜紅煎

治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等證

白朮 山藥 白芍 藥酒 炒 荆芥穗 地榆 川續斷 炒

炙甘草 北五味 烏梅 水煎食遠服 如火盛

者加黃芩黃連 如脾虛兼脾泄者加破故紙人參

人參梔皮散

治臟毒挾熱下血久痢膿血不止 挾熱者謂挾客熱及飲酒

止氣虛 附脫也

成方切用

惜紅煎 人參梔皮散 玉關丸

九 清固門 卷五

人參 梔根白皮 東引者去 等分爲末米飲或酒調下

人參之甘以補其氣梔皮之苦以燥其溼寒以解其熱瀉以

收其脫使虛者補而陷者升亦劫劑也 初起勿用

玉關丸

治腸風血脫崩漏不止帶濁不固諸藥難效者宜用此方兼

煎藥治之及瀉痢滑泄不能止者

白麩 炒熟 枯礬 文蛤 醋炒黑 北五味 訶子 二兩半 共

爲末熟湯和丸桐子大以溫補脾腎等藥隨證加減煎湯送

下或人參湯亦可如血熱妄行者以涼藥送下

撲汗法

凡自汗不止者用龍骨牡蠣糯米等分爲末絹袋盛周身撲之即止

成方切用

撲汗法

十 清固門 卷五

成方切用卷六目錄

表散門 正方二十七 附方三十八

桂枝湯

疏邪實表湯

桂枝甘草湯

桂枝加附子湯

桂枝附子湯

桂枝新加湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加厚朴杏仁湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝加黃耆湯

桂枝五物湯

栝樓桂枝湯

成方切用

目錄

一

表散門  
卷六

桂枝加龍骨牡蠣湯

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃加朮湯

麻黃附子湯

甘草麻黃湯

三拗湯

大青龍湯

小青龍湯

小青龍加石膏湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

葛根解肌湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

升麻葛根湯

柴葛解肌湯

柴胡升麻湯

九味羌活湯

十神湯

神朮散

白朮湯

太無神朮散

成方切用

目錄

二

表散門  
卷六

局方神朮散

許學士神朮散

九製蒼朮散

葱豉湯

連鬚葱白湯

人參敗毒散

倉廩散

硝黃敗毒散

敗毒加黃芩湯

連翹敗毒散

荆防敗毒散

川芎茶調散

菊花茶調散

再造散

麻桂飲

大溫中飲

升陽散火湯

方見瀉火門

藿香正氣散

方見和解門

大羌活湯

歸葛飲

舉斑湯

犀角消毒湯

柴葛煎

方見嬰孩門

成方切用

目錄

火鬱湯

見瀉火門

升陽散火湯

見瀉火門

三

表散門  
卷六

成方切用卷六

表散門

仲景太陽經風傷衛用桂枝為主藥寒傷營用麻黃為主藥陽明經用葛根為主藥少陽經用柴胡為主藥此散表之準繩也後世宗之而用之有效有不效者蓋不獨分經之未的并性味亦有未精悉也凡用散之法當知性力緩急及氣味寒溫之辨用得其宜無不妙也如麻黃峻散寒邪桂枝解肌緩散者也防風荆芥紫蘇平散者也蒼朮羌活能走經走濕而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也蒼朮羌活能走經走濕而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也蒼朮羌活能走經走濕而散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也

成方切用

桂枝湯

桂枝湯 仲景

治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾

嘔關前為陽衛為陽陽以候衛關後為陰營亦陰陰以候營受之故頭痛經曰陽浮者熱自發陰弱者汗自出風併於衛營弱衛強故發熱自汗也衛虛則惡風營虛則惡寒自汗則皮腠疏故惡風復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛實之分無汗惡寒為表實宜發汗汗出惡寒為表虛宜解肌解肌之方無汗惡風未有不惡寒者所以傷寒亦互云惡風後人謂傷寒惡風誤矣及陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗脈遲汗多屬陽明證以微惡寒尚兼太

桂枝 芍藥

生薑

甘草

二兩

大棗

十二

熱服須臾啜

稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋漓汗出病



差停後服一劑盡病證猶在者更作服喻嘉言曰妙用全藥力穀氣內充則邪不能入而熱以繼藥之後則邪不能留法中之法若此世傳方書無此四字誤失初意更有已透微似之汗蓋強逼致令大汗淋漓者總不知解肌為何義爾所以服桂枝時要使周身發熱然似汗者無非欲其皮毛開竅暫開而邪散也然恐藥力易過又藉熱粥以助其暖如此一時之久肌氣不致速閉則外受之邪盡從外解則為合法矣不識此意汗時不失之太過即失之不及太過則邪未入而先擾其營甚則汗不止而亡陽不及則邪欲出而不除而生變矣

周揚俊曰風既傷衛則衛氣疎不能內護於營而汗自出矣汗者血之液也桂枝血分藥也苟非以血藥入透營分和營散邪芍藥護營固裏則不但外邪不出且必內入而為腑患然後知和營則外邪出則衛自密更不必用固表之藥

成方切用

桂枝湯

二 表散門

而汗自止矣仲景曰病當自汗出者營氣和衛氣不共營氣邪營反出汗之理所以中風病治法宜桂枝湯也此明衛受風問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必溼之故用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能開汗孔也○亦唯有汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃以桂枝湯中有芍藥故也蓋斂汗在芍藥不在桂枝也李東垣曰仲景治表虛製此湯用桂枝為君桂枝辛熱發散體輕助陽芍藥甘草佐之若腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君芍藥酸寒主收補中桂枝甘草佐之一治表虛一治裏虛又曰以桂枝易肉桂治感寒腹痛之神藥如中熱腹痛去桂加黃芩

加白朮川芎羌活防風飴糖名疎邪實表湯節治同此以白

尤為君以代桂枝湯喻嘉言曰至令外感內傷混同論治矣桂枝麻黃所著傷寒六書書景原方參合後賢治法以代勝於仲景以節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書行而仲景之書晦如節菴者謂謂海藏去芍藥薑棗名桂枝甘草湯仲景治發汗過多叉手目心下悸欲得按者方中行曰而心虛動悸故叉手目欲得按也桂枝走陰斂液宅心能收陰補陽之為用也○不用附子者未見惡寒也不加人參者不見沉遲脈也去芍藥為陰也去薑棗無取辛散也故止用桂枝二甘草一則固表和中兩加附子名桂枝加附子湯相結合而與有薑者之立法遠矣

成方切用

桂枝湯

三 表散門

治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸方中行曰此亦太陽中風誤汗之變證夫固表斂汗無出桂枝右矣而欲復陽益氣所以有附子之加焉○惡風為陽虛小便難為膀胱傷拘急難以屈伸因無津液以養此本桂枝證也誤用麻黃勢必至大汗而亡陽人身津液有幾堪漏而無已耶故以附子入去芍藥加附子名桂枝附子湯桂枝湯中為固表回陽上兩治芍藥加附子名桂枝附子湯仲景治傷寒八九日風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而濡八九日再經之時既不傳經復不入裏者固風也不嘔不渴無裏證也浮風也虛則汗後之不足濡溼也其脈正與相應然後知風溼之邪在肌肉而不在筋節故以桂枝表之而不發熱為陽氣素虛故以附子逐溼兩相結合自不能留矣○此得之寒因此方即後條之甘草附子湯以薑棗易朮之變制也去朮者以寒本無汗不似風之自汗而溼多也用薑棗者以寒屬陰不如風陽之能食也然去彼取此雖少殊而其所以散風除溼則均爾○金匱之治風寒溼者多矣求當選用附子獨於傷寒風溼者三方均用附子其理安在蓋傷寒熱證也加以風溼寒氣勢必易熱乃至八九日之內久則易而身熱難知其人陽氣素虛矣陽虛者故仲景用桂枝解外復重附子以溫經使經絡肌肉無虛不剋則無邪矣再加芍藥生薑各一兩人參三兩名桂枝新加湯治

傷寒汗後身痛脈來沉遲

喻嘉言曰傷寒誤發汗後身反疼者乃陽氣暴虛此邪不能盡出所致

發汗新虛故於桂枝方中加芍藥以桂枝能解肌表之邪人參以補正仲景

意中明明桂枝湯不欲與參並用以桂枝能解肌表之邪人參以補正仲景

參反固肌表之邪然在誤汗後正氣虛微餘邪不解有不得

汗而陽虛邪乘恐陽孤無偶和以芍藥俾不至散亂也加芍

藥一倍名桂枝加芍藥湯

治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也

喻嘉言曰太陽病之誤下其變皆在胸膈以上此而腹滿也時痛則其邪已入陰位所以屬太陰也仍用桂枝解肌之法以升舉陽邪但倍芍藥以收太陰

去桂加茯苓白朮名桂枝去桂加茯苓白朮湯

治服桂枝湯或下之仍頭項強痛

翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利

喻嘉言曰服桂枝湯不解而證變設更下之則邪勢乘虛入裏益誤矣在表之風寒未除而在裏之水飲上逆故變五苓散

五苓散

成方切用

桂枝湯

茯苓白朮為主治去桂枝者以已誤不可復用也然桂枝雖

不可用其部下諸屬皆所以必需備併不用芍藥以收陰甘草

董素以益虛而和脾胃何以定誤汗誤下之變耶加厚朴杏

故更一主將而一軍用命甚矣仲景立方之神也

仁名桂枝加厚朴杏仁湯

治太陽病下之微喘表未解也

微喘邪猶在中上略為上逆故但疎利其氣而已均入桂枝湯者以表均未解也○厚朴杏仁為下氣散結之聖藥蓋誤下則引邪入裏既入不復外出利其下行散其熱結而喘自止矣然即非誤下而喘亦宜用此湯故仲景原文復申言此

湯也

去芍藥生薑加茯苓名茯苓桂枝甘草大棗湯

治汗後臍下悸欲作奔豚

喻嘉言曰汗本心之液發汗後腎邪欲上凌心故臍下先悸取用茯苓桂枝直趨腎界預伐其邪所謂上兵伐謀也

合麻黃湯名桂枝各半湯

仲景曰太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少不嘔渴清便一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈

微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也面色反有

熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃

各半湯

準繩云首節頗似小柴胡證故以不嘔清便自調證

司開闢原非溫經之謂後節面色反有熱色言表邪未盡故

宜各半湯不可與面合赤色此類而觀也方中行曰如瘧狀

謂有往來寒熱也發熱惡寒熱多寒少者風寒俱有而寒少

風多也不嘔渴清便便邪之往來未微表亦未及裏也二三度

發乃邪居淺近易及而頻數故脈亦微緩而為欲愈也脈微

而惡寒已下重以不得解者言而出其治也陰言後陽言前

色陽言外薄風寒持之不散所以小汗亦不能得出也而癢

也桂枝麻黃各半湯

湯

湯治服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形

如瘧日再發者汗出必解

喻嘉言曰此亦風多寒少之證服桂枝湯治風而遺其寒汗反大出

成方切用

桂枝湯

脈反洪大似乎風邪再發故重以桂枝湯探之若果風邪之

故立解矣若形如瘧日再發則邪本欲散又且淺而易散其

所以不聚者終為微寒所持

故略兼治寒而汗出必解也

二分合越婢一分名桂枝二越婢一湯

治太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽

也不可復發其汗

喻嘉言曰此亦風多寒少之證無陽二字不可更汗為戒然非汗則風寒終不解惟取桂枝之二以治

風越婢之一以治寒乃為合法越婢者石膏之辛涼也胃得

之乃熱化津生以倍芍藥加黃耆名桂枝加黃耆湯

金匱仲景云黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身

當暮盜汗出者此營氣也若汗出已反發熱者久久身必甲

錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身

潤潤即胸中痛又從腰以上汗出下無汗腰腹弛痛如有物

在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗桂

枝加黃耆湯主之此段原文極黃汗之發態而言見病始營

○徐忠可曰此段論黃汗中變態者而推言之不復黏著黃汗矣  
同而小異也謂黃汗病由水氣傷心故熱聚於胸若火不能  
下交於腎每兩脈自冷自者真氣不下非足下另受邪也假  
令發熱而足腫亦熱是風寒濕於肢節而痛故曰此屬濕節  
其汗出之期乃心火為水溼所傷不能生土中氣虛故心主  
血營分虛熱於是食已胃勞火動則汗當暮陰躁則汗故曰  
此營氣也乃又設言汗與發熱及身重相并之際以盡病態  
曰假若汗出已宜身涼今因內邪盛而反熱則皮膚之陰氣  
為汗所燥久久必甲錯更發熱不止營氣熱則生惡瘡假  
若身本重溼也汗出已輕更發熱不止營氣熱則生惡瘡假  
不能止其重則內氣愈虛內虛則肌肉凋動也胸中痛氣  
元氣不能及下則腰腹弛痛如脫也如有物在皮中狀不  
便捷也其劇而危者胸中之元氣傷則不能食周身的陰氣  
室則身疼氣壅則煩躁心火鬱冒而熱氣下流則溺瀦然皆  
成方切用桂枝湯

積漸所致其原總由水氣傷心而病日深故曰此為黃汗藥

用桂枝加黃耆者調和營衛而暢其氣則補正即所以驅邪

爾除甘草加黃耆三兩名桂枝五物湯金仲景曰血痹陰陽

俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃耆

桂枝五物湯主之徐忠可曰陰陽寸口人迎也總是大脈皆

緊謂細尋之有小緊者此病邪直入之形正如明堂篇謂病

法所謂下銳下向也然此由全體風溼血氣相搏抑其陽氣使

之不仁故以桂枝壯氣行陽芍藥和陰並重以和其營衛

協力驅風則病原拔而所入微邪亦為強弩之末矣立法之

緩不若黃耆之強有力加栝樓根名栝樓桂枝湯金仲景

曰太陽病其證備身體強凡然脈反沉遲此為瘧瘧瘧桂

枝湯主之徐忠可曰此瘧瘧瘧有汗不惡寒者主方太陽病

互辭凡然即頭項強之形狀脈反沉遲謂陽證得陰脈此

瘧瘧之異於正傷寒也其原由筋素失養而淫復扶其燥

之故以桂枝湯為風傷衛主治加栝樓根以清氣分之熱

大潤其太陽經既耗之液則經氣流通風邪自解淫氣自行

筋不燥而瘧瘧愈矣安時曰栝樓根不主項強凡其意以

肺熱不台移於腎也加於桂枝湯中則可以微熱榮筋調和

營衛矣凡字無鈞音加龍骨牡蠣名桂枝加龍骨牡蠣湯金

治男子失精女子夢交徐忠可曰陰虛之人大藥當助腎故

中上焦之營衛使陽能生陰而以安

腎寧心之龍骨牡蠣為補陰之主

麻黃湯仲景

治傷寒太陽證邪氣在表發熱頭痛身痛腰痛骨節痛項背

強惡寒惡風但有一毫頭痛無汗而喘脈浮而緊邪外束

故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先表

即足太陽寒水之經太陽為諸陽主氣乃一身綱維本經之

脈起目眦上膈下項循肩挾脊抵腰行於身後故維本經之

無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而始惡之然

成方切用麻黃湯

惡寒者見風必惡惡風者見寒亦惡此為邪在表也若邪入

於裏則無頭痛惡風寒之表證也原病式曰身熱惡寒熱在

表也熱在表而浸邪風正故病熱而反惡寒或言為寒在表

及熱在皮膚寒在骨髓者誤也凡人之傷風暑溼皆有汗唯

傷寒獨不汗出寒能滯血又表實也氣上逆故喘邪在表唯

脈浮傷寒脈緊而傷風脈緩者寒動急而風緩散也喻嘉言

曰冬傷寒春傷溫夏傷暑溼此四時正病也然夏秋亦有傷

寒冬春亦有傷暑傷溫傷暑乃四時之客病所謂異氣也冬春正

麻黃 去節 桂枝 二兩 杏仁 七十枚 甘草 炙 先煮麻黃數沸

去沫內諸藥煎熱服蓋取微汗中病即止不必盡劑無汗

再服 凡用麻黃去節湯略泡曬乾備用庶免大發冬月生

人云凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰以下周

當為脈浮緩下之脈沉急下之脈汗當急而下當緩三陰

汗當緩而下當急接汗有大汗解表微汗解肌之殊下有急

參利之別 麻黃中空辛溫氣薄肺家韻藥而走太陽能開腠散寒

所主寒從此 桂枝辛溫能引營分之邪達之肌表 桂入營血

衛和始 杏仁苦甘散寒而降氣甘草甘平發散而和中經曰

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛是已 喻嘉言曰麻黃發汗其

力最猛故以桂枝監之 成方切用 麻黃湯 卷六 表散門

甘草和之用杏仁潤下以止喘逆正如駁馬防其放逸爾李

時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝其有寒者精

微者津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗汗發熱

而惡寒風傷衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不

固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合

也證雖屬太陽然而邪鬱於皮毛而汗出不行故無汗發熱

蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分

之邪達之肌表佐以杏仁潤肺而利氣汗後無大熱而喘者

加石膏活人書夏至後加石膏知母是皆泄肺火之藥是麻

黃湯雖太陽發汗重劑實散肺金火鬱之藥肺理不密則津

液外泄而肺氣虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪

以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥瀉木而固脾使以薑棗

行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣

也活人書加黃芩為陽明湯以泄肺熱也是桂枝湯雖太陽

不味故一稱為傷寒其類則殊施治不得相混仲景之書專  
為傷寒之傷寒誤不無為不傷寒之傷寒誤也今人或以傷  
寒法治溫病則熱證居多三陰傷寒證十居七八若溫病  
但一法於熱病後人誤為通治遂疑諸熱劑不敢用是未悟仲  
景立麻黃湯桂枝湯之有所主有其時矣苟知非溫病而  
劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發於冬寒之時矣邪在表閉  
其脈浮非辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫  
病熱病發於春夏之時熱之此麻黃桂枝等劑所以必用也  
若寒者酸之劑不能散之時熱之此麻黃桂枝等劑所以必  
後人所處冰解散大黃湯千金湯防風通聖等所以不可用也  
者衣衣氣受邪也後人所處之傷寒有惡風惡寒之證者風寒  
之證故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病溫病如  
此則知熱病亦如此而不渴惡寒者非溫熱病矣或有因  
新中風寒亦見惡風惡寒之證者蓋因表虛熱達於表而傷  
表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒爾非傷風惡寒傷寒惡  
寒也溫病熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋鬱熱自內達  
外也每見世人治溫熱病誤攻其裏亦無大害誤發其表變不  
也 成方切用 麻黃湯 卷六 表散門

九 可謂此足明其熱之自內達外矣間有誤攻致害者乃春夏  
暴寒所中之疫證邪純在表未入於裏不可與溫病熱病同  
論夫秋冬傷寒真傷寒也春夏傷寒寒熱也與溫病熱病同  
是兩途豈可同治况傷寒直中陰經與太陽經傷寒不同其  
即傳陰經為寒證而當溫者又與溫病熱病不同其可混  
治乎。不惡寒則病非外來溫者又與溫病熱病不同其可混  
後至秋分前不傳手非窮理之言也草窗劉子指足經所屬  
日傷寒傳足不傳手非窮理之言也草窗劉子指足經所屬  
水土木水遇寒而潤冰土遇寒而坼裂木遇寒而凋枯故寒  
喜傷之手經所屬金與火金遇寒而愈堅火遇寒而愈燥不  
輾故寒氣不能傷味者奇之奇人身營衛經絡上下截斷不  
聯結失血氣周流手足之旨矣夫寒邪襲人必先受皮毛  
灼熱鼻息粗煩躁主皮毛之毛足手太陰肺辛金先受皮毛  
有傷寒自皮毛入之語先師有桂枝麻黃之設雖太陽表之  
表之劑然汗法舍皮毛則何有解更衣倍常閉結清泄手陽  
明大腸庚金受病矣先師有麻黃湯之設雖太陽表之陽  
裏之裏之劑然汗法舍皮毛則何有解更衣倍常閉結清泄手  
堅信乎陽氣極動血上下頭手足少陰心丁火病矣先師有  
心數法亢極動血上下頭手足少陰心丁火病矣先師有  
病矣治有三黃柴芩散條小使瘧脫手太陽小陽病矣



發其汗則津液越出大便難表虛裏實必語汗家重發汗必恍惚心亂汗者心之液心亡血液故亂腹中上下左右有動氣者不可發汗

**傷寒傷風辨** 傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒無汗傷風手足背皆溫傷

**陰陽表裏辨** 陽證之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴手足溫陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

陽證之裏發熱惡寒口渴便澀手足厥逆

**大青龍湯**

仲景曰太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁

者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之而厥

逆筋惕肉瞤此為逆也以真武湯救之

得汗則解太陽無汗因有煩躁一證兼見則非大青龍湯不

解也究竟本方原於無汗者取微似汗若有汗者之煩躁全

非鬱蒸之比其不微汗解是明加以惡風脈微弱則是少陰

亡陽之證若脈浮弱汗出惡風而不煩躁即是太陽中風之

證皆與此湯不相涉也誤服此湯寧不致厥逆陽明而速其

陽之亡耶仲景不能必用法者盡如其法更立真武一湯以

救其誤學者能識其鄭重之意即百用不致一誤矣又曰誤

服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤者既方亡陽之逆矣更推重真

**成方切用**

明自汗少陽多嘔皆外感證也○凡外感多得之風寒暑溼

邪始於太陽若內傷多得之飲食起居七情病生於太陰今

之患傷寒者兼

內傷者居多也

表散門

卷六

**成方切用**

四字括寒而言此傷寒二字括風而言風寒之脈證錯見則

桂枝與麻黃二湯不可用不待言矣仲景原文但重有輕

時六字早已擘明言但身重而無少陰之欲寐其為寒因可

審現乍有輕時不似少陰之晝夜俱重又兼風因可審所以

欲寐則內顧少陰且不遑矣敢發之乎

**麻黃六甘草** 桂枝二 杏仁 石膏 雞子 大棗

仲景製方之意本是桂枝麻黃二湯合用易芍藥以石膏者

所以勝寒鬱之內熱且以助青龍之勢而與雲雨也然去芍

藥之酸收增石膏之辛散外攻之力猛而無制在寒多風少

及風寒兩停之證則用當而通神其有風無寒之證及微弱

之脈若不知辨而誤用之有厥逆惕瞤而亡陽兩



小青龍湯

仲景曰傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或渴或利

或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

發熱惡寒頭痛身痛屬太陽表證仲景書中凡有裏證兼表證者則以表不解三

字該之內有水飲則水寒相搏水滯胃中故乾嘔而噎水寒射肺故欬而喘水停則氣不化津不生故渴水漬腸間故下利水蓄下焦故小便不利而少腹滿又曰傷寒

心下水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解

也小青龍湯主之

喻嘉言曰風寒水飲上逆津液不下行解之微也乃用小青龍湯大

率以輕劑助其欲解之勢爾

麻黃去桂枝芍藥酒炒細辛甘草炙乾薑兩半夏五味

子升水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升

成方切用小青龍湯

去滓溫服一升若微利者去麻黃加薤花如雞子大熬令

赤色麻黃發汗利則不宜利水渴者去半夏加栝樓根三

兩半夏燥津液栝樓根散熱生津噎者去麻黃加附子一枚炮噎水寒塞

子利氣而小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩茯苓能通

微而利水道喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖喘水氣射肺而

杏仁潤肺以下氣也

周禹載曰素常有飲之人一感外邪傷皮毛蔽肺氣停於心

下而上下之氣不利焉喘滿欬嘔相因而見於是以五味收

金乾薑散陰半夏祛飲而尤妙在用細辛為少陰經表藥且

能走水人之水氣大抵發源於腎故少腹滿小便不利因而

作喘安知少陰不為遺害乃以細辛搜豁伏邪走而不留而

後已上主散之藥皆靈動也

徐忠可註曰溢飲者水已流行歸四肢以不汗而致身體大

重蓋表為寒氣所侵而水已流行歸四肢以不汗而致身體大

相雜猶之風寒兩傷內有水氣故以大青龍小青龙主之然

大青龍合桂枝而去芍藥加石膏則水氣不甚而表熱者宜之

傷寒而加五味乾薑半夏細辛雖表散而實欲其寒飲之下

出也○觀仲景論太陽中喝謂身熱疼重而脈微弱乃夏月

傷冷水水行皮中所致一物瓜蒂湯主之然曰發其汗則中

喝且勝理稍固不若夏月之易汗乎彼在夏月勝理本疎又

中喝在先故主吐然則夏月之易汗乎彼在夏月勝理本疎又

宜二湯可知也金匱云先渴後嘔者水停心下小青龙湯主

之不治渴而嘔治主水去而渴自止矣金匱又云欬逆倚息

不得臥小青龙湯主之徐忠可註曰此即支飲的證也不

然而不得臥則勢亦孔亟故暫以桂枝治表蓋半治飲爾

成方切用小青龙湯

加石膏名小青龙加石膏湯金匱治肺脹欬而上氣煩躁而喘

脈浮者心下水脫金匱曰欬而上氣此為肺脹其氣喘目如

同是欬喘上氣脈浮然則條目如脫婢加半夏湯主之此條

故以麻黃甘草為主而加石膏以清寒變之熱此獨加煩躁

傷寒論中寒得風脈而煩躁者主以小青龙湯

故亦主小青龙然壅塞則氣必熱故仍加石膏爾

葛根湯

治太陽病項背強几几無汗惡風者

形客病人之頸項俱病者俯仰不能自如之貌蓋太陽之脈

下頸俠脊太陽之經其別者俠脊而上項陽明之脈其支者從

大迎下人迎循喉嚨入缺盆陽明之經其直者上腹而布至

缺盆而結上頸上而合於太陽故邪氣未罷汗轉出不已而惡風猶

明也則頸項病故曰几几也太陽未罷汗轉出不已而惡風猶

在也引以太陽尚在故用桂枝為主方以初有陽明故加葛根

枝湯中加麻黃君葛根者何意非有喘無取乎杏仁不去麻

夫  
卷六

枚璧

成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也此以中風表實故加

仲景以有汗無汗定風傷寒傷之別有汗爲風傷用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗

卷六

主果之水

葛根解肌湯 治發熱惡寒頭痛項強傷寒溫病

仲景



枝加附子法並無麻黃加附子法太陽無脈微惡寒之證不

力若錦紋爲斑

升麻三錢 葛根 芍藥二錢 甘草一錢 加薑煎 頭痛加川芎

白芷川芎爲通陰陽血氣之使白芷專治陽明頭痛 身痛背強加羌活防風此兼太陽

故兼 熱不退春加柴胡黃芩防風少陽司令柴 夏加黃芩

石膏清降火熱 頭面腫加防風荆芥連翹白芷川芎牛蒡石膏

升散 咽痛加桔梗清肺利咽 斑出不透加紫草茸涼血潤腸用茸

者取其初得暢 脈弱加人參 胃虛食少加白朮 腹痛

倍芍藥和之

陽明多氣多血寒邪傷人則血氣爲之壅滯辛能達表輕可

去實故以升葛辛輕之品發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛

故用芍藥斂陰和血又用甘草調其衛氣也雲岐子曰葛根爲君升麻爲佐

成方切用 升麻葛根湯

甘草芍藥 升麻甘草升陽解毒故又治時疫感時疫者必先以安其中

胃傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也斑疹已出

者勿服恐重虛其表也麻痘已見紅點則不可服陽明爲表

出之際宜服此湯以透其毒不可便服寒劑以攻其熱又不

可發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀角青黛大

青知母石膏黃芩黃藥人參之類若此勢稍退潮熱

諸證不大便可用大柴胡加芒硝調胃承氣下之

柴葛解肌湯 節菴製此以代葛根湯

治太陽陽明合病頭目眼眶痛鼻乾不眠惡寒無汗脈微洪

太陽脈起目內眦上額交巔陽明脈上至額顙絡於目風寒

上干故頭痛目痛眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾不眠屬陽

明脈洪將爲熱也節菴曰此陽明在經之邪若正腑病另有治法

加薑棗石膏一錢煎 無汗惡寒甚者去黃芩

寒邪在經故以羌柴芷葛散之寒將爲熱故以黃芩石膏桔

梗清之三藥並泄肺熱 以芍藥甘草和之也

柴胡升麻湯 局方

治少陽陽明合病傷風壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛

欬嗽唾涕稠黏及陽氣鬱遏元氣下陷時行瘟疫劉宗厚曰

仲景與傷寒同論雖有麻黃桂枝之分至於傳變之後亦未

嘗悉分之也諸家皆與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇

別立傷風一方在四淫之首且依傷寒以太陽爲始分註六

經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發表然受病之源

亦有不同若表虛受風專用發表之藥必致汗多亡陽之譌

若內挾痰熱而受風亦宜內外交治不可顯於解表也或曰

此云表虛而傷寒中風表虛同歟子曰不同也彼以太陽中

風而於有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表

成方切用 柴葛解肌湯 柴胡升麻湯 三 表散門

也此云表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡 前胡 黃芩 升麻 葛根 桑皮 荆芥 赤芍

石膏 加薑三片豉廿粒

陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解在經 柴胡平少

陽之熱升葛散陽明之邪三藥皆能升提清陽 前胡消痰下氣而解風

寒桑皮瀉肺利溼而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤芍調

營血而散肝邪黃芩清火於中上二焦石膏瀉熱於肺胃之

部風壅爲熱故以石膏辛寒爲君 加薑豉者取其辛散而升發也

九味羌活湯 即羌活湯和湯張元素

治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛脊強嘔吐口渴太陽

無汗及感冒四時不正之氣疫癘諸病有物有聲曰嘔氣逆而無物無聲曰吐胃寒則吐邪熱在表則不渴傳裏則渴四時不正之氣謂天地間穢惡之氣及病氣死氣流行傳染也

羌活 防風 蒼朮錢 細辛五 川芎 白芷 生地 黃芩

甘草錢 加生薑葱白 如風證自汗者去蒼朮加耆朮

發表而即實表也 胸滿去地黃加枳殼桔梗 喘加杏仁 歐寇者隨開門也

汗下兼行加大黃

此足太陽例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者

屬金於人爲義故能匡正黜邪羌防蒼細芎芷皆辛藥也羌

活入足太陽爲撥亂反正之主藥除關節痛甚 蒼朮入足

太陰辟惡而去溼能除溼下氣及安太陽使 邪氣不致傳足太陰脾 白芷入足陽明

成方切用九味羌活湯 卷六 表散門

治頭痛在額芎藭入足厥陰治頭痛在腦細辛入足少陰治

本經頭痛皆能驅風散寒行氣活血而又加黃芩入手太陰

以泄氣中之熱生地入手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生 地寒滯二味

苟用於發熱之後則當 若初發熱猶當減也 防風爲風藥卒徒隨所引而無不至

治一身盡痛爲使甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治

通四時用者當隨證加減不可執一張元素曰有汗不得用 麻黃無汗不得用桂枝

若未瘥則其變不可言故立此方使不犯 三陽禁忌但陰虛氣弱之人在所禁爾

十神湯局方

治時氣瘟疫癘氣初感頭痛發熱惡寒無汗欬嗽鼻塞聲重

表實而氣不利也○凡患時疫 而欬嗽者邪欲外出而易愈也

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草 陳皮

香附 赤芍 加薑葱白

治傷寒須分六經見證用藥此則雖有發熱惡寒頭痛鼻塞

等證然屬時氣瘟疫與傷寒不同故總以疏表辛香利氣之

藥主之而又加芍藥甘草以和之吳綬曰此湯用升麻葛根 正傷寒之藥治太陽傷寒發熱用之 則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

神朮散海藏

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者內傷冷飲則寒溼停於中 經曰其寒飲食入胃則肺

寒肺寒則外內合邪是 也寒能滯血故無汗 亦治剛瘧先傷風後傷溼及太陽過 汗溼家過汗產後血虛破

成方切用十神湯 神朮散 卷六 表散門

傷風皆發瘧其證頭搖口噤手足搐搦項背反張無汗爲剛 瘧有汗爲柔瘧亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化 痰疎風養血亦有用大氣者凡陽症不厥逆其厥

逆者皆陰瘧也宜附子湯附子防風散桂心白朮湯 蒼朮製 防風二甘草 兩 加生薑葱白 如太陽證發熱

惡寒脈浮緊者加羌活 浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩

浮緊帶弦數者是兼少陽加柴胡 婦人加當歸

防風辛溫升浮除風勝溼爲太陽主藥蒼朮甘溫辛烈散寒

發汗辟惡升陽能升胃 中陽氣 加甘草者發中有緩也

除蒼朮加白朮二兩薑三片不用葱名白朮湯海藏 治前證有 汗者 蒼朮發汗 亦治柔瘧 風而兼溼故多汗○按神朮白朮 嘉言曰此海藏得意之方蓋不欲無識者輕以麻黃 桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

之多月紉夏也

者諸傷寒無補法得補而燥燄卽痘疹癰痂以及中風中痰中寒中暑癰疽產後初時藥不敢用而虛人之遇重病可

生之機悉置不理矣古方表汗用五積散參蘇飲敗毒散和解用小柴胡白虎湯竹葉石膏湯等方皆用人參領內邪外和之熱亦不退大熱呻吟津液灼盡身如枯柴醫者技窮正謂元氣已瀕故藥不應手爾儘元氣未瀕先用參三五七分益氣藥入藥邪何至汗印不應邪東垣治內傷外感用補從仲景至今明賢方書無不用參何為今日醫家單除不用全失相傳宗旨使體虛之人百無一活會不悟其害之也蓋不當用參而殺人者是與者北歸桂附等藥同行溫補之誤不謂與羌獨柴前芎半枳桔等藥同行汗和之法所致也安得視等視鴉耶嘉靖己未江淮大疫用敗毒散倍人參已壬午大饑大疫道殣相望汗和藥中惟加入參者多活饑饉兵荒之餘飲食起居不節致患時氣者宜用此法

**加陳廩米名倉廩散治噤口痢** 乃熱毒冲心食入即吐單陳廩米煎湯治痢後大渴飲水

**止加大黃芒硝名硝黃敗毒散治熱毒壅積加黃芩名敗毒**

**成方切用** 川芎茶調散 表散門 卷六

**加黃芩湯治溫病不惡寒而渴加連翹金銀花名連翹敗毒**

**散治瘡毒如有風熱加荆芥防風名荆防敗毒散亦治腸風**

**下鮮血** 血鮮者為腸風隨感而見也 血瘀者為腦毒積久而發也

**川芎茶調散** 局方

**治諸風上攻正偏頭痛惡風有汗憎寒壯熱鼻塞痰盛頭運**

目眩正偏頭痛者風中於腦作止無時也中風故有汗惡風泄越氣併於鼻故鼻塞壯熱風寒傷於皮毛腠理密緻不得痰盛痰熱上攻故頭運目眩

**薄荷** 八錢 **荊芥** 四錢 **甘草** 炙 **羌活** 白芷 二錢 **防風** 細辛 錢

**錢 每三錢茶調服一方加菊花** 一錢 **蠶蠶** 三錢 **菊花茶調散**

**治頭目風熱** 菊花清熱明目 蠶蠶消風化痰

**羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川芎治少陽頭痛細辛**

**治少陰頭痛防風為風藥卒徒皆能解表散寒以風熱在上**

**宜於升散也頭痛必用風藥者以巔頂之上惟風可到也薄**

**荷荊芥並能消散風熱清利頭目故以為君** 辛香輕清能入風熱肝風散同諸藥上行以升清陽而散鬱火清陽不升則頭目清明

**加甘草者以緩中也用茶調者茶能上清頭目也** 凡頭痛痛以升散之也若服辛散藥反甚者則宜用酸溫收而降之

**再造散** 節菴

**治陽虛不能作汗** 陶節菴曰治頭痛項強發熱惡寒無汗服發汗藥一二劑汗不出者為陽虛不能作汗名曰無陽諸痛醫不識不論時令遂用麻黃重藥劫取其汗誤人多矣。此方必脈證中有虛寒之實據方可用也

**人參 黃耆 桂枝 甘草 附子 細辛 羌活 防風**

**川芎 煨薑 棗二枚加炒芍藥一撮煎**

**經曰陽之汗以天地之雨名之汗之無汗邪盛而真陽虛也**

**故以參耆甘草薑桂附子大補其陽而以羌防芎細發其表**

**邪加芍藥者散中有收且能滋調營衛為諸陽藥取汗之助**

**也** 節菴曰人第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥中益氣加表藥即助表藥而解散也東垣丹溪治虛人感冒多用補藥即同此意

**麻桂飲** 景岳

**治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能散者非此**

不可無論諸經四季凡有是證即宜是藥勿謂夏月不可用  
也不必厚蓋但取津津微汗透出為度此實麻黃桂枝之變

方而其神效則大有同於二方者不可不為細察

官桂一二錢 當歸三四錢 炙甘草一二錢 麻黃二三錢 陳皮隨宜用 水

一盞半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服

若陰氣不足者加熟地三五錢 若元氣大虛陰邪難解者

當以大溫中飲更迭為用

大溫中飲 景岳

凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣身雖熾熱

時猶畏寒即在夏月亦欲衣被蓋或喜熱湯或兼嘔惡泄瀉

成方切用

麻桂飲 大溫中飲

表散門

但六脈無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正

不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深必至不救溫中自

可散寒即此方也服後畏寒悉除覺有躁熱乃陽回作汗佳

兆不可疑之畏之此外凡以素稟薄弱之輩或感陰邪寒疫

發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於初感時即

速用此飲連進二三服無不隨藥隨愈真神劑也此方宜與

理陰煎麻桂飲相參用

熟地三五錢 於白朮三五錢 當歸三五錢 如泄瀉者人參二三錢

兩或甘草錢 麻黃三錢 柴胡一二錢 乾薑炒熱一二錢 水

一二盞煎八分去浮沫溫服或略蓋取微汗 如氣虛加黃耆

二三錢 如寒甚陽虛者加附子一二錢 如肚腹泄瀉宜  
少減柴胡加防風細辛亦可

此方惟氣血兩虛而重感寒邪者宜之非正傷寒治法

大羌活湯 潔古

治兩感傷寒 內經曰傷寒一日巨陽受之太陽經脈循腰脊

主肉其脈使鼻絳於目故身熱目疼而鼻乾不得臥三日少

陽受之少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脅痛而耳鳴四日

太陰受之太陰脈布胃中絡於咽故腹滿而嘔乾五日少陰

受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥

陰受之厥陰脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮兩感者謂一

日則太陽與少陰俱病有身熱語而頭項強而又口乾煩渴也二日

則陽明與太陰俱病有身熱語而腹滿不欲食也三日

則少陽與厥陰俱病有身熱語而囊縮逆也此陰陽

表裏俱病故汗之則有裏證欲下之則有表證故仲景不立

治法吳鶴皋曰易老製此方意謂傳經者皆為陽邪一於升

陽散熱滋養陰臟則感

之淺者尚或可平也

羌活 獨活 防風 細辛 防己 黃芩 黃連 蒼朮

甘草 白朮 知母 川芎 生地 每服五錢熱飲

此陰陽兩解之藥也氣薄則發泄故用羌獨蒼防芎細祛風

發表升散傳經之邪寒能勝熱故用芩連知母生地防己清

熱利溼滋培受傷之陰又用白朮甘草以固中州而和表裏

之氣升不至峻寒不至凝間能回九死於一生也

云兩感病俱作治有先後如表急當先救裏裏急當先救裏

湯三日少陽厥陰危甚大承氣加川芎柴胡救之劉宗厚曰  
傷有兼風兼溼不同表裏俱實俱虛之異大抵俱虛為多脈  
從陰者可治  
歸葛飲 景岳

治陽明溫暑時證大煩大渴津液枯涸陰虛不能作汗等證  
當歸 三五錢 乾葛 二三錢 水二盞煎一盞以冷水浸涼徐徐服  
之得汗即解

舉斑湯

治瘟疫斑毒內陷 吳又可曰瘟疫邪留血分裏氣壅閉不下  
漸出更不可下設有下證自少與承氣緩服僅大下則元氣  
不振斑毒內陷則危宜此裏舉斑湯如下後斑毒隱伏反見  
參三錢得補發出者不死

成方切用

歸葛飲 舉斑湯 犀角消毒湯 柴葛煎 手 表散門 卷六

白芍 當歸 一升 麻 五錢 柴胡 白芷 七錢 穿山甲 二錢 水煎

犀角消毒湯

治瘟疫毒氣發斑痛痒

牛蒡子 炒 防風 二錢 荆芥 一錢 甘草 八分 犀角 磨 每服三錢水煎

入犀角汁服

柴葛煎 景岳

治瘟疫痘疹表裏俱熱能散毒養陰  
方見 嬰孩門疏邪飲附方

成方切用卷七目錄

涌吐門 正方八 附方二十六

瓜蒂散

獨聖散 三聖散

又三聖散

參蘆散

梔子豉湯

梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯 梔子厚朴湯

梔子大黃湯 枳實梔子豉湯

成方切用 目錄

豉薤湯 犀角大青湯

吐法

又一法

稀涎散

常山散

乾霍亂吐方

燒鹽探吐法 又二法

搐鼻法

搐鼻如聖散

當歸湯



成方切用卷七

涌吐門

邪在表宜汗在上焦宜吐在中下宜下此汗吐下三法也  
今人惟知汗下有吐法絕不用使遇當吐之證而不行  
涌越則邪氣壅結而不散矣經曰其高者因而越之又曰  
在上者涌之丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗  
法古方多有之惟以吐發汗者世罕  
知之故子容曰吐法兼汗其以此夫  
瓜蒂散 仲景

治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂煩亂人事昏沉五癰痰壅食填

太陰欲吐不出亦治諸黃急黃

卒然發黃心滿氣喘命在須臾曰急黃或服此散或搗鼻

或加仲景云病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞

硬氣上衝咽喉不得息此為胸中有寒也當吐之宜瓜蒂散

成方切用

瓜蒂散

涌吐門

諸亡血虛家不可與瓜蒂散

喻嘉言曰寒者痰也痰飲內動身必有汗加以發熱惡寒全似

中風但頭不痛項不强此非外入之風乃內

蘊之痰室塞胸間宜用瓜蒂散以湧出之也又曰病人手足

厥冷脈乍緊者邪結在胸中心下滿而煩饑不能食者病在

胸中當須吐之宜瓜蒂散

手足厥冷與厥陰之熱深厥深相

矣可見痰結在胸故滿煩而

不能食亦宜瓜蒂散為吐法也

甜瓜蒂炒赤小豆 等分各別搗篩為散已合治之取一錢

七以香豉一合熱湯七合煮稀糜取汁和散溫頓服之快吐

乃止吐時須合閉目緊束肚皮吐不止者葱白湯解之良久

不出者含砂糖一塊即吐諸亡血虛家老人產婦挾虛脈微

者俱不可服

非尺脈絕者不宜便服此恐損胃氣若此胸中

室塞悶亂以物探之得吐即止若探不出方以

此湯吐之

胸中痰食與虛煩者不同越以瓜蒂之苦涌以赤小豆之酸

吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣

可去淫桑白皮赤小豆之屬是也赤豆瓜蒂並能行水淫痰

涎頭痛胸滿寒熱脈緊不大者宜此散吐之或問何謂木

鬱曰厥陰少陽屬木於令為春乃人身生發之氣也食者陰

物也脾胃者坤土也飲食而寒太陰則土盛而反侮木生氣

不得上升而木鬱矣吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣

參蘆 除赤豆名獨聖散 仲景曰太陽中暈身熱疼重而脈微弱

此以夏月傷冷水水行皮中所致也 劉宏璧曰仲景於此病

之水且變散為湯并無賴於赤小豆與漿水者蓋以一物驅

逐其水則陽氣行而身重疼熱立解矣此則內因也由是推

之如傷露露之從乎上者可內鼻而解地溼之從乎下者可

利小便而解上溼下流與下溼上甚為熱者可一汗而解也

除赤豆加防風黎蘆名三聖散 和除赤豆加鬱金韭汁搗翎

探吐亦名三聖散治中風風癰痰厥頭痛除赤豆加全蠍五

分吐風痰加淡豉治傷寒煩悶 瓜蒂梔鼓皆吐劑要知瓜蒂

熱如未經汗下邪鬱胸膈而痞滿者謂之實宜瓜蒂散此重

劑也已經汗下邪乘虛客胸中而懊憹者宜梔鼓湯此輕

劑也○丹溪用瓜蒂梔子苦參黎蘆等累吐許白

雲不透後以附子尖和漿水與之始得大吐也

參蘆散 治虛弱人痰涎壅盛 人參蘆 為末水調一二錢或加竹瀝

探吐之 如不探亦 未必吐也 痰和服後以物微



病人虛羸故以參蘆代黎蘆瓜蒂宣猶帶補不致耗傷元氣也  
丹溪曰人參補陽中之陰蘆反瀉太陰之陽亦猶虛黃苗能發汗根能上汗也  
梔子豉湯 仲景

治傷寒汗吐下後虛煩不眠劇者反覆頓倒心中懊憹及大下後身熱不退心下結痛或痰在膈中  
汗吐下後正氣不足故煩熱懊憹煩熱者熱而煩擾懊憹者懊惱憹悶也書動爲陽夜臥主陰陽熱未散陰氣未復故不得眠身熱去而心結痛者熱散漫爲虛煩熱仍在表故當越之

梔子 十四 淡豉 四 服令微吐

煩爲熱勝梔子苦寒色赤入心故以爲君淡豉苦能泄熱腐能勝焦  
腎氣爲腐心氣爲焦助梔子以吐虛煩故以爲臣酸

成方切用 梔子豉湯

三 卷七 通吐門

苦涌泄爲陰也此吐無形之虛煩若膈有實邪當用瓜蒂散  
海藏曰煩氣也躁血也煩出於肺躁出於腎故用梔子治肺煩香豉治腎躁亦用作吐藥以邪在上焦吐之則邪散經所謂在上者因而越之也或問煩躁皆心爲之何謂煩出於肺躁出於腎曰熱則煩熱則躁煩爲陽躁爲陰大抵皆心火爲病火旺則金燥而水虧性火獨在故肺腎合而爲煩躁○仲景曰病人舊微瀉者不可與服喻嘉言曰舊微瀉則大腑易動服此方不能上湧反爲下泄矣錄內經有先泄而後生他病者治其本必先調之後乃治其他病故此示戒又曰諸梔豉一法證顯實煩虛煩之不同要皆可用以湧其餘熱乃因汗吐下後胸中陽氣不足故虛之處便是容邪之處正宜仲景原有之甘草湯一法寧敢妄湧以犯虛虛邪不盡則宜加甘草名梔子甘草豉湯  
治前證少氣者劉宏璧曰少氣中人皆知之然既少氣謂是後中虛雖邪氣未退敢用梔豉以湧吐之乎乃知此證之少氣緣外邪內陷洵是熱傷元氣而不與但內弱者同此加生薑名梔子生薑豉湯  
治前

證兼嘔者  
辛以除淡豉加乾薑名梔子乾薑湯  
仲景治傷寒醫

以丸藥大下之身熱不去微煩者  
喻嘉言曰丸藥大下傷胃中散邪之法也除淡豉加厚朴枳實名梔子厚朴湯  
景仲

治傷寒下後心煩腹滿臥起不安者  
喻嘉言曰滿而不煩即裏證已具之實滿煩而不滿即表證未罷之虛煩合而有之且臥起不安用是邪聚胸表腹裏之間無可奈何之象故取梔子以快湧其邪而洽厚朴枳實以泄腹中之加枳實大黃名梔子大黃湯  
仲景治酒

疸發黃心中懊憹或熱痛亦治傷寒食復  
輕則導重乃攻下加枳實名枳實梔子豉湯  
景仲

復加薤白名薤薤湯  
張文治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱證  
梔豉苦寒能升能散薤白辛溫能開胸痺及大腸氣滯

成方切用 吐法 稀涎散

犀角大青湯治斑毒熱甚頭痛

吐法

此方可代瓜蒂三聖之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不通等證皆可以此代之

蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃即當吐即有吐不出者亦從下行矣

一法以蘿蔔子爲末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

稀涎散

治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先通其關令微吐稀涎續進他藥  
不可令大吐後不可大投藥餌緩緩調治過恐傷人

亦治喉痺不能進食

阜角四挺去白礬一

為末溫水調下五分或加藜蘆吐

風痰善通  
頂令人嚏

吳鶴皇曰清陽在上濁陰在下天冠地履無暴仆也若濁邪

逆上則清陽失位而倒置矣故令人暴仆所以痰涎壅塞者

風盛氣湧使然也經曰病發於不足標而本之先治其標後

治其本故不與疎風補血而先吐其痰涎白礬酸苦能涌泄

鹹能蠱頑痰故以為君阜角辛能通竅鹹能去垢專制風木

故以為使固奪門之兵也師曰凡吐中風之痰使咽喉疎通

能進湯藥便止若盡攻其痰則無液以養筋令人攣急偏枯

此其禁也丹溪曰胃氣亦賴痰以養不  
可盡攻攻盡則虛而愈劇

戊方切用

乾霍亂吐方

五

涌吐門  
卷七

張子和加藜蘆常山甘草名常山散吐瘧疾甘草台常  
山必吐

乾霍亂吐方 三因

治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹中大痛者霍亂擲霍  
有所感內有所傷陰陽乖隔邪正交爭故上吐下瀉而中絞

痛也邪在上焦則吐在下焦則瀉在中焦則吐瀉交作此淫

霍亂證輕易治若不能吐瀉邪不得出壅遏正氣關格陰

陽其死甚速俗名攪腸沙切勿與穀食即米飲下咽亦死

燒鹽 熱童便 三飲而三吐之

吐瀉不得邪結中焦鹹能軟堅可破頑痰宿食炒之則苦故

能涌吐童便本人身下降之氣引火下行乃其舊路味又鹹

寒故降火甚速此由脾上鬱極而不得發以  
致火熱內擾陰陽不交而然鹽涌於上溺泄

於下則中通矣方極簡易而有回生之功不可忽視

便非獨用以降陰之不通也陰既

不通血亦不行兼用行血藥也

單用燒鹽熟水調飲以指探吐名燒鹽探吐法治傷食痛連

胸膈痞悶不通手足逆冷尺脈全無食積太陰抑遏膽肝之  
氣不得上升兩脅相搏

故痛連胸膈腸氣不舒故手足逆冷下焦隔絕故尺脈不至

則胃下而腹堅能破積聚又龍宜涌使不化之食從上而出

當吐不吐者死或曰食填太陰胸中痞亂兩寸脈當用事今

反尺脈不見其理安在曰獨陽不生獨陰不長天之用在於

地則萬物生其理安在曰獨陽不生獨陰不長天之用在於

五臟主有形之物物者陰也陰者水也食塞於上絕五臟

毒宿食腹痛冷氣鬼氣

成方切用

六

涌吐門  
卷七

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入清水煮至將滾未滾

之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之每用半碗漸次增飲自

然發吐以去病為度而止

又法凡諸藥皆可取吐但隨證作湯劑探而吐之無不可也

搐鼻法

淫家鼻塞頭疼或頭額兩太陽痛宜行此法

苦瓜蒂不拘多少為末令病人噙水一口將此藥一字吹入

鼻中出黃水愈凡云一字者二分半  
也取一文四字之義

淫家頭疼是濁邪干清陽之分也鼻者氣竅上通於腦下屬

於肺濁邪干之故清竅不利瓜蒂苦而善湧瀉鼻竅受之則

能出濁邪而瀉溼熱經曰客者除之此之謂也

搐鼻如聖散

治纏喉急痺牙關緊閉

皁角

去皮

白礬

雄黃

藜蘆

爲末搐鼻

當歸湯

吐虛痰

體弱痰乾而吐不出者此方神効雖吐而絕不傷氣血也

當歸

錢五

甘草頭

錢一

參蘆

錢一

逆流水煎

成方切用

搐鼻如聖散

當歸湯

七

涌吐門  
卷七

成方切用卷八目錄

攻下門 正方二十四 附方一十八

大承氣湯

三一承氣湯

六一順氣湯

黃龍湯

麻仁丸

小承氣湯

三化湯

厚朴大黃湯

調胃承氣湯

當歸承氣湯

大黃甘草湯

破棺丹

成方切用

目錄

一

攻下門  
卷八

大陷胸湯

白散

小陷胸湯

大陷胸丸

十棗湯

三化神佑丸

小胃丹

赤金豆

三物備急丸

備急散

太平丸

硝砂丸

敦阜丸

木香瀝榔丸

木香導氣丸

百順丸

枳實導滯丸

倒倉法

霞天膏

蜜煎導法

豬膽導法

成方切用

鹽合草烏導法

大螺着小腹法

罌傷寒結胸法

附子瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

抵當湯

桃仁承氣湯

感應丸

久痛丸

天台烏藥散

目錄

二

攻下門  
卷八

醫董導法

竹葉薰法

蘿蔔菜薰法

成方切用

目錄

三

攻下門  
卷八

成方切用卷八

攻下門

凡攻氣者攻其聚聚可散也攻血者攻其瘀瘀可通也攻積者攻其堅在臟者可破可行在經者可鉞可灸也攻者攻其急實者攻其虛宜解標多虛者只宜求本也但諸病之實有微甚用攻之法分輕重虛實者攻之未及可以再加微實者攻之太過每以致害所當慎也凡病在陽者不可攻陰病在胸者不可攻腹若此者病必乘虛內陷所謂引賊入門也病在陰者勿攻其陽病在裏者勿攻其表若此者病必因誤而甚所謂自散諸散也大都治宜用攻必其病邪之甚者也若實邪既甚自與攻藥相宜不必難之補劑蓋實不嫌攻若但略加甘滯使相牽制虛不嫌補若但略加消耗便覺相妨所以純虛者最不可喜清熱實者最不可喜暖然實而誤補不過增病病增者可解虛而誤攻必先脫元元脫者無治矣是皆攻法之要也其或虛中有實實中有虛此又當酌其權宜不在急宜攻急宜補之例雖然凡用攻之法所以除內邪暴也亦猶後世之兵必不可無然必不得已乃可用之若或有疑再加詳慎蓋攻難去成方切用大承氣湯

邪無弗傷氣傷血實自古仁人所深忌者正恐其成之難敗之易爾

大承氣湯

治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實不大便發熱譫語自汗出

不惡寒痞滿燥實堅全見雜病三焦大熱脈沉實者陽明外

汗出不惡寒反惡熱是也此為在經仍當汗散若熱邪已入胃腑痞滿燥熱堅全見者為當下實則譫語亂言無不虛則鄭聲一語頻言也陽明多血多氣法當自汗過汗亡液無水則制火陽明有燥熱結而不下故妄見妄言也經曰何緣得陽明病曰太陽病若汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明陽明實大便難也又曰太陽初病發其汗先出微因轉屬陽明陽明實大便難也又曰太陽初病發其汗先能食為中寒寒陰陽明不能消穀以此為辨○胸膈不食為痞胸膈脹為滿大便結少為燥腹亦治陽明剛瘕此太陽兼證腹滿口噤臥不著席手足絀而無汗謂之剛瘕宜下之者以陽明主潤宗筋風寒淫熱傷陽明胃津液不行筋失所

養故以此湯下溼熱行津液喻嘉言曰傷寒腹滿可下胸滿不可下謂熱邪尚在表也此證入裏之熱極深極滿可下胸滿一線之陰陰氣不盡為陽助因不能勝必大下之以承領其亡陰之大戒復有急下救陰之法法學者深造端在斯矣○經曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳以胃為水穀之海四旁有病皆傳入胃已人胃則不復傳他經矣

大黃 四兩酒洗王海藏曰邪氣居高非酒不到若用生者則遺高分之邪熱病愈後變生用赤喉癰腫肺上熱痰也芒硝合厚朴枳實五先煎朴實將熟內大黃煮二三沸傾碗內和芒硝服得利則止枳實不通溫經用附子無乾

芒硝 內和芒硝服得利則止枳實不通溫經用附子無乾湧竹惡無毒汁不能行經絡密導無草藥不能通祇結熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤燥軟堅大黃之苦寒以瀉熱去瘀下燥成方切用大承氣湯

結泄胃強枳實厚朴之苦降瀉痞滿實滿經所謂土鬱奪之也陽明屬土大黃治大實芒硝治大燥大堅二味治有形然血藥也厚朴治大滿枳實治痞二味治無形氣藥也然非大實大滿不可輕投恐有寒中結胸痞氣之變此大小陷

由作也○承順也十劑曰通可去滯泄可去閉使寒者利而閉者通正氣得舒故曰承氣仲景曰欲行大承氣先與小承氣者腹中轉矢氣者有燥屎也可以大承氣攻之若不轉矢氣者此但初後後澀不可攻之攻之必脹滿不能食也又曰陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

已盡方敢議下不知太陽有十餘日不解者若不辨經而但計日其誤下仍在太陽至陽明二三日即顯下證反以計日當面錯過及陽明已入少陽又以計日妄行攻下輕者重而重者死矣仲景法日數雖多但有表證而脈浮者猶宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者即宜下之○古人有治惡寒戰慄用大承氣下燥屎而愈者此陽邪入裏熱結於裏表虛無陽故惡寒戰慄此陽盛格陰乃熱病非寒證誤投熱藥則死矣

加甘草等分名三一承氣湯 治大承氣證腹滿實痛調胃

證諸語下利小承氣證內熱不便一切傷寒雜病畜熱內甚

燥實堅脹 謂令三承氣為一方也成無已曰若大承氣證反

過傷元氣而腹滿不能食仲景所以分而治之後人以三方

合而為一云通治三方之證及傷寒雜病內外一切所傷與

仲景之方甚相違戾失軒岐緩急加柴胡黃芩甘草入鐵繡

之旨使病人暗受其害將誰咎哉 水三匙墜熱開結名六一順氣湯 節菴謂合三承氣三一承

方切用 大承氣湯 氣大柴胡大陷胸六方而

為一治潮熱自汗發渴譫語狂妄斑黃腹滿便實正陽明腑

病加人參甘草當歸桔梗薑棗名黃龍湯治邪熱傳裏胃有

燥屎心下硬痛身熱口渴下利純清水 有燥屎何以又下清

寒而利乃日飲湯藥而下滲也名熱結利庸醫妄謂漏去芒

硝加麻仁杏仁芍藥蜜丸名麻仁丸 景治跌陽脈浮而濇浮

則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約跌陽

也經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺

通調水道下輪膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行大

津液者也今胃火乘脾約束津液但輪膀胱致小便數而大

便難故名脾約與此丸潤燥通液此太陽傳入陽明之證故

仲景曰太陽陽明脾約是也按成氏釋此證謂脾弱胃強然

本文但云脾約未嘗云脾弱也蓋嘉言曰脾弱即當補矣何

為反用大黃朴實乎此脾上過燥使腸胃津液枯槁致中消

證中凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便勿鞭又恐初鞭後瀉未可妄攻故先與小承氣試其轉矢氣方可攻之皆是慮夫脾氣之弱也若脾約證在太陽即當下矣何待陽明耶朱丹溪曰此由久病大下之後陰血枯槁內火熾灼熱傷元氣又傷於脾而脾虛土欲不傷其可得乎肺失傳送脾熱液虧故大便硬而小便利數也理宜滋養陰血使火不熾而金化輪木有制而脾上運津液乃能入胃腸潤而通矣此方施之熱盛而氣實者則安若熱盛而血虛者勿膠柱而鼓瑟也

當下諸證 發汗不解腹滿痛者急下之利三部脈皆平按

之脈經曰滑為食病仲景曰滑則穀氣實又曰寸脈浮大按

之反濇尺中亦微而濇知有宿食宜下之傷寒六七日目中

不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下

之內經曰諸脈皆屬於目錢經曰熱病目不明熱不已者此

腎水將絕不能照物也陽明病發熱汗多者急下之汗多則

亡津液而內燥宜急下以存津液少陰病得之二三日口燥

咽乾者急下之邪入未深便作口燥此腎水將乾宜急下以

救欲絕之水少陰證六七日腹脹不大便者急下之此少陰

成方切用 當下諸證 忌下諸證 四 攻下門

邪熱入胃腑也上勝則水乾宜急下以救腎水少陰病自利

清水色純青心中必痛口中燥者急下之青為肝色肝邪乘

腎故下利陽邪上攻故口燥此亦少陰傳入陽明腑證也厥

陰證舌捲囊縮宜急下之此證仲景無治法按舌捲囊縮有

寒極而縮者宜附子四逆加吳茱萸湯并灸關元氣海葱熨

所攻勿藥而急引舌與舉丸故舌捲囊縮此為熱極當瀉陽

以救陰以上皆大承氣證也張兼善曰胃為水穀之海四旁

有病皆能傳入胃上燥則腎水乾故陽明與少陰皆有急下

之條證雖不同其入腑之理則一故皆用大承氣有病循衣

摸床兩手撮空者此胃熱也錢仲陽小兒直訣云此肝熱也

忌下諸證 太陽病外證未解不可下脈浮大為在表不可下

證不可下陽明病應發汗反下之此為大逆陽明病不能食

攻其熱必嘔胃中虛冷故也太陽陽明合病喘而胸滿宜瀉

之

子 52—574

黃湯肺氣清則胃邪自散不可下少陰病陽虛尺脈弱清者不可下脈數不可下數為血虛下之則熱邪入裏血愈虛而亡陰惡水者不可下下之則冷不嗜食完穀出頭痛目黃者不可下諸逆厥者不可下陽微不可下下之病轉諸虛不可下諸動氣者不可下

小承氣湯 仲景一名三物厚朴湯

治傷寒陽明證譫語便鞭潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通

大黃 四兩 厚朴 二兩 枳實 三枚 水四升煮一升二合去渣分

溫二服初服當更衣不爾者盡飲之若更衣勿服

邪在上焦則滿在中焦則脹胃實則潮熱有潮水之來其來

於中西故曰哺潮熱傷 陽邪乘心則狂 故譫 胃熱干肺則喘

故以枳朴去上焦之痞滿以大黃蕩胃中之實熱此痞滿燥

成方切用 小承氣湯

五 攻下門

實堅未全者故除芒硝欲其無傷下焦真陰也 陽明證有正

陽陽明有少陽陽明自陽明經傳入胃腑不惡寒腹滿便鞭

者宜大承氣下之若汗多發熱微惡寒者為外未解其熱不

潮未可與承氣若腹大滿不通者可與小承氣微和胃氣勿

令人泄下謂陽明有在經者未全入腑宜審慎陽明少自

病多由太陽傳入或成無已日自太陽少陽傳入者衆所共知

之微旨與經曰傷寒脈浮緩手足濡者繫在太陽當發黃若

小便利者不能發黃至七八日大便鞭者陽明病也程郊倩

曰此證謂之太陰陽明陽明為病本之胃實不特三陽受邪

能轉屬陽明三陰亦能轉屬陽明推之少陰三大承氣厥陰

屬陽明之病哉 金匱用治支飲胸滿更名厚朴大黃湯 徐忠可曰言支飲則

要治中風邪氣作實二便不通 三化者使三焦獲利復其氣之理非堅實之體不可輕投

調胃承氣湯 仲景

治傷寒陽明病不惡寒反惡熱口渴便閉譫語腹滿中焦燥

實及傷寒吐後腹脹滿者 邪在表則身熱汗出而惡寒邪已

出而反惡熱也汗多亡津液又入裏故口渴便閉無水以制

火內有燥屎故妄見妄言而譫語吐後不解腹脹滿者熱入

胃也然滿而不痛不宜 陽明病不吐不下而心煩者為內煩

急下故少與調胃和之 下後煩者胃有乾熱也 亦治渴證中消善食而瘦

成方切用 調胃承氣湯

本 攻下門

大黃苦寒除熱蕩實芒硝鹹寒潤燥輕堅二物下行甚速故

用甘草甘平以緩之不致傷胃故曰調胃承氣去枳朴者不

欲其犯上焦氣分也 三按本方大黃酒浸入太陽經酒洗

入陽明經浸久於洗故能引於至高之分仲景以調胃承氣

收入太陽門而不吐不下心煩者及發汗不解蒸熱者吐

後腹脹滿者是太陽陽明去表未遠其病在上不當攻下故

宜緩劑調和之也至正陽明則日急下之而大承氣湯大

黃註曰酒洗輕於浸是微升其走下之性以治其氣也至

少陽陽明則去正陽而通大陰其分爲下故小承氣湯大

泄下此仲景之妙法也。大承氣統治三焦 加當歸薑棗煎名當歸承氣湯 河治裏熱火鬱或皮膚枯燥





胸也乃表邪傳至胸中證雖滿悶尚為在表正屬少陽部分  
半表半裏之間只須小柴胡加枳桔以治未效則以小柴胡  
對小陷胸一服然若因下早而成者方用陷胸湯九分淺  
深從緩治之不宜太峻上焦乃清道至高之分過下則傷元  
氣也崔行功曰傷寒結胸欲經心膈高起手不可近用大陷  
胸湯不達者此下後虛逆氣效如神活人云誤下未成結胸  
中丸先理其氣次調諸疾其效如神活人云誤下未成結胸  
中者急須與理中湯自然解了蓋理中治中焦故也胃中雖  
和傷寒未退宜依日數足卻以承氣再下之蓋前來之下未  
是也其水結胸者用小半更加茯苓湯小柴胡去黃加牡蠣  
主之又有血結胸證手不可近漱水不欲嚥  
喜忘如狂大便黑小便利宜犀角地黃湯

小陷胸湯 仲景

治傷寒誤下小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者及痰熱

塞胸 前證上下俱硬此則正在心下前證痛不可近此則按

與此湯以除

成方切用

小陷胸湯 大陷胸丸

九 卷下門八

黃連 兩半 夏 升 栝樓 大者 一枚

黃連之苦寒以泄熱栝樓之寒潤以滌垢半夏之辛溫以散

結結胸多由痰熱結聚故用三物以除痰去熱也 劉心山曰

痰飲凝結心胸故陷胸瀉心用日蓮半夏

大陷胸丸 仲景

治傷寒結胸項強如柔痙狀 有汗為柔痙胸膈實滿故項

大黃 兩 杏仁 去皮 葶藶 芒硝 各半 合研取如彈丸一枚

別搗甘遂末一錢白蜜丸合煮服大黃之苦寒以泄熱芒硝

之鹹寒以軟堅杏仁之苦甘以降氣葶藶甘遂取其行水而

直達白蜜取其潤滑而甘緩

十棗湯 仲景

治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出頭

痛心下痞鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒表解而裏未

和邪熱內蓄有伏飲者 下利嘔逆裏受邪也汗出不惡寒表

氣邪熱內蓄而有伏飲也此為水氣上逆嘔逆頭痛與表證

頭痛稍別周揚俊曰此證與結胸頗同故湯亦與陷胸相微

表解後攻與結

芫花 黑 甘遂 大戟 等分 大棗 十枚 先煮棗去滓內前藥末強

人服一錢虛人五分或棗肉為丸病不除者再服得快下後

糜粥自養

成方切用

十棗湯

十 卷下門八

處以攻決為用三藥過峻故用大棗之甘以緩之益土所以

勝水使邪從二便而出也 十棗湯小青龙湯主水氣乾嘔桂

枝湯主太陽汗出乾嘔黃芩湯主

少陰下利乾嘔吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔王海藏曰表

證表未解心下有水氣而飲乾嘔發熱或喘或利小青龙湯

主之表已解有時頭痛惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或

喘或欬十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂

開鬼門也十棗湯逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨腑去

陳法也或問十棗湯計枝去桂加茯苓白朮湯皆屬飲家

俱有頭痛項強之證何也張兼善曰太陽經多血少氣病人

表熱微渴念飲水漿為水多氣弱不能施化本經血氣因而

凝滯致有頭痛項強之證不迫及表但宜逐飲飲盡則自安

杜壬曰裏未和者蓋痰與燥氣乘於中焦故頭痛乾嘔汗出

短氣是痰膈也非十棗不能除但此湯不宜輕用恐損人於

忽除大棗加大黃黑丑輕粉水丸名三花神佑丸 河治壯實人

風痰鬱熱支體麻痺走注疼痛溼熱腫滿氣血壅滯不得宣  
通及積痰翻胃服二九後轉加痛悶此痰涎壅塞頓攻不開  
再加二九快利則止加牽牛大黃大瀉氣血之滯加輕粉無  
竅不入以去痰積虛人尤不可輕用

各五錢加黃蘗三兩大黃兩粥丸名小胃丹治胸膈腸

胃熱痰溼痰

赤金豆亦名八仙丹

治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹蟲積結聚癥堅宜此主  
之此丸去病極速較之硝黃殺我之類過傷臟氣者大為勝

巴霜去皮膜略去生附子切略炒皂角微炒焦丁香 木香

成方切用赤金豆 三物備急丸 卷八

天竺黃各二錢輕粉一錢硃砂二錢為末醋浸蒸餅為丸羅

荀子大硃砂為衣欲漸去每服五七丸欲驟行者每服一二

十丸用滾水或煎藥或薑醋茶蜜荷香使君子煎湯為引送

下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得

冷即止也如治氣溼食滯鼓腫先用紅棗煮熟取肉一錢許

隨用七八丸甚者一二十丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖

少許送下如治蟲痛亦用棗肉和服止用清湯送下

三物備急丸 千金

治食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿欲死及中惡客忤卒

暴諸病食滯腸胃上焦下行下脫下通  
故痛脹欲死內實者法當下之

巴豆霜 大黃 乾薑 等分蜜丸小豆大每服二三九中

惡口噤者折齒灌之崔氏乾薑易桂枝名備急散

大黃苦寒以下熱結巴豆辛熱以下寒結加乾薑辛散以宣

通之乾薑辛溫開五臟  
大腑通四肢關節三藥峻厲非急莫施故曰備急

太平丸

治胸腹疼痛脹滿及食積氣積氣痛血痛邪實祕滯等證此

借些微巴豆以行羣藥之力去滯

陳皮 厚朴 木香 烏藥 白芥子 草豆蔻 三稜

蓬蘽乾薑牙皂炒澤瀉各三錢已上十一味共為細

末另將巴豆用滾湯泡去皮心并膜稱足一錢用水一碗微

成方切用太平丸 備急丸 卷八

火煮半碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將煎湯攪入研勻

然後量藥多少入蒸餅浸爛搗丸前藥如紫豆大每用三分

或五分甚者一錢隨證用湯引送下 凡傷食停滯即以本

物湯下 婦人血氣痛或紅花湯下或當歸湯下 氣痛陳

皮湯下 疝氣茴香湯下 寒氣薑湯下 欲瀉者用熱湯

送下一錢未利再服 利多不止用冷水一二口即止

硃砂丸 本事

治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂 巴豆去油三稜 乾薑 白芷五錢木香 青皮 胡椒

半錢 乾姜 炒 大黃 兩 檳榔 肉豆蔻 筒 為末醋醋二升煮

巴豆五七沸再下三稜大黃末同煎五七沸入礪砂熬成膏和諸藥杵丸菴豆大每服五九薑湯下

此治肉積氣積血積通劑也礪砂化肉食礪砂性大熱能爛五金本草言其能

化人心為血故治腐乾黍散瘀血木香青皮行滯氣三稜破

血而行氣肉蔻暖胃而和中白芷散風而除溼乾薑胡椒除

沉寒錮冷大黃巴豆能斬關奪門方內多辛熱有毒之品用

之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之以蕩熱去實蓋積聚既深

攻治不得不峻用醋者酸以收之也玉機微義曰方中因白

痰飲也○潔古曰壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣

血兩衰四時有感冒能成積若速以磨堅破結之藥治之疾

似去而人已衰矣乾姜麥砂三稜大黃牽牛之類得藥則暫

快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先

成方切用敦阜丸攻下門

虛使氣血旺積自消如滿坐皆君子則小人自無

容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

敦阜丸

治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香 山查 麥芽 皂角 丁香 烏藥 青皮 陳皮

澤瀉各五錢 巴霜一錢 右共為末用生蒜頭一兩研爛加熟

水取汁浸蒸餅搗爛丸菴豆大每服二三十九丸隨便用湯引

送下如未愈徐徐加之

木香檳榔丸子和

有因火熱者火燥物而性急也有因氣滯者大腸氣壅不得

宣通也有因積滯者腸胃有物結聚也有氣虛者中氣陷下

不能升也也有血虛者津枯腸燥虛坐努責是也當分證

論治脈洪大而實為實宜下若脈浮大慎不可下

我蔬醋三稜 黃連黃連 黃蘗黃蘗 枳殼枳殼 陳皮陳皮 青皮青皮 檳榔檳榔

椰 木香錢五 大黃酒浸 香附香附 黑牽牛黑牽牛 芒硝水芒硝水 量入

虛實服一方加當歸當歸 張子和儒門事親無三稜枳殼只十

味紺珠無三稜陳皮名木香導氣丸

溼熱在三焦氣分木香香附行氣之藥能通三焦解六鬱陳

皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣瀉痢多由肝 枳殼寬腸而

利氣而黑丑檳榔又下氣之最速者也氣行則無痞滿後重

之患矣瘧痢由於溼熱鬱積氣血不和黃蘗黃連燥溼清熱

成方切用木香檳榔丸 百順丸 齒 攻下門

之藥三稜破血中氣滯莠莠破氣中血滯大黃芒硝血分之

藥能除血中伏熱通行積滯並為摧堅化痞之峻品溼熱積

滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不除清陽終不得升

故必假此以推蕩之亦通因通用之意然非實積不可輕投

滑伯仁曰腸胃陽明燥金也下焦少陽相火也後重之用木

香檳榔行燥金之鬱也癰閉之用知母黃蘗散相火之鬱也

百順丸

治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱祕結等

證但各為湯引隨宜送下無往不利

川大黃錦紋者 牙皂角炒微黃 為末湯浸蒸餅為丸菴

豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜丸

子 52-579

亦可

枳實導滯丸 東垣

治傷溼熱之物不得施化痞悶不安腹內硬痛積滯泄瀉

大黃兩一枳實錢二黃芩錢二黃連錢二神麴錢五白朮錢三茯苓錢三澤瀉錢三

錢二 蒸餅為丸量多寡服

飲食傷滯作痛成積非有以推蕩之則不行積滯不盡病終

不除故以大黃枳實攻而下之而痛瀉反止經所謂通因通

用也傷由溼熱黃芩黃連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利

溼積由酒食神麴蒸餅之物化食解酒因其同類溫而消之

芩連大黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白朮之甘溫補土而

成方切用 枳實導滯丸 倒倉法

圭 攻下門

固中也

倒倉法 丹溪

黃牡牛肉 肥嫩者二 三十觔

切碎洗淨用長流水桑柴火煮糜爛

濾去滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣擇一

靜室明快不通風者令病人先一夜不食坐其中每飲一鍾

少時又飲積數十鍾病在上者必吐病在下者必利病在中

者吐而且利視所出物可盡病根乃止 連進之急則逆上而

多視病之上吐利後必渴不得與湯其小便必長取以飲之

下而為緩急名輪迴酒非惟止渴兼滌餘垢行後倦臥覺饑先與米飲次

與稀粥三日後方與厚粥軟飯菜羹調養半月一月精神煥

發沉痾悉痊矣須戒色慾半年一年戒牛肉五年 霞天臺

即照前法每肉十二觔可熬膏一觔磁罐盛之夏月水浸可

留三日寒天久留生蠟用重湯煮入煎劑調服入丸劑每三

分加麴一分煮糊或同蜜煉

朱丹溪曰牛坤土也黃土之色也以順為德而法健為功者

壯之用也肉胃之藥也液無形之物也積聚久則形質成依

附腸胃迴薄曲折之處以為巢曰豈銖兩之丸散所能窺其

藩牖乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮莖陳朽皆

順流而下不能停畱凡屬滯礙一洗而空澤枯潤槁補虛益

損寧無精神煥發之樂乎其方傳於西域異人中年後行一

成方切用 蜜煎導法

圭 攻下門

二次亦卻病養壽之一助也 王綸曰牛肉補中非吐下藥借

蜜煎導法 仲景

治陽明證自汗小便利大便祕者 胃實自汗小便利此為

下葉則液愈耗矣雖大便祕不可攻津液內竭非熱結也若與

之宜俟其欲大便然後用外導之法

蜜七合銅器中微火煎頻攪勿令焦候凝如飴捻作挺子令

頭銳大如指長寸許摻皂角末少許乘熱納穀道中用手抱

住大便出時乃去之 加鹽少許亦可

蜜能潤腸熱能行氣早能通竅津液內竭饑不可攻須俟其

欲便乃導而通之不欲以苦寒傷胃也 徐忠可曰此為大便秘

設也結胸痞滿腸結胃有燥屎皆有見證今但自汗且小便利是津耗熱結而乾燥也

豬膽導法 仲景

治證同前

豬膽一枚取汁入醋少許用竹管長三四寸以一半納穀道將膽汁灌入頃當大便

便秘者屬燥屬熱自汗者為亡津液當小便不利今反利是

熱猶未實故不可攻豬膽汁寒勝熱滑潤燥苦能降醋酸善

人故能引入大腸而通之也 海藏法用蜜煎鹽相合或草烏

草烏能化寒消結可隨證陰陽所宜而用之○準繩曰凡多

汗傷津及屢經汗下不解或尺中脈遲弱元氣素虛人便欲

下而不潤利者宜導法但須分津液枯者用蜜導邪熱其

者用鹽導濕熱痰飲固結薑汁麻油浸枯者用蜜導邪熱其

水者導之無益非大承氣峻攻不效以蜜結在內而不在下

也至於陰結便閉者宜於蜜導中加薑汁生附子末或別陳

成方切用 豬膽導法 大螺着小腹法 七 攻下門

長沙之未備也 大螺着小腹法

宋季饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溺不通五日腹脹

如鼓同輩環視皆不能措力與西湖妙果僧慧月相善遣信

邀至訣別月驚馳而往於釣橋逢一異客揖之曰方外高人

何子子走趨若是月曰善友久患秘結病危急欲往問客

曰易事爾待奉施一藥即脫離人水探一大螺而出曰事濟

矣抵家以鹽半匙和殼生搗置病者臍下一寸三分用寬帛

緊繫之仍辦溺器以須其通月未以為然姑異謝之至熊家

彥誠昏不知人妻子聚泣諸醫知無他策慢使試之曾未安

席而暴下諸醫愧歎而歲月歸訪異人不見矣熊後十六年

乃終此因熱秘而便溺不通大螺性寒而善分清故濁水之

中一着大螺便能澄澈劑之以鹽取其善潤而已

瘧傷寒結胸法

凡傷寒結胸其有中氣虛弱不堪攻擊內消須以此法外

之則滯行邪散其效如神

葱白頭兩生薑兩生蘿蔔 此味加倍如 右三味共搗一處

炒熱用手巾或白布包作大餅罨胸前脹痛處此藥須分二

包冷則輪換罨之無不即時開通汗出而愈但不宜大熱恐

炮烙難受也

成方切用 瘧傷寒結胸法 竹葉薑法 又蘿蔔菜薑法 太 攻下門

又法以大蒜頭二十箇搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處

少頃即散用治一切腹脹無不神效

竹葉薑法

凡大便不通實結在肛門而不得下將烈火煮竹葉一鍋乘

滾熱傾淨桶內上撒綠絲末一握坐上薰之

又蘿蔔菜薑法

用蘿蔔菜如上法亦妙如無蘿蔔菜即青菜亦可

成方切用卷九目錄

消導門 正方一十九 附方三十三

枳朮丸

枳朮湯

半夏枳朮丸

橘半枳朮丸

橘皮枳朮丸

木香枳朮丸

香砂枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

木香人參乾薑枳朮丸

消飲丸

三黃枳朮丸

麴蘖枳朮丸

平胃散

成方切用

目錄

一 消導門 卷九

除溼湯

和解散

藿香平胃散

人參養胃湯

加味平胃散

厚朴溫中湯

對金飲子

和胃飲

保和丸

小保和丸

大安丸

芍藥枳實丸

痞氣丸

伏梁丸

肥氣丸

息賁丸

賁豚丸

十香丸

枳實消痞丸

廓清飲

健脾丸

益氣健脾丸

養榮健脾丸

理氣健脾丸

舒鬱健脾丸

化痰健脾丸

清火健脾丸

和中健脾丸

妙應丸

寬中進食丸

成方切用

目錄

二 消導門 卷九

解肝煎

排氣飲

葛花解醒湯

大和中飲

小和中飲

鼈甲飲

小分清飲

方見燥溼門

資生丸

神香散

佐關煎

見祛寒門

抑扶煎 見祛寒門

成方切用

目錄

三

消導門  
卷九

成方切用卷九

消導門

消者散其積也導者行其氣也脾虛不運則氣不流行氣不流行則停滯而為積或作瀉痢或成癰瘕以致飲食減少五臟無所資榮氣血日以虛衰因致危困者多矣故必消而導之酸劑已見攻下門茲集緩攻平治之劑

枳朮丸 潔古

消痞除痰健脾進食

白朮 上蒸枳實一兩 為末荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶

加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神麴

東垣曰白朮甘溫補脾胃之元氣其味苦除胃中溼熱利腰

臍間血過於枳實剋化之藥一倍枳實苦寒泄胃中痞悶化

成方切用

枳朮丸

消導門  
卷九

胃中所傷是先補其虛而後化其傷則不峻矣荷葉中空色

青形仰象震在人為少陽膽胃氣元氣穀氣甲膽上升之氣

皆生氣也食藥感此氣化胃氣何憂不上升乎燒飯與白朮

協力滋養穀氣補令胃厚不致再傷其利廣矣 王安道曰勞

為內傷誠不足矣飲食傷又當於不足之中分其有餘夫饑

餓不飲食者胃氣空虛此為不足而傷也飲食自倍腸胃乃

傷者此不足之中兼有餘而傷也惟其不足故補益惟其有

餘故消導亦有物滯氣傷宜消補兼行者亦有物滯氣不傷

但須消導者亦有不須消導但須補益者枳朮丸之類雖曰

消導固有補益之意焉若所滯之物非枳朮丸之力所能去

者備急丸煮黃丸瓜蒂散等潔古東垣亦未嘗委之而勿用

也景岳曰枳朮丸以白朮為君脾胃得其燥所以能健然佐以

枳實其味苦峻有推牆倒壁之功此實寓攻於守之劑惟脾

金匱用枳實七枚白朮二兩作湯名枳朮湯治水飲心下堅

大如盤邊如旋盃心下上焦陽分也屬氣分之水加半夏一兩名半夏枳朮

丸治脾溼停痰及傷冷食淋者加澤瀉一兩加陳皮半夏名

橘半枳朮丸健脾消痞化痰加橘皮一兩名橘皮枳朮丸治

飲食不消氣滯痞悶加木香一兩名木香枳朮丸治氣滯痞

滿木香平肝行氣使木不尅土再加砂仁名香砂枳朮丸破滯氣消飲食

強脾胃再加乾薑五錢名木香乾薑枳朮丸兼治氣寒再加

人參陳皮名木香人參乾薑枳朮丸開胃進食加茯苓五錢

乾薑七錢名消飲丸治停飲胸滿嘔逆加酒炒黃連黃芩大

黃炒神麴橘紅各一兩名三黃枳朮丸治傷肉食溼麴辛熱

成方切用 平胃散 二 卷九 消導門

味厚之物填塞悶亂不快加神麴麥芽各一兩名麴蘖枳朮

丸治內傷飲食或泄瀉

平胃散 局方

治脾有停溼痰飲痞宿食不消滿悶嘔瀉上溼太過木邪乘不勝而侮之

脾虛不能健運故有痰食雷滯中焦致生痞滿諸證胃寒則嘔溼盛則瀉及山嵐瘴霧不服水土

由胃虛故易感也

蒼朮二錢厚朴二錢陳皮二錢甘草一錢加薑棗煎傷食加神

麴麥芽或枳實溼勝加五苓痰多加半夏脾倦不思食加參

耆痞悶加枳殼木香大便秘加大黃芒硝小便赤澀加苓澤

傷寒頭痛加葱豉取微汗

蒼朮辛烈燥溼而強脾厚朴苦溫除溼而散滿苦降能瀉實

滿陳皮辛溫利氣而行痰甘草中州主藥能補能和為使泄

中有補務令溼上底於和平也景岳曰平胃者欲平治其不

其性味從辛從燥從苦而能消能散惟此為胃強邪實者設故

之今見方家每以此為常服健脾之劑動輒用之而不察其

誤甚矣

合二陳加藿香名除溼湯治傷溼腹痛身重足輭大便溏瀉

加藁本枳殼桔梗名和解散局方治四時傷寒頭痛煩躁自汗

欬嗽吐利加藿香半夏名藿香平胃散又名不換金正氣散

局治胃寒腹痛嘔吐及瘧疫溼瘧再加人參茯苓草菓生薑

烏梅名人參養胃湯治外感風寒內傷生冷食停痰嵐瘴

成方切用 和胃飲 三 卷九 消導門

瘟疫或飲食傷脾發為痄瘧老瘧也加麥芽炒麴名加味平胃

散治宿食不消吞酸噯臭除蒼朮加木香草蔻乾薑茯苓名

厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯胃時作

疼痛散以辛熱佐以苦甘滲以甘淡氣溫胃和痛自止矣本方一兩加桑白皮一兩名

對金飲子治脾胃受溼腹脹身重飲食不進肢痠膚腫

和胃飲

治寒溼傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿等

證

陳皮 厚朴各一錢乾薑一錢炙甘草一錢

此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛寒一聞蒼



尤之氣亦能動嘔故以乾薑代之凡薑香木香丁香茯苓半  
夏菖豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼  
時氣寒熱加柴胡以清利之

保和丸

治食積飲停腹痛泄瀉痞滿吐酸積滯惡食食瘧下利傷於  
脾不運化滯於腸胃故有泄痢食瘧等證傷而未甚不欲食  
以腐劑惟以和平之品消而化之故曰保和東垣曰傷飲者  
無形之氣也宜發汗利小便以導其滯傷食者有形之物也  
輕則消化或損其穀重則方可吐下脈經云大腸有宿食寒  
則消導重則下之

山查

三兩  
去核神麴

茯苓

半夏

陳皮

萊菔子

炒連翹

麴和丸麥芽湯下或加麥芽入藥亦可

成方切用

保和丸

四

消導門

山查酸溫收縮之性能消油膩腥羶之食收縮故陳麴辛溫  
蒸晉之物能消酒食陳腐之積菔子辛甘下氣而制麴麥芽  
鹹溫消穀而輭堅堅積食必兼乎溼茯苓補脾而滲溼積  
久必鬱為熱連翹散結而清熱半夏能潤能燥和胃而健脾  
陳皮能降能升調中而理氣此傷於飲食而氣未病者故但  
當消導也

加白朮白芍去半夏菔子連翹蒸餅糊丸名小保和丸助脾  
進食加白朮二兩名大安丸或加人參治飲食不消氣虛邪  
微加白朮香附黃芩黃連厚朴枳實治積聚痞塊合越鞠丸  
扶脾開鬱

芍藥枳實丸

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛脾胃不和等證此  
方較枳朮丸其效更神

白朮

炒赤芍藥

二兩枳實

陳皮

兩

荷葉湯煮老黃米糊

為丸桐子大米飲或滾白湯任下百餘丸如臟寒加炒黃

乾薑一二兩

如脾胃虛加人參一二兩

痞氣丸東垣

治脾積在於胃脘大如盤久不愈令人四肢不收或發黃疸  
飲食不為肌膚金匱曰堅而不移者名積為臟病推移不定  
運而成虛心下位中央填塞痞滿皆土病也與脹滿有輕重  
之分痞惟內覺滿悶脹滿則外有脹急之形也有中氣虛衰

成方切用

芍藥枳實丸

痞氣丸

五

消導門

九

不能運化精微而成痞者有飲食積積不能施化而成痞者  
有淫熱太甚上乘心下而成痞者古方用黃連黃芩枳實之  
苦以泄之厚朴半夏生薑之辛以散之參以散之參以散之  
以補之茯苓澤瀉之淡以滲之惟宜上下分消其氣果有內  
實之證庶可略施疎導世人苦於痞塞喜用利藥  
暫時通快藥過滋甚皆由不察中氣不運所致  
黃連八錢厚朴五錢吳茱萸錢白朮錢黃芩錢茵陳酒炒乾薑炮砂  
仁錢人參錢茯苓錢澤瀉錢川烏錢川椒錢桂錢巴豆霜  
分四蜜丸燈草湯下黃連瀉熱燥溼治痞君藥仲景治痞滿  
之用厚朴砂仁行氣而散滿茵陳蒼瀉利水以實脾黃芩清肺  
而養陰椒黃燥脾而逐冷薑桂川烏補命火以生脾土而薑  
桂又能去瘀生新脾無積血巴豆能消有形滯積為斬關奪  
門之將藉之以為先驅加參朮者以補脾元正氣正旺然後

可以祛邪也潔古曰養正積自除

除吳茱白朮茯苓澤瀉茵陳川椒砂仁加菖蒲茯神丹參紅

豆名伏梁丸治心積起膈上至心下大如臂令人煩心除吳

茱砂仁桂朮黃芩澤瀉加柴胡莢逆阜角昆布甘草名肥氣

丸治肝積在左脇下有頭足令人發欬痰瘡不已除吳茱白

朮砂仁黃芩茵陳澤瀉加紫苑桔梗天冬白薤青皮陳皮三

稜名息賁丸淡薑湯下治肺積在右脇下令人灑淅寒熱喘

欬發肺癰秋冬黃連減半除吳茱白朮砂仁人參乾薑川椒

黃芩茵陳加菖蒲丁香附子苦棟延胡獨活全蠍名賁豚丸

淡鹽湯下治腎積發於小腹上至心下若豚狀上下無時令

成方切用痞氣丸 十香丸 枳實消痞丸

人喘欬骨痿及男子七疝女子瘕聚帶下此東垣五積方也雖有破滯削堅之

藥多藉人參之力贊助成功經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

十香丸

治氣滯寒滯諸病

木香 沉香 澤瀉 烏藥 陳皮 丁香 小茴香 香

附酒荔枝核煨焦各等分 阜角微火燒煙盡減半 爲末酒糊丸彈子大

者磨化服丸桐子大者湯引下癰疽之屬溫酒下

枳實消痞丸東垣

治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦脾虛不運故痞滿惡食脾主四肢虛故懶倦右關屬

脾脈弦者脾虛而木來侮之也○經曰太陰所至爲積飲痞隔皆陰勝陽也受病之臟心與脾也因兩鬱乘而痞者火與

同溼也蓋心陽火也主血脾陰土也主運凡傷其陽則火拂而血凝傷其陰則土壅塞而滯聚陰陽之分施治之法不可

枳實炒黃連五錢 厚朴四錢 半夏麴 麥芽炒 人參 白

朮炒茯苓三錢 甘草炙 乾薑錢 蒸餅糊丸

枳實苦酸行氣破血黃連苦寒瀉熱開鬱並消痞之君藥厚

朴苦降散溼滿而化食麥芽鹹溫破結氣而軟堅半夏燥痰

溼而和胃乾薑去惡血而通陽通四肢關節皆所以散而瀉

之也參朮苓草甘溫補脾使氣足脾運而痞自化既以助散

瀉之力又以固本使不傷真氣也王叔和義曰此半夏瀉心湯加減法也內有枳朮四

君平胃等藥利溼消痞補虛之劑也

成方切用枳實消痞丸 廊清飲 健脾丸

廊清飲

治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水不利年力未衰通身

腫脹或肚腹單脹氣實非水等證

枳殼二厚朴一錢 大腹皮一錢 白芥子七分 陳皮二錢 茯苓

連皮用蘿蔔子生搗一錢如中不用澤瀉錢 水煎食遠服

內熱多火小水熱數者加梔子木通各一二錢 身黃小

水不利者加茵陳二錢 小腹脹滿大便堅實不通者加生

大黃三五錢 肝滯脇痛者加青皮 氣滯胸腹疼痛者加

烏藥香附 食滯者加山楂麥芽

健脾丸

治脾虛氣弱飲食不消

白朮<sup>土</sup>人參<sup>二</sup>麥芽<sup>一</sup> 陳皮<sup>二</sup>山查<sup>去核</sup>枳實<sup>三</sup> 神麴糊

丸米飲下

脾胃者倉廩之官胃虛則不能容受故不嗜食脾虛則不能運化故有積滯所以然者由氣虛也參朮補氣陳皮利氣氣運則脾健而胃強矣山查消肉食麥芽消穀食戊巳不足<sup>胃</sup>為己土故以二藥助之使化枳實力猛能消積化痞佐以參朮則為功更捷而又不致傷氣也夫脾胃受傷則須補益飲食難化則宜消導合斯二者所以健脾也

去山查麥芽加茯苓炙甘草名益氣健脾丸治脾虛食少去

成方切用

健脾丸

八

消導門

山查麥芽陳皮加當歸芍藥芩麥冬柏子仁名養營健脾丸治脾陰不足飲食不為肌膚<sup>血充然</sup>去人參枳實麥芽加

香附木香半夏茯苓神麴黃連當歸芍藥<sup>方無</sup>荷葉燒飯

丸名理氣健脾丸治脾胃虛弱久瀉久痢去人參山查麥芽

加神麴川芎香附麴糊丸名舒鬱健脾丸治脾氣鬱滯飲食

不消去山查麥芽加半夏膽星蛤粉茯苓神麴糊丸名化痰

健脾丸治內傷挾痰去人參山查麥芽加半夏山梔黃連水

丸名清火健脾丸治脾虛有火去人參山查麥芽加木香檳

榔厚朴半夏甘草名和中健脾丸治胃虛饑不欲食仍用人

參名妙應丸治胃虛不能食臟腑或結或泄去山查加半夏

青皮木香砂仁草薹乾薑炙甘草茯苓豬苓澤瀉蒸餅丸名寬中進食丸<sup>東</sup>補脾胃進飲食

解肝煎

治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者宜化肝煎<sup>方</sup>

門

陳皮 半夏 厚朴 茯苓<sup>一錢</sup>蘇葉 芍藥<sup>一錢</sup>砂仁<sup>七分</sup>

加煨薑三五片 如脇肋脹痛加白芥子一錢 胸膈氣滯

加枳殼香附藿香之屬

排氣飲

治氣逆食滯等證

成方切用

解肝煎

排氣飲

葛花解醒湯

九

消導門

陳皮 枳殼 藿香<sup>一錢</sup>香附<sup>五分</sup>澤瀉 烏藥<sup>二錢</sup>厚朴<sup>一錢</sup>木

香<sup>七分</sup>或 水煎熱服 如食滯者加山查麥芽各二錢

寒滯者加焦乾薑肉桂之屬 氣逆之甚者加白芥子沉香

青皮檳榔之屬 嘔而兼痛者加半夏丁香之屬 痛在小

腹者加小茴香 兼疝者加荔枝核煨熟搗碎用二三錢

葛花解醒湯

專治酒積或嘔吐或泄瀉痞塞頭痛小便不利<sup>酒熱而兼淫</sup>

諸證

葛花 豆蔻 砂仁 木香 青皮 陳皮 人參 白朮

炒 茯苓<sup>四</sup>神麴<sup>炒</sup>乾薑 豬苓 澤瀉<sup>二</sup>

過飲無度溼熱之毒積於腸胃葛花獨入陽明令溼熱從肌

肉而解豆蔻砂仁皆辛散解酒故以為君神麴解酒而化食

木香乾薑調氣而溫中青皮陳皮除痰而疏滯二苓澤瀉能

驅溼熱從小便出乃內外分消之劑飲多則中氣傷故又加

參朮以補其氣也人參補氣最能解酒東垣曰酒大熱有毒

下分消其溼氣今人或用酒療大熱之藥下之或用大黃

牽牛下之是無形元氣受傷反損有形陰血陰血愈虛陽毒

大旺元氣消亡而虛損之病成矣葛花解酒而發散不如

枳椇根一名雞距一名木蜜經霜黃赤而味甘其葉入酒

酒化為水門外植此木者屋內釀酒多不佳

大和中飲

治飲食積滯雷聚等證

成方切用 大和中飲 小和中飲 十消導門 卷九

陳皮 枳實二錢 厚朴 澤瀉 山查 麥芽錢半 砂仁五分 水

煎溫服 脹甚者加白芥子 胃寒無火或惡心者加炮乾

薑一二錢 疼痛者加木香烏藥香附之類 痰多者加半

夏

小和中飲

治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

藟豆炒 山查二錢 陳皮 茯苓 厚朴錢半 甘草五分 加煨薑三

五片 嘔者加半夏一二錢 脹滿而氣不順者加砂仁七

八分 火鬱於上者加炒梔子一二錢 婦人氣逆血滯者

加蘇梗香附之屬 寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

龍甲飲

治瘧久不愈腹中結塊名曰瘧母瘧久不愈為瘧母多成癥

肝之積也瘧屬少陽膽經膽與肝相表裏久瘧在血分

血亦肝所主也當以龍甲為君隨證虛實而施佐使之藥

龍甲醋炙 白朮炒 黃耆 白芍酒炒 檳榔 草菓厚朴 陳皮

甘草 等分薑三片棗二枚烏梅少許煎

久瘧必由脾虛白朮補脾氣黃耆補肺氣使氣足脾運方能

磨積也川芎補肝而行血中氣滯芍藥助脾而散肝經火邪

二藥並和厥陰營氣營血調則陰陽和矣陰陽不和而爭積

榔下氣而攻積草菓煖胃而祛寒厚朴破血而散滿陳皮理

氣而消痰甘草和中而補土龍甲鹹平屬陰色青入肝專能

成方切用 龍甲飲 小分清飲 資生丸 十消導門 卷九

益陰補虛清熱散結故為瘧瘧之君藥也

小分清飲

治小水不利溼滯脹腫不能受補等證如兼火者宜大分清

飲方見燥

方見燥溼門

資生丸

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養營衛張三錫曰余初識

出彈丸咀嚙問之曰此得之秘傳饑者服之即飽飽食之即

饑因飲其方已於醉飽後服二丸經投枕臥夙興了無停

滯始信此方又善治胎前惡阻

白朮米泔浸用山黃土拌九人參人乳浸飯米仁三神麴

查肉 蒸橘紅二錢 茯苓 麥芽麵 雲苓 飯上蒸曬 懷藥一兩

五錢 蓮肉 去心 桔梗 米泔 眞薑香 甘草 蜜炙 川連

薑汁 白豆蔻仁 微炒 澤瀉 二錢 末之蜜丸 每丸二錢重 每服

一丸 醉飽後二丸 細嚼淡薑湯下

按此方九補九消即枳朮丸之意而推廣之立方較為穩妥

名曰資生重脾胃也

神香散

治胸膈胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲隔噎諸藥不效

者惟此最妙

丁香 白豆蔻仁

或砂仁 亦可

等分爲末清湯調下七分甚者

成方切用

小分清飲

神香散

主

消導門 卷九

一錢日數服不拘若寒氣作痛者薑湯送下

成方切用卷十目錄

和解門 正方二十九 附方二十二

小柴胡湯

柴胡去半夏加栝樓根湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡合桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

柴胡飲子

柴胡桔梗湯

柴平湯

清鎮丸

柴胡四物湯

調經湯

小前胡湯

柴胡雙解散

成方切用

目錄

十

和解門 卷十

芍藥甘草湯

白朮芍藥湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃芩芍藥湯

外臺黃芩湯

黃連湯

溫膽湯

十味溫膽湯

越鞠丸

消遙散

八味逍遙散

黑逍遙散

藿香正氣散

藿薤湯

六和湯

三解湯

清脾飲

薑茶飲

梅蜜飲

痛瀉方

甘草黑豆湯

成方切用

正柴胡飲

柴陳煎

柴芩煎

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

歸柴飲

盧根湯

目錄

二 和解門 卷十

陰陽水

栝樓薤白白酒湯 見治氣門

半夏瀉心湯 見瀉火門

甘草瀉心湯 見瀉火門

生薑瀉心湯 見瀉火門

成方切用

目錄

三 和解門 卷十

和解門

凡病兼虛者補而和之兼滯者行而和之兼寒者溫而和之兼熱者涼而和之和之爲義廣矣亦猶土兼四氣其於補瀉溫涼之用無所不及務在調平元氣不失中和之爲貴也故凡陰虛於下而精血虧損者忌利小水如四苓通草之屬是也陰虛於上而肺熱乾欬者忌用辛燥如半夏蒼朮砂仁香附芎歸白朮之屬是也陽虛於下忌沉寒如黃連陳皮砂仁木通之屬是也大便泄瀉忌滑利如天冬從蓉知母梔子木通之屬是也大便泄瀉忌滑利如天冬從蓉牛膝當歸柴胡童便之屬是也表邪未解忌收斂如五味藥杏仁地榆文蛤之屬是也氣滯者忌塞閉如黃耆白朮山藥甘草之屬是也凡邪火在上者不宜升火得升而愈熾矣沉寒在下者不宜降陰被降而愈亡矣諸動者不宜再動如火動者忌溫暖血動者忌辛香汗動者忌疏散神動者忌耗傷凡性味之不靜者皆所當慎其於剛暴更甚者則又在不言可知也諸靜者不宜再靜如沉微細弱者脈之靜也神昏氣怯者證之靜也肌體清寒者表之靜也口

成方切用

腹畏寒者裏之靜也凡性味之陰柔者皆所當慎其於沉寒更甚者又在不言可知也夫陽主動以動濟動火上添油也不焦爛乎陰主靜以靜益靜雪上加霜也不寂滅乎凡前所論論其畧爾而書不盡言言不盡意能因類而廣之斯知和之爲義矣

小柴胡湯

仲景

治傷寒中風少陽證往來寒熱

寒爲陰熱爲陽裏爲陰表爲陽客於半表半裏陰出與

陽爭陰勝則寒陽入與陰爭陽勝則熱又曰太陽行身之後  
屬膀胱寒水爲表陽明行身之前屬胃燥金爲表之裏邪在  
於中近後勝膀胱寒水則寒近前陽明燥金則熱也寒熱有定  
時者爲虛無定時者爲往來寒熱以熱在表而淺邪惡正故  
惡寒寒已復熱此邪未併於胸脇痞滿心煩喜嘔牛表半裏  
表裏故寒熱微而無定時也胸脇痞滿心煩喜嘔屬足少陽  
膽脈行於兩脇手少陽三焦之脈絡心包風邪干之心氣不  
得宣暢故煩滿或攻胸脇故又痞而痛也邪在表則不煩不  
嘔在裏則煩嘔表方默默不欲食邪在表則呻吟不安在裏  
傳裏故心煩喜嘔也默默不欲食則煩而悶亂邪自表而方

傳裏故默默靜也經曰陽入之陰則靜邪在表則能食入裏則不能食今在表裏之間故但不欲食未至於不能食也

或脇下痛或腹中痛或渴或利裏虛或欬或悸小便不利裏

停耳聾口苦  
少陽膽脈絡於耳  
膽氣上溢故口苦  
肝與膽皆屬木故脈弦  
或汗後餘

熱不解及春月時嗽瘡發寒熱婦人傷寒熱入血室血室衝脉也男

女皆有之婦人傷寒七八日邪當傳裏值經水適來則邪不

人厥垂虛而入血室或經水適斷表邪乘虛而入血室熱與血搏結而不行致有寒熱如瘧暮則譫語如見鬼狀在男子

則下血。謦語皆爲熱入血室。婦人傷寒與男子無異。惟熱入

血室受傷寒熱不同也小柴胡在經主氣在臟主血故更

行氣夫血婦也如婦人經病先柴胡以行經亦治易寒五六

之表夫四物以行經之裏亦先氣而後血也

日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便秘脈細者爲

陽微結仲景曰汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗入頭

小柴胡湯 二 和解門

有汗故知非少陰也按二陰脈皆至頸胸中而還不上膺頭

程郊倩曰熱雖結而不甚也以有微惡寒之半表在至於脈

皆陽熱鬱結之證無關少陰也可見陽氣一結不但腸證以

陰陽脈亦似陰矣經曰傷寒中風有柴胡證但見一證便是

證仍在者復與柴胡湯必蒸蒸而脹發熱汗出而愈或溼熱

在半表半裏而發黃者仍與小柴胡湯雖雜證不能外也

柴胡半 黃芩 人參 甘草 生薑三 半夏半 大棗十二

水一斗二升煮六升去渣再煎取三升溫服一升日三服喻

言曰少陽經用藥有汗吐下三禁故但取小柴胡湯以抑之

然一方之中柴胡欲出表黃芩欲入裏半夏欲祛痰紛紜而

其不至於僨事爾又和非和於表亦非和於裏乃和於中也

是必煎至最熟令藥氣併停胃中少頃隨胃氣以敷布表裏

而表裏之邪不覺潛消黜奪所以方中既用人參甘草復加生薑大棗不厭其複全藉胃中天真之氣爲斡旋所謂大力

者負之而走爾試卽以仲景印仲景三黃附子湯中以其人

子 52—591

陽邪入陰而熱熾非三黃不能除熱其人復真陽內微而陰盛非附子不能回陽然必各煎後乃得以各行其事而復煎以共行其事之

義不亦彰彰乎 嘔逆加生薑以散逆陳皮以理氣 煩而不嘔去半夏人參加栝蒌以蕩鬱熱 渴者去半夏加花粉以生津 若不渴外有微熱去參加桂枝以解肌覆取微汗

欬嗽去參棗生薑加五味以斂肺乾薑以散寒 效為氣逆 禮曰少陽有嗽無喘有喘非少陽也 齒燥無津 屬陽加石膏以清胃止渴 虛煩加竹葉以涼心糯米以和胃 痰熱

加瓜蒌貝母 腹痛去黃芩 以其加芍藥 合甘草 脇下痞 鞭去大棗 人滿加牡蠣 鹹能 脇下痛加青皮芍藥 膽為肝

痛屬肝火 心下悸 經曰太陽證飲水多心 小便不利 水畜 二藥平肝 心下悸 經曰太陽證飲水多心 小便不利 水畜

成方切用 小柴胡湯 三和 解十 去黃芩 苦反 加茯苓 淡能 本經頭痛加川芎 入肝活血 發

黃加茵陳以利溼 膽為清淨之腑無出入其經在半表半裏不可汗吐下法

宜和解 仲景曰少陽中風耳聾目赤胸滿而煩不可吐下吐

氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚又曰傷寒脈弦

細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗之則譫語釋曰汗之亡津

液少陽之邪因邪入本經乃由表而將至裏當微熱發表迎

而奪之勿令傳太陰柴胡味苦微寒少陽主藥以升陽達表

為君黃芩苦寒以降陰退熱為臣 陽乘於陰則發熱用柴胡

不熱陰乘於陽則發寒用黃芩降陰氣使不上入陽中則不

寒又曰柴胡黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛溫以退寒

人參大棗甘草之 半夏辛溫能健脾和胃以散逆氣而止嘔

人參甘草以輔正氣而和中使邪不得復傳入裏為佐邪在

半表半裏則營衛爭 表屬衛 故用薑棗之辛甘以和營衛為

使也 陶節菴曰本經證心下飽悶未經下者非結胸也乃表

不效就邪傳至胸中未入於腑尚為在表只須小柴胡加枳桔

珍曰少陽證雖在半表半裏而胸膈痞滿實兼心脾上焦之

邪心煩喜嘔雖在半表半裏而胸膈痞滿實兼心脾上焦之

治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也喻嘉言曰傷寒分表裏

中三治表裏之邪俱盛則從中而和之於人參甘草半夏生

薑大棗助脾之升者帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入

胃中聽胃氣之升者帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入

可曰小柴胡湯為邪傳少陽恰在半表半裏和解之主方又

能散諸經血凝氣聚故凡邪之表裏混雜者俱藉之以提出

少陽俾循經而散以柴甘生薑為定藥餘則加減隨證爾吳

綬曰小柴胡為半表半裏之劑太陽經之表熱陽明經之標

熱皆不能解也若夫陽氣虛寒面赤發熱脈沉足冷者服之

立見危殆及內有虛寒大便不實婦人新產發熱皆不可用

成方切用 小柴胡湯 四和 解十

也李士材曰今人治傷寒不分陰陽表裏藥用此方去參投

之以為平穩殺人多矣不獨峻劑也喻嘉言曰虛勞發熱熱

者乃衛虛則惡寒營虛則發熱爾緩調營衛伸不亢戰寒熱

自止若誤用小柴胡俾汗多而衛傷於外便瀉而營傷於內

虛益甚矣

去半夏加花粉名柴胡去半夏加栝蒌根湯 治往來寒熱

而渴及勞瘵 喻嘉言曰此仲景治少陽病全體大用之一方

小柴胡湯乃傷寒少陽經天然不易之法湯者去半夏加栝

蒌實亦天然不易之法而施之於少陽邪傳陽明傷耗津液

之證亦為天然不易之法蓋渴雖陽明津竭而所以致陽明

津竭者全太少陽之邪觀內經刺法渴者取之少陽非以其

木火之熱切奪胃津而然耶故瘵邪進退於少陽即以此方

進退而施其巧柴胡黃芩對治木火人參甘草扶助胃土枯

萎生津潤燥薑棗發越營衛若勞瘵之病其木火盛去半夏

營衛衰津液竭所不待言故并可施此方以治之也 去半夏

人參薑棗加桂枝乾薑花粉牡蠣名柴胡桂枝乾薑湯 景仲治



傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而

不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也

陽所以誤下而胸脇微結也太陽中篇結胸條內頭微汗出

用大陷胸湯以其熱結在裏故從下奪之法也此頭汗出而

胸微結用柴胡桂枝乾薑湯以裏證未具故從和解之法也

小柴胡方中減半夏人參而加枳實以行太陽加乾薑以散

滿結一皆從本例也亦治瘧發寒多微有熱或但寒不

熱服一劑如神喻嘉言曰此瘧之寒多熱少或但寒不熱非

止附一方且云服一劑如神其邪之輕而淺從可識矣蓋

以衛氣在外營血在內胸中之陽氣散行於分肉之間今以

邪氣痺之則外營血在內胸中之陽氣散行於分肉之間今以

痰結而不散遇衛氣行陽二十五度而病發其邪之入營者

既無外出之勢而營之素痺者亦不出而與陽爭所以多寒

少熱或但有寒無熱也小柴胡湯本陰陽兩停之方可隨進

邪之進退以為進退者加桂枝乾薑則進而從陽瘧瘧之邪

可以開矣更加牡蠣以乘其堅壁則陰陽豁然貫通而大汗

成方切用 小柴胡湯 五 卷和解門

解矣所以服一劑如神也其加 合桂枝湯名柴胡桂枝湯

治傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證

未去者 喻嘉言曰心下支結者邪結於心下之偏旁不中正

宜經傳已過乃發熱微惡寒肢節煩疼微嘔其邪尚在太陽

之界未入於裏雖心下支結而外證未除則不可用大陷胸

湯以大陷胸湯主裏而不主表也亦不可用小陷胸湯以

陷胸湯主飲而不主表也夫支結之邪其在外者方盛其陷

入者原少故但合用柴胡桂枝和解二 除黃芩甘草加桂枝

法以治其表邪去而支結自開矣 除黃芩甘草加桂枝

茯苓龍骨牡蠣鉛丹大黃名柴胡加龍骨牡蠣湯 治傷寒

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側

中胸中既滿則腹中之氣不能因布而使道絕使道絕則

主孤危所以心驚而神亂也煩與譫語本屬胃此則兼心小

便不利本屬津液內竭此則兼小腸火燭一身盡重不可轉

側者又神明內亂治節不行百骸無主之明徵也夫邪方在

表裏其患已及神明於此而補天浴日寧復尋常表裏所

故用人參茯苓之補以益心虛鉛丹之重以鎮心驚龍骨牡

蠣之功後人不察謂是總三陽而和之之法豈其然哉○按傷

寒雖云傳足不傳手其實原無界限此證于少陰心主為邪

所逼神明內亂因致譫語無倫較他證證于少陰心主為邪

去懸絕若復以治足經之法治之必無幸矣方中藥止九味

用入心藥五種不以治足經之法治之必無幸矣方中藥止九味

城震動勢必悉力入援非孤注可圖饒倖也至於痰飲搏

少之例用桂枝柴胡二味陽邪入陰最宜急驅者但用大黃

一味是則治傷寒與緊之虞咸落第二義止從治心諸藥之

後一案共結其局此等 去柴胡黃芩加厚朴名厚朴生薑半

手服豈凡近可識耶 夏甘草人參湯 治發汗後腹脹滿者

夏甘草人參湯 治發汗後腹脹滿者 喻嘉言曰吐後腹脹

成方切用 小柴胡湯 芍藥甘草湯 六 卷和解門

以邪氣乘虛入裏為實也若發汗後外已解而復脹滿知非

裏實之證由脾胃氣虛虛津液搏結陰氣內動壅而為滿也故

以益胃和脾降 除半夏加當歸白芍大黃名柴胡飲子 治

肌熱蒸熱積熱汗後餘熱脈洪實弦數 表為肌熱裏為積熱亦治

瘧疾 喻嘉言曰於和法中 加桔梗名柴胡桔梗湯治春嗽合

平胃散名柴平湯治溼瘧身痛身重加青黛薑汁和丸名青

鎮丸 治嘔吐脈弦頭痛及熱嗽本方一分加四物二分名

柴胡四物湯治婦人日久虛勞微有寒熱本方與四物各半

名調經湯以前胡易柴胡名小前胡湯 崔氏去風痰 加陳皮

芍藥名柴胡雙解散 芍藥甘草湯

治腹中不和而痛此陰陽氣血不和肝木乘脾而然○腹痛有蟲寒痛者病無增減或兼吐利熱痛者時痛時止腹滿

血有蟲寒痛者病無增減或兼吐利熱痛者時痛時止腹滿堅結實痛者痛甚脹滿手不可按虛痛者按之即止食痛者痛甚則利後痛減死血痛者痛有常處淫痰痛者脈滑痰氣阻礙不得升降蟲痛者時作時止面唇紅大抵胃脘下大腹痛者多屬食積外邪繞臍痛者屬仲景用治誤表發厥痰火積熱臍下少腹痛者屬寒或瘀血

腳攣吐逆與甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫者更作此湯

以和其陰其腳即伸酸甘相合用補陰血

白芍藥 甘草各四兩 脈緩傷水加桂枝生薑脈洪傷金加

黃耆大棗脈瀉傷血加當歸脈弦傷氣再加芍藥脈遲傷火

加乾薑

氣血不和故腹痛白芍酸收而苦泄能行營氣炙甘草溫散而

成方切用

芍藥甘草湯 黃芩湯

七 和解門

甘緩能和逆氣又痛為木盛尅土諸痛皆屬肝木 白芍能瀉肝甘草

能緩肝而和脾也王海藏曰稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙方也

加白朮名白朮芍藥湯機要治脾溼水瀉身重困弱保命集曰或暴下者皆太陰受病故不可離芍藥人不受溼則不利故須白朮

黃芩湯仲景

治太陽少陽合病自下利者

合病者謂有太陽證之身熱頭痛嘔而口苦寒熱往來也自利者不因攻下而泄瀉也

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十二枚

太陽陽明合病下利為在表與葛根湯以汗之少陽陽明合

病下利為陽邪入裏與承氣湯以下之此太陽少陽合病下

利為在半表半裏與黃芩湯以和解之仲景之書一字不苟此證單言下利故此方亦單治下痢機要用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯潔古因之加木香檳榔大黃黃連歸尾官桂更名芍藥湯治下痢仲景此方遂為

治瀉痢之祖方矣

加半夏升二兩 生薑二兩 黃芩加半夏生薑湯仲景治前證兼嘔者

嘔胃氣逆也加半夏生薑以散逆氣千金曰生薑嘔家聖藥是散其逆氣也金匱云嘔家用半夏以治其水水去則嘔止是下其

痰飲也亦治膽腑發欬嘔苦水如膽汁膽氣逆則嘔苦除大

棗名黃芩芍藥湯機要治熱痢腹痛後重身熱膿血稠黏及火

升鼻衄不止脈洪數

外臺黃芩湯黃芩人參乾薑各三兩 桂枝一兩 大棗十二枚 半夏半

治乾嘔下利

成方切用

黃芩湯 黃連湯

八 和解門

黃連湯仲景

治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而腹痛成氏曰溼家下以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐宜與此湯以升降陰陽

黃連炒 乾薑炒 桂枝三兩 人參二兩 半夏半 大棗十二枚

黃連苦寒泄熱以降陽薑桂辛溫除寒以升陰人參助正祛

邪半夏和胃止嘔甘草大棗調中止痛上中二焦寒熱交戰

故以此和解之喻嘉言曰溼家下之舌上如胎者丹田有熱表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之

連湯以桂枝代柴胡以黃連代黃芩以乾薑代生薑飲入胃

中聽胃氣之上下敷布故不問下寒上熱上寒下熱皆可治

之也夫表裏之邪則用柴芩用生薑之辛以散之上下之邪則用桂連用乾薑之辣以開之仲景聖法灼然矣

溫膽湯集驗

治膽虛痰熱不眠虛煩驚悸口苦嘔涎膽熱則口苦膽虛氣鬱致脾生痰涎而煩

嘔傷寒病後多有此證

半夏製茯苓或用陳皮去枳實炒竹筍加薑煎或

加棗局方無茯苓如心虛加人參棗仁心內煩熱加黃連麥

冬口燥舌乾去半夏以其行加麥冬五味花粉表熱未清加

柴胡內虛大便自利去枳實加白朮內實心煩加黑梔子

橘半生薑之辛溫以之導痰止嘔即以此之溫膽戴氏云痰在膽經神不守

舍亦令人不寐枳實破滯茯苓滲淫甘草和中竹筍開胃土之鬱清

成方切用

溫膽湯 越鞠丸

九 卷和十

肺金之燥涼肺金即所以平甲木也膽為甲木金能平木如是則不寒

不燥而膽常溫矣經又云胃不和則臥不安又曰陽氣滿不

得入於陰陰氣虛故目不得瞑半夏能和胃而通陰陽故內

經用治不眠二陳非特溫膽亦以和胃也三因云心虛膽怯

搏變生諸證觸事易驚或夢寐不祥或短氣悸乏或自汗並

溫膽湯主之嘔則以人參代竹筍經曰諸水病者故不得臥

則效甚

越鞠丸丹溪

加人參棗仁遠志熟地各十味溫膽湯治夢遺驚惕

統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消六鬱者氣鬱血鬱

鬱也六者之中以氣為主氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由於痰

火飲食不消由氣不運行丹溪曰氣升則鬱自降滑伯仁曰

鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降當變

化者不得變化所以傳化失常而病見矣氣鬱者胸膈痛滯

鬱者周身痛或關節痛遇陰寒即發痰鬱者動則氣喘脈沉

滑熱鬱者昏瞶便赤脈沉數血鬱者四肢無力能食食鬱者

噎酸腹飽不能食

香附醋蒼朮炒撫芎神麴梔子炒等分麴糊丸如

溼鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加南星半夏枯蘘海石

血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查砂仁

痰寒少加吳茱萸

吳鶴皋曰越鞠者發越鞠鬱之謂也香附開氣鬱蒼朮燥溼

鬱撫芎調血鬱梔子解火鬱神麴消食鬱陳來章曰皆理氣

也氣暢而鬱舒矣脾胃為水穀之海五臟六腑之主四臟一

成方切用 越鞠丸 逍遙散

藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蒼朮

辛烈雄壯固胃強脾能徑入諸經疏泄陽明之溼通行數滯

香附陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫芎

足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海為通陰陽氣血之

使不但開中焦而已胃主行氣於三陽脾主行氣於三陰脾

胃既布水穀之氣得行則陰陽臟腑皆由胃氣而得通利矣

逍遙散 局方

治血虛肝燥骨蒸勞熱潮熱欬嗽有乾欬嗽者丹溪曰極為

鬱其火邪在中用逍遙散以 往來寒熱口乾便溼月經不調

凡肝膽兩經鬱火以致脇痛頭眩或胃脘當心而痛或肩髀

絆痛或時眼赤痛連及太陽婦人鬱怒傷肝致血妄行赤白

淫閉沙淋崩漏等證俱宜此方加減治之易曰風以散之是

當歸 酒炒 白芍 酒炒 白朮 土炒 柴胡 茯苓 甘草 炙 五 加煨

薑薄荷煎

肝虛則血病當歸芍藥養血而斂陰木盛則土衰甘草白朮

和中而補土 補土生金 柴胡升陽散熱合芍藥以平肝而使

木得條達 為補取疏通之義 茯苓清熱利溼助甘朮以益土

而令心氣安寧 茯苓能煨薑煖胃祛痰調中解鬱薄荷搜肝

瀉肺理血消風疏逆和中諸證自已所以有逍遙之名 醫貫

鬱曰東方先生木者生生之氣即火氣也火附木中木鬱

則火亦鬱矣火鬱則土自鬱土鬱則金鬱金鬱則水鬱五行

相因自然之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆愈逍遙散是

也方中柴胡薄荷二味最妙蓋難乃甲木少陽之氣其氣柔

嫩象草穿地而未伸此時若被寒風一鬱即轉為燥風遇抑不能

上伸不上伸則下尅脾土而金水併病矣惟得溫風一吹鬱

成方切用 逍遙散 土 和 解 門

氣始得暢達也蓋木喜風搖寒則摧萎溫則發生柴胡薄荷

辛能發散溫能入少陽古人立方之妙如此其甚者方中加

吳茱炒連即左金丸黃連清心火吳茱氣燥肝氣亦燥同氣

相求以平肝木平則不生心火不刑金而金能制木木不

直伐木而左金以制木此左金所以得名也此法之巧者然

遙散風以散之也地黃加胡芍藥以滋腎水俾能生木道

此法一立木火之鬱既舒木不下尅土土亦得滋潤無燥燥

之患金水自能相生子謂一法可通五法者如此推而廣之

凡寒熱往來惡寒惡熱嘔吐吞酸噎膈胸膈痛小腹痛脹

頭運益汗黃疸瘧疾瘧疾瘧疾瘧疾瘧疾瘧疾瘧疾瘧疾

傷風傷濕除直中寒外凡外感者皆作鬱看以逍遙散加減出

入無不獲效如小柴胡湯因逆散復活湯大同小異然不若

此方之響應也僅一服即愈少頃復發者用溫補之劑如陽虛

下寒上熱之假證此湯不可復投當改用溫補之劑如陽虛

以四君子湯加溫熱藥陰虛以六味湯加溫熱藥元陽之土

不須子贅矣又曰子以冬月正傷寒麻黃桂枝證作寒鬱治

為熱不知即是本身之火為寒所鬱一步返歸一步久則純

熱矣三黃解毒解其火也葛根升麻火鬱發之也三承氣土

黃桂枝之必小柴胡木鬱達之也此理甚簡易守其真謂用

氏謂九味羌活散可代三方皆非也不若逍遙散真可一方

滋其水以柴胡舒其木活人多矣

加丹皮山梔名八味逍遙散 薛 治怒氣傷肝血少目暗 肝

經曰目得血而能視肝傷血少則目昏丹皮能瀉血中伏火

梔子能瀉三焦鬱火故薛氏加之以抑肝氣兼以調經也醫

貫曰古方逍遙散柴胡薄荷當歸芍藥陳皮甘草白朮茯苓

其加味者則丹皮山梔子余以山梔屈曲下行泄水改用吳茱

黃妙黃連○按以加味逍遙散六味丸治鬱自薛長洲始也

然長洲之法實得之丹溪越鞠之芍藥即逍遙之歸芍也越

鞠之蒼朮即逍遙之白朮也越鞠之神麴即逍遙之陳皮也

越鞠之香附即逍遙之柴胡也越鞠之梔子即逍遙之加味

也但越鞠峻而逍遙和矣越鞠燥而逍遙潤矣此則青

出於藍後全居上亦從古作述之大凡如東垣之補中益氣

謂枳朮萬全無弊矣然豈可 加熟地名黑逍遙散

成方切用 藿香正氣散 藿香正氣散 主 和 解 門

治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔逆胸膈滿悶欬嗽

氣喘及傷冷傷溼瘧疾中暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣

者並宜增減用之 元氣虛弱 人慎用

藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 三 白朮 土 陳皮 半

夏麴 厚朴 薑 桔梗 二 甘草 兩 每服五錢加薑棗煎一方

加木瓜 氣脫能收 傷食重者加消食藥

藿香辛溫理氣和中辟惡止嘔兼治表裏為君蘇芷桔梗散

寒利膈佐之以發表邪厚朴大腹行水消滿橘皮半夏散逆

除痰佐之以疏裏滯苓朮甘草益脾去溼以輔正氣為臣使

也正氣通暢則邪逆自除矣吳綬曰若太陽傷寒頭痛發熱用之雖汗出亦不解變成壞證者多矣凡傷寒發熱脈沉元氣虛人并夾陰傷寒發熱者皆不可用戴元禮曰肥人多中氣盛於外而軟於內也肺為氣出入之道人肥者必氣急氣急必肺邪盛肺金剋肝木膽為肝之腑故痰涎壅盛治之必先理氣中後氣未盡順痰未盡降調理之劑當以藿香正氣散和星香散服此藥非特治中風之證中氣中惡霍亂尤宜合三味香薷飲名藿薷湯治伏暑吐瀉轉筋

六和湯局方

治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑氣寒熱交作霍亂吐瀉及伏暑煩悶倦怠嗜臥口渴便赤中酒等證

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 藟豆 木瓜 人參

白朮 赤茯苓 甘草 加薑棗煎傷暑加香薷傷冷加

成方切用

六和湯 三解湯

卷十

紫蘇一方無白朮一方有蒼朮

藿香砂仁杏仁厚朴香能舒脾辛能行氣而砂仁厚朴兼能

化食木瓜酸能平肝舒筋助肺金以平肝邪故治霍亂轉筋

藟豆赤茯苓能滲溼清熱而藟豆又能散暑和脾半夏辛溫

散逆而止嘔參朮甘溫補正以匡邪甘草補中協和諸藥薑

棗發散而調營衛皆所以和之也吳鶴皋曰六和者和六腑也脾胃為六腑之總司先

調脾胃則水精四布五經

三解湯

治時行瘧之通劑

喻嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪伏於

陰勝則寒入與陰爭陽勝則熱即純熱無寒為瘧瘧溫瘧純寒無熱為瘧瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救弊亦必還

返少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脈縱緩遲而弦之一字實貫徹之也

柴胡 麻黃去澤瀉各三錢

瘧邪藏於分肉之間邪正分爭併於表則在表併於裏則在

裏未有所併則在半表半裏麻黃之辛能散表邪由汗而泄

澤瀉之鹹能引裏邪由溺而泄柴胡升陽退熱居表裏之間

而和解之此但可以治實瘧虛者當辨其氣血晝發屬氣而夜發屬血

加補劑

清脾飲嚴用和

治瘧瘧脈弦數但熱不寒或熱多寒少脘滿不食口苦舌乾

成方切用

清脾飲

卷十

煩渴小便赤澀大便不利

青皮 厚朴醋炒 柴胡 黃芩炒 半夏薑製 茯苓 白朮土炒 甘草

炙草果 薑引一方加檳榔大渴加麥冬知母瘧不止加酒

炒常山一烏梅二箇常山板痰截瘧烏梅斂陰清熱

瘧為肝膽之邪然多因脾胃受傷而起脾屬溼土重感於暑

溼故見前證也脾既受病木又尅之故用青皮柴胡以破滯

而伐肝半夏厚朴以行痰而平胃古云無痰不作瘧 茯苓用以滲溼

黃芩用以清熱草果辛熱能散太陰之積寒除痰而截瘧清能

膏粱蓋先去其害脾者而以白朮甘草調而補之也此即小

加減從溫脾諸方而一變也張子和曰世醫以瘧為脾寒甚

納涼深浴寒客肌肉之間或饑飽勞役內傷而病作肌肉屬脾發則惡寒戰慄乃謂之脾寒兩實由風寒淫喝邪鬱厥理夏時毛竅疏通而不為病至秋收斂之際表邪不能發越故進退不已往來寒熱勢如凌虛人之狀所以名瘧者多兼兼理內傷取效由脾胃和精氣通陰陽和解諸邪悉散實非脾病也世用發表解肌溫經散寒等法亦未嘗執於燥脾却劑也吳鶴皋曰清脾非清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之一清也劉宗厚因草果之辛熱而議焉是未達嚴氏之清矣高鼓峯曰治瘧多方俱不得要惟此方為中正子每用此加減無不愈者蓋瘧發寒熱原屬少陽半表半裏故必以小柴胡為君青皮以解脈之弦數厚朴以寬胃中之積滯草果以化痰消壅蒼朮以實脾土此二味乃補正之義緣瘧固由外感然必內傷而後外感起焉此東垣之微旨也嚴氏立方最為的當但竟由飲食起者子每以蒼朮易白朮加陳皮以合平胃之意熱多寒少者稍加黃連滑石寒多熱少者稍加前胡以發其鬱熱無不應手而驗能審此而消息之何至遷延久病困苦天下人哉若誤服湯藥病久者不可執此為不易之法是在學者神而明之爾如服寒藥而致胃傷者須以人參養胃湯養之服熱藥多者仍以小柴胡湯多加黃連丹皮生地以解之久而虛者補中益氣以救之發於夜者益母草飲

成方切用

薑茶飲 痛瀉要方

五

和解門

以濟之用法雖殊然小柴胡之旨不可脫也○益母草飲一名香紅飲

薑茶飲

治赤白痢及寒熱瘧

生薑 陳細茶 每味三錢濃煎

茶助陰薑助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒此方用之屢效勿以平淺而忽之也

除生薑加陳白梅蜜水煎名梅蜜飲治熱痢除茶加木香肉

蔻治冷痢

蜜最能治痢

痛瀉要方

劉草憲

治痛瀉不止

脾虛故瀉肝實故痛吳鶴皋曰此與傷食不同傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不止故責之土

敗木賊也○戴氏曰水瀉而腹不痛者溼也痛甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或少者痰也

白朮

三兩 白芍 二兩 陳皮 半 防風 兩

或煎或丸久瀉加

升麻

白朮苦燥溼甘補脾溫和中芍藥寒瀉肝火酸斂逆氣緩中

止痛防風辛能散肝香能舒脾風能勝溼為理脾引經要藥

東垣曰若補脾胃陳皮辛能利氣炒香尤能燥溼醒脾使氣

行則痛止皆以瀉木而益土也

甘草黑豆湯

解百藥毒兼治筋疝

莖中掣痛挺脹不堪由用春方邪

成方切用

甘草 黑豆湯 正柴胡飲

大

和解門

甘草 兩 黑豆 半

蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

若治筋疝當用甘草梢以梢能徑達莖中也

加大黃名大黃甘草湯治上中下三焦消渴

正柴胡飲

景岳

凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛痠瘧初起等證氣血和平宜從平散者

柴胡

三錢 防風 錢 陳皮 半 芍藥 二錢 甘草 一錢 生薑 三五片

如熱

而兼渴者加乾葛一二錢 如嘔惡者加半夏錢半 如溼

勝者加蒼朮一錢 如胸腹有微滿者加厚朴一錢 如寒

氣勝而邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫或蘇葉亦可  
柴陳煎 景岳

治傷風兼寒欬發熱痞滿多痰

柴胡三錢 陳皮錢五 半夏錢二 甘草錢一 生薑七片 如寒勝者

加細辛七八分 如風勝氣滯者加蘇葉錢半 如冬月寒

甚者加麻黃錢半 氣逆多嗽者加杏仁一錢 痞滿氣滯

加白芥子五七分

柴苓煎

治傷寒表邪未解內外俱熱瀉痢煩渴喜冷氣壯脈滑數者

宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表邪發黃等證

成方切用

柴陳煎 柴苓煎 一柴胡飲 七 和解門 卷十

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 木通 枳殼 如瘧痢並行

鮮血純血者加芍藥二錢甘草一錢 如溼勝氣陷者加防

風一錢

一柴胡飲 景岳

一為水數從寒散也 凡感四時不正之氣或為發熱或為

寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因冒風寒

以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者須從涼散宜此

主之

柴胡三錢 黃芩錢半 芍藥錢二 生地 陳皮錢半 甘草八分 如內熱

盛者加連翹一二錢 如外邪盛者加防風一錢 如邪結

在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢 如熱在陽明而兼  
渴者加花粉或葛根一二錢甚者加知母石膏亦可

二柴胡飲

二為火數從溫散也 凡遇四時外感或其人元氣充實臟

氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等證者皆不宜妄

用涼藥以致寒邪不散則為害匪淺宜此主之

陳皮錢半 半夏 細辛 厚朴錢一 甘草八分 柴胡錢半 或生薑

三五 如邪盛者可加羌活防風白芷紫蘇之屬擇而用之

如頭痛不止者加川芎一二錢 如多溼者加蒼朮 如

陰寒氣勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

成方切用

二柴胡飲 三柴胡飲 四柴胡飲 六 和解門 卷十

三柴胡飲 景岳

三為木數從肝經血分也 凡素稟陰分不足肝經血少而

偶遇風寒或感邪不深可兼補而散者或病後或產後感冒

有不得不從解散而陰氣虛弱不能外達者宜此

柴胡三錢 芍藥錢半 甘草錢一 陳皮錢一 當歸二錢 瀉泄者 生薑三

片 如微寒欬嘔者加半夏

四柴胡飲 景岳

四為金數從氣分也 凡元氣不足或忍饑勞倦而外感風

寒或六脈緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解

散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧根本未有不元氣



先敗者察之慎之

柴胡一二錢人參隨宜炙甘草一錢當歸二三錢薄荷三五錢生薑三五片如

胸膈滯悶者加陳皮二錢

五柴胡飲 景岳

五爲土數從脾胃也 脾土爲五臟之本凡中氣不足而外

邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲

止調氣分此則兼培血氣以逐外邪尤切於時用者也神效

不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

芍藥炒白朮當歸柴胡一二錢熟地三五錢炙甘草一錢陳

皮酌用或寒勝無火者減芍藥加生薑三五七片或炮薑

成方切用 五柴胡飲 歸柴飲 蘆根湯 五和 解門

一二錢或加桂枝二錢則更妙 脾滯者減白朮 氣虛者

加人參隨宜勞倦傷脾下陷者加升麻一錢

歸柴飲 景岳

治營虛不能作汗凡真陰不足外感寒邪難解者此神方也

當歸一錢柴胡五錢炙甘草八分或加生薑三五七片或加陳皮

一錢或加人參大便多溏者以冬朮代當歸亦佳

蘆根湯 千金

治傷寒病後嘔噦不下食

蘆根升竹筴升生薑二兩粳米二合

蘆根甘寒降伏火利小水竹筴甘寒除胃熱清燥金生薑辛

溫祛寒飲散逆氣三者皆能和胃胃和則嘔止加粳米者亦

藉以調中州也

陰陽水 又名生熟水

治霍亂吐瀉有神功 藥中治霍亂者最多然有寒熱二證萬

切勿輕投偏熱偏寒之劑惟飲陰陽水爲最穩 ○張子和曰

霍亂吐瀉乃風淫腸三氣合邪也淫土爲風木所剋則生

熱心火上炎故吐也者腸也脾淫下注故瀉也瀉者淫也風急

甚則轉筋轉筋者風也又邪在上焦則吐在下焦則瀉在中

焦交作 百沸湯 新汲井水 各半和服

陰陽不分而擾亂故上吐下瀉而霍亂飲此輒定者分理其

成方切用 陰陽水

陰陽使和平也 五和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門

子 和 解門



成方切用卷十一目錄

表裏門 正方一十四 附方六

大柴胡湯

大前胡湯

柴胡加芒硝湯

葛根黃連黃芩湯

桂枝加大黃湯

防風通聖散

雙解散

祛風至寶丹

五積散

成方切用

目錄

一 表裏門 卷十一

五積交加散

參蘇飲

茯苓補心湯

芎蘇飲

香蘇飲

三黃石膏湯

麻黃白朮湯

冰解散

茵陳丸

柴苓飲

四逆散

成方切用卷十一

表裏門

病在表者宜汗宜散病在裏者宜攻宜清至於表裏未除兼證又急者仲景復立大柴胡葛根黃芩等法合表裏而數方以爲準則學者其引而伸之比例而善用之則得矣

大柴胡湯

仲景

治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏熱結在裏

少陽陽明三陰亦有轉入陽明者如太陰有桂枝加大黃湯少陰有三承氣厥陰一小承氣皆兼陽明證也

痞鞭嘔而下利

張兼善曰裏虛者雖便難而勿攻裏熱者雖下利而不可下

故下之則愈又曰傷寒下之早因作痞者裏虛協熱而利也

因表裏不解故用桂枝人參湯解表而裏若傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利或往來寒熱煩渴譫妄腹滿便者此爲實故以大柴胡下之

成方切用

大柴胡湯

一 表裏門 卷十一

祕表證未除裏證又急脈洪陽明或沉實弦數者

爲邪在少陽

柴胡八兩半夏半升黃芩芍藥三兩生薑五兩大棗十二枚枳實四兩

黃二兩酒浸

表證未除故用柴胡以解表裏證又急故用大黃枳實以攻裏芍藥安脾斂陰

能瀉肝火使木不尅土黃芩退熱解渴半夏和胃止嘔薑辛散而棗甘緩以調營衛而行津液此表裏交治下劑之緩者也

陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須石熱氣淺深用藥三焦則有燥實堅三證宜調胃承氣湯加甘草和中去枳朴者

恐傷上焦氣虛之氣也邪在上焦則痞而實宜小承氣湯去芒硝者恐傷下焦氣陰也若表證未除裏證又急不得不下者則用大柴胡湯通表裏而緩治之大承氣最緊小承氣次

之謂胃承氣又次之大柴胡又次之蓋恐有微邪不  
用周揚俊曰仲景於太陽人膀胱腑證則有五苓散少陽  
陽明腑證則有大柴胡  
湯皆表裏兩解之法也

以前胡易柴胡名大前胡湯崔氏取其清降而治風痰

柴胡加芒硝湯仲景

治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡潮熱已而微利此本

柴胡證知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴

胡湯以解外後以加芒硝湯主之傷寒十三日為再經已盡也胸滿而日晡潮熱陽明也邪氣猶在表裏之間

小柴胡湯見和加芒硝六兩

表證誤下邪熱乘虛入胃以致下痢而滿嘔潮熱之證猶在

成方切用柴胡加芒硝湯 葛根黃連黃芩湯 卷十一 表裏門

故仍先與小柴胡湯以解外隨後以加芒硝湯以瀉胃熱亦

與大柴胡兩解同意

葛根黃連黃芩湯仲景

治太陽病桂枝證發熱頭痛

惡風自汗醫反下之利遂不止邪在表而反下之虛

其腸胃表邪乘虛入裏脈促者表未解也脈數而止曰促促

脈促知表未解喘而汗出者汗出而喘為邪氣外盛所致喘

前證仍在也而汗出為裏實氣逆所致與此

清裏熱此湯主之

葛根半甘草炙黃芩二黃連三先煮葛根內諸藥煎或加

薑棗  
表證尚在醫反誤下邪入陽明之腑其汗外越氣上奔則喘

下陷則利故舍桂枝而用葛根顯主陽明之表葛根能升陽

治瀉加芒連以清裏熱甘草以調胃氣不治利而利自止不

治喘而喘自止乃太陽陽明表裏兩解之變法也

桂枝加大黃湯仲景

治太陽誤下轉屬太陰腹滿大實痛者

桂枝湯見表加大黃兩一芍藥三兩

誤下而成結胸則邪在上仍屬太陽今腹滿而大實痛則邪

已入太陰經曰諸痛為實痛隨利減故用桂枝以解未盡之

表邪加大黃以下內陷之邪熱王海藏曰腹痛桂枝加大黃何為

只用芍藥大黃而於桂枝內加之要知從太陽來以太陽為

本也趙嗣真曰太陰腹痛有三有次第傳經之邪有直入本

成方切用桂枝加大黃湯 防風通聖散 卷十一 表裏門

經之邪有下後內陷之邪此腹滿時痛為下後內陷之邪宜

桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝加大黃湯設遇本經直入陰

邪腹痛實痛脈沉細者宜急用四物理中等以和之矣○經

又曰太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減

之以口氣弱易動故也以太陰為

寒藏其病多宜溫而不宜下也

防風通聖散河間

治一切風寒溼暑饑飽勞役內外諸邪所傷氣血怫鬱表裏

三焦俱實憎寒壯熱邪在表頭目昏運目赤睛痛風熱上攻耳鳴鼻

塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠黏咳嗽上氣大便秘結熱結

小便赤澀熱畜膀胱瘡瘍腫毒氣血折跌損傷瘀血便血腸風痔

漏手足癰癰驚狂譫妄肝風丹斑癰疹風熱在胃火

防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸 白芍

炒白朮 山梔炒 大黃酒 芒硝五 黃芩 石膏 桔梗兩 甘草兩 三 加生薑葱白煎自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加薑製半夏

防風荆芥薄荷麻黃輕浮解表使風寒從汗出而散之於上大黃芒硝破結通幽梔子滑石降火利水使風熱從便出而泄之於下風淫於內肺胃受邪桔梗石膏清肺瀉胃風之爲患肝木受之川芎歸芍和血補肝黃芩清中生之火連翹散氣聚血凝甘草緩峻而和六一重用甘草滑石亦猶白朮健脾而燥溼上下分消表裏交治而於散瀉之中猶寓溫養之意所以汗不傷表下不傷裏也

成方切用

五積散

四

表裏門

除大黃芒硝名雙解散麻黃防風荆芥薄荷川芎以解表黃芩歸白芍以和血桔梗甘草連翹石膏消石以解裏復有草白朮以調氣故曰雙解再加人參補氣熟地益血黃蘗黃連除熱羌活獨活天麻細辛全蠍祛風蜜丸彈子大每服一丸茶酒任下名祛風至寶丹喻嘉言曰此中風門不易之方也

五積散

局方

治少陰傷寒及外感風寒內傷生冷身熱無汗頭痛身痛項背拘急胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來腳氣腫痛冷秘寒疝寒瘕惡寒無汗婦人經水不調上證皆寒淫爲病

白芷 陳皮 厚朴分六 當歸 川芎 芍藥 茯苓 桔梗 蒼朮 枳殼分七 半夏 麻黃分四 乾薑 肉桂用桂枝 甘草

三 加薑葱煎又法除桂芷枳殼陳皮餘藥慢火炒攤冷入桂芷同煎名熟料五積散用妙者助其溫散也有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳桔加人參白朮腹痛挾氣加吳茱萸胃寒加炮薑陰證傷寒肢冷虛汗加附子婦人調經加醋艾

麻黃桂枝所以解表散寒甘草芍藥所以和裏止痛蒼朮厚朴平胃土而散滿陳皮半夏行逆氣而除痰芎歸薑芷入血分而祛寒溼枳殼桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾所以爲解表溫中除溼之劑去痰消痞調經之方也王海藏曰桂枝麻黃芍藥甘草即各半湯也蒼朮陳草即平胃散也枳桔陳皮半即枳桔半夏等湯也加芍歸治血又加乾薑爲厚朴散此數藥相合爲解表溫中之劑消痞調經之方雖爲內寒外感表裏之分所製實非仲景表裏桂枝麻黃

成方切用

參蘇飲

五

表裏門

蓋附之的方也惟在活法變而通之陶節菴曰夫病不身熱頭痛初起治寒腹痛嘔吐泄瀉臥沉熱不渴脈沉遲無力人皆知爲陰證矣至於發熱面赤煩躁渴去衣被脈大八皆不識認作陽證誤投寒藥死者多矣不知陰證不分熱與不熱不論脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必須薑附溫之不取證也按傷寒有舍證取脈者又有舍脈取證者○本方能散寒積食積氣積血積痰積故名五積

合人參敗毒散名五積交加散治寒溼身體重痛腰脚痠疼

參蘇飲

元戎

治外感風寒內傷飲食發熱頭痛嘔逆欬痰寒中焦眩暈嘔煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止已汗而熱不止猶有表裏則邪自散○溢飲身重注痛者亦宜此方清利之

人參 紫蘇 乾薑 前胡 半夏黃汁 茯苓七錢 陳皮去

甘草 枳殼炒 桔梗 木香錢 每五錢加薑棗煎外感多

者去棗加葱白肺中有火去人參加杏仁桑白皮瀉肺泄瀉加

白朮 糯豆蓮肉炒燥淫

元戎云此方有風藥解表氣藥和中外感風寒內積痰飲皆

可用也合四物名茯苓補心湯尤能治虛熱及吐衄便血乃

虛實表裏兼治之劑然不可過劉宗厚曰此出少陽柴胡例

本方云前胡葛根自能解肌枳殼橘紅輩自能寬中

快膈毋以性涼為疑思觀藥性非涼亦是辛平之劑

去人參加川芎前胡易柴胡薑棗煎名芍蘇飲治傷風寒

外有發熱頭痛惡寒內有欬嗽吐痰氣湧此因肺有實熱且

成方切用 三黃石膏湯 六 表裏門 卷十一

參而加川芎以除頭痛以柴胡易 前胡者取其升散不取其清降也

三黃石膏湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂叫欲走煩躁大渴面赤鼻乾兩目

如火身形拘急而不得汗或已經汗下過經不解三焦大熱

譫狂鼻衄身目俱黃六脈洪數及陽毒發斑陶節菴曰此因

經絡津液榮衛 不通遂成此證

生石膏兩 黃芩 黃連 黃芩錢五 梔子三十箇 麻黃去 淡豉

兩 每服一兩薑三片棗二枚細茶一撮煎熱服

表裏之邪熱俱盛故以黃芩瀉上焦之火黃連瀉中焦之火

黃芩瀉下焦之火梔子通瀉三焦之火而以麻黃淡豉發散

表邪石膏體重瀉火氣輕解肌亦表裏分消之藥也

麻黃白朮湯東垣

治大便不通小便赤澀身面俱腫色黃麻木身重如山喘促

無力吐痰唾沫發熱時躁躁已振寒項額如冰目中溜火鼻

不聞香膈有動氣少腹急痛東垣曰此宿有溼熱伏於營血

氣喘促為陰火傷氣門故發弱為腎水不足冬時寒水

得令乘其肝木尅火傷木火勝必有火復故見諸證

青皮 陳皮 黃連酒 黃芩酒 甘草 升麻二 柴胡 桂枝

人參 黃耆 蒼朮酒 白朮土 厚朴 豬苓三 澤瀉 吳

萸 茯苓四 白朮五 蒼朮五 厚朴六 升麻六 杏仁四 分

二服 成方切用 麻黃白朮湯 香蘇飲 七 表裏門 卷十一

前證蓋因表裏俱傷陽氣抑不得升故風火溼熱鬱而為病

也桂枝麻黃解表祛風升麻柴胡升陽散火黃連黃芩燥溼

清熱而黃芩又能補腎滋陰菴朴青陳利氣散滿而青柴又

能平肝菴朴又能溫胃杏仁利肺下氣神麴化滯調中吳萸

煖腎溫肝參耆甘草蒼朮白朮補脾益氣二苓澤瀉通利小

便使溼去而熱亦行方內未嘗有通大便之藥蓋清陽升則

濁陰自降矣此方蓋合四君五苓平胃散黃芩黃連解毒而為

藥俱備但皆氣藥而無血藥與五積不同

香蘇飲局方 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噯氣惡食內經

下之地春氣常在故東南卑澤之區風氣柔弱易感風寒俗稱感冒受邪膚淺之名也出鼻而入在於上部客於皮膚故無六經形證唯發熱頭痛而已胸滿噯氣惡食則兼內傷也。輕爲感冒重者爲傷又重者爲中

香附 炒 紫蘇 錢 陳皮 錢 甘草 分 加薑葱煎傷食加消導

藥欬嗽加杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風鼻塞頭昏加羌活荆芥心中卒痛加延胡索酒一杯

紫蘇疏表氣而散外寒香附行裏氣而消內壅橘紅能兼行表裏以佐之橘紅利氣能散表寒益氣行則寒散而食亦消矣甘草和中亦能解表爲使也

水解散 肘後

治天行一二日頭痛壯熱

成方切用

水解散 茵陳丸

表裏門 卷十一

麻黃 兩 桂心 甘草 炙 白芍 兩 大黃 黃芩 兩

麻黃能開腠發汗桂心能引血化汗黃芩以清上中之熱大黃以瀉中下之熱甘草白芍能調胃而和中蓋天行瘟疫鬱

熱自內達外與傷寒由表傳裏者不同故雖一二日之淺可以汗下兼行治法絕不同於傷寒也鬱熱畢竟外解爲易大黃宜減用

茵陳丸

治時氣瘴氣黃病疹瘡赤白痢等證

茵陳 梔子 鼈甲 炙 芒硝 兩 大黃 兩 常山 杏仁 兩 炒 三 巴

豆 心皮 炒 豉 合 蜜丸 梧子大每服一丸或吐或利或汗如

不應更服一丸不應則以熱湯投之老幼以意加減

梔子淡豉梔豉湯也合常山可以涌吐合杏仁可以解肌大黃芒硝承氣湯也可以瀉熱去實合茵陳可以利溼退黃名茵陳湯加巴豆大熱以去臟腑積寒加鼈甲滋陰以退血分寒熱此方備汗吐下三法故能統治諸病

柴胡飲 景岳

治風溼發黃發熱身痛脈緊表裏俱病小水不利中寒泄瀉等證

柴胡 錢 茯苓 豬苓 澤瀉 錢 白朮 錢 肉桂 錢 水

一盞半煎服 如寒邪盛者加生薑三五片 如汗出熱不退者加芍藥一二錢

成方切用

柴胡飲 四逆散

表裏門 卷十一

四逆散 仲景

治傷寒少陰證陽邪入裏四逆不溫熱結於裏或欬或悸或

或小便不利或腹中痛或泄利下重皆因熱結於裏○傷寒

至太陰則手足溫至少陰則熱邪漸深四肢逆而下溫至厥陰則手足逆冷經曰熱深厥亦深熱微厥亦微與此湯以散之熱

柴胡 芍藥 枳實 甘草 等分爲末水調飲欬加五味

子散逆 乾薑 散肺 併主下利肺與大腸相表裏上 悸加桂枝

導引 陽氣 小便不利加茯苓甘淡 腹痛加附子補虛 泄利下重加

薤白通大腸泄氣滿

經曰諸四逆者不可下故用枳實泄結熱甘草調逆氣柴胡

散陽邪芍藥收元陰以辛苦甘酸之品合表裏而交治之則陽氣敷布於四末矣

成方切用

四逆散

十

法裏門  
卷十一

成方切用卷十二目錄

祛風門 正方七十一 附方一十二

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散方

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

朮附湯

成方切用

目錄

十

祛風門  
卷十二

越婢加朮湯

小續命湯

麻黃續命湯

白虎續命湯

附子續命湯

羌活連翹續命湯

千金大續命湯

大秦朮湯

地黃飲子

天麻丸

桂枝續命湯

葛根續命湯

杜附續命湯

錄驗續命湯

稀莪丸

活絡丹

三生飲

牽正散

改容膏

獨活湯

胃風湯

東垣胃風湯

解風散

愈風丹

成方切用

目錄

清風膏

消風散

轉舌膏

正舌散

二丹丸

排風湯

涼膈散

清心散

滌痰湯

方見除痰門

稀涎散

二 祛風門  
卷十二

竹瀝湯

貝母瓜蒌散

青州白丸子

星附散

治風六合湯

方見理血門

三聖散

加味六君子湯

薏苡仁湯

人參補氣湯

烏頭粥

成方切用

目錄

桂枝五物湯

方見表散門

十味判散

通痹散

史國公藥酒方

三因白散子

獨活湯

防風通聖散

方見表裏門

祛風至寶丹

方見表裏門

獨活寄生湯

羌活續斷湯

三 祛風門  
卷十一

資壽解語湯

不換金丹

搜風順氣丸

順風勻氣散

攝生飲調蘇合丸

烏藥順氣散

八味順氣散

通頂散

瀉青丸

舒筋保安散

成方切用

目錄

加味羚羊角散

如聖飲

上中下通用痛風方

三化湯

方見攻下門

血痺湯

三痹湯

千金地黃湯

烏梅擦牙關方

許盾宗方

王克明方

四

祛風門  
卷十一

清震湯

成方切用

目錄

五

祛風門  
卷十一





治大人風引癱瘓小兒驚癇瘰癧日數十發巢氏用

大黃 乾薑 龍骨四兩 牡蠣 甘草二兩 桂枝三兩 寒水石 滑

石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏六兩 十二味杵粗

篩以葦囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸溫服一升

風邪內并則火熱內生五臟亢盛逆歸於心故以桂甘龍牡

通陽氣安心腎為君然厥陰風木與少陽相火同居火發必

風生風生必挾木勢侮其脾土故脾氣不行聚液成痰流注

四末因成癱瘓故用大黃以蕩滌風火溼熱之邪為臣隨用

乾薑之止而不行者以補之為反佐又取滑石石膏清金以

伐其木赤白石脂厚土以除其溼寒水石以助腎水之陰紫

成方切用 風引湯 三 祛風門 卷十二

石英以補心神之虛為使故大人小兒風引驚癇皆主之巢

氏用治腳氣以石性下達可勝溼熱不使攻心也嘉言曰風

陰內屬肝木上繫手經下繫足經中見少陽相火所以風自

內發者由火熱而生也風生必害中土土主四肢土病則四

末不用聚液成痰癱瘓者以風火挾痰注於四肢故也觀金

匱此方可見非退火則風不熄非填竅則風復生風火一熾

則五神無主故其用藥如是之周到也又曰侯氏黑散顧主

補虛以熄其風此方兼主清熱去溼以除其風明此以治風

之入臟者游刃有餘何後世以為石藥過多舍之不用而用

腦麝以散其真氣花蛇以增其惡毒智耶愚耶吾不解矣忠

可曰河間謂風病多因熱甚良由將息失宜而心火暴甚腎

水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣熾鬱心神昏冒筋骨

不用而卒倒無知多因喜怒悲憂恐五志過極此最確之論

謂風強則然而以漸入內者也下則出風引湯方而方名全  
主於風以風為陽邪故熱也則知從亡血來是熱能生風而  
外邪又助之也從中風來是風能生熱以滯津液而痰涎壅  
實有陽虛而外邪入之為卒倒為偏枯為筋急癱瘓者若  
諸痿全起於肺熱因而傳入五臟為昏或癱瘓皆問暴瘖皆  
屬於火為四肢不收舌本強足痿不收痰涎有聲皆屬於土  
悉是溼熱之病與中風之虛多風多寒多皆為中風之理全  
不相涉矣○觀風引藥味全是和臟腑通經絡便是治風不  
專治風也○按黑散風引二湯喻氏以為仲景聖方而程雲  
來金匱直解又曰侯氏黑散風引湯防已地黃湯頭風摩散  
磐石湯所主皆非中風歷節之證是宋人較正附入唐人  
方遂盡刪之又云仲景方書之祖復取  
侯氏方為法耶亦不過臆度之見爾

防已地黃湯 金匱

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

桂枝 防風三分 甘草一分 以酒一杯漬之一宿絞取

成方切用 防已地黃湯 頭風摩散方 四 祛風門 卷十二

汁生地黃二觔咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞

地黃汁和分再服

此亦風之進入於心者也風升必氣湧氣湧必滯涎涎滯則

流溼溼留壅火邪聚於心故以二防桂甘去其邪而以生地

最多清心火涼血熱謂如狂妄行獨語不休皆心火熾盛之

證也况無寒熱則知病不在表不在表而脈浮其為火盛血

虛無疑爾後人地黃飲子犀角地黃湯等實祖於此

頭風摩散方 金匱

大附子炮 鹽 等分為散沐了以方寸匕以摩疾上令藥力

行

頭風乃偏着之病故以附子劫之鹽漬其邪

桂枝芍藥知母湯 金匱

治諸肢節疼痛身體羸瘦如脫頭眩短氣溫溫欲吐

生薑 五兩 桂枝 二兩 白朮 四兩 知母 四兩 防風 四兩 芍藥 四兩 附子 三兩 炮麻黃 二兩

甘草 二兩 九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

此類歷節病由風溼外邪而兼脾腎俱虛之方也謂諸肢節疼痛溼留關節也因而身體為邪所痹則羸瘦從下受亦或自上注之總是溼喜歸下故腳腫如脫腎虛挾風故頭眩

衛氣起於下焦腎元既虧三焦無主致太陽與陽明相牽制

為病故胃氣欲下行而太陽望其氣在上太陽欲上行而胃

成方切用 桂枝芍藥知母湯 烏頭湯 五 祛風門 卷十二

溼相搏不利故短氣溫溫欲吐用桂枝湯去棗加麻黃以助

其通陽加白朮防風以伸脾氣加知母附子以調其陰陽謂

欲制其寒則上之鬱熱已甚欲治其熱則下之腎陽已痹故

並加之爾

烏頭湯 金匱

治病歷節不可屈伸疼痛亦治腳氣疼痛不可屈伸

烏頭 五枚 咬咀以蜜二升 煎取一升即出烏頭 甘草 炙 黃耆 炙 芍藥 二兩 麻黃 二兩

將後四味咬咀以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之

服七合不知盡服之

歷節病即行痹之屬也乃溼從下受挾風流注故或足腫而

必發熱且更不可屈伸而疼痛故以甘芍和陰麻黃黃耆通

礬石湯 金匱

治腳氣衝心 此亦因風而自下而上也故方列中風門

礬石 二兩 以漿水一斗五升煎三五沸浸腳良礬石收溼解

毒故以之為外治然至衝心亦能治之蓋腳氣而至衝心皆

由腎水挾腳氣以陵心得礬石之卻水而勢自不能相陵所

以有護心之功也

朮附湯 近効

治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

成方切用 礬石湯 朮附湯 越婢加朮湯 六 祛風門 卷十二

附子 一枚半 炮去皮 甘草 炙 白朮 一兩 三味剉每五錢煨薑五片棗

一枚水盞半煎七分去滓溫服

腎氣空虛風邪乘之漫無出路風挾腎中濁陰之氣厥逆上

攻故頭重眩苦至極兼以胃氣亦虛不知食味此非輕揚風

劑可愈故用附子暖其水臟白朮甘草暖其土臟水土一暖

猶之冬月井中水土既暖陽和之氣可以立復而濁陰之氣

不驅自下矣

越婢加朮湯 千金

治內熱極則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣下焦腳弱

石膏 半斤 麻黃 六兩 白朮 四兩 甘草 二兩 生薑 二兩 大棗 十五枚 六味以

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

風加附子一枚

此治風極變熱之方也謂風勝則熱勝以致內熱極而汗多將必津脫津脫而表愈虛則腠理不能復固汗泄不已將必大泄風入營為厲內經曰厲者有營氣熱附今風入營為熱即是厲風氣矣蓋風勝氣浮下焦本虛至厥陽獨行而濁陰不降無以養陰而陰愈虛則下焦腳弱故以麻黃通痹氣石膏清氣分之熱薑棗以和營衛甘草白朮以理脾家之正氣汗多而用麻黃賴白朮之扶正石膏之養陰以制之故曰越脾加朮湯所謂用人之勇去其暴也汗大泄而加惡風即須成方切用

防其亡陽故加附子方內麻黃用根

小續命湯 千金

治中風不省人事神氣憤亂半身不遂丹溪曰左半身不遂物湯加桃仁紅花薑汁竹瀝右半身不遂屬氣虛與痰以四君子湯加竹瀝薑汁○分氣血屬左右亦太拘着不甚驗也筋急拘攣口眼高斜語言蹇澀風溼腰痛痰火併多六經中風及剛柔二瘕瘕者項背強直手足反張也傷風有汗為柔濕血也亦有血虛筋脈無所榮養而成瘕者凡中風口開為心絕手撒為脾絕眼合為肝絕遺尿為腎絕鼻鼾為肺絕吐沫直視髮直頭搖面赤如粧汗凝如珠皆不治或只見一二證尚有得生者○金匱中風篇曰寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛者相搏邪在皮膚虛者氣虛絡脈空虛賊邪不於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎釋曰中絡者邪方入衛尚在經絡

之外故但肌膚不仁中經則入營脈之中骨肉皆失所養故身體重着至中腑中臟則離外而內邪入深矣中腑必歸於胃者胃為六腑之總司也中臟必歸於心者心為神明之主也風入胃中胃熱必盛蒸其津液結為痰涎胃之大絡入心痰涎壅盛堵其出入之竅故中腑則不識人也諸臟受邪進入於心則神明無主故中臟者舌縱難言廉泉開而流涎沫也廉泉穴在舌下竅通於腎津液之所出也

防風一錢 桂枝 麻黃 杏仁 去皮尖 芍藥酒 白芍酒 人參

甘草 炙 黃芩 炒 防已 八分 附子 四分 每服三錢加薑棗煎

筋急語遲脈弦者倍人參加薏仁當歸去芍藥以避中寒煩躁不大便去桂附倍芍藥加竹瀝日久不大便胸中不快加大黃枳殼破下痢去防已黃芩倍附子加白朮嘔逆加半夏語言蹇澀手足戰掉加石菖蒲竹瀝身痛發搐加羌活口

成方切用 小續命湯

渴加麥冬花粉煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃杏仁

加白朮口燥去桂附加石膏此六經中風之通劑也鶴臯曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表證者所必用也人參甘草補氣川芎芍藥補血此中風寒氣血虛者所必用也風淫故主以防風挾溼佐以防已挾寒佐以附子挾熱佐以黃芩病來雜擾故藥亦兼該也嘉言曰中風之寒則浮緊兼風則浮緩兼熱則浮數兼痰則浮滑兼氣則浮瀉兼火則盛大兼陽虛則脈微兼陰虛則脈數或細如絲虛滑為頭痛緩遲為營衛衰然虛浮遲數正氣不足尚可補救急大數疾邪不受制必死無疑然數大未至急疾尚有可補救者又曰世傳中風之人每遇外風一發宜進續命湯以禦之珠為不然風勢熾定更用續命湯重引風入是添蛇足也惟

用甘寒藥類煩熱服內不召風外無從入之路且甘寒一可息風二可補虛三可久服何樂不用耶○保命集曰厥陰瀉痢不止脈沉遲手足厥逆膿血稠黏此為難治宜麻黃湯小續命湯汗之謂有表邪縮於內當散表邪則臟腑自安矣又曰厥陰風瀉以風治風小續命消風散主之

易老六經加減法倍麻黃杏仁防風名麻黃續命湯治太陽中風無汗惡寒倍桂枝芍藥杏仁名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡風去附子加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無汗身熱不惡寒加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗不惡風倍附子加乾薑甘草名附子續命湯治太陰中風無汗身涼倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中

成方切用

小續命湯

九

祛風門

風六經混淆繫少陽厥陰或肢節攣急或麻木不仁王機微義曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以爲易老治分六經庶乎台法去防風防已附子白芍加當歸石膏即古今錄驗續命湯治中風痺身軀不能自收持或拘急不得轉側內之營衛痺而口不能言冒昧不知痛處嘉言曰痺即痺之別名也風入而痺其營衛即身軀不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側也然營衛有虛有實虛者自內傷得之實者自外感得之此方則治外感之痺其營衛者故以得小汗爲貴然已變越婢之制而加芍歸養血人參益氣矣其內傷而致營衛之痺錄驗方去者於補氣血藥中略加散風藥爲制更可知矣錄驗方去人參加乾薑黃芩竹瀝即千金大續命湯通治五臟偏枯賊風

大秦羌湯

機要

治中風手足不能運掉舌強不能言語風邪散見不拘一經者

秦艽 石膏兩三當歸酒洗白芍酒炒川芎 生地酒洗熟地 白朮土茯苓甘草炙黃芩酒炒防風 羌活 獨活 白芷兩細 每服一兩 兩酒加生薑春夏加知母心下痞加枳殼

成方切用

大秦羌湯

十

祛風門

陰內淫之風溼責之苓朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風溼在足少陰甘草緩風邪上干於肺用當歸熟地芍藥者所以養血於疏風之內以濟風藥之燥也嘉言曰此方既云養血而筋自柔何得多用風燥藥既云靜以養血何復用風藥以動之是言與方悖矣偶論三化湯愈風湯大秦羌湯皆似是而非者又曰四肢不舉皆屬脾土膏粱太過積熱內壅者爲脾土痰實宜瀉以開其壅食少體羸怠惰嗜臥者爲脾土虛衰宜補以健其運地黃飲子河間

治中風舌瘡不能言足廢不能行此少陰氣厥不至名曰風痺急當溫之○風痺如癱瘓是也

熟地 巴戟去心 黃肉 茯苓酒洗 附子炮 官桂 石斛 茯苓

石菖蒲 遠志 麥冬 五味 等分每服五錢入薄荷

少許薑棗煎

熟地以滋根本之陰巴戟茯苓官桂附子以返真元之火石

斛安脾而祕氣山黃溫肝而固精菖蒲遠志茯苓補心而通

腎臟麥冬五味保肺以滋水源使水火相交精氣漸旺而風

火自息矣醫賈曰治中風當以真陰虛為本但陰虛有二有

黃飲子為主水虛者當以六味地黃丸為主果是水虛辛熱

之藥與參耆之品俱不可加或曰風注所勝治以辛涼何故

反用桂附使火盛制金不能平木而風注所勝治以辛涼何故

虛真陰失守孤陽飛越若非桂附何以追復其散失之元陽

其痰涎上湧者水不歸元也面赤煩渴者火不歸元也惟桂

附能引火歸元水火既歸其元則水能生木木不生風而風

成方切用地黃飲子 天麻丸 卷十二 風門

自息矣。按腎氣厥不至舌下乃臟真之氣不上榮於舌本

爾至其濁陰之氣必橫格於喉舌之間吞咯維艱昏迷特甚

又非如不言之證可以緩調方中所用桂附巴戟原

為驅逐濁陰而設用方者不可執已見而輕去之也

天麻丸 易老

養血祛風壯筋骨

天麻祛風 牛膝強筋 二味用酒同 革薺祛風 玄參各六兩壯

杜仲七兩使筋 常歸和血 生地一兩益 羌活十兩去 附子炮

兩行 蜜丸一方有酒活

此方大意主治腎熱生風其以天麻入牛膝同製取其下達

倍用當歸地黃生其陰血革薺玄參清下焦之溼熱附子補

下焦之真陽蓋唯腎中陽虛故風得以久據其地也羌活

之獨本者即真獨活不必更加也吁嗟多慾之人兩腎空虛

有如烏風洞慘慘黯黯漫無止期環視風門諸藥有一能勝

其病者乎此方雜在羣方內未易測識特表而出之劉宗厚

湯愈風湯雖皆有補血之藥而行經散風之劑居其大半

將何以養血而益筋骨也天麻丸養血壯筋骨庶幾近理

稀莖丸 張詠

治中風尚僻語言蹇澀風中 肢緩骨痛風而 及風痺走痛風

內經所謂行痺痛痺也或十指麻木氣血不足或肝腎

風氣風溼諸瘡

稀莖草 以五月五日七月七日九月九日採者佳不拘多

少揀去粗筋留枝葉花實蒸曬九次蜜丸稀莖草苦氣寒其

成方切用 稀莖丸 卷十二 風門

次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不

至九次則藥性不能透骨而御病也。嘉言曰稀莖草

也其性屬木乃風木所生之始取用其葉以治風凡腎臟生

風之證服此其效最著其妙處全在氣味之劣劣與腎中之

脾臟同氣相求故能入腎而助其驅逐陰風之力也因治

腎風之方百不得一特錄此丸合前天麻丸發其義也

稀莖能驅風散溼行大腸之氣然風藥終燥若風痺由於脾

腎兩虛陰血不足不由風溼而得者亦忌服之黃帝內有進

詠進稀莖表云其草金銀線素紫莖葉相對頗類

耳巨槩百服眼目清明至千服髮烏黑筋力轉健效驗

活絡丹

治中風手足不仁日久不愈經絡中有溼痰死血腿臂間忽

有一二點痛

川烏炮去 草烏炮去 膽星六地龍 乳香去 沒藥另研  
三 酒丸酒下

膽星辛烈所以燥溼痰二烏辛熱所以散寒溼蚯蚓溼土所  
生欲其引烏星直達溼痰所結之處大易所謂同氣相求也  
風邪注於肢節久則血脈凝滯不行故用乳香沒藥以消瘀  
血乳香活血能去風神效沒藥散瘀生  
新血二藥並能消腫止痛故每相須而行

三生飲

治中風卒然昏愈不省人事痰涎壅盛語言蹇澀等證東垣  
風非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或  
憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者  
則間有之亦是形  
盛氣衰而如此爾

成方切用

活絡丹 三生飲

圭

祛風門 卷十二

生南星一兩 生川烏去皮 生附子去皮 木香二錢 每服一兩加入

參一兩煎

南星辛熱散風除痰附子重峻溫脾逐寒烏頭輕疏溫脾逐

風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力峻而行速也

重加人參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也醫賈

東垣之論當以氣虛為主雖有風邪亦是乘虛而襲經曰如  
之所湊其氣必虛是也當此之時尋常藥餌能通達於上  
下哉急以三生飲一兩加入參一兩煎服即通此乃行經治  
痰之劑斬關擒王之將必用人參兩許駕馭其邪而補助真  
氣否則不惟無益適以取敗觀先哲參耆參附其義可見若  
遺尿手撒口開鼻鼾為不治然服前藥多有生者○驗嘉言  
日隱為陰可勝純陽之藥前陽必加陰藥一二味  
制其僭熱經絡之淺又當加和營衛升宣導之藥

牽正散 直指方

治中風口眼喎斜無他證者足陽明之脈挾口環唇足太陽  
熱大陽外中於風故牽急而喎斜也○又未及則在少陽  
經乘之未為全乘則土寡於畏故口眼喎斜口目常動故風  
生焉耳鼻常  
動故風息焉

白附子 僵蠶 全蠍 等分為末每二錢酒調

吳鶴臯曰羌防之屬可以驅外風而內生之風非其治也  
熱則自生風與星夏之屬足以治溼痰而風虛之痰非其治  
也三藥療內生之風治虛熱之痰得酒引之能入經而正口  
眼又曰白附辛可驅風而遊風蠶蠍鹹能軟痰浮能上走頭  
而驅風散痰全蠍直辛中有熱者必熱可使從風蠶蠍有毒  
走厥陰為治風要藥  
可使破結藥有用熱以攻熱用毒以攻毒者大易所謂同氣

成方切用

牽正散 獨瘧湯

古

祛風門 卷十二

相求內經所謂衰之以其屬也

附改容膏蓖麻子一兩 冰片三錢 共搗為膏寒月加乾薑附子各

錢 左貼貼右右貼貼左即正或用鱉魚血或用蜥蜴搗敷亦

良蓋三物皆追風拔毒之品也

獨瘧湯 嚴氏

治中風身體煩痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難  
諸證皆因營衛虛而風淫下之也經曰營虛則不仁衛虛則  
不用不仁皮膚不痛痛者不仁也手足不能運動也岐伯  
曰中風大法有曰一日偏枯半身不遂二日風痺也身無痛  
痛四肢不收也三日風痙也身不遂也四日風痺也身無痛  
風快也蓋言曰雖相類實有不同風則陽先受之痺則陰先  
受之兩致痺之因曰風曰痺曰風曰痺曰風曰痺曰風曰痺  
風氣勝者為行痹風性善行故也風氣勝者為行痹風  
寒主收急故也以淫氣勝者為痺也風氣勝者為痺也



黃耆蜜酒洗赤芍羌活 防風 甘草 片子薑黃酒炒

加薑棗煎

辛能散寒風能勝溼防風羌活除溼而疏風氣通則血活血

活則風散黃耆炙草補氣而實衛黃耆畏防風合用而其功益大當歸赤芍

活血而和營薑黃理血中之氣能入手足而祛寒溼也凡風痺偏枯未有不因真氣不周而病者也治之不用黃耆為

昔人參歸芍為臣防風桂枝鉤藤刺瀝竹瀝薑汁韭汁葛汁漿汁乳汁之屬為佐而徒雜香手烏附羌獨以酒營而耗衛如此死者醫殺之也

胃風湯易老

治風冷乘虛客於腸胃食泄注下完穀不化及腸風下血又

治風虛能食牙關緊閉手足癱瘓肉瞤面腫名曰胃風

成方切用

胃風湯

五 祛風門 卷十二

人參 白朮土炒茯苓 當歸酒洗芍藥 芍藥酒炒桂 等分加

粟米百餘粒煎此即十全湯去黃耆地黃甘草

胃風者胃虛而風邪乘之也風屬肝木能剋脾土故用參朮

茯苓以固脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調營芍藥瀉

肝而能和脾肉桂散風而能平木木得桂而枯削桂針木根其木即死又辛能散風

故能住泄瀉而療風溼也王機微義曰此方名治風而實非治風乃補血和血益胃之藥血痢

而挾溼者實可倚仗

東垣胃風湯白芷升麻一錢麻黃二錢葛根一錢柴胡羌活

本蒼朮蔓荊草薏黃蘗當歸炙草各五分加薑棗煎亦治胃風

證驗嘉言曰風入胃中何以反能食蓋風能生熱即內經痺成爲消中之理也是方但去其風不去其熱殊不合內經

之旨必加麥門冬竹瀝花粉石膏歲時生地梨汁甘寒之藥入升麻葛根甘草為劑始為克當

解風散

治風成寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參兩麻黃二兩川芎 獨活 細辛 甘草一兩 為細末每

五錢水盞半生薑五片薄荷葉少許煎八分不拘時服

按風成爲寒熱乃風入胃中而釀營衛之偏勝前胃風湯正

驅胃風使從外解之藥此因風入既久胃氣致虛故以人參

為君臣以麻黃川芎佐以獨活細辛使以甘草而和其營衛

乃可收其外解之功也若夫久風成爲食泄則風已入於裏

又當用人參為君桂枝白朮為臣茯苓甘草為佐使而驅其

成方切用

解風散

愈風丹

五 祛風門 卷十二

風於內此表裏之權衡內經之旨要也本方雖用風成寒熱

四字漫無着落今併及之

愈風丹

治諸風證偏正頭痛

防風通聖散四物湯黃連解毒湯各一料加 羌活 細辛

甘菊花 天麻 獨活 薄荷 何首烏兩 蜜丸如彈

子大每服一丸細嚼茶清下不拘時服

按外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭然風火

盛營血必虧故其藥如是也

清空膏 東垣



治正偏頭痛年深不愈及風溼熱上壅頭目及腦苦痛不止  
頭痛者少陽相火也其源目有痰者多左屬風火多血  
右屬痰濕熱多氣虛薄而門醫書多分頭痛頭風二門  
然一病也淺而近者名頭痛深而遠  
者為頭風當驗其邪所從來而治之

黃芩酒炒黃連酒炒羌活防風柴胡七錢川芎五錢甘草炙兩半

為末每服三錢茶調如膏白湯送下如少陰頭痛加細辛太

陰頭痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛

服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍散少陽如自

汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷東垣曰

痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣逆也太陰少陰二經雖

不上頭然痰與氣壅於腦中頭上氣不得通而為痛也

頭為六陽之會其象為天乃清空之位也風寒溼熱干之則

成方切用清空膏七祛風門卷十二

濁陰上壅而作實矣羌防入太陽柴胡入少陽皆辛輕上升

祛風勝溼之藥川芎入厥陰為通陰陽氣血之使甘草入太

陰散寒而緩痛辛甘發散為陽也芩連苦寒以羌防之屬升

之則能去溼熱於高巔之上矣芩連用酒炒非獨制其寒欲

般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治魚尾眼角

也又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂顛頂痛

也○頭痛用羌活防風柴胡川芎升麻細辛藁本之異者分

各經也用黃芩黃連黃蘗石膏知母生地之異者分各臟為

火也用茯苓澤瀉者導溼也用參耆補氣也用芎歸者養

血也王海藏曰熱在至高之分當以輕劑抑之從緩治也若

急服之上熱未除中寒生矣

消風散

治風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑癩癰

疹癢癢婦人血風婦人衝任二經為風

厚朴薑汁炒陳皮去白甘草炙荆芥錢五防風錢五蟬蛻羌活藁

香殭蠶洗川芎茯苓人參兩二為末每服三錢茶湯

下瘡癰酒下

羌防荆芎之辛浮以治頭目項背之風殭蠶蟬蛻之清揚以

去皮膚之風藁香厚朴以去惡散滿參苓甘橘以輔正調中

使風邪無留壅也

轉舌膏

治中風癱瘓舌蹇不語

涼膈散加菖蒲遠志各等分蜜丸彈子大硃砂為衣薄荷湯

成方切用

化下臨臥服

此乃治心經蘊熱之方也

正舌散

治中風舌本強難轉語不正

蠟梢二七茯苓兩一末之每服一錢溫酒調又擦牙更效

此乃治風涎壅塞之方也

二丹丸

治風邪健忘養神定志和血內安心神外華腠理得睡

丹參熟地天冬去心硃砂兩半人參兩半菖蒲遠志錢五

神麥冬甘草兩一煉蜜丸桐子大每服五十九至一百

九空心食前服

按中風證心神一虛百骸無主風邪擾亂莫由驅之使出此

方安神益虛養血清熱息風服之安睡功見一斑矣相傳用愈風湯

吞下殊失用方之意

排風湯

治風虛冷溼邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風發等

證

麻黃 茯苓 獨活一錢半 甘草炙 防風 白朮 當歸 芍

藥 肉桂 杏仁 川芎 白鮮皮五分 加薑三片

按虛風冷溼雖已入臟其治法必先宣之使從外散故用藥

成方切用

排風湯

涼膈散

清心散

五 祛風門 卷十一

如是也

涼膈散

治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡唇裂吐衄涎嗽稠黏

二便淋閉胃熱發斑瘡疹黑陷諸風癰瘰手足掣搦筋攣疼

痛

連翹 梔子仁 薄荷 大黃 芒硝 黃芩 甘草 加

棗二枚葱一根

清心散

即涼膈散加黃連竹葉煎成去渣入蜜少許溫服 如頭痛

加防風川芎石膏

按中風證大率風木合君相二火主病多顯膈熱之證古方

用涼膈散最多不但二方已也如轉舌昏用涼膈散加黃蒲

遠志活命金丹用涼膈散加青黛藍根蓋風火之勢上炎胸

膈正燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功居多要

不可以宣通腸胃之法輕訾之也

滌痰湯

治中風痰迷心竅舌強口不能言

方見除痰門

稀涎散

治風涎不下喉中作聲如牽鋸或中溼腫滿

成方切用

滌痰湯

稀涎散

手

祛風門 卷十一

半夏大者十枚 豬牙皂角一箇 咀作一服水二盞煎一盞入

生薑自然汁少許服不能嚥者徐徐灌

此以半夏治痰涎牙皂治風比而成方蓋因其無形之風挾

有形之涎膠結不解用此二物俾涎散而風出也其有涎多

難散可於涌吐門諸吐法參治之或用蘿蔔子合牙皂等分

為末煎湯吐之其風多涎少人事不昏則用蝦半觔入醬葱

薑等水煮先喫蝦次喫汁後以鵝翎探引吐之活法在心無

施不當也

竹瀝湯

治四肢不收心神恍惚不知人事口不能言

竹瀝 生葛汁二升 生薑汁二合 和勻分溫三服

按人身之積痰積熱常招致外風結為一家令人心神恍惚如邪所憑實非邪也消風清熱開痰其神自安此方可頻服也

貝母栝樓散

治肥人中風口眼喎斜手足麻木左右俱作痰治

貝母 栝樓 南星炮 荆芥 防風 羌活 黃蘗 黃芩

黃連 白朮 陳皮 半夏湯泡七次 薄荷 甘草炙 威靈仙

天花粉 加薑煎

按中風證多挾熱痰而肥人復素有熱痰不論左右俱作痰

成方切用

竹瀝湯 貝母栝樓散 青州白丸子

主 祛風門 卷十二

治誠為當矣但肥人多虛風瘦人多實火虛風宜用甘寒一

派如竹瀝人參麥冬生地生葛汁生梨汁鮮淡竹葉汁石膏

栝樓葳蕤胡麻仁等藥此方三黃並用治瘦人實火或可治

肥人虛風甚不宜也至泛論治熱痰之藥諸方中又唯此足

擅其長存之以備實火生風生熱之選

青州白丸子

治風痰壅盛嘔吐涎沫口眼喎斜手足癱瘓及痰盛泄瀉肥人

滑泄多屬之痰腸滑不食不饑多責之痰

白附子 南星二兩 半夏水浸去衣七兩 川烏去皮臍五錢 四味俱生用

為末生絹袋盛於井花水內擺出粉未出者以手揉令出渣

再搗再擺以盡為度用磁盆日曝夜露每日一換新水攪而後澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾如玉片以糯米粉作稀糊丸如菉豆大每服二十九生薑湯下無時如癱瘓酒下此治風痰之上藥也然藥味雖經浸曝毒氣已殺溫性猶存熱痰迷竅非所宜施

星附散

治中風能言口不至而手足癱曳者

南星 半夏各製 茯苓 礬蠶炒 川烏去皮臍 人參 黑附子

白附子八分 煎成熱服得汗愈凡用附子藥多取冷服謂熱因寒用也此用烏頭附子人

參一派溫補絕無發散之藥向非加以熱服亦何由而得汗耶

成方切用

星附散 治風六合湯 三聖散

主 祛風門 卷十二

此治虛風寒痰之主藥也風虛則熾痰寒則壅阻遏脾中陽

氣不得周行故手足為之癱曳用此方熱服以助脾中之陽

俾虛風寒痰不相互結乃至得汗則風從外出痰從下出分

解而病愈矣

治風六合湯

治風虛眩暈

方見理血門四物湯附方內

三聖散

治中風手足拘攣口眼喎斜腳氣行步不正

當歸酒洗 玄胡索微炒 肉桂去粗皮 為末每服二錢空心

溫酒調下

按此方治血虛風入之顛劑也故取以治口眼喎斜之左急

右緩者然血藥中而加地黃白芍秦艽杜仲牛膝風藥中而

加大麻防風羌活白芷細辛或加獨活以去腎間風加草解

以除下焦熱又當隨證酌量也

加味六君子湯

治四肢不舉屬於脾土虛衰者須用此顛治其本不可加入

風藥

六君子每味一錢加竹瀝半小麥冬三錢加薑三片棗二枚

口渴去半夏加蕤蕤石膏 虛甚不熱者加附子

成方切用 加味六君子湯 蕤蕤仁湯 三 祛風門 卷十二

按中風門中從不錄用此方所謂治末而忘其本也夫風淫

末疾四肢不舉乃風淫於內虛者多實者少審其果虛則以

六君子加甘寒藥如竹瀝麥冬之屬允為治虛風之儀式也

慈苳仁湯

治痺在手足溼流關節并治手足流注疼痛麻木不仁難以

屈伸

慈苳仁 當歸 芍藥 桂心 麻黃 甘草 蒼朮米泔浸炒

加薑煎

此治風溼相搏關節不利之證故以慈苳仁為君舒筋除溼

其力和緩當倍之又倍加之至於麻黃雖能通陽氣然在溼

勝方中即無汗不可多用減之又減可也

人參補氣湯

治手指麻木

人參 黃耆二錢升麻 柴胡 芍藥 生甘草 炙甘草

五味子五分

按諸陽起於指手指麻木風已見端宜亟補其氣以禦外入

之風故用此為綱繆計也

烏頭粥

治痺在手足風淫末疾并治風寒溼麻木不仁此粥大治手足不隨及腫

服此預防之 人參補氣湯 烏頭粥 桂枝五物湯 三 祛風門 卷十二

成方切用 烏頭生研 每用香熟白晚米二合入藥末四錢以砂礮煮

作稀粥不可太稠下生薑汁一匙白蜜三是攪勻空心溫啜

之為佳如中溼多更加苳仁末三錢

按四肢為諸陽之本木根之地陽氣先已不用現周身經絡

之末乎故用烏頭合穀味先從營衛所生之地注力俾四末

之陽以漸而充

桂枝五物湯

治在上之痺

方見表散門桂枝湯附方內

此乃金匱治血痺之方也血痺而用桂枝湯加黃耆以其風

邪獨勝風性上行故其痺在上也其脈微濇寸口關上小緊  
緊處乃邪着之驗也然又曰寸口關上微尺中小緊外證身  
體不仁如風痺狀此方主之又可見風性善行隨其或上或  
下又皆主以此方矣桂枝湯為中風一證羣方之祖不但中  
絡即中經中腑中臟藥中皆當加入本  
方以風從外入者究竟必驅從外出故也後人競用續命湯  
為加減此方置之不錄未免得流忘源矣又况源流俱失者  
哉

十味劉散

治在臂之痺又治中風血弱臂痛連及筋骨動難支

附子炮黃耆 當歸 白芍 川芎 防風 白朮分茯苓

肉桂分五錢 熟地酒洗焙乾二錢 薑三片棗二枚臨臥服

成方切用

十味劉散 通痺散

祛風門 卷十二

按臂痛乃筋脈不舒體盛者可去其筋脈中之風然既已血  
痺所受風燥之累不淺故取此方養血之中加附子之力通  
其陽氣而用防風反佐黃耆出其分肉腠理之風也

通痺散

治腰以下至足風寒溼三氣合而成痺兩足至臍冷如冰不  
能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

天麻 獨活 當歸 川芎 白朮 薑本等 末之每服

二錢熱酒調下

此方因風寒溼三氣混合入於陰股其邪已過於營衛故變  
桂枝五物之制而用此散緩緩分出其邪也

史國公藥酒方

治中風語言蹇澀風中手足拘攣風燥其筋而血不濡也 半身不遂邪

虛痿痺不仁風而兼溼頑麻痺也

晚蠶砂炒 鼈甲醋炙 虎脰骨酥炙 松節 枰 防風 杜仲薑汁炒 川

草薢 川牛膝酒浸 當歸酒洗 白朮土炒 羌活 兩蒼耳子炒碎 秦艽

兩枸杞五兩 茄根蒸熟 為粗末絹袋盛浸無灰酒三十觔煮

熟退火毒服每日數次常令醺醺不斷

防風羌活蒼耳秦艽松節茄根蠶砂草薢既以祛風兼以燥

溼松節能除骨節間之風茄根散之品當歸枸杞杜仲牛膝補陰

潤燥養血榮筋白朮補氣而健脾脾主四肢 虎脰驅風而壯骨風從

成方切用

史國公藥酒方 三因白散子 祛風門 卷十二

虎故虎骨治風虎雖死猶立不仆其氣力皆在  
前脛且脛骨能入手足若腰脊痛又當用脊骨 鼈甲亦厥陰  
血分之藥能益陰血而去肝風風溼去氣血旺則病除矣治

三因白散子

治肝腎中風涎潮壅塞不語嘔吐痰沫頭痛眩暈兼治陰證  
傷寒六脈沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通

大附子去皮滑石桂府者 半夏製七錢半 為末每用二錢薑七

片蜜半匙煎空心冷服

按此方甚超但不明言其所以然且引兼治陰證傷寒霍亂  
吐瀉等證為言轉覺泛而不精矣蓋此即濁陰上逆之證緣

肝腎之氣厥逆而上是以涎潮壅塞舌瘡不語痰沫吐咯難出頭目重眩故非附子不能驅其濁陰然濁陰走下竅者也濁陰既上逆其下竅必不通故用滑石之重引濁陰仍順走前陰之竅亦因附子雄入之勢而利導之也更慮濁陰遇胸中之淫痰兩相留戀再加半夏以開其痰庶涎沫與濁陰俱下矣

獨活湯 丹溪

治風虛癱瘓昏憤不覺或為寒熱筋急而縮為癱緩而縱為瘓是也木曰曲直之象也肝虛而風乘之入於血脈則癱瘓若在皮膚則為寒熱若移邪於所生則昏憤不覺也所生心也木能生火

成方切用

獨活湯 防風通聖散

祛風門 卷十二

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當歸 芎藭

半夏 人參 茯神 遠志 菖蒲 五錢 甘草 炙二錢半 每服

一兩加薑棗煎

肝屬風木而主筋故癱瘓為肝邪肝欲散急食辛以散之二活防風祛風細辛桂心溫經半夏除痰芎歸辛散風而溫和血活則風散辛以散之即辛以補之也木喜條達故以散為補心為肝子肝移熱於心則昏憤故以人參補心氣菖蒲開心竅茯神遠志安心神白微鹹寒退熱而治厥使風靜火息血活神寧而癱瘓自已矣

防風通聖散

治諸風潮搐手足癱瘓大便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風證

方見表裏門

祛風至寶丹

治諸風熱

方見表裏門防風通聖散附方內

獨活寄生湯 千金

治肝腎虛熱風溼內攻腰膝作痛冷痺無力弓伸不便肝主筋骨靈樞曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨

獨活 桑寄生 如無真者以續斷代之 秦艽 防風 細辛 當歸 洗

成方切用

祛風至寶丹 獨活寄生湯

祛風門 卷十二

芍藥 酒炒 川芎 酒洗 熟地黃 杜仲 薑汁炒 牛膝 人參 茯苓

甘草 桂心 等分每服四錢

獨活細辛入少陰通血脈借秦艽防風疏經升陽以祛風桑寄生益氣血祛風溼偕杜仲牛膝健骨強筋而固下芎歸芍地所以活血而補陰參桂苓草所以益氣而補陽辛溫以散之甘溫以補之使氣血足而風溼除則肝腎強而痺痛愈矣丹溪曰久腰痛必用官桂以開之方止腹痛亦然

資壽解語湯

治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風 附子 天麻 棗仁 羚羊角 官桂 羌活 甘

草 加竹瀝二匙薑汁二滴

喻嘉言曰此方乃治風入脾臟舌強不語之證至於少陰脈

繫舌本腎虛風入舌不能言喫緊之候古今從無一方及之

子每用此方去羌防加熟地何首烏枸杞子甘菊花胡麻仁

天門冬治之獲效今特識於此方之下聽臨病之工酌用焉

不換金丹

退風散熱治中風口喎 此方祛風之力頗大勢風 或塗口

處亦可

荊芥穗 甘草 防風 天麻 僵蠶 薄荷葉 羌活

成方切用

養氣語 不換金丹 搜風順氣丸

無 卷十二

川芎 白附子 烏頭 蠟梢 藿香葉 煉蜜丸彈子

大每服一丸細嚼茶酒任下

搜風順氣丸

治風燥便祕因致氣閉不行暫時用之以疏風潤燥順氣殊

不可少 本方條下過於誇大謂久服百病皆除者還少豈

肚肺萎補之則其藥有 偏峻不可久服明矣

車前子 白檳榔 火麻子 微炒 牛膝 浸 郁李仁 湯泡去

菟絲子 乾山藥 枳殼 防風 獨活 大黃 生熟

煉蜜丸桐子大每服二十九酒茶米飲任下空心臨臥各一

服去腸中宿滯并腸風下血

順風勻氣散

治中風中氣半身不遂口眼喎斜半身不遂偏枯也經曰胃

小堅急皆屬偏枯男子發左女子發右不偏舌轉可治蓋心

是神機開發之本胃是木穀充大之標標不相得則中氣

相失宗氣虛耗分布不周於經脈則偏枯不周於五臟則瘖

口眼喎斜者足陽明之脈缺口環唇寒則筋急熱則筋弛左

寒右熱則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩陽明燥金

主緊縮風病而或筋縮木極似金反乘勝已之化燥之甚也

治宜辛涼不可用桂附元戎日酒淫之病亦能作瘖證口

眼尚斜半身不遂舌強不運或口歪或口喎中風當瀉毒及風氣腰

痛 不可作風病治而汗之也衍義易簡言與此同

白朮 錢烏藥 人參 天麻 沉香 磨 甘草 炙 青皮 木瓜

蘇葉 白芷 加薑煎

成方切用 順風勻氣散 攝生飲調蘇合丸

按勻氣之說甚長身內之氣有通無壅外風自不能久居而

易於解散故知勻氣即調氣之旨也若取其方以治口眼喎

斜之右急左緩者當倍用生熟甘草加苡仁以緩其急加麥

冬竹瀝以熄其風得效去白芷蘇葉可多服也 蘇復龍目治

之即當順氣及其久也即當活血若不順氣連用 風之法初

烏附若不活血連用羌防天麻輩未見其能治也 攝生飲調蘇合丸

治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之

類初起或可用此先以皂角去皮弦細辛生南星半夏為末

吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙禁者中指點南星半夏細

半夏百沸湯泡少頃一錢半 南星白者澤 南木香 蒼朮 細辛

生甘草 石菖蒲右件剉散分二服加生薑七厚片煎

取其半乘熱調蘇合丸半丸灌下痰盛者加全蠍二枚炙

按此方治卒中氣閉痰迷不得不用之劑但正氣素虛之人

不能當腦腐及辛香摧枯拉朽之勢裁節而用十之二三可

也諸香立散真氣虛風證大非所宜○牛黃清心丸與蘇合丸異治熱阻關竅可用牛黃丸開之寒阻關竅可用蘇合丸開之其口開手撒遺尿等死證急用人參附子峻補間有得生者若牛黃蘇合之藥入口即斃此無異于鈞鎖一絲也

### 烏藥順氣散

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏身頑麻及癱瘓語言蹇澀腳

氣步履多艱手足不遂先宜服此藥以疏氣逆然後隨證投

### 成方切用

烏藥順氣散

至

風門卷十一

以風藥凡中風證多挾中氣不但急中為然

麻黃去節 陳皮去白 烏藥二兩 白殭蠶炒去 川芎 白芷 甘草炙

枳殼炒 桔梗兩 乾薑錢五 為末每服三錢水一盞薑三片東

二枚煎如憎寒壯熱頭痛身體倦怠加葱白三寸煎併服

出汗 或身體不能屈伸溫酒調服

### 八味順氣散

治中風正氣虛痰涎壅盛

白朮炮 白茯苓 青皮去穢 白芷 陳皮去白 白烏藥 人參

錢一甘草五分

經曰邪之所湊其氣必虛故用四君子以補氣治痰之法利

氣為先故用青皮白芷烏藥陳皮以順氣氣順則痰行而無

壅塞之患矣此標本兼施之治也嚴用和云人之元氣強壯

焉能為害或因七情飲食勞役致真氣先虛營衛不固邪

乘虛而入故致此疾若內因七情而得者法當調氣不當治

風外因六淫而得者亦當先調氣後以所感六氣治之此良

法也宜八味順氣散嚴氏此說於理甚當其方較局方烏藥

順氣散不用麻黃枳殼殭蠶等風藥正先治氣後治風之妙

旨後人反惜其說有未備且謂方中不當雜入白芷吹毛責

備詎知白芷香而不燥正和營衛之善藥也和劑合兩方取

用人參乾薑川芎陳皮枳梗厚朴白芷甘草白朮麻黃更加

葛根治感風頭痛鼻塞聲重尚為合宜故知論方不可概以已見也

### 通頂散

治初中風不知人事風鼓火盛痰涎上壅 口噤不開風冷之氣客於胸

藜蘆 甘草生 細辛 人參 川芎 錢一 石膏 錢五 為末用一

### 成方切用

八味順氣散

通頂散

至

風門卷十一

字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可治

中風不省人事病已急矣非平藥可以開其壅塞故用藜蘆

與人參細辛取其相反而相用也藜蘆苦寒有毒入口即吐

細辛相反細辛散肺苦氣上逆加石膏之重以墜之氣即火

風通竅溫經破痰也痰隨火湧故用石膏 甘草之平以緩之芍藥之用取其清氣利竅

辛寒入肺降火而開諸鬱為通陰陽氣血之使○凡諸辛

而已中戶厥鬱皆當發表還魂湯用麻黃桂枝清魂湯用

荆芥及用阜角半夏搗鼻取嚏藜蘆砒石折齒取嚏所以

開發三焦使表邪流通也中暑忌用冷水開表亦同此意

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱躁煩之故也



當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防風 龍膽草等

蜜丸彈子大每服一九竹葉湯化下

按此方以瀉青爲名者乃瀉東方甲乙之義也風入厥陰風木之臟同氣相求其勢必盛所慮者虛而眩運熱而躁煩虛也熱也其可以爲壯實而輕瀉之乎審果壯實乃可施此審屬虛熱必以四物湯全方加人參竹瀝秦艽羌活八味爲劑始合法度也

舒筋保安散

治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂腳腿少力乾溼腳氣及溼滯經絡久不能去宜用此以宣導諸氣

成方切用

瀉青丸

舒筋保安散

卷十二

祛風門

虎骨

酒炙

草薢

五靈脂

牛膝

酒浸

白殭蠶

炒

松節

白芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃耆

當歸

防風

木瓜

五兩

用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封紮日足取藥焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒調下酒盡用米湯調下

此治風溼搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏正氣不得通行故用藥如是也

加味羚羊角散

治筋痹肢節束痛

羚羊角

當歸

白芍

川芎

附子

薄荷

獨活

防風

加薑三片

此方治筋痹之義甚善蓋筋痹必以舒筋爲主宜倍用羚羊角爲君筋痹必因血不榮養宜以白芍川芎更加當歸爲臣

然恐羚羊性寒但能舒筋不能開痹必少用附子之辛熱爲反佐更少用薄荷獨活防風入風寒溼隊中而爲之使也

如聖飲 節菴

治剛柔二瘕面赤項強頭搖口噤角弓反張與癰瘕同法瘕太陽中風重感寒溼而爲病也風則燥而動寒則引而緊溼則着而拘故頭搖口噤項強而反張也風挾寒則筋澀無汗爲剛瘕風挾溼則液出有汗爲柔瘕

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

羌藥

當歸

烏藥

加薑煎入薑汁竹瀝服柔瘕加白

成方切用

加味羚羊角散

如聖飲

祛風門

卷十二

羌桂枝剛瘕加蒼朮麻黃口噤齧牙大便實加大黃

羌防芎芷柴胡甘草辛甘以發散風邪用烏藥者治風須順氣也用歸芍者治風先活血也用半夏薑汁竹瀝者風必挾痰也用黃芩者風必生熱也柔瘕加白朮桂枝有汗欲其無汗剛瘕加蒼朮麻黃無汗欲其有汗口齒屬陽明陽明實則口噤齧牙而便秘故加大黃以泄胃熱也

上中下通用痛風方 丹溪

黃藥 炒蒼朮 洗南星 製神糊 妙調 川芎 上下 桃仁 去皮 龍膽 草 行防已 下白芷 一兩 羌活 上威靈仙 酒拌 桂枝 三錢 紅花 二錢 麝香 糊丸

黃藥 炒蒼朮 洗南星 製神糊 妙調 川芎 上下 桃仁 去皮 龍膽 草 行防已 下白芷 一兩 羌活 上威靈仙 酒拌 桂枝 三錢 紅花 二錢 麝香 糊丸

痛風有寒有溼有熱有痰有血之不同此方能通治之黃藥  
清熱若北燥溼治此能勝湯火防已行水四者所以  
治溼與熱也南星燥痰散風桃仁紅花活血去瘀川芎為血  
中氣藥四者所以治痰與血也羌活祛百節之風白芷祛頭  
面之風桂枝威靈仙祛臂脛之風四者所以治風而又兼治  
寒也加神麴者所以消中州陳積之氣也疎風而兼祛寒以  
宜於上瀉熱利溼以泄於下活血燥痰消滯以調其中所以  
能兼治而通用也證不兼者以意消息可矣丹溪曰大法痛  
川芎當歸白芷酒芩在上方加羌活桂枝威靈仙在下者加  
牛膝防已木通黃藥薄桂能獨行手背項向星者此諸藥至  
處痛

成方切用

土中下通用痛風方

三化湯

聖

藏風門  
卷十二

三化湯

治中風二便數日不行邪氣內實者以此方微利之嘉言曰  
絡只宜宜之使散誤下則風邪乘虛入腑入臟釀患無窮若  
夫中臟之候多有平素積虛真不守者下之立亡不可不  
慎唯在胃腑一證內實便澀者間有可下然不過解其煩熱  
非大下也所謂一氣之微汗一句之微利亦因可用始用之  
至於下和以下立法機要中候者宜下為言則指下為定  
法胡可訓耶然中候有緩急二候中候日久熱勢深極傳入  
臟者此為可下而必使風與熱俱去其空虛則不冉  
生若問其重虛必反增風熱何以下為哉其辛虛身中急證  
下藥入口其人即不覺矣可通與後世以中腑之便澀指  
為中臟見其誤下不致害人益信于和緩要之法為可用設  
遇真中臟證下不  
中病難可復追矣

方見攻下門附方內

大黃厚朴枳實小承氣湯也上焦滿治以厚朴中焦滿破以

枳實下焦實奪以大黃用羌活者不忘乎風也服後二便微  
行則三焦之氣無所阻塞而復其傳化之職矣故曰三化  
攻之峻劑非堅實之體不可輕服蓋傷寒證胃熱腸枯不  
得不大承氣以開其結然且先之以小承氣湯調胃承氣  
恐誤用不當即傷人也在中風證多有虛氣上逆關隘阻閉  
之候斷無用大承氣之理古方取藥積腹中不下以漸填其  
其風豈知窺空而風愈熾長此安窮也哉

血痺湯

治血痺多驚筋脈掣急

人參 黃耆 肉桂 當歸 川芎 代赭石 羌活

厥陰肝臟所主者血也所藏者魂也血痺不行其魂自亂今  
不通其血而但治其驚此不得之數也故用人參以開血為

成方切用

血痺湯 三痺湯

美

藏風門  
卷十二

君黃耆肉桂當歸川芎為臣以代赭石之顛通肝血者佐參  
耆之不逮少加羌活為使蓋氣者血之天也氣壯則血行然  
必以肉桂當歸大溫其血預解其凝泣之勢乃以代赭之重  
墜直入厥陰血分者開通其瘀壅而用羌活引入風痺之所  
緣厥陰主風風去則寒溼自不存爾

三痺湯

治氣血凝滯手足拘攣風寒溼三痺

人參 黃耆 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 生地

黃 杜仲 薑汁 炒 牛膝 桂心 細辛 秦艽 川獨活

防風 等分加薑棗煎

喻嘉言曰此方用參耆四物一派補藥內加防風秦艽以勝風溼桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡治三氣襲虛而成痺患者宜準諸此

千金地黃湯

治熱風心煩及脾胃熱壅食不下

生地黃汁

枸杞子汁

荆瀝

竹瀝

升真酥

生薑汁

人參

天門冬

兩

白茯苓

兩

大黃

梔子

兩

以後五味為

細末先煎地黃等汁內末藥調服方寸匙再漸加服以利為度

按此方補虛清熱潤燥除痰除風開通瘀壅美善具備誠足

成方切用

千金地黃湯

烏梅擦牙關方

圭

風門卷十二

貴也因養血豁痰難於兩用姑舉此方為例以聽臨證酌量

又四肢不舉俱屬脾土而虛實分途異治苟其虛實不甚相

遠此方更在所必用法無窮盡人存政舉未易言爾

烏梅擦牙關方

治中風口噤不開胃陽明之脈循頰車入齒縫風寒中之輕

開不噤者筋先絕也不治

烏梅 揩擦牙齦涎出即開

酸先入筋本能尅土

酸屬木陽明門屬土

使牙關酸軟則開矣若以鐵

器攪之恐傷其齒也

許盾宗治唐柳太后病風脈沉而噤盾宗曰口不下藥宜以湯

氣蒸之令藥入腠理周時可瘳遂造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如煙霧次日使得語蓋鼻氣通於天無形之氣由鼻而入呼吸傳變無處不到黃耆甘而善補得防風而功益速驅風補虛兩得之矣

王克明治廬州王守道風噤不能語以熾炭燒地熱灑以湯藥

置病者於上須臾小蘇

若此二者以病至垂危藥不能及亦治風之權變也

清震湯

治雷頭風頭面疙瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒

也東垣曰病在三陽不可通用寒藥重劑誅伐無過清震湯治之

三陽之氣皆合於頭額從額至巔絡腦後者屬太陽從額至鼻下面者屬陽明從額至耳中耳之前後者屬少陽

成方切用

清震湯

錢

升麻

蒼朮

錢

升麻 蒼朮 五錢 荷葉 一枚

升麻性陽味甘氣升能解百毒蒼朮辛烈燥溼強脾能辟瘴

癘局方升麻湯也荷葉色青氣香形仰象震

能助胃中清陽上行用甘溫辛散之藥以升發之使邪從上

越且固胃氣使邪不傳裏也

成方切用卷十三目錄

祛寒門 正方五十三 附方四十

理中湯

附子理中湯

桂枝人參湯

枳實理中丸

理中安蚘丸

溫胃湯

黃耆湯

溫中湯

補中湯

連理湯

理陰煎

六味回陽飲

成方切用

目錄

四逆湯

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

芍藥甘草附子湯

甘草乾薑湯

白通湯

茱萸四逆湯

當歸四逆湯

茵陳四逆湯

回陽返本湯

漿水散

當歸四逆湯

四逆加吳茱萸生薑湯

溫胃湯

附子湯

吳茱萸湯

吳茱萸加附子湯

大建中湯

小建中湯

黃耆建中湯

十四味建中湯

八味大建中湯

樂令建中湯

養中煎

白通加入尿豬膽汁湯

附薑湯

成方切用

目錄

薑附白通湯

附薑歸桂湯

附薑歸桂參甘湯

辛溫平補湯

甘寒補氣湯

益元湯

回陽救急湯

栝樓瞿麥丸

中滿分消湯

溫胃飲

四神丸

二神丸

澹寮四神丸

烏頭赤石脂丸

五君子煎

感應丸

九痛丸

黃芽丸

導氣湯

附子粳米湯

成方切用

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

天台烏藥散

薏苡仁附子散

四維散

疝氣方

梔附湯

鎮陰煎

橘核丸

五味子散

三  
祛寒門  
卷十三

歸氣飲

暖肝煎

補火丸

金液丹

半硫丸

二氣丹

破陰丹

黑鉛丹

黑錫丹

五德丸

成方切用

七德丸

唐鄭相國方

青娥丸

復陽丹

三氣飲

壽脾煎

一炁丹

九炁丹

聖龍煎

目錄

四  
祛寒門  
卷十三

喝起丸

成方切用卷十三

祛寒門

寒之為病有陰邪犯於表者有生冷傷於內者有陰寒中於臟者此皆外來之寒人所易知者也至於本寒之寒初起無所感莫測其因人之病此者最多世之知此者最其難也或因稟賦之弱或因失調以致陽氣不足者多見其寒從中而生或因感寒之病無所不致第其由來者漸形見者微當其未覺也孰為之意及其既甚也始知難治別庸醫多有不識每以假熱為真火因與寒相混無形無跡又不知其幾也故惟高明見道之士常以陽衰根本為憂凡祛寒之法如乾薑黃連中亦能散去無忌無汗者宜之內桂能行血善達四肢血滯多痛者宜之吳茱萸善暖下焦腹痛泄瀉者極妙肉豆蔻可溫脾胃強壯利者最奇胡椒溫胃和中其類近於草撥丁香止瀉行氣其暖過於豆仁補骨脂性降而善開故能氣定而瀉止帶濁泄瀉製附子性行如酒故無慮不到能救急回陽凡此之類皆性味溫熱之當辨者然用法尚有其要以其兼溫者散寒邪也以行兼溫者行

成方切用

理中湯

卷十三

理中湯

寒滯也以補兼溫者補虛寒也第多汗者忌薑薑能散也失血者忌桂桂動血也氣短氣怯者忌紙紙降氣也

治傷寒太陰病自利不渴王海藏曰上吐下瀉不止當渴而利者為寒利三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身冷其大較也下利雖有表證不可發寒多而嘔腹痛糞

火脈沉無力或厥逆拘急寒束於外或結胸吐衄寒凝於中及感寒霍亂陰陽不和而揮霍撩亂或吐或瀉亦凡中宮虛寒氣不能理諸證俱宜用此分理陰陽安和胃氣

白朮陳壁土炒二兩乾薑炮甘草炙人參兩一自利腹痛者加木香

不痛利多者倍白朮渴者倍白朮益氣燥淫故能生津踞臥沉重利不

止加附子此兼少陰證腹滿去甘草甘令嘔吐去白朮加半夏薑

汁白朮甘薑逆臍下動氣去朮加桂白朮補氣悸加茯苓則悸

茯苓利發黃加茵陳寒實結胸加枳實本方等分蜜丸名理

中丸仲景曰大病瘥後喜唾久不了了胃中有寒宜理中丸

大理中丸上此服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受病之源也果愈

成方切用

理中湯

卷十三

人參補氣益脾故以為君白朮健脾燥溼故以為臣甘草和

中補土故以為佐乾薑溫胃散寒故以為使以脾土居中故

曰理中人身上脘清氣居多下脘濁氣居多而其

本方加附子一枚名附子理中湯亦可作丸即四逆湯加參朮治中寒腹

痛身痛四肢拘急漸傷曰傷卒中曰中有中臟中腑中經絡

換金正氣散加附子皮肉筋脈之殊治之當分微甚微則用附

子理中湯薑附湯入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加於白

朮入心加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治太陽表證不

除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不解者欲解表裏之

為敷布故用理中以和裏而加桂枝以解表不名理中而名

桂枝者到底先表之意也大抵陽熱為邪則腹滿而咽乾陰

寒為邪則腹加枳實茯苓蜜丸名枳實理中丸崔行治寒實

結胸欲絕胸膈高起手不可近用大陷胸不瘥者

此是下後

虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相搏結於胸者用此丸先理其氣次療諸疾其效如神渴者加花粉自汗者加牡蠣粉

去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安蚘丸

陶仲文治胃寒吐就

就得甘則動故去甘草得酸則止得辛則伏故加椒梅

薑煎名溫胃湯治憂思鬱結脾氣凝脹滿上衝飲食不下

加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯

海藏亦出理中例法

加青皮陳皮名

治中湯治前證腹滿痞悶兼食積者加陳皮茯苓名補中湯

治泄瀉瀉不已加附子惡食食不化加砂仁加黃連茯苓名

連理湯治傷暑瀉而作渴

若外感盛暑內傷生冷者非此不可

理陰煎

成方切用

理陰煎

主 祛寒門 卷十三

治真陰虛弱脹滿嘔逆痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等證

熟地三五七錢或一二兩當歸二三錢或五七錢乾薑炒黃色一錢甘草炙一錢或二錢

加肉桂一二錢 加附子名附子理陰煎 若風寒外感邪

未深入但見發熱脈數不洪凡內無火證素稟不足者但用

此湯加柴胡一錢半或二錢連進一二服其效如神若寒凝

陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢放心用之或不用柴

胡亦可恐其清利也 若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或

背惡寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加附子

一二錢 若陰虛火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪

不能解者宜去薑桂單以三味與之加減或止加人參亦可

若脾腎兩虛水泛為痰或嘔或脹者加茯苓一錢五分或

加白芥子五分以行之 若泄瀉不止及腎瀉者宜少用當

歸或并去之加山藥藕豆吳茱萸破故紙肉豆蔻附子 若

腰腹有痛加杜仲牛膝 若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂

仁

此理中湯之變方也凡脾腎中虛等證宜剛燥者當用理中

六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類又凡真陰不足或

素多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼

痛或面赤舌焦或雖渴而不喜冷飲或背心肢體畏寒但脈

見無力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用此加

減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從陰

達而寒邪不攻自散此最切於時用者也

六味回陽飲

治命門火衰陰中無陽陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢製附子二三錢炮乾薑二三錢炙甘草一錢熟地五錢

當歸三錢血者以冬龍代之 如肉振汗多者加炙黃耆

四五錢或一兩或冬白朮三五錢 如泄瀉者加烏梅二枚

或北五味二十粒 如虛陽上浮加茯苓二錢 如肝經鬱

滯加肉桂二三錢

成方切用

六味回陽飲

四

祛寒門 卷十三

四逆湯 仲景

治三陰傷寒

四逆湯為少陰主藥然三陰通身痛腹痛下利

清穀自利居名惡寒不渴四肢厥冷

則血脈凝滯陽氣不能敷布或反不惡寒面赤煩躁陽盛格

故一身盡痛而手足厥冷也

裏寒外熱或乾嘔或咽痛虛火上炎脈沉微細欲絕少陰脈

緊有數而仲景統以微細言之蓋沉必重按始得緊數亦有

沉細中見不似陽證浮大而緊數也薛慎齋曰人知數為熱

不知沉細中見數為寒其真陰寒證脈皆

有七八至者但按之無力爾宜深察之

附子一枚

生用乾薑兩甘草二兩冷服面赤者格陽於上也

加葱九莖以通陽

驗嘉言曰陽虛之人雖有表證其汗仍出

藥外邪不致散故用

腹痛真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽

前湯加葱為治

成方切用 四逆湯 五 社稷門

痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利止脈不出加人參二

兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散逆氣

寒淫於內治以甘熱故以薑附大熱之劑伸發陽氣表散寒

邪附子生用甘草亦補中散寒之品又以緩薑附之僭上也

甘草為君乾薑必冷服者寒盛於中熱飲則格拒不納經所

謂熱因寒用又曰治寒以熱涼而行之是也此制奇之大劑

大劑不能達仲景云傷寒醫下之續得下利清穀腹滿身痛

者急當救裏宜四逆湯清便自調身痛者急當救表宜桂枝

湯蓋身痛尚屬表證急則先救裏而後解表也厥陰篇曰大

汗出熱不去內拘急四肢厥痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯

主之按厥陰證下利證語有燥屎厥沉疾按之有力者為陽

厥止宜下以小承氣湯如脈沉遲按之無力者則為陰厥宜

四逆湯更須速灸之凡傳經邪則為陽厥弱赤而喜飲冷

直中真寒則為陰厥陰縮而喜飲熱湯經曰凡陰陽不相順

接便為厥手足逆冷是也○三陰三陽之脈俱相接於手足

陰上寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足逆冷

加人參一兩名四逆加人參湯治惡寒脈微復利止亡血

利雖止而津液再加茯苓六兩名茯苓四逆湯治汗下後病

不解而煩躁去乾薑加芍藥三兩名芍藥甘草附子湯治傷

寒發汗不解反惡寒者虛故也百問曰汗後惡寒人必實除附

子用甘草四兩乾薑二兩名甘草乾薑湯治傷寒脈浮自汗

小便數微惡寒腳掣急用桂枝湯誤攻其表得之使厥咽中

乾煩躁吐逆與此湯以復其陽也脈浮自汗便數惡寒陽不足

故與甘草益氣乾薑助陽侯厥愈足溫重與芍藥甘草湯各四兩以和陰

液證雖鄰於少陰而不敢用四逆其腳即伸除甘草加葱白

成方切用 當歸四逆湯 六 社稷門

四逆名白通湯

復陽加吳茱萸名茱萸四逆湯治少陰厥陰

腹痛加當歸木通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷脈細欲

絕及寒疝臍下冷引腰膝痛寒傷營血故加當歸木通能通

加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃加生脈散陳皮名回陽返本

湯治陰盛格陽加官桂良薑半夏名漿水散治虛寒水瀉

冷汗脈微甚者嘔吐此為急病

當歸四逆湯 仲景

治厥陰傷寒手足厥寒脈細欲絕

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 通草 即木通 大棗 十

五 仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸二升生薑半酒六

子 52-632



升和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

四逆之名多矣而有因寒因熱之不同此則因風寒中血脈

而逆故以常歸辛溫血中之氣藥為君通脈散逆必先去血

中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒

為輔未有營衛不和而脈能通者故以芍藥甘草大棗調和

營衛通草利九竅通血脈關節諸藥藉之以破阻滯而厥寒

散矣

真武湯 仲景

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為

有水氣或欬或嘔或小便不利傷寒脈沉細欲吐不吐心煩但

成方切用

真武湯

社稷門

陰證凡人寤則氣行於陽寐則氣行於陰然必自少陰始故  
少陰證但欲寐陰氣勝也一有陽擾則反是矣周揚俊曰但  
欲寐非能寐昏昏如夢爾少陰屬腎腎病不能制水水飲停  
為水氣腹痛者寒淫內甚也四肢沉重疼痛寒淫外甚也小  
便不利自下利者淫勝而水穀及太陽病發汗汗出不解仍  
不別也或欬或嘔皆停飲也

發熱心悸頭眩筋惕肉瞤振振欲擗地氣虛惡寒汗出過多

為心液汗去心虛如魚失水則離也水停心下亦心悸心屬

火火畏水故悸也虛陽內動故頭眩汗多則液少不能榮養

筋肉故筋惕肉瞤而跳肉瞤謂動也振振欲擗地者亡陽無

奈欲擗地而入也程郊倩曰汗多亡陽夫人知之然有衛外

之陽為周身營衛之主此陽虛遂有汗漏不止惡寒身痛及

奔豚之證有腎中之陽為上焦心肺之主此陽虛遂有發熱  
眩悸瞤振擗地之證有胃中之陽為中焦水穀生土之主此  
陽虛遂有腹脹滿胃不和而心下痞之證按諸者須觀脈  
證知犯何逆以法治之胃之真陽盛則水皆內附而與腎  
氣同其收藏矣腎之陽虛不能制水則汎溢為病故上凌心  
而為眩悸中侮土而致嘔瀉也方名真武蓋取固腎為義

喻嘉言曰汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷况裏虛  
為悸上虛為眩經虛為瞤身振振搖無往而非亡陽之象所  
以行真武把關  
坐鎮之法也

附子一枚 白朮二兩 茯苓 白芍 生薑三兩

水寒相搏欬者加五味子細辛乾薑五味散肺氣細小便利

去茯苓以其下利去芍藥加乾薑芍藥散寒嘔去附子加生

薑一倍 附子散逆

茯苓白朮補土利水能伐腎邪而療心悸生薑附子回陽益

衛能壯真火而逐虛寒芍藥酸收能斂陰和營而止腹痛

必兼和陰不欲偏勝經曰寒淫所勝治以辛熱淫淫所勝佐以酸平 真武北方之神一龜一蛇

司水火者也腎命象之此方濟火而利水故以名焉 程郊倩

成方切用

真武湯

社稷門

唯太陽與少陰有之以二經同司夫水也然太陽從表得之  
膚腠不宣水氣為元府所遏故以小青龍發之少陰由下焦  
有寒不能制水水客邪得深入而動其本氣緣胃陽衰而  
隄防不及也故用真武湯溫中鎮水收攝其陰氣按青龍上  
太陽表水十棗主太陽裏水真武主少陰裏水喻嘉言曰陽  
明少陽絕無用附子法唯太陽有不得不用之證蓋太陽陽  
明為腎之腑腎中陽虛陰盛勢必傳出於腑以故經見脈微  
惡寒漏汗惡風心悸頭眩筋惕肉瞤等證縱是傳經熱  
邪不得不不用附子以消陰而回陽也

去生薑加人參二兩名附子湯 景仲 治少陰病身體痛手足寒

骨節痛脈沉者 陰盛而生內寒所致非外感也若以外感之

痛治之則殺人矣故用參附助陽而及少陰病得之一二日

勝腎寒加芍藥斂陰以為陽之附也 及少陰病得之一二日

口中和背惡寒者 背為胸中之陽諸陽受氣於胸中轉行於

背為之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣又有陰氣

不足陽氣乘虛內陷陰中表陽新虛背微惡寒者經所謂傷

寒無大熱口渴心煩背微惡寒者是也白虎加人參湯主之  
一為陰寒內盛一為陽氣內陷何以別之蓋陰寒為病內無  
燥熱則口中和陽氣內陷則清稀津液口燥舌乾而  
渴也欲辨陰陽寒熱之不同當以口中燥潤詳之  
吳茱萸湯 仲景

治陽明證食穀欲嘔若得湯反劇者則屬上焦少陰證吐利  
手足厥冷煩躁欲死厥陰證乾嘔吐涎頭痛 厥陰之脈挾胃  
內格也厥陰之脈上竅頭痛寒氣上逆也。按三陽皆有頭  
痛太陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛唯厥陰與督脈  
會於巔亦有頭痛然風溫在少陰溫在太陰而頭痛反痛是  
又不可拘拘者李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足  
寒而氣逆也蓋太陰少陰二經雖不上循頭然  
痰與氣逆壅於膈中頭上氣不得暢而為痛也

吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚 生薑六兩

喻嘉言曰此明嘔有太陽亦有陽明若食穀而嘔則屬胃寒  
成方切用 吳茱萸湯 九 社寒門 卷十三

與太陽之惡寒嘔逆原為熱證者不同 火熱上衝而嘔 恐誤以寒藥  
治寒嘔也若服吳茱萸湯反劇者則仍屬太陽熱邪而非胃

寒明矣 宜葛根加半夏湯小柴 若少陰證吐利厥逆至於煩  
躁欲死腎中之陰氣上逆將成危候 腎中陰盛上格 故用吳

茱散寒下逆人參薑棗助陽補土使陰寒不得上千溫經而

兼溫中也 吳茱為厥陰本藥故又 治肝氣上逆嘔涎頭痛

加附子名吳茱萸加附子湯治寒疝腰痛牽引睪丸尺脈沉

遲

大建中湯 金匱

治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見有

頭足上下痛而不可觸近者 陽受氣於胸中陽虛則陰邪得  
格於中焦故見高起而不可觸近之為心為胃其陰  
寒乘於心冷熱相激故痛寒乘於脾胃冷弱不消水穀故痛  
而嘔後不 能飲食也

蜀椒 合乾薑 兩人參 煎去滓內飴糖一升微煎溫服

助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩

可和中蓋人以中氣為主用辛辣甘熱之藥大建其中臟之

陽以祛其逆上之濁陰也

小建中湯 仲景

治傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛 邪氣入裏與正相搏則腹

成方切用 大建中湯 小建中湯 十 社寒門 卷十三

越土也太陽在表無腹痛少陽在牛表半裏有胸脇痛而無

腹痛陽明腹滿急痛者裏實也宜下之大柴胡湯小承氣湯

三陰下利而腹痛者裏虛也宜溫之四逆湯附子理中湯傷

寒三三日心悸而煩 悸者陽氣虛也煩者陰血虛也氣血內

陰陰收則陽歸附也加飴糖者 通治虛勞悸衄裏急腹痛夢

遺失精四肢痠痛手足煩熱咽燥口乾虛勞黃疸 黃疸小便

者是無熱也不可除熱當作虛寒治之喻嘉言曰虛勞病至

於亡血失精精枯槁難為力矣急宜建其脾使飲食增

而陰血旺故但用稼穡作甘之味生其精

血而酸辛酸苦在所不用含是無良法也

桂枝 生薑 芍藥 甘草 大棗 入飴糖一升

微火解服 湯但桂有厚薄按此湯以飴糖為君故不名桂

枝芍藥而名建中今人局建中絕不用飴糖失仲景遺意矣

吳鶴皋曰桂枝當是桂枝湯故可以解表桂枝厚故用

以建裏

準繩曰脾居四臟之中生育營衛通行津液一有不調則失

所有所行矣必以此湯溫健中臟故名建中脾欲緩急食甘

以緩之故以飴糖為君甘草為臣桂枝辛熱辛散也潤也營

衛不足潤而散之芍藥酸寒酸收也泄也津液不通收而行

之故以桂芍為佐生薑辛溫大棗甘溫胃者衛之源脾者營

之本鍼經曰營出中焦衛出上焦是已衛為陽益之必以辛

營為陰補之必以甘辛甘相合脾胃健而營衛通故以薑棗

為使李東垣曰傷寒論云陽脈瀦陰脈法當腹中急痛以臣水挾木勢亦來侮土肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水薑棗

辛甘而溫發散陽氣行於經脈皮毛為使或謂桂枝湯解表

成方切用小建中湯 卷十二 補寒門

而芍藥少建中湯溫裏而芍藥多何也皮膚為近則制小其

服心腹為遠則制大其服所以不同也按此即表欲其散裏

欲其收之義也小建中治腹痛者以木來侮土取芍藥為君

土中瀉木也理中湯治腹痛者以水來侮土取乾薑為君

中瀉水也平胃散治腹痛自利者取蒼朮為君瀉土除濕也

雲岐子曰建中為補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之

虛調胃為瀉能瀉中焦之實

而黃耆兩半名黃耆建中湯金匱治虛勞諸不足準繩曰血不

黃耆味甘加以甘草大能生血此仲景之妙法蓋家穡精作甘

甘能補胃胃為氣血之源氣血所從生也經曰無陽則陰無

表而出之按補血湯黃耆五倍於當歸而云補血即此義亦

治傷寒汗後身痛表虛惡寒脈遲弱者身痛有表裏俱有之

熱有風有淫陽證身痛但拘急陰寒身痛體勢沉重如被

杖以此辨之此證因過汗耗損陽氣血少不能榮養筋脈故

病陽虛故脈遲汗後故脈弱用黃耆甘草之甘以補中氣芍

藥之酸以收陰氣桂枝辛熱外以益衛而實表內以和營而

補虛使中氣建立則能生血營衛通行津液

十四味建中湯

治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵及陰證發斑

或汗吐下後中氣虛乏或因勞事損傷腎氣或因過服涼藥

成陰證寒伏於下通其無根失守之火上獨薰肺而發斑

其色淡紅隱隱見於肌表與陽證發斑色紫赤者不同此胃

氣極虛若服寒涼立見危殆與陽證發斑色紫赤者不同此胃

之變者也醫不寒其脈微

黃耆人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 夏黃當歸 白芍

熟地 川芎 麥冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加薑棗

煎人參 茯苓 甘草 半夏 夏黃當歸 白芍 熟地 川芎 麥冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加薑棗

黃耆益衛壯氣補中首藥四君益氣四物養血陰陽調和則

成方切用十四味建中湯 卷十二 補寒門

血氣各安其位矣半夏和胃健脾麥冬清心潤肺茯苓補命

門相火之不足桂附引失守之火而歸元於十全大補之中

而有加味要以強中而戢外也

除茯苓白朮麥冬川芎熟地茯苓名八味大建中湯治同除

川芎熟地白朮附子茯苓加柴胡細辛陳皮名樂令建中湯

治臟腑虛損身體羸瘦潮熱自汗將成勞瘵大能退虛熱生

氣血喻嘉言曰樂令建中湯柴胡細辛為君意在退熱而陰

陽而陰虛之陽未必不可復又在用方者之善為斟酌也

二方治臟氣虛虛之以兩建其脾胃之陽蓋虛勞之病多本

脾腎故引伸建中之法

乃使人超出之方也

養中煎

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參二錢 山藥二錢 白朮三錢 炙甘草一錢 乾薑二錢

如噤腐氣滯者加陳皮一錢或砂仁四分 如胃中空虛覺餒加熟地三五錢

白通加人尿豬膽汁湯 仲景

治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔而煩服此湯後脈暴出者死微續者生 腎者胃之關也前陰利水後陰利穀寒邪客之則不能禁固故下利也與白通湯復陽散寒服後利不止厥後脈暴出者正氣因發泄而脫也故生

葱白四兩 乾薑一斤 附子一枚 人尿五合 豬膽汁一合 加減法同四

成方切用

黃帝經 白通加人尿豬膽汁湯

圭

社稷門 卷十三

逆湯

葱白之辛以通陽氣薑附之熱以散陰寒此白通湯也服而不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達少陰故加人尿豬膽汁為引取其與陰同類下咽之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反者反治此之謂也 以熱治寒以寒治熱為正治以熱治熱以寒治寒為反治亦曰從治謂從其性而伏之也按厥有陰陽二證陰厥者身涼不渴脈遲細而微陽厥者身熱極而反厥雖厥而煩渴躁妄身復時溫而脈數也若陽厥極深至於身冷脈微欲絕為熱極而將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生脈而合身暖也若以熱藥助其陽則陰氣暴絕而死矣陰厥用白通四逆湯亦須急投緩則無及

薑附白通湯

治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色清氣冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之證

附子炮去 乾薑炮五錢 葱白五草 豬膽汁大者 用水二大盞煎

附薑二味至一盞入葱汁并豬膽汁和勻服再用葱一大握以帶輕束切去兩頭畱二寸許以一面熨熱安臍上用熨斗盛炭火熨葱白上面取其熱氣從臍入腹甚者連熨二三餅又甚者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯 臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸 內外協攻務在一時之內令得陰散陽回身溫不冷次用附薑歸桂湯

成方切用

薑附白通湯 附薑湯

圭

社稷門 卷十三

喪神守急用附子乾薑加葱白以散寒加豬膽汁引入陰分然恐藥力不勝熨葱灼艾外內協攻乃足破其堅凝少緩須臾必無及矣又曰用薑附以勝陰復陽者取飛騎突入重圍舉旗樹幟使既散之陽望幟爭趨頃之復合爾不知此義者加增藥味和合成湯反牽制其雄入之勢必至藥緩無功矣

附薑湯

治卒暴中寒其人腠理素虛自汗淋漓身冷手足厥逆或外顯似熱躁擾乃陰盛於內逼其陽亡於外即前方不用葱白也

附子炮去 乾薑炮五錢 水二大盞煎至一盞加豬膽汁一蛤

穀和溫冷服不用葱熨及艾灼

喻嘉言曰若其人真陽素擾腠理素疎陰盛於內必逼其陽亡於外魄汗淋漓脊項強硬用附子乾薑豬膽汁即不可加葱及熨灼恐助其散而陽無由內附也宜撲止其汁陡進前藥隨加固護腠理不爾恐其陽復越也

附子歸桂湯

治暴病用附薑湯後第二服隨用此繼之因附薑專主回陽而其所中寒邪先傷營血故加歸桂驅營分之寒纔得病相當也

附子炮去乾薑炮當歸肉桂二錢五分水二大盞煎至一盞  
成方切用  
附薑歸桂湯  
附薑歸桂湯  
入蜜一蛤殼溫服

喻嘉言曰其次前藥中即須首加當歸肉桂兼理其營以寒邪中入先傷營血故也不爾藥偏於衛弗及於營與病即不相當邪不盡服必非勝算也

附子歸桂參甘湯

治陽氣將回陰寒少殺略有端緒第三服即用此方

附子炮去乾薑炮當歸肉桂一錢五分人參甘草二錢水二大盞煨薑三片白不用大棗二枚煎至一盞入蜜三蛤殼溫服  
喻嘉言曰其次前藥中即須加入人參甘草調元轉餉收功  
韓幄不爾薑附之猛直將犯上無等矣

辛溫平補湯

治暴中寒證服前三方後其陽已回身溫色活手足不冷吐利漸除第四方即用此平調臟腑營衛俾不致有藥偏之害  
附子炮去乾薑炮肉桂五分當歸人參甘草炙黃耆蜜白北土白芍酒炒五味子十二粒水二大盞煨薑三片大棗二枚煎至一盞入蜜五蛤殼溫服

喻嘉言曰用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃耆白朮五味白芍大隊陰陽平補不可歇手蓋重陰見睨浪子初歸斯時搖搖靡定怠緩不為善後必墮前功也又曰用羣陰之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出成方切用  
辛溫平補湯  
甘寒補氣湯

早已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無由遽轉為熱薑附固可弗施其牛黃竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素有熱痰妄投寒劑則陰復用事陽即躁擾必墮前功也

甘寒補氣湯

治中寒服藥後諸證盡除但經絡間微有窒塞辛溫藥服之不能通快者第五方用甘平助氣藥緩緩調之  
人參麥冬白芍酒炒黃耆蜜炙生地黃二分甘草炙牡丹皮八分淡竹葉鮮者取汁少許水二大盞煎至一盞入梨汁少許熱服無梨汁用竹瀝可代

喻嘉言曰前用平補後已示銷兵放馬偃武崇文之意茲後復有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛熱助熱藥塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧字也

益元湯 活人

治面赤身熱不煩而躁飲水不入口名戴陽證成氏曰煩躁也躁煩者先躁而逆遲復煩也從煩至躁為先躁後煩明矣按內熱曰煩謂心中煩煩為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱曰躁謂身體手足動擾欲裸衣入非為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治大抵煩不煩者多屬熱惟悸者屬虛獨躁不煩者多屬寒而火邪者間或有之

成方切用

益元湯 回陽救急湯

社稷門 卷十三

附子 乾薑 艾葉 黃連 知母 人參 麥冬 五味

子 甘草 加薑棗葱白煎入童便一匙冷服

附子乾薑艾葉回陽之藥協以人參甘草補其陽虛退其陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以折泛上之火知母以滋在下之陰以靜其躁蓋陽無陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰也麥冬五味補肺清心合人參以生其脈加童便而冷服者熱因寒用也

回陽救急湯 節菴自註云即四逆湯

治三陰中寒初病身不熱頭不痛惡寒戰慄四肢厥冷引衣自蓋跪臥沉重腹痛吐瀉口中不渴或指甲唇青口吐涎沫

或無脈或脈沉遲無力初病無身熱頭痛是無表邪邪不在表於四肢也引衣自蓋是寒中少陰也腹痛吐瀉不渴是寒中太陰也指甲唇青口吐涎沫是寒中厥陰也至於沉遲無脈陰寒為已甚矣戰慄有屬陰者陽微陰勝邪氣內爭而正不勝故心寒足冷身微厥冷而一身戰慄也而勝故身為振搖遂大汗以解也

附子 乾薑 肉桂 人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮

分七甘草五分 分五五味子九粒 加薑煎入麝三釐調服無脈加豬膽

汁而通脈 泄瀉加升麻黃耆嘔吐加薑汁吐涎沫加鹽炒吳茱萸

寒中三陰陰盛則陽微故以附子薑桂辛熱之藥祛其陰寒而以六君溫補之藥助其陽氣五味合人參可以生脈加麝

成方切用

栝樓瞿麥丸

社稷門 卷十三

香者通其竅也

栝樓瞿麥丸 金匱

治小便不利有水氣其人渴

栝樓根二枚 茯苓 薯蕷兩 附子一枚 瞿麥一兩 煉蜜丸服以

小便利腹中溫為知

金匱治小便不利而淋且渴者用之以其胃中有熱腹中有寒故變八味丸之制為此丸見其人跌陽脈數即胃中有熱胃熱必消穀引食大便必堅小便必數是其淋而且渴為胃熱中消明矣故用栝樓以清胃熱茯苓瞿麥以利小便然腎中寒水之氣上入於腹則腹中必冷故用附子以勝其寒方

下云以小便利腹中溫爲知制方之義可繹思也

中滿分清湯 東垣

治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心  
下痞下虛陰躁奔豚不收 或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則腹滿或臟寒生滿病此湯

川烏 乾薑 畢澄茄 生薑 黃連 人參 當歸 澤

瀉 青皮 麻黃 柴胡 草薢仁 厚朴 黃耆 黃蘗

分益智仁 吳茱萸 木香 半夏 茯苓 升麻 熱

服

川烏二薑吳茱萸益智草薢除溼開鬱暖胃溫腎以祛其

成方切用

中滿分清湯 溫胃飲

九 祛寒門 卷十三

寒青皮厚朴以散其滿升麻柴胡以升其清茯苓澤瀉以降

其濁人參黃耆以補其中木香以調其氣當歸以和其血麻

黃以泄其汗半夏以燥其痰黃蘗黃連以去溼中之熱又熱

因寒用也 李東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者

脾胃有病令上下分清其淨下焦如瀉氣血自然分化

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不

安等證

白朮 炒 當歸 錢 人參 錢 白扁豆 炒 甘草 錢 乾薑

炒黃 錢 陳皮 炒 錢 如下寒帶濁者加故紙一錢 如氣滯

或兼胸腹痛者加藿香丁香白豆仁砂仁白芥子之屬 如

兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴胡 如脾氣

陷而身熱者加升麻五七分 如水泛爲痰而胸膈痞滿者

加茯苓一二錢 如脾胃虛極大嘔大吐不能止者宜倍用

參朮仍加柴胡胡椒二三分煎熟徐徐服 如泄瀉者去當

歸無滯去陳皮

四神丸

治腎瀉脾瀉 腎瀉者五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰

能鍵閉故將交陽分則瀉也脾瀉者脾之清陽下陷不能運

化關門元氣不足不能分別水穀不瀉而瀉也兩證皆由腎

命火衰不能上生脾土故也 關門在大小腸之交主

成方切用

四神丸

手 祛寒門 卷十三

破故紙 四兩酒浸 五味子 三兩 肉豆蔻 二兩 吳茱萸 一兩

泡 用大棗百枚生薑八兩切片同煮棗爛去薑取棗肉搗

丸每服二錢臨臥鹽湯下 若平旦服之至夜藥力已盡不能敵一夜之陰寒也

破故紙辛苦大溫能補相火以通君火火旺乃能生土故以

爲君肉蔻辛溫能行氣消食暖胃固腸五味鹹能補腎酸能

瀉精吳茱萸辛熱除溼燥脾能入少陰厥陰氣分而補火蓋久

瀉皆由腎命火衰不可專責脾胃故大補下焦元陽使火旺

土強泄瀉自止矣

單用破故紙肉豆蔻名二神丸治同 詩學士曰有全不進食

授二神丸頓能進食此病不可全作脾治蓋腎氣怯弱真單

元衰削是以不能化食如釜鼎之下無火物終不熟也



用五味子吳茱萸名五味子散治同除五味吳茱萸加茴香

木香錢五薑煮棗丸亦名四神丸治同茴香亦散胃之藥

湯用以疎肝和脾不使木鬱土也薛氏醫案云脾胃虛寒下者補中益氣湯加木香肉果補腎脂脾氣虛寒不

者六君子湯加炮薑肉桂命門火衰脾土虛寒者宜入味丸

脾腎氣血俱虛者十全大補湯送四神丸大便滑利小便秘

瀉或肢體盡腫喘嗽吐痰為脾

腎虧損宜金匱加減腎氣丸

烏頭赤石脂丸金匱

治心痛微背背痛微心

赤石脂煅蜀椒兩烏頭炮附子炮乾薑炮蜜丸日三服

不知稍加

此乃陰寒之氣厥逆而上干橫格於胸背經脈之間牽連痛

成方切用烏頭赤石脂丸 五君子煎 手 祿寒門 卷十三

楚亂其氣血攪其疆界此而用氣分諸藥則轉益其病勢必

危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背

既亂之氣難安而即於溫藥隊中取用乾薑之泥赤石脂之

瀉以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胸之氣自行於胸背之氣

自行於背各不相犯其患乃除此煉石補天之精義也今人

知有溫氣補氣行散氣諸法矣亦知有堵塞邪氣攻衝之實

令胸背陰陽二氣竝行不悖者哉

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼溼者

人參錢三乾薑炒黃白朮錢二茯苓錢二甘草錢一加陳皮

一錢名六味異功煎證治同前而兼微滯者

按此即四君子湯五味異功散之變方也

感應丸

治新舊冷積瀉痢等證

木香 肉豆蔻 丁香兩乾薑炮百草霜一杏仁一百四十

巴豆七十粒去心巴豆杏仁另研同前藥末和勻用好黃

蠟六兩溶化重絹濾去渣好酒一升於砂鍋內煮數沸候酒

冷蠟浮用清油一兩銚內熬熱取蠟四兩同化成汁就銚內

和前藥末乘熱拌勻丸如豆大每服三十丸空心薑湯下

肉蔻逐冷消食下氣和中丁香暖胃助陽宜壅除癖木香升

成方切用感應丸 久痛丸 手 祿寒門 卷十三

降諸氣和脾疎肝杏仁降氣散寒潤燥消積炮薑能逐鋼冷

而散痞通關巴豆善破沉寒而奪門宜滯寒積深鋼非此莫

攻百草霜和中溫散亦能消積治痢為佐也醫貫曰此方神

巴豆不令人瀉其積自然消化李時珍曰一婦年六十餘瀉

瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服升溫藥瀉反甚服沉而

滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法當以熱下之用蠟置巴豆

丸五十粒服二日遂愈自此每用治瀉痢愈者近百人

久痛丸金匱

治久寒心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷

流注心胸痛并冷腫上氣落馬墜車血疾等

附子三生狼牙炙巴豆去皮心人參 乾薑 吳茱萸兩

煉蜜丸桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸



仲景於胸痹證後附久痛丸治久寒心痛以其久着之邪不同暴病故藥則加峻而湯改爲丸取緩攻不取急蕩也久寒心痛乃久客之劇證即腎水乘心腳氣攻心之別名也痛久血瘀陰邪團結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非搗其巢邪終不去爾黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證人參二錢焦乾薑二錢蜜丸芡實大常嚼服甚妙加甘草二錢爲散名參薑散治脾肺虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等證

二方或陳皮或華撥或茯苓皆可酌用

成方切用 黃芽丸 導氣湯 圭 卷十三

治寒疝疼痛 陰氣積於內復爲寒邪所襲營衛不調則成疝七種寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝癰疝也證雖見於腎病實本於肝以厥陰肝脈絡於陰器故也女子小腹有積前陰突出及陰菌亦同此類但女子不名疝而名瘕

川練子四錢木香三錢茴香二錢吳茱萸一錢湯泡 長流水煎

此治疝之通劑也川練苦寒能入肝舒筋使無鬱急之苦又能導小腸膀胱之熱從小水下行爲治疝之主藥木香升降諸氣通利三焦疏肝而和脾茴香能入腎與膀胱暖丹田而祛冷氣吳茱萸入肝腎氣分燥溼而除寒三者皆辛溫之品用以宣通其氣使小便下利蓋疝病多因寒溼所致寒去則

溼自除也

附子粳米湯 金匱

治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子一枚炮 半夏半升甘草一兩大棗十枚粳米半升以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

腹中陰寒奔迫上攻胸脇以及於胃而增嘔逆頃之胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之機所重全在胃氣乘其邪初犯胃尙自能食而用附子粳米湯以溫飽其胃胃氣溫飽則土厚而邪難上越胸脇逆滿之濁陰得溫無敢畱戀必還從下竅而出曠然無餘此持危扶顛之手眼也

成方切用 附子粳米湯 胃關煎 圭 卷十三

治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證

熟地三五錢或一兩 山藥炒 藕豆炒 白朮炒 焦乾薑三錢 甘草一錢 吳茱萸製五分 瀉甚者加肉豆蔻一二錢 炒或補骨脂亦

可 氣虛甚者加人參隨宜用 陽虛下脫不固者加製附子一二三錢 腹痛甚者加木香七八分或厚朴八分 滯痛不通者加當歸二三錢 滑脫不禁者加烏梅二箇或五味子二十粒 肝邪侮脾者加肉桂一錢

佐關煎 治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒溼安

脾胃此胃關之佐者也

厚朴炒 陳皮炒 山藥炒 藟豆炒 豬苓 澤瀉二錢 乾薑炒 肉桂一錢 甘草七錢 如腹痛甚者加木香三五分吳茱萸亦可

抑扶煎

治氣令陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起氣血未衰脾胃未敗或脹滿或嘔惡皆可先用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒溼傷臟霍亂邪實者最宜用此

厚朴 陳皮 烏藥錢半 豬苓 澤瀉二錢 甘草一錢 乾薑二錢 吳茱萸五分 如氣滯痛甚者加木香五七分或砂仁亦可

成方切用

佐關煎 抑扶煎 天台烏藥散

卷十三

血虛多痛者加當歸二錢 寒溼勝者加蒼朮錢半

天台烏藥散

治小腸疝氣牽引臍腹疼痛厥陰肝脈絡於陰器上入少腹

疼痛小腸經絡並於厥陰寒邪客於小腸少腹痛引羣丸上而不下痛入臍腹甚則上衝心胸故俗亦名小腸氣古人治法往往相類

巴豆七十粒 川練子十箇 烏藥 木香 茴香鹽炒 良薑炒 青皮五錢

檳榔二箇 先將巴豆微打破同川棟熬炒黑去殼及巴豆同

餘藥為末酒下一錢烏藥散膀胱冷氣能消腫止痛川棟等小腸邪熱從小便下行木香青皮行氣而平肝良薑茴香散寒而暖腎檳榔性如鐵石能下水潰堅巴豆斬關奪門破血

瘕寒積皆行氣祛溼散寒之品也

薏苡仁附子散金匱

治胸痺緩急之證

薏苡仁二兩 大附子一枚 杵為散服方寸七日三服

胸中與太空相似天日照臨之所而膈中之宗氣又賴以包舉一身之氣者也今胸中之陽痹而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總由陽氣不運故致然也用薏苡仁以舒其經脈用附子以復其陽則宗氣大轉陰濁不留胸際曠若太空所謂化日舒長曾何緩急之有哉

四維散

成方切用

薏苡仁附子散 四維散 疝氣方

卷十三

治脾胃虛寒滑脫之甚或瀉痢不能止或氣血下陷二陰血

脫不禁者無出此方之右

人參兩 乾薑炒 製附子二錢 甘草一錢 烏梅五分 或不用此即四 為末和勻用水拌溼蒸一飯頃取起烘乾

再為末每服一二錢溫酒調下

疝氣方丹溪

治疝氣疼痛

吳茱 枳殼 梔子 棠球子即山查之小者俱妙用 荔枝核殼 等

分為末空心長流水煎湯下二錢

吳茱入厥陰氣分溫肝逐寒山梔瀉三焦火熱由膀胱出枳

殼行氣而破癰山查散瘀而磨積務枝雙結形類舉九能入  
肝腎辟寒散滯故假之以爲引也丹溪曰痼病自素問而下  
者必有說以通之可也因思此病始於淫熱在經絡過至久  
又感外寒淫熱被鬱而作痛只作寒論恐有未盡古方以烏  
頭梔子等分作湯其效亦速後因此方隨證加減無有不應  
須分淫熱多少而治之又有按虛而發者當以參朮爲君而  
佐以疎導其脈沉緊而大者是也按疎導藥即訖仁山查  
枳實黑梔川棟吳茱延胡丁香木香之類○山梔附子酒煎  
加鹽服名梔附湯丹溪曰烏頭  
治外束之寒梔子治內鬱之熱

鎮陰煎

治陰虛於下格陽於上則眞陽失守血隨而溢以致大吐大  
衄六脈細脫手足厥冷危在頃刻而失血不能止者速宜用  
此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痺上熱當以此湯  
成方切用

冷服

熟地一二錢 牛膝二錢 甘草一錢 澤瀉一錢 肉桂一錢 製附子一二錢  
分 如兼嘔惡者加乾薑炒黃一二錢 如氣脫倦言而

脈弱極者宜速速多加人參隨宜用之

橘核丸

治四種癰疽 莖囊癰丸腫硬不痛不癢爲癰疽亦有引臍腹  
絞痛者四種腸癰卵癰水癰氣癰也皆寒淫爲  
病

橘核 川棟子 海藻 海帶 昆布 桃仁 延胡索

厚朴 枳實 木通 桂心 木香 酒糊丸鹽湯或酒

下

橘核木香能入厥陰氣分而行氣桃仁延胡能入厥陰血分  
而活血川棟木通能導小腸膀胱之熱由小便下行所以去  
淫官桂能平肝暖腎補腎命之火所以祛寒厚朴枳實並能  
行結水而破宿血昆布藻帶鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱  
淫久爲熱寒 同爲散腫消堅之劑也 朱丹溪曰癰疽不痛非  
久亦爲熱 若蒼朮神麴山查白芷川芎枳實半夏皆要藥又宜隨時  
月寒熱加減有熱加梔子堅硬加朴消秋冬加吳茱萸  
歸氣飲

治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中脾腎等證

熟地三錢 茯苓 藕豆二錢 炮薑 丁香 陳皮一錢 藿香半錢 甘

草八分 中氣寒甚者加製附子 肝腎虛寒者加吳茱萸肉

成方切用 歸氣飲 暖肝煎 補火丸 桂或加當歸

暖肝煎

治肝腎陰寒小腹疼痛等證

當歸二錢 枸杞子三錢 茯苓 小茴香 烏藥二錢 肉桂一錢 沉

香一錢或木 生薑三五片 如寒甚者加吳茱萸乾薑再甚者

加附子

補火丸

治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落肢倦言微 吳鶴皋曰凡人之身  
行於三焦出入於甲膽聽命於天君所以溫百骸養臟腑充  
九竅者皆此火也爲萬物之父故曰天非此火不能生物人  
非此火不能有生此火一息猶萬物無父故其肉衰而  
瘠血衰而枯骨衰而齒落筋衰而肢倦氣衰而言微也

石硫黃一觔豬大腸二尺將硫黃爲末入豬腸中爛煮三時取

出去腸蒸餅爲丸如梧子大每服十九日漸加之凡服硫黃者忌食諸

禽獸

硫黃火之精也亦號將軍大黃至寒亦號將軍故用之以補火以其大

熱有毒故用豬臟爛煮以解之庸俗之人忌而罕用蓋不知

其有破邪歸正返滯還清消陰回陽化魄生魂之力也吳鶴

戴元禮有言曰諸涼藥皆滯惟黃連寒而不滯諸熱藥皆燥惟硫黃熱而不燥昔仁和吏早衰服之年至九十他如范文

正公之金液丹得效之玉真丸和劑之來復丹半硫丸靈砂丹百選之二氣丹活人之返陰丹楊氏之紫霞丹但所主各

有飲當爾按人有眞陽虛衰桂附所不能補者非硫黃不能補之其性雖燥毒而卻疎利與燥瀉者不同苟製鍊得宜誠

爲救危妙藥若用之不當貽禍匪輕

成方切用

補火丸

祛寒門卷十三

附金液丹硫黃十兩研末瓷盒盛水和赤石脂封口鹽泥固

濟日乾地內埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火

養七日七夜加頂火一觔煅取出研末蒸餅丸米飲下治久

寒錮冷勞傷虛損傷寒陰證

來復丹太陰元精石舶上硫黃硝石各一兩硝黃同微炒不

結成砂子五靈脂去砂青皮陳皮各一兩醋和丸米飲下治伏暑

泄瀉身熱脈弱玉機微義曰硝石性寒佐以陳皮其性疎快

生冷或冒暑熱中脫閉結揮霍變亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚驗若因暑火淫熱者勿用

半硫丸半夏硫黃等分生薑糊丸治老人虛秘冷秘

靈砂丹水銀三兩硫黃一兩鍊成研細糯米糊丸治諸虛錮

冷

二氣丹硝石硫黃等分爲末石器炒成砂再研糯米糊丸梧

子大每服四十九井水下治伏暑傷冷二氣交錯中脫痞結

或嘔或泄霍亂厥逆返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁四肢逆

冷硫黃五兩硝石太陰元精石各一兩附子炮乾薑炮桂心

各五錢用鐵銚先鋪元精末一半次鋪硝石末一半中間蓋

硫黃末又着硝石一半蓋硫黃再以元精末蓋上用小盞合

着炭三觔燒令得所勿令煙出研末和前藥末飯丸梧子大

每服十五至二十丸艾湯下汗出爲度

本事方破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏硫黃水銀各一

成方切用

黑錫丹

祛寒門卷十三

兩陳皮青皮各五錢先將硫黃入銚鎔開次下水銀鐵杖攪

勻令無星細研糊丸每服三十丸如煩躁冷鹽湯下陰證艾

湯下

傷寒百問方硫黃五錢艾湯調下治身冷脈微厥而煩躁令

臥汗出而愈

黑鉛丹黑鉛硫黃各二兩將鉛鎔化漸入硫黃候結成片傾

地上上火毒研至無聲爲度治陰陽不升降上盛下虛頭目

眩暈

黑錫丹

治眞元虛億陽氣不固陰氣逆沖三焦不和冷氣刺痛飲食

無味腰背沉重膀胱久冷夜多小便女人血海久冷赤白帶下及陰證陰毒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一百粒即便回陽此藥大能升降陰陽補虛益元墜痰除溼破癖

黑錫去滓硫黃二兩葫蘆巴酒浸附子炮陽起石研細肉豆蔻炒

金鈴子蒸去沉香皮核舶茴香破故紙木香一兩桂

兩用鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十九空心鹽薑湯下女人艾棗湯下急證用百丸

喻嘉言曰此方用黑錫水之精硫黃火之精二味結成靈砂

成方切用

黑錫丹

三 補藥門 卷十三

爲君諸香燥純陽之藥爲臣用金鈴子苦寒一味爲反佐用沉香引入至陰之分爲使凡遇陰火逆沖眞陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此藥再無他法可施昌每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲以吾身元氣溫養其藥藉手効靈厥功歷歷可紀即如小兒佈痘與此藥迴不相值然每有攻之太過如用蜈蚣穿山甲桑蟲之類其痘雖勃然而起然頭面偏身腫如瓜匏瘡形溼爛難乾乃至眞陽上越氣喘痰鳴兒醫撒手駭去昌投此丸領其陽氣下入陰中旋以大劑地黃湯峻補其陰以畱戀夫眞陽肌膚之熱反清腫反消溼爛反乾而成厚膚如此而全活者不知凡幾因附本方項下以廣

用方者之識

五德丸

治脾腎虛寒飧泄鶩瀉等證或暴傷生冷或感時氣寒溼或酒溼傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂四兩北五味或肉豆蔻吳茱萸製木香二兩乾薑四兩

湯或米湯或人參湯俱可下 腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸

治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年少氣血未衰及寒溼

成方切用

五德丸 七德丸 唐鄭相國方

三 補藥門 卷十三

食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏裨也

補骨脂炒乾薑炒蒼朮炒台烏藥 吳茱萸 木香 荻

下 神麴糊爲丸梧子大每服七八十九或百丸白滾湯

唐鄭相國方

治虛寒喘嗽腰脚痠痛

破故紙十兩胡桃肉二十兩蜜調如飴每晨酒服一

大匙不能飲者熱水調忌薑棗油菜羊血

破故紙屬火入心包命門能補相火以通君火暖丹田壯元

陽胡桃屬木能通命門利三焦溫肺潤腸補養氣血有木火

相生之妙氣足則肺不虛寒血足則腎不枯燥久服利益甚多不獨上療喘嗽下強腰腳而已也古云黃蘗無知母破故蠟也李時珍曰命門在兩腎中央為生命之原相火之主腎命相通藏精而惡燥胡桃狀類皮汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸證自然愈矣

加杜仲一觔生薑炒蒜四兩名青娥丸治腎虛腰痛經曰腰加杜仲一觔生薑炒蒜四兩名青娥丸治腎虛腰痛者腎之腎將應矣不能再加牛膝酒浸黃蘗鹽水川草薺童便蜜丸治同

復陽丹

治陽虛嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

北五味炒甘草炙附子製炮薑 胡椒一兩白麪二兩為末

成方切用

復陽丹 三氣飲

三氣飲

和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引下

三氣飲

治氣血虧損風寒溼三氣乘虛內侵筋骨歷節疼痛之極及

痢後鶴膝風痛等證

當歸 枸杞 杜仲二錢或五錢甘草炙北細辛或代以獨活

芍藥 牛膝 茯苓 肉桂 白芷 附子一錢生薑片如

氣虛者加人參白朮隨宜 風寒勝者加麻黃一二錢此

飲亦可浸酒大約每藥一觔可用燒酒六七觔浸十餘日徐

徐服之

治脾煎一名攝

治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒積勞及誤用攻伐等藥

犯損脾陰致中氣虧陷神魂不寧大便脫血不止或婦人無

火崩淋等證兼嘔惡尤為危候速宜用此單救脾氣則統攝

固而血自歸源此歸脾湯之變方其效如神若犯此證而再

用寒涼則胃氣必脫無不即斃者

白朮錢當歸 山藥錢東仁錢甘草炙遠志製五分炮薑

錢蓮肉去心炒人參隨宜如血未止加烏梅二

錢凡畏酸者不可用或加地榆錢半亦可 滑脫不禁加醋

炒文蛤一錢 下焦虛滑不禁加鹿角霜二錢為末攪入藥

中服之 氣虛甚者加炙黃耆二三錢 氣陷而墜者加炒

成方切用

歸脾煎 一五丹

三氣飲

升麻五七分或白芷亦可 兼泄泄者加補骨脂一錢炒用

陽虛畏寒者加附子一二三錢 血去過多陰虛氣餒心

跳不寧者加熟地人參七八錢或一二兩

一五丹

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證此即參附湯之

變方也

人參 製附子分等煉白蜜為丸如菜豆大每用白滾湯送

下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次隨帶此丹最

妙

九聖丹

治脾胃虛寒如五德丸之甚者

熟地八兩 製四兩 肉豆蔻炒 吳茱萸 焦薑 補骨脂炒 萸

芡 五味子二兩 粉甘草 炙一兩 煉蜜丸或山藥糊丸 桐子大每

服六七十丸或百丸滾白湯下如氣虛者加人參或二兩或

四兩尤妙

聖朮煎

治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇肋疼痛或過用尅伐

等藥致傷臟氣而脈息無力氣怯神倦者速宜用此不得因

其虛滿虛痞而畏用白朮此中虛實之機貴乎神悟也若痛

脹覺甚者即以此煎送神香散最妙若用治寒溼瀉嘔吐證

成方切用

九蒸丹 聖朮煎

寒 卷十三

尤為聖藥

白朮用冬朮味甘者炒五錢 乾薑 赤肉桂 一二錢 陳皮 酌用或

若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人參甘草之類當隨宜加用

若治中虛感寒則麻黃柴胡之類亦隨宜加用

成方切用卷十四目錄

消暑門 正方二十 附方二十四

消暑丸

黃連消暑丸

小半夏茯苓湯方見燥溼門

四味香薷飲

黃連香薷飲

三物香薷飲

六味香薷飲

縮脾飲

成方切用

目錄

消暑門 卷十四

大順散

來復丹方見祛寒門

枇杷葉散

冷香飲子

桂苓甘露飲

又桂苓甘露飲

清暑益氣湯

黃耆人參湯

清燥湯

二妙散

三妙散

補肝湯

六一散

益元散

碧玉散

溫六丸

吳萸六一散

五苓散

竹葉石膏湯

人參白虎湯

生脈散

五味子湯

威方切用

補氣湯

水葫蘆丸

大黃龍丸

潑火散

總論消暑諸方

雞蘇散

青六丸

三生益元散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

黃耆六一散

成方切用卷十四

消暑門

暑本夏月之熱病左傳陰陽人於樾下其名久矣在仲景謂之中暈凡盛暑烈日之時或於長途或於田野不辭勞苦致病頭眩煩躁肌體大熱大渴等證遇無汗者必以得汗為正治宜先散外邪得汗已方清其內若多汗者宜察氣之虛實火之微甚或清或補可也亦有畏暑貪涼不避寒氣或於溪堂大廈或於風地樹陰或乍熱乍寒之時不謹衣被以致寒邪襲於肌表而病發熱惡寒頭痛無汗身形拘急肢體痠疼等證惟宜溫散為主當以傷寒法治之又痛等證治宜溫中為主苟其不分表裏不察陰陽則殺人慘於刀

消暑丸

治伏暑煩渴發熱頭痛脾胃不利

成方切用

半夏

湯下有痰

長夏炎蒸溼土司令故暑必兼溼證見便祕煩渴或吐或利

者以溼勝不得施化此方不治其暑頗治其溼用半夏茯苓

行水之藥少佐甘草以和其中半夏用醋煮者醋能開胃散

水斂熱解毒也使暑氣溼氣俱從小便下降則脾胃和而煩

渴自止矣

本方一黃連二錢名黃連消暑丸治伏暑煩渴而多熱痰

小半夏茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

消暑丸 小半夏茯苓湯

半夏 一 茯苓 甘草 薑汁糊丸勿見生水熱

湯下有痰 湯下

長夏炎蒸溼土司令故暑必兼溼證見便祕煩渴或吐或利

者以溼勝不得施化此方不治其暑頗治其溼用半夏茯苓

行水之藥少佐甘草以和其中半夏用醋煮者醋能開胃散

水斂熱解毒也使暑氣溼氣俱從小便下降則脾胃和而煩

渴自止矣

本方一黃連二錢名黃連消暑丸治伏暑煩渴而多熱痰

小半夏茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

消暑門 卷十四



方見燥溼門

四味香薷飲

治感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重或煩渴或吐瀉

香薷一厚朴薑汁炒 藳豆炒 黃連三錢 冷服香薷辛熱必

謂治溫以清涼而行之也熱服作瀉

香薷辛溫香散能入脾肺氣分發越陽氣以散皮膚之蒸熱

厚朴苦溫除溼散滿以解心腹之凝結藳豆甘淡能消脾胃

之暑溼降濁而升清黃連苦寒能入心脾清熱而除煩也

珍曰有處高堂大厦而中暑者緣納涼太過飲冷太多陽氣

為陰邪所遏反中入內故見頭痛惡寒之證用香薷以發越

陽氣散水和脾則愈王履曰此非中暑蓋亦傷寒之類爾按

香薷乃夏月發汗之藥其性溫熱只宜於受寒之人若暑火

成方切用四味香薷飲 二消暑門

證服之反成大害凡元氣虛者用之適足以招

暑今人謂能解暑藥用代茶是開門揖盜也

除藳豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩或下鮮血

過加茯苓治痺瘡暑熱不寒曰痺瘡當責之暑邪 除黃連加

木瓜甘草香附陳皮蒼朮紫蘇名二香散蓋合香薷飲香 治

外感內傷身熱腹脹除黃連名三物香薷飲治傷暑嘔逆泄

瀉再加茯苓甘草名五物香薷飲驅暑和中再加木瓜名六

味香薷飲治中暑溼盛再加人參黃耆白朮陳皮名十味香

薷飲治暑溼內傷頭重吐利身倦神昏喻嘉言曰傷寒夾陰

濕傷暑夾陰誤用香薷飲入喉便後發於香薷飲三物香

中加人參黃耆白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有見也

香薷藥

縮脾飲

清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒食所傷

藳豆炒 乾葛二兩 砂仁 草果煨去 烏梅 甘草多四 每服

四錢

暑必兼溼而溼屬脾土暑溼合邪脾胃病矣故治暑必先去

溼砂仁草果辛香溫散利氣快脾消酒食而散溼藳豆專解

中宮之暑而滲溼溼盛則 葛根能升胃中清陽而生津

多燥則葛根生津烏梅清熱解渴甘草補土和中

大順散

成方切用編脾飲 大順散 來復丹 主消暑門

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀不分清濁相干陰陽

氣逆霍亂吐瀉臟腑不調

乾薑 桂 杏仁去皮 甘草 等分先將甘草用白砂炒次

入薑杏炒過篩去砂淨合桂為末每服二三錢湯點服

夏月過於飲冷食寒陽氣不得伸越故氣逆而霍亂吐瀉也

脾胃喜燥而惡溼喜溫而惡寒乾薑肉桂散寒燥溼杏仁甘

草利氣調脾皆辛甘發散之藥升伏陽於陰中亦從治之法

也吳鶴皋曰此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃

不旋踵矣

來復丹

治伏暑泄瀉身熱脈弱

方見祛寒門補火丸附方內

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛炙 陳皮去白焙 丁香 厚朴去皮薑汁炙五錢 白茅根 麥

門冬 乾木瓜 甘草 香薷半錢 擣羅爲末每服二錢水

一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花

水調下小兒三歲以下可服五分更量大小加減

冷香飲子

治傷暑口渴霍亂腹痛煩躁脈沈微或伏

成方切用

附子炮 陳皮炙 甘草炙 草果半錢 水盞半薑十片煎八分去

渣井水頓冷服

桂苓甘露飲

治中暑受溼引飲過多頭痛煩渴溼熱便祕

滑石四兩 石膏 寒水石 甘草二兩 白朮 茯苓 澤瀉一兩 猪

苓 肉桂錢五 每服三錢或五錢此五苓六一之合劑以清

六腑之熱也

張子和去猪苓減三石一半加人參乾葛各一兩 藿香木香各一

錢減桂只用一錢每服三錢亦名桂苓甘露飲治伏暑煩渴

脈虛水逆渴飲飲水水入即吐名水逆

清暑益氣湯

東垣

治長夏溼熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿氣促身熱心煩

口渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澀大便溏黃而脈虛

者暑溼蒸人脾土受傷故肢倦便溏暑熱傷肺故氣促心煩

口渴便赤濁氣在上則生脹故胸滿惡食暑先入心汗

爲心液故自汗溼盛故身痛身重寒傷形表邪外盛

故脈大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脈虛而不足

黃耆 人參 白朮炒 蒼朮 神麴炒 青皮炒 陳皮留白 甘草

麥冬 五味 當歸洗酒 黃蘗炒酒 澤瀉 升麻 葛根 薑

棗煎 熱傷氣參者益氣而固表溼傷脾二朮燥溼而強脾火盛則

金病而水衰故用麥冬五味以保肺而生津肺爲水之上源

成方切用 清暑益氣湯 五 消暑門 卷十四

不能生水麥冬合用黃蘗以瀉熱而滋水青皮平肝而破滯

人參生脈生津 當歸養血而和陰神麴化食而消積升葛解肌熱而升清

上升能生津液 澤瀉瀉溼熱而降濁陳皮理氣甘草和中合

之以益氣強脾除溼清熱也東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃

陰火傷其生發之氣營衛大虧血虛又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉火

生陰血也更能當歸和血又加黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉火

火滅則心氣得平而安也心火乘脾故用炙甘草瀉火而補脾

少用恐滋滿也中滿者去之若腹中急痛急縮者卻宜多用

咳者去人參爲清濁相干故以橘皮理之長夏溼勝故加二

朮澤瀉上下分消其溼熱也溼勝則食不化炒麴辛甘青皮

辛溫消食快氣五味麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺金

救庚金也醫貫曰有傷暑吐衄者暑傷心虛不能生血不

宜通用寒涼以傷心宜清暑益氣加丹皮生地犀角之

類蓋暑傷心亦傷氣其脈必虛以參者補氣斯無弊也

除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯東垣 治暑傷元氣注夏倦怠

胸滿自汗時作頭痛時痛時止除白朮青皮麥冬五味加茯苓豬苓柴胡羌活防風連翹知母名補肝湯東垣治陰汗如水

陰冷如冰腳痿無力

清燥湯東垣

治肺金受溼熱之邪痰喘促胸滿少食色白毛敗頭眩體

重身痛肢倦口渴便秘經曰肺者相傳之官治節出焉火盛

治節故肢體或縱或縮而成痿也火逆肺故喘促肺主

皮毛故色白毛敗溼熱填於膈中故胸滿壅於陽明則食少

上升於頭則眩注於身則體重流於關節則身痛肺

受火傷天氣不能下降勝脫絕其化源故口渴便赤

黃耆錢一蒼朮錢一白朮炒陳皮炒澤瀉五人參炒茯苓炒升

麻分三當歸洗生地黃清燥湯麥冬炒甘草炙神麴炒黃蘗炒豬苓炒

成方切用清燥湯六消暑門卷十四

分黃連分一五味子九柴胡三

肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受溼熱之邪則

寒水肺生化之源絕源絕則腎水虧金不能而痿躄諸證作

矣金者水之母也氣者水之源也黃耆益元氣而實皮毛故

以爲君二朮參苓甘橘神麴健脾燥溼理氣化痰所以運動

其土土者金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生地滋陰

而養血黃蘗黃連燥溼而清熱黃蘗合蒼朮爲二妙散治

麻柴胡所以升清豬苓澤瀉所以降濁使溼熱從小便出則

燥金肅清肺爲高水出高原而諸證平矣朱丹溪曰今世風

混同論治古聖論風痰條目不同治法亦異夫風病外感善

行數變其病多實發表行滯有何不可諸痿起於肺熱傳入

五臟散爲諸證其昏惑癱瘓胃悶暴病鬱冒蒙昧暴痛皆屬

於火其四肢不舉足痿舌強痰涎有聲皆屬於土悉是溼熱

之病當作諸痿論治大抵祇宜補養若以外感風邪治之寧

免實虛虛虛之禍乎或曰內經治痿獨取陽明何也曰只諸

痿生於肺熱一語已見大意金體燥而居上主氣畏火者也

土性溼而居居中主四肢畏火而木者欲不節則水失所養

寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣肺受熱則金失所養

木寡於畏而侮所勝脾得火邪而熱矣脾受熱則土失所養

一身脾傷則四肢不爲人用而諸痿之病作矣瀉南方則肺

金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而肺經不

虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿大法無過於此

六一散河間

治傷寒中暑表裏俱熱煩躁口渴小便不通瀉痢熱瘧霍亂

吐瀉下乳滑胎解酒熱毒偏主石淋暑熱皆陽邪在表則發

上則煩渴在下則便秘或熱瀉火氣煎灼精結成石則爲石淋

成方切用六一散七消暑門卷十四

滑石六甘草一爲末冷水或燈心湯調下丹溪曰泄瀉及

中寒者加硫黃少許嘔吐生薑湯下

滑石重能清降寒能瀉熱滑能通竅淡能行水使肺氣降而

下通膀胱火退則肺故能祛暑住瀉止煩渴而利小便也利則大便實

而瀉自止加甘草者和其中氣又以緩滑石之滑降也其

數六一者取天一生水地六成之之義也故又名天水散劉

表裏諸病蓋取其能通除上下三焦溼熱也然唯體盛溼多

之人空服之以解暑利水使溼熱從小便出若無溼之人而

服此則反耗其津液而渴轉甚矣又當用生脈散清癰無

溼之人及肥人內夾虛寒誤用六一散解暑驅溼反促其臟

腑氣絕者比比加辰砂少許名益元散鎮心神而瀉丙丁之邪熱也小腸爲

爲丁加薄荷少許肺清名雞蘇散加青黛少許肝清名碧玉散加

紅麴五錢名清六九治赤痢赤屬血分受傷紅加乾薑五錢

名溫六九治白痢白屬氣分受傷乾加生柏葉生車前生藕

節名三生益元散治血淋加牛黃治虛煩不得眠除甘草加

吳茱萸一兩名吳萸六一散治溼熱吞酸除滑石加黃耆六

兩大棗煎熱服名黃耆六一散治諸虛不足盜汗消渴凡渴證防

發癰疽宜黃耆六一散吞忍冬丸

### 五苓散

治暑溼爲病發熱頭疼煩躁而渴

方見燥溼門

### 成方切用

五苓散 竹葉石膏湯 人參白虎湯 生脈散

八 消暑門 卷十四

### 竹葉石膏湯

治傷暑發渴脈虛

### 人參白虎湯

治太陽中暈身熱汗出足冷惡寒脈微而渴

以上二方俱見清火門

### 生脈散

治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肺虛而咳肺主氣火熱傷肺故氣短金爲

火制不能生水故口渴氣少故倦怠肺主皮毛虛故汗出虛火乘肺故欬李東垣曰津者庚大陽所主三伏之時爲庚金受困若心津液汗大泄溼熱亢甚燥金受困風木無制故風溼相搏骨節煩疼一身盡痛也○凡溼熱大行金爲火制絕寒水生化之源致肢體痿頓腳軟眼黑最宜服之

人參 麥冬分五五味子七粒

肺主氣肺氣旺則四臟之氣皆旺虛故脈絕氣短也人參甘

溫大補肺氣而瀉熱爲君麥冬甘寒補水源而清燥金爲臣

五味酸溫斂肺生津收耗散之氣爲佐蓋心主脈而百脈皆

朝於肺補肺清心則氣充而脈復故曰生脈夏月火旺克金

當以保肺爲主清晨服此能益氣而禦暑也李東垣曰手陽

小腸皆屬足陽明胃大腸主津小腸主液大腸小腸受胃之

陽氣乃能行津液於上焦灌漑皮毛充實腠理若飲食不節

又曰夏月加黃耆甘草服之令人氣力湧出

加陳皮炙甘草名五味子湯蒸餅爲丸名補氣丸治肺虛少

### 成方切用

水葫蘆丸 大黃龍丸

九 消暑門 卷十四

自汗怔忡再加茯神遠志木通名茯神湯治脈虛欬則心痛

喉中介介或腫

### 水葫蘆丸

治冒暑毒解煩渴

川百藥煎兩人參錢二麥門冬 烏梅肉 白梅肉 乾葛

甘草兩半爲細末麪糊丸如雞頭實大含化一丸夏月出行

可度一日

按諸葛孔明五月渡瀘深入不毛分給此丸於軍士故名水

葫蘆曹孟德遙指前有梅林失於未備爾

### 大黃龍丸

治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃 硝石一兩 白礬 雄黃 滑石錢五 白麴兩四 五味

研末入麴和勻滴水丸如梧子大每服三十丸新汲井水下

潑火散 即地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆 赤芍藥 黃連 青皮去白 每服三錢漿水調服

若血痢水煎服

喻嘉言總論消暑諸方曰元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣爾其

成方切用

潑火散

十 消暑門 卷十四

取用小半夏茯苓湯不治其暑顧治其溼又以半夏茯苓少加甘草名消暑丸見消暑在消其溼名正言順矣其香薷飲用香薷藊豆厚朴為主方熱盛則去藊豆加黃連為君治其心火溼盛則去黃連加茯苓甘草治其脾溼其縮脾飲則以脾為溼所浸淫而重滯於藊豆葛根甘草中佐以烏梅砂仁草果以快脾而去脾所惡之溼甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃為溼所竊據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅根之辛香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香引子以治暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於熱溼虛寒淺

深緩急間酌而用之其利溥矣而後來諸賢以益虛繼之河

間之桂苓甘露飲五苓三石意在生津液以益胃之虛子和

之桂苓甘露飲用人參葛根甘草藊香木香益虛之中又兼

去濁或用十味香薷飲於局方五味中增人參黃耆白朮陳

皮木瓜益虛以去溼熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃耆

湯又補中實衛以去其溼熱肥白內虛之人所宜服者也中

暑必兼躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之制方名清燥

湯仍以去溼為首務夫燥與溼相反者也而清燥亦務除溼

非東垣具過人之識不及此矣又如益元散之去溼而加辰

砂則并去其熱五苓散之去溼而加人參則益虛加辰砂減

成方切用

總論消暑諸方

十一 消暑門 卷十四

桂則去熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝溼合之局方則大備矣然尚有未備焉嘗觀暑風一證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方雖有大黃龍丸初不為暑風立法管見從而贊之曰有中暈昏死灌之立甦則其方亦可得暑風之一班矣儻其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸寧不立至危殆乎良方復有地榆散治中暑昏迷不醒人事而欲死者但用平常涼血之藥清解深入血分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名為潑火散者知言哉夫中天火運流金燦石而此能潑之益見暑風為心火暴甚煎熬陰血舍清心涼血之外無可撲滅爾綜羣方而論之因

其詳故益加詳焉

成方切用

總論消暑諸方

主

消暑門  
卷十四

成方切用卷十五目錄

燥溼門 正方二十七 附方二十九

五苓散

四苓散

蒼朮五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

茯苓白朮湯

春澤湯

二朮四苓湯

成方切用

目錄

茯苓琥珀湯

藟苓湯

豬苓湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

腎着湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

越婢湯

加味腎氣丸

辰砂五苓散

茵陳五苓散

豬苓散

澤瀉湯

白茯苓湯

又春澤湯

節庵導赤散

胃苓湯

柴苓湯

一  
燥溼門  
卷十五

防己黃耆湯

防己茯苓湯

舟車丸

瀉川散

疏鑿飲子

實脾飲

五皮飲

麥門冬湯

大分清飲

小分清飲

成方切用

草薢分清飲

縮泉丸

琥珀散

茵陳蒿湯

茵陳三物湯

升陽除溼防風湯

禹功散

羌活勝溼湯

羌活除溼湯

東垣升陽除溼湯

升陽除溼湯

茵陳將軍湯

目錄

二 燥溼門  
卷十五

大橘皮湯

八正散

防己飲

當歸拈痛湯

蒼朮丸

平胃散

見消導門

成方切用

目錄

三 燥溼門  
卷十五





小便赤卻當下此是表裏俱見五苓散主之○裏表之裏也  
太陽本膀胱腑也○五苓利水何以能止渴生津蓋濕熱壅  
於中焦則氣不得施化故津竭而小便不通也○五苓利其  
小便則濕熱下消津回而渴止矣○內經通因通用之意東  
垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其濕傷食者  
有形之物也輕則消之或損穀重則方吐下○若汗下之  
後內亡津液而便不利者不可用五苓恐重亡津液而益虧  
其陰也○勿治之便利自愈○一切陽虛不化氣陰虛而泉竭  
以致小便不利者若再用五苓以  
劫其陰陽禍如反掌不可不慎

去桂名四苓散李東垣曰無惡寒證不可用桂周揚俊曰五  
苓為渴而小便不利者設若不渴則茯苓甘  
草湯足矣若但加辰砂名辰砂五苓散治小便不利用二  
湯則四苓足矣

赤名二朮五苓散治寒溼加茵陳名茵陳五苓散治溼熱發

黃便祕煩渴加羌活名元戎五苓散治中焦積熱去桂澤瀉

名豬苓散治嘔吐病在膈上思飲水者但用肉桂茯苓等

成方切用

五苓散

三 燥溼門 卷十五

分蜜丸名桂苓丸治冒暑煩渴引飲過多腹脹便赤但用澤

瀉五白朮二名澤瀉湯治心下支飲常苦眩冒但用茯苓

白朮等分名茯苓白朮湯治脾虛不能制水溼盛泄瀉再加

郁李仁入薑汁服名白茯苓湯治水腫加川楝子治水疝加

人參名春澤湯再加甘草合四君子亦名春澤湯治無病而渴與

病瘥後渴者去桂加蒼朮甘草芍藥梔子黃芩羌活名二朮

四苓湯通治表裏溼邪兼清暑熱倍桂加黃耆如朮之數治

傷暑大汗不止加甘草滑石梔子入食鹽燈草煎名節庵導

赤散治熱蓄膀胱便秘而渴如中溼發黃加茵陳水結胸加

木通合益元散治諸溼淋瀝再加琥珀名茯苓琥珀湯治

小便數而欠頻來而短少也合平胃散名胃苓湯一名對金飲子治

中暑傷溼停飲夾食腹痛泄瀉及口渴便祕此上下分消其

泄瀉有屬風屬溼屬寒屬火此因於外感者也○外感風寒

感動臟氣不平亦致泄瀉此因於內傷者也○外感風寒

內則當調五臟又有因飲食所傷而泄者法當消導因風冷

泄者當解散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾

胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止合黃連香薷飲名藳苓湯治傷暑

泄瀉合小柴胡湯名柴苓湯治泄瀉發熱口渴瘧疾熱多寒

少口渴心煩以上三方並加薑棗煎

豬苓湯仲景

治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不通成氏曰脈浮發熱

水熱在裏也小便不利熱結下焦津液不通也○表也渴欲飲

字誤也○是脈字下脫一不字也○活人云脈浮者五苓散脈沉

成方切用豬苓湯

者豬苓湯按太陽篇五苓散陽明篇豬苓湯桂朮芍藥

主外阿膠滑石甘寒為陰主內若脈浮則常用五苓散若

豬苓矣少陰篇下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠下利不

湯主之雖不言脈沉然少陰之脈必沉也以此推之成氏隨

文誤釋少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠下利不

明矣也渴者陽邪入裏心煩不眠知挾熱也欬而渴嘔有停飲

也渴而下利知小便必不利是熱邪已入膀胱也宜利小便

則熱降通治溼熱黃疸口渴渴赤五苓湯溼勝故用滑石

而便實豬苓茯苓澤瀉滑石阿膠兩

熱上壅則下不通下不通熱益上壅又溼鬱為熱熱蒸更為  
溼故心脾而嘔渴便秘而發黃也淡能滲溼寒能勝熱茯苓  
甘淡滲脾肺之溼豬苓甘淡澤瀉鹹寒瀉腎與膀胱之溼滑  
石甘淡而寒體重降火通行上下之溼阿膠甘平潤滑以療

煩渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降而三焦俱清矣吳鶴皋曰以諸藥過燥故又加阿膠以存津液王好古曰滑石為至燥之劑徐之才曰燥可去溼桑白皮赤小豆之類是也蓋皆以行水之藥為燥也

茯苓甘草湯

仲景

治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水卻治其厥不爾

水漬入胃必作利也太陽證飲水過多水停心下必悸火畏水故心惕然動不自安也亦治

傷寒汗出不渴者經曰傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之汗而不渴為邪未入裏故但解表利亦治膀胱腑欬而遺溺

水而兼和中

茯苓 桂枝 甘草 生薑

兩二兩一兩三兩

淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲溫能發汗解

成方切用

茯苓甘草湯 腎著湯

五

燥淫門 卷十五

肌故用薑桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草

去生薑加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯仲景治傷寒吐下後

心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉發汗則動經身為振

搖者逆滿氣衝寒邪伏飲上搏於胸也故令頭眩沉為在裏且既經吐下復發其汗則陽益虛而津液耗故振搖也

與此湯導飲和 金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩

腎著湯 金匱一名乾薑苓朮湯

治傷淫身重腹痛腰冷不渴小便自利飲食如故病屬下焦

腎主水淫性下流必舍於其所合而歸於坎勢也腰為腎之腑冷淫之邪著而不移故腰冷身重是著痹也此由身勞汗出衣裏冷淫

久入得之 宣明用治胞痹膀胱熱痛滿於小便上為清涕

風寒淫邪客於胞中氣不能化故水道不通足太陽經上額絡腦太陽經氣不得下行上入腦而流於鼻則為清涕

乾薑 茯苓 甘草 白朮炮 兩四兩多 兩炒二有寒者加附子經心錄加

肉桂澤瀉杜仲牛膝治同

喻嘉言曰腰冷如坐水中非腎之精氣冷也故飲食如故便

利不渴且與腸胃之腑無預況腎臟乎故但用甘溫從陽淡

滲行水之藥足矣

小半夏加茯苓湯 金匱三因名大半夏湯

治卒嘔吐心下痞滿間有水眩悸水氣上逆則嘔停膈間則痞上干於頭則眩凌於心

悸則

半夏 生薑 茯苓

半升一升半兩三兩

半夏生薑行水氣而散逆氣能止嘔吐茯苓寧心氣而泄腎

成方切用

小半夏加茯苓湯 越婢湯

六

燥淫門 卷十五

邪能利小便火因水而下行則悸眩止而痞消矣

除茯苓名小半夏湯金匱治支飲嘔吐不渴亦治黃疸金匱云

渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯上之○嘔吐津液去必渴不可因渴而遽以為熱除茯苓

生薑加人參白蜜名大半夏湯金匱治反胃食入即吐東垣曰

薑之類治嘔吐但治上焦氣逆表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者唯宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛

藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也

越婢湯 金匱

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者經曰

并沉為石水并浮為風水水在皮膚故脈浮裏無熱故不渴病本於風故汗出惡風無大熱者熱未盡退也

麻黃 石膏 生薑 甘草 大棗 惡風者加附子

風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏之甘寒以清

胃肺主通調水道甘草佐之使風水從毛孔中出又以薑棗

為使調和營衛不使其太發散耗津液也胃為十二經之主

若婢經曰脾主為胃行其津液是方名越婢者以

防己黃耆湯

治風水脈浮身重汗出惡風及諸風諸溼麻木身痛東垣曰

風人皆知之細核則有區別如久坐亦麻木繩縛之人亦麻

本非有風邪乃氣不行也常補肺氣麻木自去矣亦有因

氣虛而風邪入而踞之所

成方切用

防己黃耆湯

七

黃芩寒多掣痛加薑桂溼盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛加陳皮

枳殼蘇集

防己大辛苦寒通行十二經開竅瀉溼為治風腫水腫之主

藥黃耆生用達表治風注膚痛溫分肉實腠理白朮健脾燥

溼與黃耆並能止汗為臣防己性險而捷故用甘草甘平以

緩之又能補土制水為佐薑棗辛甘發散調和營衛為使也

去白朮薑棗加茯苓為桂枝名防己茯苓湯治水在皮膚

四肢聶聶而動名皮水防己行經絡茯苓善滲泄黃耆達皮

節疼痛名風水脈浮腫按之沒指其腹如鼓不惡風不渴

名皮水當發其汗又云惡寒不渴名風水不惡寒而渴名皮

水假令皮水不渴亦當發汗脈沉遲自喘名正水脈沉腹滿

不喘水積胸中堅滿如石名石水脈沉遲發熱胸滿身腫汗

如藥汁

加味腎氣丸金匱腎氣丸即桂附八味丸治婦人轉胞無車前

治脾腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰盛小便不利大便

溼黃已成蠱證亦治消渴飲一澀一經曰腎者胃之關也關

類也上下溢於皮膚則為肺腫腎消者腎水衰竭龍雷之火

不安其位上炎於肺消渴引飲飲入於胃下無火化直入勝

元地黃補陰壯真水滋腎為治下消之劑

熟地黃四兩茯苓三兩山藥微炒丹皮酒洗山萸肉酒洗澤瀉酒洗牛膝

酒車前子微炒肉桂兩附子蜜丸

土為萬物之母脾虛則上不能制水而洋溢水為萬物之源

天一腎虛則水不安其位而妄行以致泛濫皮膚肢節之間

生水腎虛則水不安其位而妄行以致泛濫皮膚肢節之間

成方切用

加味腎氣丸

因而攻之虛虛之禍不待言矣經曰母虛盛母

滋真陰而能行水補命火因以強脾桂附補命門火火能生

則使溺通加車前利小水而不走氣加牛膝益肝腎藉以下

行使水道通而腫脹已又無損於真元也喻嘉言曰胃為水

之原脾不能散胃之水精於肺而病於中脾不能通胃之水

道於膀胱而病於上腎不能司胃之關時其輪漚而病於下

以致積水浸淫無所不至又曰按此方濟生以附子為君此

薛新甫重訂以茯苓為君然腎之關門不開必以附子為君此

蒸動腎氣其關始開胃中積水始下以陽主開故也開即

不用茯苓牛膝車前而水亦下關閉即車前茯苓乎張景岳曰

抑莫之如何矣用方者將君附子乎抑君茯苓乎張景岳曰

水腫證乃脾肺腎三臟相干之病蓋水為至陰故其本在腎

水化於氣故其標在脾水畏土故其制在脾今脾虛則氣

不化精而化水脾虛則上不制水而反赴腎虛則水無所主

而妄行求古治法惟全真內加減腎氣湯為對證之方予履

用之無不見效此雖壯水之劑而實即脾肺腎三臟之正治

也蓋腎為先天生氣之源若先天元氣虧於下則後天胃氣失其所本而由脾及肺治節所以不行是以水積於下則氣塞於上而喘脹由生但宜峻補命門使氣復元則三臟必皆安矣今論其方如所用甘附以化陰中之陽也熟地山藥皆使氣化於精而所以治肺也補火生土即所以治脾也此藥通竅即所以治腎也但能隨證加減用之其應如響諸方之後及氣虛本弱者但能隨證加減用之其應如響諸方加減腎氣湯者誠然善矣然用之之法病當因此虛而論論在呼吸乃以大劑參附熟地之類幸得挽回愈後喜飲未及兩月忽病足股盡腫脹及於腹按之如鼓堅而且硬因其前次之病中氣本傷近日之病又因酒淫度非加減腎氣湯不余然計其前後服藥無所不效終不見效人皆料其必不可治去補力亦與實漏危者何異元氣不能復病必不能退遂悉而足腫消二十餘劑而腹脹盡退白

舟車丸

河間做仲景十棗例製此湯治一切水滯

丸

卷十五

治水腫水脹形氣俱實

腫脹者水道壅遏也形氣俱實者口水先腫上體肩背手肘三陽經陰水先腫下體腰腹腫脹是三陰經腫脹脾腫則陽氣滯行如單脹而不腫者名鼓脹為木橫克土難治脾虛則陽氣滯行如單脹而不腫者為氣虛朝暮俱急為氣血俱虛脾虛則陽氣滯行如單脹而不腫者由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下者皆治脾腎若黑則傷脾若黃則傷心脾出則傷脾是心平則傷腎身熱則傷脾若可治腹

黑牽牛

橘紅

牽牛

水然腫屬於脾脹屬於肝水之不行由於脾之不運脾之不

運由於木盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香疏肝泄肺而健脾與陳皮均為導氣燥溼之品使氣行則水行脾運則腫消也輕粉無竅不入能去積痰故少加之然非實證不可輕投

減羌花大戟青皮陳皮木香加芒硝郁李仁名濬川散豈湯

下五分治同

疏鑿飲子

治遍身水腫喘呼口渴大小便秘上證為溼熱甚而氣實也脈必沉數陰水見

羌活 秦艽 檳榔 商陸 椒目 大腹皮 茯苓皮

成方切用

疏鑿飲子 實脾飲

十

卷十五

木通 澤瀉 赤小豆 等分加薑皮煎

外而一身盡腫內而口渴便秘是上下表裏俱病也羌活秦

艽解表疏風使溼以風勝邪由汗出而升之於上腹皮苓皮

薑皮辛散淡滲所以行水於皮膚以皮商陸檳榔椒目赤豆

去脹攻堅所以行水於腹裏木通瀉心肺之水達於小腸澤

瀉瀉脾腎之水通於膀胱實為水也上下內外分消其勢亦

猶神禹疏江鑿河之意也

實脾飲

治肢體浮腫色悴聲短口中不渴二便通利脾胃虛寒上不

行而浮腫以無鬱熱故口不渴而便不秘此為陰水嚴氏曰治陰水發腫用此先實脾土

白朮土炒 茯苓 甘草炙 厚朴炒 大腹子 葶藶 木香

木瓜 附子 黑薑 加薑棗

脾虛故以白朮甘草補之脾寒故以薑附草蔻溫之脾滯故以大腹茯苓利之脾滯故以木香厚朴導之然土之不足由於木之有餘木瓜酸溫能於土中瀉木兼能行水與木香同為平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣水病當以健脾為主使脾實而氣運則水自行宜參苓為君視所挾證加減苟徒用利水藥多致不救醫貴曰治腫滿先用補劑不益脹滿乎曰肺氣既虛不可復行其氣腎水既衰不可復利其水服補劑初覺不快過時藥力得行漸有條理矣喻嘉言曰治水以實脾為先不但陰水為然然陰水者少陰腎中之真陽衰微不能封閉而泛溢無制爾方中不用桂而用厚朴大腹尚有可議

成方切用

麥門冬湯

士 燥淫門 卷十五

麥門冬湯

治水溢高原肢體皆腫經曰三焦者決瀆之官水道出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中

水畜勝勝 麥門冬五十枚 粳米五十

吳鶴皋曰肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱肺熱則失其下降之令以致水溢高原淫於皮膚而為水腫醫罕明此實脾導水皆不能愈故用麥冬清肺開其下降之源粳米益胃培乎生金之母此治病必求其本也或問此證何以辨之曰肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿此其候也

五皮飲澹寮

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮 一方五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後脾肺氣虛而致腫滿五加祛風勝溼地骨退熱補虛生薑辛散助陽水為陰邪大腹下氣行水茯苓滲溼健脾於散瀉之中猶寓補助之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

大分清飲

治積熱秘結小水不利或致腰腹下部極痛或溼熱下利黃疸溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

成方切用

五皮飲 大分清飲 小分清飲

主 燥淫門 卷十五

茯苓 澤瀉 木通二錢 豬苓 梔子 枳殼 車前子錢

如內熱甚者加黃芩黃蘗龍膽之屬 如大便堅硬脹痛者

加大黃二三錢 如黃疸小水不利熱甚者加茵陳二錢

如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

小分清飲

治小水不利溼滯脹腫不能受補等證

茯苓 澤瀉 豬苓錢二 米仁錢二 枳殼 厚朴錢一 如陰虛

水不能達加生地牛膝各二錢 如黃疸者加茵陳二錢

無內熱而寒滯不行者加肉桂一錢

草薢分清飲

治陽虛白濁小便頻數凝白如油名曰膏淋腎氣虛不能化

脫有熱則水道清而清濁不分或敗精滲入

川草薺 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草稍 入鹽服

一方加茯苓

草薺能解陽明厥陰溼熱去濁而分清史國信曰若欲與陽

智脾藥兼入心腎固腎氣而散結烏藥益智等分山藥糊丸

石菖蒲開九竅而通心甘草稍達莖中而止痛使溼熱去而

心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疏泄而為禁止者也

琥珀散

成方切用 草薺分清飲 琥珀散

治氣淋血淋膏淋砂淋心腎氣鬱清濁相干熱毒勝於清

而痛膏淋便出如膏砂淋精結成石勞淋遇勞即發冷淋寒

戰後遺大抵多屬於熱熱其生溼則水液渾濁而為淋若冷

滑石 二琥珀 木通 藟藟 木香 當歸 鬱金

為末服

滑石滑可去著利竅行水篇蓄苦能下降利便通淋琥珀能

降肺氣通於膀胱木通能瀉心火入於小腸小腸為心之腑

應於心者其水必自小便滲入膀胱經

能引血歸經氣淋由於氣滯木香能升降諸氣諸淋由心肝

火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也大法鬱金用開鬱

牛膝破血黃蘗生地滋陰東垣用藥凡例小腹痛

茵陳蒿湯 仲景

治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口渴二便不利溼熱發黃脈

沉實者經曰陽明病發熱汗出此為熱越則不發黃若但頭

黃黃者脾胃之色也熱甚者身如橘色汗如漿汁頭為諸陽

之會熱蒸於頭故但頭汗而身無汗夫熱外越則不裏鬱下

及水結胸膈皆有頭汗之證乃傷寒傳變故與雜病不同

反渴腹或脹滿溼熱相搏則發黃熱勝色明而便燥溼勝色

身不痛

茵陳 六兩 大黃 二兩 梔子 十四枚

成方切用 茵陳蒿湯 禹功散

茵陳發汗利水以泄太陰陽明之溼熱故為治黃主藥梔子

為臣大黃為佐分泄前後則腹得利而解矣茵陳梔子能導

大黃能導溼

生薑燈草煎名茵陳將軍湯治同去梔子大黃加附子乾

薑治寒溼陰黃前證為陽黃如身黃而色暗者為陰黃宜此

下之無汗為表實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景

云發黃小便自利當與虛勞門小建中湯自利腹滿而喘不

可除熱而除之必噉小半夏湯主之王海藏曰內感傷寒勞

役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只宜理中

禹功散 子和

治寒溼水疝陰囊腫脹囊如水晶陰汗不絕謂之疝得之

二便不利寒溼所凝不

黑牽牛四兩茴香一兩為末每一錢薑汁調下或加木香一

兩

牽牛辛烈能達右腎命門走精隧行水泄溼兼通大腸風秘

氣秘茴香辛熱溫散能暖丹田祛小腸冷氣同入下焦以泄

陰邪也

升陽除溼防風湯東垣

治大便秘塞或裏急後重數至閫而不能便或有白膿或血

慎勿利之利之則必至重病反鬱結而不通矣以此湯升舉

成方切用升陽除溼防風湯 羌活勝溼湯

五燥溼門 卷十五

其陽則陰自降矣通大便有用升

蒼朮四錢防風二錢茯苓 白朮 芍藥錢一如胃寒泄瀉腸

鳴加益智半夏各五分薑棗煎

蒼朮辛溫燥烈升清陽而開諸鬱故以為君白朮甘溫茯苓

甘淡佐之以健脾利溼防風辛溫勝溼而升陽白芍酸寒斂

陰而和脾也劉宗厚曰飲食入胃輪精心肺氣必上行然後

泄利者法當填補中氣升之舉之不

可疏下此東垣發前人所未發也

羌活勝溼湯局方

治溼氣在表頭痛頭重或腰脊重痛或一身盡痛微熱昏倦

也溼熱則為熱然溼乃陰邪故微熱而昏倦

羌活 獨活錢一川芎 藁本 防風 甘草分五蔓荊子分三

如身重腰中沉沉然中有寒溼也加酒洗漢防己附子

經曰風能勝溼羌獨防藁蔓皆風藥也溼氣在表六者辛

溫升散又皆解表之藥使溼從汗出則諸邪散矣藥本善治

荆防善散太陽風溼二活祛風勝溼兼通關節川芎能升厥

陰清氣上治頭痛甘草助諸藥辛甘發散為陽氣味甘平發

中有若水溼在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經曰溼

補也若水溼在裏則當用行水滲洩之劑喻嘉言曰經曰溼

易下之則難故當變常法而為表散吳鶴皋曰脾弱溼傷者

發黃者五皮茵陳之類主之今溼流關節非前藥所宜矣無

發黃者五皮茵陳之類主之今溼流關節非前藥所宜矣無

此湯加柴胡五分治臥而多驚悸多驚悸者邪在少陽厥陰

也如淋加澤瀉五分經曰肝腎之病同一治此下焦風寒三

成方切用大橘皮湯

經合病非風藥行經不可也

除獨活蔓荊川芎甘草加升麻蒼朮名羌活除溼湯治風溼

相搏一身盡痛除川芎加黃耆當歸蒼朮升麻名升陽除溼

湯治水疝腫大陰汗不絕再加麥芽神麴豬苓澤瀉除當歸

黃耆亦名升陽除溼湯東垣治脾虛瀉痢

大橘皮湯

治溼熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉小便併於大腸

滑瀉及水腫等證

滑石錢六甘草 赤茯苓錢一豬苓 澤瀉 白朮七錢桂分五陳皮

錢木香 檳榔分三加薑煎每服五錢



赤茯苓澤瀉瀉火行水白朮補脾肉桂化氣此五苓散也  
滑石清熱利溼甘草瀉火調中此六一散也溼熱內甚故加  
檳榔峻下之藥陳皮木香行氣之品使氣行則水行以通小  
便而實大便也

八正散 局方

治溼熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通溼熱下注小腹急滿則小便當  
行矣而卒不行或淋痛尿血或因熱為腫

車前子 木通 瞿麥 篇蓄 滑石 甘草梢 梔子炒

大黃 加燈草煎一方加木香

木通燈草清肺熱而降心火肺為氣化之原心為小腸之合

戒方切用

八正散

燥淫門 卷十五

也車前清肝熱而通膀胱肝脈絡於陰器膀胱津液之腑也  
瞿麥篇蓄降火通淋此皆利溼而兼瀉熱者也滑石利竅散  
結梔子大黃苦寒下行此皆瀉熱而兼利溼者也甘草梢者  
取其徑達莖中甘能緩痛也雖治下焦而不專於治下必三  
焦通利水乃下行也朱丹溪曰小便不通有熱有滯有氣結  
如不因肺燥但膀胱有熱則瀉膀胱此正治也如因肺燥不  
能生水則清金此謂隔二如因脾溼不運而精不升故燥不  
能生水則當燥脾健胃此謂隔三車前子茯苓清肺也黃蘗  
黃芩瀉熱也若水白朮健脾也又曰小便不通屬氣  
虛血虛實熱痰閉皆宜吐或就其參者藥中調理吐之血虛用  
用參朮升麻等先服後吐或就其參者藥中調理吐之血虛用  
四物湯先服後吐或就其參者藥中調理吐之血虛用  
吐或加香附木通實熱當利之或八正散蓋大便動則小便  
自通矣或問以吐法通小便其理安在曰譬如滴水之  
器上竅閉則下竅無自以通必上竅開而下竅始出也

當歸拈痛湯 東垣

治溼熱相搏肢節煩痛肩背沉重或偏身疼痛或腳氣腫痛  
腳膝生瘡膿水不絕及溼熱發黃脈沉實緊數動滑者溼熱

則痛足膝腫痛溼熱下注也發黃溼熱薰蒸脾胃也腳氣多  
主水溼亦有夾風夾寒之異溼熱勝而為病或成水泡或  
成赤腫丹毒或如疔氣攻上引下俱可用此湯損益為治  
凡手足前廉屬陽明後廉屬少陽外廉屬少陽內廉屬厥陰  
內前廉屬太陰內後廉屬少陰以管貼身垂下大指居前小  
指居後定之手足痛者當分是何經絡用本經藥為引行其  
氣血則愈太陽羌活防風陽明升麻白芷葛根少陽柴胡  
厥陰吳茱萸川芎青皮太陰蒼朮白芍少陰獨活細辛

茵陳 羌活 防風 升麻 葛根 蒼朮 白朮 甘草

黃芩 酒炒 苦參 酒炒 當歸 豬苓 澤瀉 知母 一方加人

參

戒方切用

當歸拈痛湯

燥淫門 卷十五

羌活透關節防風散留溼為君升葛味薄引而上行苦以發  
之白朮甘溫和平蒼朮辛溫雄壯健脾燥溼為臣溼熱相合  
肢節煩痛苦參黃芩知母茵陳苦寒以泄之酒炒以為因用  
血壅不流則為痛當歸辛溫以散之入參甘草甘溫補養正  
氣使苦寒不傷脾胃治溼不利小便非其治也豬苓澤瀉甘  
淡鹹平導其畱飲為佐上下分消其溼使壅滯得宣通也王  
微義曰此方東垣本為治腳氣  
溼熱之劑後人用治諸瘡甚驗

防已飲

治腳氣足脛腫痛憎寒壯熱腳氣自外感得者山嵐瘴水或  
茶酒油麵溼熱之毒有溼有熱皆下流故注於足溼熱分  
乎淫勝則憎寒熱勝則壯熱有頭痛諸證者狀類傷寒但



脛腫掣痛為異爾此病忌用補劑及淋洗以淫熱得地也亦不宜大瀉治之喜通而惡塞若腳氣衝心喘急不止嘔吐不休者死水凌火故也○先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脈弛張腫痛者名淫腳氣宜利淫疎風腫縮枯細不腫而痛者名乾腳氣即熱也宜潤血清燥

防己 木通 檳榔 生地 酒洗 川芎 白朮 炒 蒼朮 炒 鹽 黃蘗

甘草稍 犀角 熱加黃芩時令熱加石膏肥人有痰加

竹瀝薑汁或南星大便秘加桃仁紅花小便赤澀加牛膝或

木瓜薏苡仁

防己行小療風瀉下焦之淫熱檳榔攻堅利水墜諸藥使下

行木通降心火由小腸出草梢泄脾火徑達腎莖黃蘗生地

滋腎陰而涼血解熱蒼白二朮燥脾淫而運動中樞腫由血

成方切用 防己飲 蒼朮丸 末 燥淫門 卷十五

鬱川芎行血中之氣痛由肝實犀角涼心而清肝合之以清

熱利淫消腫止痛也

蒼朮丸

治寒淫在脾泄瀉久不能愈者

眞茅山蒼朮 米泔浸一宿切如無破故紙酒浸曬 白芍 炒 黃

四厚朴 薑汁 雲苓 二甘草 炙 川椒 炒出汗 小茴香 炒 一

爲末糯米糊爲丸桐子大每服食遠清湯下七八十丸

成方切用卷十六目錄

潤燥門 正方二十八 附方七

麥門冬湯

炙甘草湯

清燥救肺湯

通幽湯

當歸潤肺湯

濟川煎

潤腸丸

活血潤燥丸

潤燥湯

成方切用 目錄

又潤腸丸

一 潤燥門 卷十六

決津煎

韭汁牛乳飲

活血潤燥生津湯

甘露飲

桂苓甘露飲

小甘露飲

消渴方

地黃引子

治久嗽方

環玉膏

麻仁蘇子粥

桑白皮等汁十味煎

滋燥養營湯

白茯苓丸

文蛤散

黃耆湯

宣明黃耆湯

宣明麥門冬飲子

易老麥門冬飲子

豬膏湯

成方切用

豬膏金銀花酒

豬膏髮煎

人參白虎湯

竹葉石膏湯

甘麥大棗湯

目錄

二

潤燥門

成方切用卷十六

潤燥門

成方切用

麥門冬湯

一

潤燥門

麥門冬湯

金匱

治火氣上逆咽喉不利

麥門冬升七半夏升一人參兩三甘草兩二大棗枚十二粳米合三水一

斗二升煮六升服一升日三夜一喻嘉言曰此胃中津液乾

枯虛火上炎之證用寒涼藥而火反升徒知與火相爭知母

貝母屢施不應不知胃者肺之母氣也仲景於麥冬人參梗

米甘草大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味用以利咽下氣此非半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣

炙甘草湯 仲景

治傷寒脈結代心動悸及肺痿欬唾多心中溫溫液液者動脈  
向中止能自還者曰結不能自還曰代氣血虛衰不能相續也心中動悸氣內虛也肺痿渴唾多者以胃中之津液上供悉從燥熱也實鑑用治呃逆

甘草 炙四兩 生薑 桂枝 人參 阿膠 蛤粉炒 生地黃 麥冬 麻仁 研半 大棗 十二枚 水酒各半煎內阿膠烱化服

人參麥冬甘草大棗益中氣而復脈生地阿膠助營血而寧成方切用 清燥救肺湯 二 潤燥門

心麻仁潤滑以緩脾胃薑桂辛溫以散餘邪加清酒以助藥力也聖濟經云津液散為枯五臟痿弱營衛涸流淫劑所以潤之麻仁阿膠麥冬地黃之甘潤經益血復脈通陽也喻嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也予全用治虛勞外感用肺痿實竟本方所治亦何止一病哉外感所取在於益氣之虛潤肺金之燥至於桂枝辛溫則有不宜不知桂枝能通營氣致津液則肺氣能轉輸運津以漸而下尤為要緊所以云治心中溫溫液液也吐涎沫而不效不為必遺尿小便數血此屬陰虛火熱甚也吐涎沫而不效不為必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必涎涎唾用炙甘草乾薑湯以溫之○肺痿涎唾多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也與補陰虛火熱不同故肺痿有寒熱之異

清燥救肺湯  
治諸氣膈鬱諸痰喘嘔

二桑葉 經霜者得金氣而柔順不燥取之為君去枝梗三錢 石膏 稟清肅之氣極清甘 草 和胃生人參生胃之津養胡麻仁一錢 真阿膠 八錢 麥門冬 去心一分 杏仁 泡去皮尖 枇杷葉 一片刷去毛 水一碗煎六分頻頻滾熱服痰多加貝母瓜蒌血枯加生地黃熱甚加增石膏

喻嘉言曰諸氣膈鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而唯喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下成方切用 清燥救肺湯 三 潤燥門

非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內經六氣脫誤秋傷於燥一氣指長夏之溼為秋之燥後人不取更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥夾雜如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬此方名清燥救肺湯大約以胃氣為主胃土為肺金之母也其天門冬雖能保肺然味苦而氣滯恐反傷胃阻痰故不用也其知母能滋腎水清肺金亦以苦而不用其他苦寒降火傷胃之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫爾儻更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有生理乎誠做此增損以救肺燥變生諸證如沃焦救焚不厭其煩庶克有濟爾

通幽湯 東垣

治幽門不通上衝吸門噎塞不開氣不得下大便艱難名曰

下脘不通治在幽門 下脘即幽門胃之下口也人身上下有

即會厭氣喉上掩飲食者不通其吸入之氣不得下歸肝腎

胃之滯與陰火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通

利泄其陰火調其燥血生其新血則幽門通吸門亦不受邪

是為陰得下歸地也

當歸身 升麻 桃仁 紅花 甘草 原生地 原熟地

或加檳榔

當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤燥而行血檳榔下墜而

破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁

成方切用 通幽湯 濟川煎

四

陰不降經所謂地氣上為雲天氣下為雨也 李東垣曰陰經

大便難者取足少陰夫腎主五液津液是則大便如常若饑

飽勞役損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪火伏血中

耗散其陰津液虧少故大便燥結少陰不得大便以幸潤之

太陰不得大便以幸潤之得食者以苦泄之血燥者以桃仁

酒製大黃通之風燥者以麻仁加大黃利之氣塞者以杏仁

杏仁卑角仁潤之不可藥用牽牛巴豆之類下之損其津液

暫得通快燥結加大黃麻仁名當歸潤腸湯治同

愈其遂成不救

濟川煎

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用

若勢有不得不通者宜此主之此用通於補之劑也

當歸三五 牛膝二 肉苁蓉二 酒洗去鹹 澤瀉一 錢 五分 升麻一 錢 五分 或一 錢

枳殼一錢虛甚 如氣虛加人參無妨碍 如有火加黃芩

腎虛加熟地

潤腸丸 東垣

治腸胃有伏火大便秘澇全不思食風結血結 風結即風秘

傳於大腸或素有風病者亦多秘氣秘由氣不升降血秘由

亡血血虛津液不足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣橫於腸

胃凝陰固結津液不通非燥糞也仲景曰脈浮而數能食不

大便者此為實名曰陽結脈沉而遲不能食身體重大便反

難名曰陰結李東垣曰實秘熱秘即陽結

也宜散之虛秘冷秘即陰結也宜溫之

大黃 歸尾 羌活 錢 桃仁 研 大麻仁 去殼 蜜丸一方有

防風風溼加秦艽卑角子 性用

歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通幽麻仁滑

腸利竅血和風疏腸胃得潤則自然通利矣 朱丹溪曰古方

成方切用 潤腸丸 決津煎

氣品劑蓋肺氣不降則難傳送用枳殼沉香調子杏仁等是

也又老人虛人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻麻仁阿

膠等是也如妄以峻藥逐之則精液走

氣血耗雖暫通而即秘矣必發生他證

加防風卑角仁蜜丸名活血潤燥丸治同 卑角得澤則滑

去羌活加升麻紅花生熟二地名潤燥湯 俱東垣方 治同大黃煨

熟當歸酒浸枳實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥

澀

決津煎

治婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水濟水若江河

一決而積垢皆去宜用此湯隨證加減主之此用補為瀉之

神劑也

當歸三五錢或一兩澤瀉五分肉桂三錢熟地二錢或五錢錢錢或不用亦可烏藥

錢 如嘔惡者加焦薑一二錢 如陰滯不行者非加附子

不可 如氣滯而痛脹者加香附一二錢或木香七八分

如血滯血澀者加酒炒紅花一錢 如小腹不煖而痛極

者加吳茱萸七八分 如大便結澀者加肉蓯蓉三錢或鎖

陽亦可煮粥彌佳 如氣虛者宜少用澤瀉烏藥之類甚者

不用亦可

韭汁牛乳飲 丹溪

治胃脘有死血乾燥枯槁食下作痛翻胃便秘胃脘有死血  
雖暴多怒積久而成癥熱也枯槁者血聚則肝氣燥燥熱故  
槁也瘀血阻礙故食下作痛翻胃而吐出也瘀血不去則新

成方切用

韭汁牛乳飲

六 潤燥門

血不生故腸枯而便秘。腸澀翻胃多因氣血兩虛胃脘痛  
冷而成飲可下而食不下槁在吸門即喉間之會厭也食下  
胃脘痛須臾吐出槁在賣門胃之上口也此上焦名噎食下  
焦久吐出槁在兩門胃之下口也此中焦名膈食吞吐槁  
在兩門小腸下口也此下焦名翻胃又有寒痰瘀  
血食積壅塞胃口者或補或消或潤宜隨病施治

韭菜汁 牛乳 等分時時呷之有痰阻者加薑汁一方去

牛乳加陳酒治血膈尤捷

韭汁辛溫益胃消瘀牛乳甘平潤燥養血瘀去則胃無阻血

潤則大腸通而食得下矣 治噎膈諸藥非汁散於竹瀝薑汁

血虛根汁止嘔芽根汁涼血甘薑汁和胃芽根汁消食蠶屎  
蟲或加燒酒米醋白蜜和諸汁煎服亦佳朱丹溪曰反胃噎

膈大便燥結宜牛羊乳時時呷之兼服四物湯為上策不可  
服人乳人乳有五味之毒七情之熱也。按噎膈不通服香

燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如  
少服藥飲牛乳加韭汁或薑汁或陳酒為付

活血潤燥生津湯 丹溪

治內燥津液枯少

當歸 白芍 熟地黃 天冬 麥冬 桔蘂 八分 桃仁 研紅

花 五分

歸芍地黃滋陰養血枯槁二冬潤燥生津桃仁紅花活血去

瘀凡陰虛血燥而兼痰滯者此方最宜

甘露飲

治胸中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血吐血衄血目瞼

垂重常欲合閉或即饑煩不欲食飲及目赤腫痛不任涼藥

口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發皆可服之又治脾胃受溼痰

成方切用

活血潤燥生津湯

甘露飲

七 潤燥門

熱在裏或醉飽房勞溼熱相搏致生疰病身目皆黃肢體微  
腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼

枇杷葉 甘草 一方加桂荅名桂荅甘露飲

此方創自潔古老人朱丹溪以為此心肺胃三經藥也主治

胸中客熱口臭齒爛心煩咽痛等證許學士又去麥冬加犀

角主治與上略同別如眼赤并一切瘡瘍已散未散皆可治

之然小甘露飲去熟地者以手陽明胃與腎無相關之勢故

加桔梗使與裏合治胃則以腎為關故加熟地二冬也 按此

固本丸為主而加入他藥原因胃中溼熱下流歸坎則水源  
濁泛故見證如此而當日立方之意實從救腎起見清胃者

自清胃而救原者自救原丹溪止言心肺胃猶未是全論高氏每於肝經有鬱火者加丹皮山梔去石斛甘草枇杷葉亦無不應驗則知水木同源之義若原有胃火而又挾肝木之勢者竟以原方加丹皮山梔等味亦無不效也丹溪言肺最妙然必須列證中有大便乾燥燥合手足陽明兩經之藥爾至一變而為小甘露去枇杷葉地二冬枳殼而加升麻枯梗梔子則手陽明實證通治之義全見矣火盛渴甚者加知母走馬疳而急者加石膏黃連火蝕既久元氣虛者加人參真胃中燥火之神劑也

附小甘露飲山梔黃芩生地升麻桔梗茵陳石斛甘草治脾勞實熱身體面目悉黃舌乾咽燥齒痛

消渴方 丹溪

治渴證胃熱善消水穀渴而多飲為上消肺熱也多食善饑下消腎熱也皆火盛而水衰也經曰二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足

成方切用

消渴方 地黃引子 人 卷十六

陽明胃主血熱則消穀善饑是血中伏火血不足也未傳能食者必發腦症背癢不能食者必傳中滿鼓脹皆不治之證○氣分渴者喜飲冷水宜寒涼滲劑以清其熱血分渴者喜飲熱水宜甘溫酸劑以滋其陰上輕中重下危如中上平則不傳下腎消小便甜者為重水生於甘而死於鹹小便本鹹而反甘是生氣泄脾氣下陷入腎中為土剋水也多死

黃連 天花粉 生地汁 藕汁 牛乳 將黃連花粉為末調服或加薑汁蜂蜜為膏嚥化

地黃引子 易簡

治消渴煩躁咽乾面赤 腎火 上炎

人參 黃耆 甘草 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬

枇杷葉 蜜 石斛 澤瀉 枳殼 炒

此方生津補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疏導二腑 澤瀉海 膀胱之

大以殺寬 使小腑清利則心火下降 心與小腸相為表裏紅大腸之氣使小腑清利則心火下降 心與小腸相為表裏紅消大腑流暢則肺經潤澤 肺與大腸相為表裏宿熱既除其渴自止矣喻嘉言曰人參白虎湯專治氣分燥熱此湯顯治血分燥熱竹葉黃耆湯兼治氣血燥熱宜辨證而擇用之附竹葉黃耆湯淡竹葉生地黃各二錢當歸川芎芍藥麥冬黃芩炒人參黃耆甘草半夏石膏煨各一錢治消渴氣血兩虛兼有胃火者

治久嗽方 千金

潤肺散寒 白蜜滑能潤肺 生薑辛能散寒

白蜜 生薑 取汁 先秤銅銚知飭兩訖納蜜薑汁微火熬

令薑汁盡唯有蜜飭兩在則止每含如棗大一丸日三服 朱 散故也○宋洪邁有痰疾晚對上諭以胡桃三枚薑三片臥

成方切用

治久嗽方 瓊玉膏 丸 卷十六

時啣服即飲湯復啣薑桃如前數靜臥必愈 過如行服且而痰消嗽止亦與此方同意

瓊玉膏

治乾欬嗽 有聲無痰謂之乾欬緣肺腎津枯所致若火鬱其 咳而乾欬者當用升發之藥如逍遙散之類隨用

滋陰之 劑收功

地黃 助 茯苓 兩 人參 兩 白蜜 二 先將地黃熬汁去渣入

蜜煉稠再將參苓末和入磁罐封水煮半日白湯化服 臘仙

加琥珀沉香 各五 錢

地黃滋陰生水水能制火白蜜甘涼性潤潤能去燥氣為水

母土為金母故用參苓補土生金蓋人參益肺氣而瀉火茯

苓清肺熱而生津也 澤熱去 則津生

麻仁蘇子粥 本事方

治老人風秘 許叔微曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不進食其家憂惶子辨前藥皆誤此是老人風秘臟腑滯聚於胸中則腹脹惡心不思飲食上至於顛則頭痛不語也合用此粥兩服而氣漸下結聚如散及產後大便不通後有三種疾發則多汗多目則大便不通故難於用藥

大麻仁 紫蘇子 等分洗淨合研再用水研取汁煮粥

麻仁陽明正藥滑腸潤燥利便除風蘇子兼走太陰潤肺通腸和血下氣行而不峻緩而能通故老人產婦氣血兩虛者所宜用也

桑白皮等汁十味煎 許仁則

成方切用 麻仁蘇子粥 桑白皮等汁十味煎

十 調經門 卷十六

治氣嗽經久將成肺痿乍寒乍熱唾涕稠黏喘息氣上聲口焦乾亦有唾血者漸覺瘦悴小便赤少色敗毛聾此亦成蒸及久嗽成肺癰唾膿出無多少

桑白皮 升地骨皮 三升 二味合煎汁三升 生地汁 升生麥冬汁 二升 生葛

根汁 竹瀝 升生薑汁 白蜜 棗膏 升牛酥 三合 以麥冬

生地葛根竹瀝薑汁和煎減半再內桑皮地骨汁和煎三分

減一再入酥蜜棗膏攪勿停手煎如飴糖夜臥時取一胡桃

大含之稍加至雞子大或盡日丸服亦得桑皮瀉肺行水麥

冬補肺生津地骨退熱除蒸竹瀝清痰通絡 能除痰涎之生

蘗祛寒而溫胃棗膏補土以生金地汁葛汁甘寒以除大熱

白蜜牛酥甘潤以止久嗽也

滋燥養營湯

治火燥肺金血虛外燥皮膚皴揭筋急爪枯或大便風秘肺皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而筋燥故外見皮毛枯槁肌膚燥癢內有筋急使秘之證

當歸 二錢 酒洗 生地黃 熟地黃 芍藥 炒 黃芩 炒 秦艽 防風

甘草 五分 前證為血虛而水潤當歸潤燥養血為君二地滋腎水而補

肝芍藥瀉肝火而益血為臣黃芩清燥肺之火而退陽亢防

散肝膽之風而不燥 防風 秦艽 能養血榮筋防風

乃血藥之使 皆用酒洗 甘草 甘平瀉火入潤劑則補陰血為

成方切用 滋燥養營湯 白茯苓丸

白茯苓丸

七 調經門 卷十六

佐使也

白茯苓丸

治腎消因中消之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯燥遂致此

疾兩腿漸細腰腳無力 腎消即下消乃上消中消之傳變候

無病則氣能管束津液其精微者榮養筋骨血脈餘者為

洩肺病則津液無氣管攝而精微者水隨洩下如音油也

茯苓 黃連 花粉 草薢 熟地黃 覆盆子 人參

元參 兩 蛇牀子 七錢 雞胫 皮 三十具 微炒 石斛 七錢 蜜

丸磁石湯送下

茯苓降心火而交肺腎連清脾火而瀉心石斛平胃熱而清

腎熱地元參生腎水覆盆蛇牀固腎精人參補氣花粉生津

革薛清熱利溼脬脰之脾也能消水穀通小腸膀胱而止  
便數善治膈消磁石色黑入腎補腎益精故加之以為使也  
喻嘉言曰友人病消渴後渴少止反加躁急足膝痠痛子主  
是火加犀角有醫曰腎病而以黃連犀角治心母乃倒乎子  
曰腎者胃之關也胃熱下傳於腎則關門大開心之陽火得  
以直降於腎心火灼腎燥不能濡子用犀角黃連對治其下  
降之陽光寧為倒乎服之果効再用  
六味地黃丸加犀角而肌澤病起矣

文蛤散

本文云渴欲飲水不止者文蛤散主之文蛤一味杵為散以  
沸湯五合和服方寸匙

金匱於小溲微覺不利蚤用文蛤一味治之方書從不錄用  
詎知輭堅之品非劫陰即傷陰獨此一種平善無過兼可利

成方切用

文蛤散 黃耆湯 宣明黃耆湯 主 潤燥門 卷十六

水誠足寶乎按傷寒論用此治候以水噀人面肌膚粟起之  
表證今消渴裏證亦用之蓋取其功擅輭堅且利水微熱爾

黃耆湯 本事方

治心中煩躁不生津液不思飲食

黃耆 熟地黃 芍藥 五味子 麥冬 天冬 人參

甘草 茯苓 加鼈屎烏梅煎

黃耆人參補氣熟地芍藥補血烏梅五味斂耗生津天冬麥  
冬瀉火補水茯苓淡以利溼甘草甘以和中溼去氣運則脾

和而思食津生而燥退矣

宣明黃耆湯

治心移寒於肺為肺消飲少溲多當補肺平心

黃耆 五味子 人參 麥門冬 桑白皮 枸杞子 熟  
地黃 兩 為末每服五錢

宣明麥門冬飲子

治心移熱於肺傳為膈消胸滿心煩精神短少

人參 茯苓 麥門冬 五味子 生地黃 甘草 知母

葛根 栝蒌根 等分 咬咀每服五錢加竹葉十四片

喻嘉言曰宣明二方為內經心移寒移熱兩證各出其治一  
種苦心非不可嘉然移寒移熱其勢頗銳而生精養血其應  
差緩情非的對易老門冬飲子亦然子謂心之移寒必先束

成方切用

宣明麥門冬飲子 易老門冬飲子 主 潤燥門 卷十六

肺之外郭用參耆補肺加散寒之藥可也而用枸杞熟地黃  
補腎則迂矣用桑白皮瀉肺其如外束之寒何至心之移熱  
治以鹹寒先入其心如文蛤散之類自無熱可移正直走大  
梁解圍之上着何不及之所以觀於海者難為水也

易老門冬飲子

治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草 五味子 麥門冬 加

鼈煎

喻嘉言曰按易老方即變宣明麥冬飲子去生地知母葛根  
加枸杞也方下不言心移熱於肺唯以治老弱虛人大渴而



增枸杞之潤去地黃之泥知母之苦葛根之發立方於無過  
治本之圖不為迂矣

### 豬膏湯

治過勞四肢筋液耗竭數轉筋爪甲皆痛不能久立名曰  
筋極肝主筋筋極六極之一也經曰陽氣者清則養神柔則  
也爪甲者筋之餘養筋筋過勞耗其津液不能榮養故筋急而筋數轉  
葉皆萎也不能久立筋衰不能束骨也

### 豬脂

薑汁二酒合五先將豬脂薑汁熬取三升再入酒分

### 三服

津竭筋枯非草木之藥卒能貢効豬脂潤能養筋薑汁辛能  
潤燥酒和血而性善行取易達於四肢也

### 成方切用

豬膏湯 豬膏髮煎

西

潤燥門  
卷十六

除薑汁加金銀花煮酒飲治瘡疥最良

### 豬膏髮煎

金匱

治諸黃令病從小便出

### 豬膏

牛如鷄子  
筋亂髮大三枚

二味和煎髮消藥成分再服

徐忠可曰此為黃疸之穀氣實者設也腎為胃關胃家穀氣  
實則氣閉而腎燥故以豬膏潤腎燥髮灰利陰血則胃燥和  
而鬱解仲景於婦人胃氣下泄陰吹而正喧者亦用此方註  
曰此穀氣之實也以豬膏髮煎導之乃利陽明之陰以洩穀  
氣之實也然此之穀氣實又非穀疸之比蓋穀疸原由風寒  
不能消穀此則真穀氣過實熱而閉爾予友駱天游黃疸腹

大如鼓百藥不效用豬膏四兩髮灰四兩一劑而愈仲景豈  
欺我哉

### 人參白虎湯

原治太陽中喝汗出惡寒身熱而渴

### 竹葉石膏湯

治虛煩燥渴

以上二方俱見瀉火門

喻嘉言曰按此二方治火熱傷其肺胃清熱救渴之良劑也  
故消渴病之在上焦者必取用之東垣以治膈消潔古以治  
能食而渴者其不能食而渴者用錢氏白朮散倍加葛根而

### 成方切用

人參白虎湯 竹葉石膏湯

圭

潤燥門  
卷十六

東垣論消渴未傳能食者必發腦疽背疽其不能食者必成  
中滿鼓脹一變其方為蘭香引子用石膏知母生熟甘草人  
參加入蘭香防風白芷薤仁連翹桔梗升麻半夏再變其方  
為生津甘露飲子用石膏人參生熟甘草知母加黃藥杏仁  
山梔草澄茄白葵白荳蔻白芷連翹黃芩麥門冬蘭香當歸  
身桔梗升麻黃連木香柴胡藿香全蠍而為之辭曰此制之  
緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣三消皆可用子實不敢  
信其然也乃至三因之石子薤苳湯潔古之清涼飲子俱從  
此方增入他藥引入他臟全失急救肺胃之意此後賢之所  
以為後賢耶

甘麥大棗湯 金匱

治婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸亦補脾氣人血室先受積冷而鬱久為熱則臟為之燥靈樞曰一陰主關關之因折則肝氣絕而喜悲則知燥氣乘肝為悲傷欲哭象如神靈所作病從血來故曰陰象也靈樞曰胃善伸數欠伸黑則知燥氣侵胃為欠伸但使肝氣津潤君火不亢則臟陰不燥何致乘肝侵胃今合悲傷欠伸其肝陰之熱可知心驚之熱亦可知故以甘麥大棗湯主之

甘草 錢 小麥 升 大棗 枚 以水六升煮取三升分溫三服

小麥能和肝陰之客熱而養心液且有消煩利溲止汗之功故以為君甘草瀉心火而和胃生金故以為臣大棗調胃而通津液利其上壅之燥故以為佐蓋病本於血心為血主肝之子也心火瀉而土氣和則胃氣下達肝臟潤肺氣調則燥止而病自除也

成方切用 甘麥大棗湯

未 調燥門 卷十七

成方切用卷十七目錄

瀉火門 正方五十四 附方四十七

黃連解毒湯

三黃金花丸

梔子金花丸

大金花丸

藥皮湯

三補丸

梔子藥皮湯

三黃瀉心湯

三黃丸

附子瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

半夏瀉心湯

成方切用 目錄

十 瀉火門 卷十七

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

白虎湯

人參白虎湯

白虎加蒼朮湯

桂枝白虎湯

化斑湯

柴胡石膏湯

竹葉石膏湯

又竹葉石膏湯

白頭翁湯

甘桔湯

甘草湯

甘桔防風湯

如聖湯	訶子清音湯
枳桔湯	桔梗湯
又桔梗湯	
保陰煎	
滋腎丸	
療腎滋本丸	黃蘗滋腎丸
大補丸	潛行散
升陽散火湯	
火鬱湯	節菴升陽散火湯
抽薪飲	
成方切用	目錄
徒薪飲	二 瀉火門
龍膽瀉肝湯	
東垣龍膽瀉肝湯	又龍膽瀉肝湯
清流飲	
涼膈散	方見祛風門
當歸龍薈丸	
化陰煎	
瀉青丸	方見祛風門
人參瀉肺湯	
瀉白散	

黃芩一物湯	清金丸
東垣加減瀉白散	寶鑑加減瀉白散
謙甫加減瀉白散	
利膈散	
化肝煎	
導赤散	
清胃散	
獨活散	
天門冬散	
玉女煎	
成方切用	目錄
瀉黃散	丰 瀉火門
又瀉黃散	卷十七
地黃煎	
左金丸	
又茱連丸	戊己丸
連附六一湯	抑青丸
瀉心湯	
約陰丸	
導赤各半湯	
消毒犀角飲	

蓮子清心飲

服蠶煎

普濟消毒飲

約營煎

紫雪

碧雪

人參清肌散

人參散

白朮除溼湯

石膏散

成方切用

玉泉散

清骨散

二母散

元參升麻湯

陽毒升麻湯

消斑青黛飲

蒼耳散

辛夷散

玉屑無憂散

腎熱湯

目錄

四

萬火門  
卷十七

綠豆飲

香連丸

黃連丸

雪梨漿

大清飲

成方切用

目錄

五

萬火門  
卷十七

成方切用卷十七

瀉火門

內經至真要大論所列病幾凡言火者五言熱者四似皆謂之火也然諸病之見於諸篇者復有此言熱而彼言寒此言實而彼言虛者豈果本經之自矛盾耶蓋諸篇所言在專悉病情故必詳悉盡本篇所言亦不過總言五運六氣之大約原非確指為實火實熱也故於篇末復以有無虛實二字總結於後此軒岐之明見萬世正恐後人誤以火熱二字悉認為實火而曉示如此此其火有虛實熱有真假從可知矣蓋火得其正即為陽氣此火之不可無亦不可衰衰則陽氣之虛也火失其正為邪熱此火之不可有尤不可甚甚則真陰傷敗也然陽以元氣言火以病氣言故凡病在元氣者不得以火論何也蓋人之元氣止於充足焉為得也惟病在形體者乃可以言火所謂無形者其氣即在血所謂有形者其化實即此是也故凡火之為病其在外者必見於皮膚筋骨其在內者必見於臟腑九竅如果有熱證可據則火性急烈誠可畏也然實火止隨形

成方切用

黃連解毒湯

卷十七

質因謂之凡火又謂之邪火不過病之標爾洗之除之又何難哉惟虛火則本於元氣之虛而再攻其火非徒即刃矣是以諸病之殺人而尤惟火病為最者正以凡火未起必殺人而以虛作實則無不殺之矣。瀉火諸藥黃連梔子瀉心肝大腸之火山梔子降火從小便出其性能屈曲下行石膏瀉腸胃之火山梔子降火從小便出其性能屈曲下行脾肺大腸之火黃蘗瀉肝腎諸經之火知母清肺胃肝腎之火地骨皮退陰中之火善除骨蒸夜熱生地麥門冬清肝肺涼血中之火天門冬瀉肺大腸之火桑皮瓜蒌薤白貝母解上焦痰逆之火柴胡清肝解肝脾諸經之熱大毒膽草瀉肝腎膀胱之火槐花清肝解肝脾諸經之熱連芎藥石解清肝胃之火天花粉清痰止渴解上焦之火連翹瀉諸經之浮火元參清上焦之浮火山荳根解咽喉之火膽星開心脾胃脘之痰火青黛瀉肝火連翹五臟之火熱鬱火苦參瀉肺熱之火木通下行瀉小腸之火滑石利小腸膀胱之火澤瀉車前子利權閉之火人中白清肝脾腎之陰火童便降陰中血分之浮火大黃朴硝瀉陽明諸經實熱之火人參黃耆白朮甘草除氣虛氣脫氣散失之火熱地當歸杞山黃滋心腎不交陰分無根之火附子乾薑肉桂救元陽失位陰盛格陽之火凡此治火之

法已若盡之然亦筌蹄之說而神明存乎人矣

黃連解毒湯

其自製者

相傳此方為太倉公火劑而崔氏治劉護軍又云

治一切火熱表裏俱盛狂躁煩心邪入於陽則狂心為熱所擾則煩躁則煩之甚也

口燥咽乾火盛大熱乾嘔上逆錯語不眠熱昏其神崔尚書

錯語正熱盛亦令人錯語若認而錯語者吐血衄血傷寒吐

宜承氣湯通而錯語者宜黃連解毒湯

當汗不汗蘊熱熱甚發斑入胃

黃連 黃芩 黃蘗 梔子 等分

三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火於上焦黃連瀉脾火

於中焦也子能令母實實則瀉其子黃蘗瀉腎火於下焦梔

成方切用

黃連解毒湯

卷十七

子通瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰故用大苦大寒

兼三焦而統治之瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非

實熱不可輕投劉河間曰傷寒表熱極甚身痛頭痛不可忍

柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後

而三下後熱勢尚甚本氣損虛而脈不能實擬更下之恐脫

而瀉利併少而急瀉者必欲作利也宜黃連解毒湯

水丸名三黃金花丸治中外諸熱癰汗齕牙夢語驚悸吐衄

淋祕勞嗽骨蒸加大黃名梔子金花丸去梔子加大黃名大

金花丸治略同去梔子名蘗皮湯治三焦實熱用粥丸名三

補丸治三焦有火噤燥喉乾二便閉結及溼痰夜熱經日壯

少火生氣故少火宜升壯火宜降今以黃芩瀉上焦連瀉中

黃蘗瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養三焦皆受

益去苓連加甘草名梔子蘗皮湯治傷寒發黃身熱發黃



必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也  
大陷胸湯主之若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也  
宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之證非傳經熱邪也

半夏升黃連一兩黃芩甘草人參乾薑三兩大棗十二枚

成氏曰否而不泰為痞苦先入心瀉心者必以苦故以黃連

為君黃芩為臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必以辛故

以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必

和其中故以人參甘草大棗為使以補脾而和中

則痞熱消而大汗以解矣

此方藥味蓋本理中人參

而脈反細不可下者瀉心湯上之脈有力者黃連瀉心湯

瀉心湯主之若瀉心湯主之若瀉心湯主之若瀉心湯主之

於心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實

成方切用

穢又不能下行唯用苦寒從其下而瀉之仍慮下焦之陰邪

上入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞而痞自散所以寒熱

互用若陰痞不關陽鬱則當用木成熱散是上下陰陽部分

知下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰下焦之陽驟虛

氣必上逆則上焦之陽反而下而成實以火氣不下行故也

治多瀉上補下心君得苦寒而安則反能從陽引之入陰故

麥連梔子瀉亦成補若汗下相因有虛無實溫補猶恐不足

前法一無所用矣

除人參再加甘草

前四兩名甘草瀉心湯

治傷寒中風醫

反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩醫

復下之其痞益甚此非結熱但以胃虛客氣上逆故使鞭也

為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃復其陰

退虛熱大要痞滿下利者為虛使閉者為實按甘草甘令人

滿故中滿證忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健運

寒之下利腸鳴也雜證腸鳴亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則

腸鳴腹滿又云中氣不足腸鳴之苦鳴宜參朮補劑加甘草

水激動其水也宜二陳湯加麥連梔子加生薑四兩名生薑

瀉心湯

治汗解後胃中不和心下痞硬乾嘔

不化脇下有水氣腹中雷鳴下利

火盛邪熱不殺穀故完穀不化脇下有水氣上逆伏飲搏胸故痞

故腹中雷鳴下利謂之逆也逆則胃中不和故乾嘔胃虛

生薑以散邪邪飲益胃後陽到則問曰瀉心湯而水穀變色者為

熱不變色而澄徹清冷者為寒若腹門漉漉小便黃赤者為

即出不及化也此所謂邪熱不殺穀也

白虎湯

治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒

三陽合病脈浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語

遺尿發汗則譫語下之則頭上生汗手足逆冷自汗出者

身重口不仁譫語陽明證也而少陽證也遺尿太陽證也

攻裏則陰氣不竭而虛陽上脫必煩汗出而手足逆冷治陽

明病脈洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎白痛

鼻乾不得臥心煩躁亂目睛潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

盛故脈洪大外無寒邪故不惡寒反惡熱中風有汗身熱無

汗傳入陽明則有汗謂之熱越故易明病法多汗身熱故

渴陽明上風肉故肌熱然交中故目痛脈洪鼻全燥故鼻

乾胃不和故臥不安人之陽氣者日行陽二十五度平旦

少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒證中日

肺潮熱為胃實無虛證證熱下則發斑

石膏知母甘草粳米先煮石膏數十沸

投藥米熟湯成溫服

熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏甘草為臣津液內燥故以粳米甘平益氣

為使不致傷胃也又煩出於肺躁出於腎石膏清肺而瀉胃

火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火或瀉其子

或瀉其母心不顯治陽明氣分熱也石膏甘草不但清裏

方可用或有血虛身熱神虛發熱及陰虛發熱而赤煩躁類

白虎湯證誤投之不可救也按白虎證脈洪大有力類白虎

證脈大而虛以此為辨又按陰虛陽盛格陽陰虛而格陽於

外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱

則寒是也當於小便分之使清者外雖微熱而中必寒便赤

者外雖微冷而內實熱而口中燥潤及舌苔淺淡蓋舌為

心苗應南方火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結則生胎

而滑胎白者丹田有熱胸中有寒邪在半表半裏也熱入潮

深則燥而濕熱聚於胃則黃宜承氣及白虎若熱病口乾活

成方切用 白虎湯 卷十七 海火門

黑乃腎水刑於心火熱益深而病篤矣然亦有胎黑屬寒者

舌無芒刺口有津液也又當用溫補之劑尤宜細辨東垣曰

邪在陽明肺受火劫故用辛寒以清肺所以有白虎之名白

虎西方金神也吳鶴皋曰如秋金之令行則夏火之炎退成

氏曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰有是病則投是藥

苟拘於時例以謂手若以白虎為大寒承氣又何以行於冬

陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加人參湯主之又云傷

寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎林億校正謂於此

表裏差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中渴表裏發熱前

後二證或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種發熱

無汗其表不解全是麻黃亦治太陽中喝身熱汗出惡寒足

與葛根證安可用白虎也

冷脈微而渴身熱惡寒為在表足亦治火傷肺胃傳為膈消

陰虛證曰肺消以地黃丸治其血分腎消加蒼朮名白虎加

蒼朮湯治其氣分病不能除腎之罪也

若虎湯治淫溫脈沉細者沉細屬陰淫溫受暑後受濕暑淫

痛多汗渴而譫語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人

多得之宜入參白虎湯靜而傷暑淫勝身重安樂之人多得

之宜蒼朮加桂枝名桂枝白虎湯治溫瘧但熱不寒骨節

疼痛時嘔除粳米加人參名化斑湯治胃熱發斑脈虛者加

柴胡黃芩半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴

成方切用 白虎湯 竹葉石膏湯 卷十七 海火門

竹葉石膏湯 仲景

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐傷寒解後餘熱未盡津液

逆故亦治傷暑發渴脈虛

竹葉二石膏 人參兩 甘草兩 麥冬一升 半夏 粳米

加薑煎

子 52-680



陽欲勝兩火旺則金囚故以竹葉瀉火以桔梗救金薄荷散火於上木通泄火於下甘草石膏直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣○外實經也內實腑也戊土胃也

白頭翁湯 仲景

治傷寒熱利下重欲飲水者 陽熱之利與陰寒不同陰利宜理中四逆溫臟陽利黃芩必焦

黃熱臭便出作聲 臍下必熱宜涼藥

白頭翁 兩 秦皮 黃連 黃蘗 三兩

白頭翁苦寒能入陽明血分而涼血止澀秦皮苦寒性瀉能

涼肝益腎而固下焦 清血色青故黃連涼心清肝黃蘗瀉火

補水並能燥溼止利取其寒能勝熱苦能堅腎瀉能斷下也

徐忠可曰此主熱利下重蓋下陷則傷陰陰傷則血熱雖後重而不用調氣之藥病不在氣爾周揚俊曰邪傳厥陰少陽

成方切用

竹葉瀉火湯 白頭翁湯 甘桔湯

九

瀉火門

其表也臟腑相連於法禁下故但謀去其熱熱除而利自止矣

甘桔湯 金匱名桔梗湯

治少陰咽痛喉痺肺癰吐膿乾欬無痰火鬱在肺 手少陰心

少陰腎脈循喉嚨火炎則痛經曰一陰一陽結謂之喉痹一陰少陰君火一陽少陽相火也金匱云熱之所過血爲之凝

滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成難治火鬱在肺則乾欬無痰

甘草 兩 桔梗 兩 或等分王好古加減法失音加訶子聲不

出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味酒毒

加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑吐膿血加紫苑肺癰加

阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫

加茯苓膚痛加黃耆發斑加荊芥防風痰毒加牛蒡子大黃

不得眠加梔子

甘草甘平解毒而瀉火桔梗苦辛清肺而利膈又能開提氣

血表散寒邪排膿血而補內漏故治咽痛喉痺肺癰欬嗽取

其辛苦散寒甘平除熱也 金匱曰欬而胸滿振振咽乾不渴

喻嘉言曰此上提之法其新起提其敗血或從唾出或從

便出足以殺其毒此因胸滿振振不渴病尚在表用此開提

肺氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此法不中用矣病日

日喉癰惡寒爲裏閉於外熱鬱於內忌用膈藥等劑雖喉使

陽鬱不得伸又忌硝黃等寒劑下之使陽邪陷裏宜用表藥

提其氣升以助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之

酸收之也○外臺祕要曰五臟之尊心雖爲主而肺居其

上肺爲華蓋下覆四臟合天之德通達風氣性愛溫而惡寒

心火更炎上蒸其肺金被火傷則葉萎倚着於肝肝發癰則

嗽因心肝虛弱不能傳陽於下焦遂至正陽俱損變成嗽矣

肺主皮毛遇寒則燥而栗起肺嗽因痰著於肝而成病

由不能扣金而鳴也先養肺抑心肝虛熱和其腎自愈矣

成方切用 甘桔湯 十 瀉火門

除桔梗名甘草湯 治同加防風名甘桔防風湯治同加防

風荊芥連翹名如聖湯 宋仁 治上焦風熱加訶子和童便服

名訶子清音湯治中風不語 肺屬金主音金空則有聲風痰

散逆破結桔梗利肺氣甘草和元氣童便降火潤肺或加木

通以利機竅也○足少陰腎脈挾舌本足太陰脾脈通舌本

黃耆<sup>七</sup>分杏仁百合甘草<sup>各三</sup>分加薑煎亦名桔梗湯<sup>生清</sup>治肺癰

吐膿監乾多渴

保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太蚤凡一切陰虛內熱等證

生地 熟地 芍藥<sup>錢二</sup>山藥 川續斷 黃芩 黃蘗<sup>錢半</sup>生

甘草<sup>錢</sup> 如小水多熱或兼怒火動血者加焦梔子一二錢

如夜熱身熱加地骨皮一錢五分 如肺熱多汗者加麥

冬地骨皮血熱甚者加黃連一錢五分 如血虛血滯筋骨

腫痛者加當歸二三錢 如氣滯而痛者去熟地加青皮陳

皮丹皮香附之屬 如血脫血滑及便血久不止者加地榆

一二錢或烏梅一二個或百藥煎一二錢文蛤亦可 如少

年或氣血正盛者不必用熟地山藥 如肢節筋骨疼痛或

腫者加秦艽丹皮各一二錢

滋腎丸 又名通關丸東垣

治下焦邪熱口不渴而小便秘及腎虛蒸熱腳膝無力陰痿

陰汗衝脈上衝而喘<sup>腎中有水有火水不足則火獨旺故虛</sup>

力陰痿陰汗衝脈起於<sup>熱肝腎虛而淫熱壅於下焦故腳膝無</sup>

而上至胸水不制火故氣逆上而喘

黃蘗<sup>酒炒</sup>知母<sup>酒炒</sup>一兩桂<sup>錢一</sup>蜜丸

小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱水不能生是

絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清

燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若

熱在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰

中之陰藥治之<sup>痰滲之藥若二苓澤瀉琥珀燈心木通車前</sup>

小便不通漸成中滿腹堅如石腿裂出水夜不得眠不能飲

食東垣診治歸而不至不寐因記素問曰無陽則陰無以生

無陰則陽無以化又云膀胱者兩部之官津液藏焉氣化則

能出矣此病癰秘是無陰則陽無以化也此因膏粱積熱損

傷腎水火又通上而為嘔噦內關外格之證悉具死在旦夕

矣前處北刀火大苦寒之劑黃蘗知母各一兩桂一錢為引須

分而濁一在下焦血分而不渴二者之殊至易辨爾又曰凡

病在下焦皆不渴血中有溼故不渴也○若膀胱陽虛陰無

以化又當用八味腎氣丸按消渴證以渴為主而分氣血故

血分亦有渴者淋證以淋為主而分氣血故

而分氣血故血分亦有渴者

成方切用 滋腎丸 升陽散火湯

去桂名療腎滋本丸治腎虛目昏去桂加黃連名黃蘗滋腎

丸治上熱下冷<sup>似陽極</sup>水衰心煩單黃蘗一味名大補丸治腎

虛膀胱虛熱腰股痛而足心熱為末薑汁酒調服名潛行散

治痛風腰以下溼熱流注

升陽散火湯 東垣

治肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燎捫之烙手此病

多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服

此

柴胡<sup>錢八</sup>防風<sup>錢二</sup>葛根 升麻 羌活 獨活 人參 白

柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌活以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使三焦暢遂而火邪皆散矣人參甘草益脾土而瀉熱芍藥瀉脾火而斂陰且酸斂甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也

除人參獨活加葱白名火鬱湯治同火鬱者內熱外寒脈沉而數火鬱無微故外寒

成方切用

升陽散火湯

圭

瀉火門

陶節菴升陽散火湯人參白朮茯神甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃芩加薑棗金器煎治傷寒又手冒心尋衣摸牀譫語昏沉不省人事節菴曰俗醫不識誤認風證不知此乃肝便利者可治有痰加薑棗半夏大便燥實諸語發渴加大黃瀉瀉加白朮升麻陽虛故又手自冒其心熱皆其神故也衣摸牀小便利則肺氣猶降膀胱猶能化氣而腎水未枯故可治

抽薪飲

治諸凡火盛而不宜補者

黃芩 石斛 木通 梔子 黃蘗 枳殼 細甘草 煎成食遠溫服 如熱在經絡肌膚者加連翹天花粉以解之 熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之 熱在陽明

頭面或躁煩便熱者加生石膏以降之 熱在下焦小水痛澇者加草龍膽車前以利之 熱在陰分津液不至者加麥冬生地芍藥之類以滋之 熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲

治三焦氣火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

黃芩 麥冬 芍藥 黃蘗 茯苓 丹皮 陳皮 如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮梔子

龍膽瀉肝湯局方

成方切用

抽薪飲 徙薪飲

南

瀉火門

治肝膽經實火溼熱脇痛耳聾膽溢口苦筋痿陰汗陰腫痛白濁洩血肝者肝膽之部也火盛故作痛筋脈絡於耳故也決斷出焉膽虛數謀慮而不決膽氣上溢故口為之苦肝主筋溼熱勝故筋痿肝脈絡於陰器故或汗或腫或痛白濁洩血皆肝火也

龍膽草 黃芩 梔子 澤瀉 木通 車前子 當歸 生地黄 柴胡 生甘草

龍膽瀉肝湯

三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之溼木通車前瀉小腸膀胱之溼以佐之然皆苦寒下泄之藥故用歸地以養血而補肝用甘草以緩中而不使傷胃為臣使也

東垣無黃芩梔子甘草亦名龍膽瀉肝湯治前陰熱癢臊臭

此因飲酒風濕熱合於下焦為邪厥陰肝脈絡於陰器柴胡入肝為引澤瀉車前木通利小便亦除濕氣所謂在下者因而瀉之生地龍膽苦寒以瀉濕熱一方除當歸地木通澤瀉車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦名龍膽瀉肝湯

治筋癢癢急口苦爪枯亦治前證加人參者扶土所以抑木平木潤燥所以養筋用黃連知母者上以瀉心火下以瀉腎火一為肝子一為肝母也

清流飲

治陰虛挾熱瀉利或喜冷或發熱或下純紅鮮血或小水赤痛等證

生地黃 芍藥 茯苓 澤瀉 二當歸 一黃芩 黃連 一錢

成方切用

龍膽瀉肝湯 清流飲 當歸龍膏丸

主 瀉火門 卷十七

分枳殼 甘草 一錢 如熱甚者加黃蘗 小水熱痛者加梔子 燥渴者加花粉麥冬

當歸龍膏丸 宣明

治一切肝膽之火神志不寧驚悸搖擗躁擾狂越頭暈目眩

耳鳴耳聾胸膈痞塞咽嗌不利腸胃燥澀兩脇痛引少腹肝

移熱於肺而欬嗽肝屬風木主筋主怒故搖擗躁擾狂越皆

故目眩耳聾心脈挾咽歷膈腎脈貫膈循喉嚨水衰火盛故

膈咽不利兩脇少腹皆肝膽經所循故相引而痛五臟六腑

皆有欬然必傳以與肺 亦治盜汗盜汗屬熱此與當

當歸 酒洗 龍膽草 酒洗 梔子 黑黃連 炒黃蘗 炒黃芩 炒一大黃 酒

青黛 水蘆薈 錢五 木香 錢二 麝香 分 蜜丸 薑湯下

肝木為生火之本肝火盛則諸經之火相因而起為病不止

一端矣故以龍膽青黛直入本經而折之而以大黃芩連梔

藥通平上下三焦之火也蘆薈大苦大寒氣燥入肝能引諸

藥同入厥陰先平其甚者而諸經之火無不漸平矣諸藥苦

寒已甚當歸辛溫能入厥陰和血而補陰故以為君少加木

香麝香者取其行氣通竅也然非實火不可輕投

化陰煎

治水虧陰涸陽火有餘小便癃閉淋濁疼痛等證

生地 熟地 牛膝 豬苓 澤瀉 生黃蘗 生知母

綠豆 三錢 龍膽草 五分 車前子 一錢 加食鹽少許 若水虧居

成方切用

當歸龍膏丸 化陰煎 瀉青丸

主 瀉火門 卷十七

多而陰氣大有不足者可遞加熟地用至一二兩亦可

瀉青丸 錢乙

治肝火鬱熱不能安臥多驚多怒筋癢不起目赤腫痛肝屬

木盛生火故發熱多甚於寅卯木旺之時按之在寸之下竹

之上為肝熱肝熱之經行於兩脇風火干之故臥不安肝在

志為怒故多怒肝虛膽怯故多驚肝主筋達

方見祛風門

肝者將軍之官風淫火熾不易平也龍膽大黃苦寒味厚沉

陰下行直入厥陰而散瀉之所以抑其怒而折之使下也羌

活氣雄防風善散竝能搜肝風而散肝火所以從其性而升

之於上也少陽火鬱多煩躁梔子能散三焦鬱火而使邪從

小便下行少陽火實多頭痛目赤川芎能上行頭目而逐風

邪且川芎當歸皆血分之藥能養肝血而潤肝燥血虛故肝燥故

多驚又皆血中氣藥辛能散而溫能和一瀉一散一補同為

平肝之劑故曰瀉青然必壯實之人方可施用余于容口時

有餘之說舉手便云平肝按聖濟經云原四時之所化始於

木究十二經之所養始於春女子受娠一月是厥陰肝經養

之肝者乃春陽發動之始萬物生之之源故戒怒養陽使先

天之氣相生於無窮是謂生之切要也不可泥於此說內經

六節臟象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其臟求其勝

也皆歸始春蓋春屬肝木乃吾身之勝各以氣命其臟求其勝

五行之中唯木有發榮暢茂之象花葉蓂莢榮而可愛結

實成實食之以全生皆此木也使天地而無木則世界黯淡

無色矣由是言之培之養之猶恐不暇而向欲剪之伐之乎

外臺祕要曰五行五臟皆互相生肝雖處中而為臟首位在

甲乙懷養懷仁故應春而王也為心之母餘臟循次而生焉

成方切用瀉青丸 人參瀉肺湯 瀉白散 主瀉青丸 人參瀉肺湯 瀉白散

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘欬嗽胸膈脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子仁 枳殼 薄荷 甘草 連翹 杏

仁去皮 桑白皮 大黃 桔梗

按人參肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺立名可

見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也况人參之溫以一味清涼

桑白皮 地骨皮錢 甘草五錢 粳米百粒

桑白皮甘辛而寒行水降火瀉肺氣之有餘除痰止咳能利

二便而療熱渴地骨皮寒瀉肺中之伏火淡泄肝腎之虛熱

涼血退蒸甘草瀉火而益脾粳米清肺而補胃並能瀉熱從

小便出肺主西方故曰瀉白時珍曰此瀉肺諸方之準繩也

物湯丹溪清金丸瀉肺金血分之瀉白散瀉肺氣分之火黃芩

加人參五味茯苓青皮陳皮名加減瀉白散東治欬嗽喘急

嘔吐加知母黃芩桔梗青皮陳皮亦名加減瀉白散實治欬

而氣喘煩熱口渴胸膈不利除甘草粳米加黃芩知母麥冬

五味桔梗亦名加減瀉白散羅謙 治過飲傷肺氣出腥臭唾

成方切用瀉白散 利膈散 太瀉白散 利膈散

涕稠黏隘喉不利口苦乾燥原文云桑皮地骨皮味苦微寒降

母苦寒治氣出腥臭清肺利氣為臣五味酸溫以收肺氣麥

冬苦寒治唾涕稠黏口苦乾燥為佐桔梗辛溫輕浮治痰逆

利膈散

治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥穗 防風 桔梗 牛蒡子炒 人參 甘草

等分為末每服二錢不拘時沸湯點服咽喉口瘡甚加鹽

鹽

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降下之味

其見甚超較涼膈散諸方為更勝

化肝煎

治怒氣傷肝而因氣逆動火致為煩熱脇痛動血等證

青皮 陳皮 白芍 二錢 瀉 如血見下部者 梔子 炒 丹皮 錢一

五士貝母 錢二 如大便下血者加地榆小使下血者加木

通各一錢五分 如兼寒熱者加柴胡一錢 如火盛加黃

芩一二錢 如脇腹痛脹加白芥子一錢 脹滯多者勿用

芍藥

導赤散 錢乙

治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡齦牙口渴心與

相表裏心熱則小腸亦熱故便赤淋痛心屬君火是五臟六

腑火之主故諸經之熱皆應於心面赤煩躁齦牙口渴皆心

成方切用 化肝煎 導赤散 卷十七 門

熱也舌為心苗若心火上炎薰蒸於口則口糜口瘡輕手按

至皮毛之下肌肉之上則熱日中大甚是熱在血脈為心熱

方主之如治白濁沙淋等證合消遙散

生地黃 木通 甘草梢 淡竹葉

生地涼心血竹葉清心氣 故清上焦 木通降心火入小腸

宜木通相火宜澤瀉行水通利 草梢達莖中而止痛 便赤以

所用各別君心火也相腎火也 小腸為丙火心為丁火心熱

共導丙丁之火由小水而出也 泄小腸釜底抽薪之義也

老用導赤散合五苓散治口糜神效 經曰膀胱移熱於小腸

膀胱不便上為口糜亦有因用子理中湯者因脾胃虛寒之

火被遏上炎故用參朮甘草補其土 灌附散其寒則火得所

助接引退舍矣綱目曰心氣熱則上竅宜導赤散腎氣虛則

下宜 地黃丸

天門冬散

治肺壅熱鼻乾大便祕澇

天門冬 皮 桑白皮 升麻 大黃 枳殼 炒 甘草 荆芥

按此方藥味較人參瀉肺湯為少減然用升麻且升且降以

散上焦壅熱可取

清胃散 東垣

治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱其牙喜寒惡熱

或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口頰腮腫痛 足陽明胃脈循

頰口齒唇頰頰車上耳前主上牙齦喜寒飲而惡熱手陽明

大腸脈上頸貫頰入下齒俠口主下牙齦喜熱飲而惡寒足

陽明別絡絡腦故腦痛陽明之脈營於面故面熱二經熱盛故

唇口齒頰病而腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血或齒縫

出血也亦名齒衄乃腎病若血多而湧出不止為陽明熱盛

以陽明多氣多血也唇屬脾胃大腸經燥則乾熱則裂風則

成方切用 天門冬散 清胃散 玉女煎 卷十七 門

關寒則揭若腫破裂如蠶繭名曰齦唇唇舌者

肌肉之末也人中平滿者為唇反唇反肉先死

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 一方加石膏

黃連瀉心火亦瀉脾火脾為心子而與胃相表裏者也當歸

和血生地丹皮涼血以養陰而退陽也石膏瀉陽明之大熱

升麻升陽明之清陽清升熱降則腫消而痛止矣 薛新甫曰

牙痛者承氣湯輕者清胃散大腸熱而齦腫痛者清胃散甚

者調胃湯六鬱而痛者越鞠丸中氣虛而痛者補中益氣湯

思慮傷脾而痛者歸脾湯腎經虛熱而痛者六味丸腎經虛

寒而痛者還少丹重則八味丸其屬風熱者獨活散散茵陳散

風寒入腦者羌活附子湯當臨時制宜附獨活散散茵陳散

玉女煎

治水虧火勝六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴

頭痛牙疼失血等證其效如神若大便溏泄者大非所宜

生石膏錢三五 熟地或三五錢 麥冬錢二 知母錢一 牛膝錢一 如火

之盛極者再加梔子地骨皮之屬亦可 如多汗多渴者加

五味子十四粒 如小水不利或火不能降者加澤瀉一錢

五分或茯苓亦可 如金水俱虧因精損氣者加入參三三

錢尤妙

### 瀉黃散

治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易饑熱在肌肉

唇者脾之外候口燥唇乾口瘡口臭皆屬脾火脾熱故煩渴

易饑病名中消脾主肌肉故熱在內分輕按重按皆不熱不

氣虛熱宜補中益氣湯。按面上熱身熱一熱身熱狂而

成方切用 王汝廉 瀉黃散 主 瀉火門

妄言妄見皆足陽明肩背熱及足外廉脛後熱皆足太陽

口熱舌乾中熱而喘足下熱而痛皆足少陰肩熱項似拔

耳前熱若寒皆手太陽身熱膚痛手少陰瀝漸寒熱手太陰

掌中熱手太陰少陰厥陰熱而筋縱不收陰痿足陽明厥陰

又曰胃居膈上胃熱則膈以上熱腸居膈下腸熱則膈以下

熱肝居膈居膈上熱則膈亦熱肺居胸背肺熱則胸背亦熱

腎居腰腎熱則腰亦熱可類推也

防風四錢 藿香七錢 山梔炒黑 石膏五錢 甘草二兩 右末微炒香酒

調服 山梔清心肺之火使屈曲下行從小便出藿香理脾肺之氣

去上焦壅熱辟惡調中石膏大寒瀉熱兼能解肌甘草甘平

和又能瀉火重用防風者取其升浮能發脾中伏火又能

於土中瀉木也 木盛尅土防風能散肝火吳鶴皋曰或問脾

燥何以用防風金曰東垣有言防風乃風藥中潤劑也李東

垣曰瀉黃散非瀉脾也脾中瀉肺也實則瀉其子以脾為生

石膏梔子之類

錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳殼黃芩錢半 石斛錢一 半夏錢一

甘草七分 治同前證或唇口皸燥裂脾之華在唇動也風

者陽明藥防風祛風而散脾火燥裂也皸裂水也白芷升麻

之也黃芩瀉中上之熱枳殼和中上之氣半夏能燥能潤發

表開鬱石斛清脾平胃退熱補虛甘草

和脾能泄火亦火鬱發之之義也

地黃煎 治積熱

地黃汁四升 扶神 知母 葳蕤四兩 枯樓根 生薑汁 鮮

地骨皮 生麥冬汁 白蜜二升 石膏八兩 竹瀝三合

成方切用 瀉黃散 地黃煎 左金丸 主 瀉火門

右吹咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去渣下竹瀝

地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火煎至六升初服

四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之

按此方生津涼血制火微熱兼擅其長再加人參乃治虛熱

之聖方也

左金丸 又名葉連丸

治肝膽鬱火左脇作痛或胸脇痛不可忍吞酸吐酸筋痛痞

結酒溼發黃 肝火盛則脇痛吞酸吐酸亦由肝火上升肺胃

成筋痛肝木過盛尅 亦治噤口痢湯藥入口即吐 加糯米一

制脾土則成痞結 得三匙下咽 即不復吐矣



黃連 六兩薑 吳茱萸 一兩鹽 水丸

肝實則作痛心者肝之子實則瀉其子故用黃連瀉心清火

為君使火不尅金金能制木則肝平矣吳茱萸辛熱能入厥陰

肝行氣解鬱又能引熱下行故以為反佐一寒一熱寒者正

治熱者從治 以熱治熱從其性 而治之亦曰反治 故能相濟以立功也肝居於

左肺居於右左金者謂使金令得行於左而平肝也 東垣曰

諸嘔吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也以雜病論之嘔

吐酸水者其則酸水浸其心次令牙酸不能相對以熱熱

療之必減若病機作熱攻之誤矣或問吞酸素問以為熱東

垣以為寒何也丹溪曰吐酸與吞酸不同吐酸出酸水如

醋平時津液隨上升之氣鬱而成積滯中生熱故隨木化逐

作酸味非熱而何其有鬱之久伏於腸胃之間略不得上

不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖

理開發或得香熱湯九汁液得行亦可暫解非寒而何素問

成方切用 左金丸 約陰丸 卷十七

熱言其本也東垣言其末也子嘗治吞酸用黃連吳

茱萸炒時令送為佳使若茱萸為輔蒸餅為丸吞之仍

效糲食蔬葉自養則病易安 丹溪之論亦未易盡總之此

意有熱有寒不可執一 或氏曰房勞腎虛之人胸膈多有

隱痛此因腎虛不能納氣氣虛不能生血之故氣與血虧水

也盛則流暢虛則木有不濡者所以作痛宜破故紙之類補

腎常臨痛治則殆矣

加炒芩蒼朮陳皮亦名茱萸丸治同加芍藥等分為丸名戊

己丸治熱痢熱瀉 熱瀉者黃連也戊為胃土己為陰吳

約陰丸

黃連一味吳茱萸浸一宿為丸名抑青丸大瀉肝火治左脇

作痛單黃連煎服名瀉心湯治心熱

治婦人血海有熱經脈先期及過多者或兼腎火而帶濁不

止及男婦大腸血熱便紅等證

當歸 白朮 白芍 炒生地 茯苓 地榆 黃芩 白石

脂 醋煨 北五味 丹皮 續斷 等分為細末煉蜜丸服

火盛者加黃連 兼肝腎之火盛者加知母黃蘗各等分

大腸血熱便紅者加黃連防風各等分

導赤各半湯 節菴

治傷寒後心下不鞭腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神

昏不語或睡中獨語目赤口乾不飲水與粥則嘔不與勿思

形如醉人名越經證 傷寒不鞭不滿二便如常病在脾也

成方切用 約陰丸 導赤各半湯 消毒犀角飲 卷十七

於少陰心火上而通肺也邪熱入裏故曰赤舌

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石 麥冬 人參

甘草 茯神 加燈心苗棗煎

陳來章曰熱入心經涼之以黃連犀角梔子心熱上逼於肺

清之以黃芩知母麥冬泄之以滑石甘草燈心者欲使心肺

之邪熱從小腸膀胱出也故亦曰導赤然邪之越經而傳於

心者以心神本不足也故又加人參茯神以補之

消毒犀角飲

治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅甚腮項結核口舌生瘡及遍

生瘡癰已潰未潰並宜服之



犀角磨防風 荆芥穗錢 鼠粘子炒二錢 炙甘草錢一

按此方顯清上焦蘊熱與利膈散略同彼可多服此可暫服

蓮子清心飲局方

治憂思抑鬱發熱煩躁或酒色過度火盛尅金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁遇勞即發四肢倦怠五心煩熱夜靜甚

及女人崩帶煩躁遺精淋濁者心虛而有熱也心火妄動不能下交於腎故元精失守也遇勞即發為勞淋勞則動其心火也晝偏熱者陽虛也崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病本於帶脈而得名亦屬血白屬氣由陰虛陽竭營氣不升衛氣下陷或淫痰濕熱蘊積而下流也

石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡 黃芩 地骨皮

戊方切用

消毒犀角飲 蓮子清心飲 服法煎

圭 卷十七

麥冬 車前子 甘草 空心的

參者甘草所以補陽虛而瀉火東垣曰參者甘草瀉火之聖藥助氣化而達

州都勝腕也氣化則能出地骨退肝腎之虛熱柴胡散肝膽之火邪黃

芩麥冬清熱於心肺上焦茯苓車前利溼於膀胱下部中以

石蓮清心火而交心腎則諸證悉退也

服法煎

此方性味極清極輕善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地 麥冬 白芍 石菖蒲 石斛 丹皮 茯神 陳

皮 木通 知母 如痰勝多鬱者加貝母二錢 痰

盛兼火者加膽星一錢五分 陽明火盛內熱狂叫者加石

膏二三錢 便結脹滿多熱者加元明粉二三錢調服或漸

加大黃亦可 氣虛神困者加人參隨宜

普濟消毒飲東垣

治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛口不能開上喘

咽喉不利口渴舌燥俗云大頭天行初覺不相訪問染者多不效奈和問多有病此者醫以承氣加下之稍緩翼日如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱在於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣瀉胃中之實熱是為誤伐無過病以適至其所為準因處此方全活甚眾遂名普濟消毒飲

黃芩 黃連 陳皮 生甘草 元參 柴胡 桔梗

戊方切用

普濟消毒飲

圭 卷十七

連翹 板藍根 馬勃 鼠粘子 薄荷 殭蠶 升麻

為末湯調時服之或蜜拌為丸噙化一方無薄荷有人

參三錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

芩連苦寒瀉心肺之熱為君元參苦寒橘紅苦辛甘草甘寒

瀉火補氣為臣連翹薄荷鼠粘辛苦而平藍根甘寒馬勃殭

蠶苦平散腫消毒定喘為佐升麻柴胡苦平行少陽陽明之

陽氣不得伸桔梗辛溫為舟楫不合下行為載也此解本之東垣而稍

加刪潤然十書中無此方見於準繩

約登照

治血熱便血無論脾胃大小腸膀胱等證皆可用

生地 芍藥 續斷 地榆 黃芩 槐花 荊芥穗 炒烏

梅箇 如火盛者加梔子黃連膽星之屬 如氣虛者加人

參白朮 如氣陷者加升麻防風

紫雪局方

治內外煩熱不解狂易叫走發斑發黃口瘡腳氣瘴毒盡毒

熱毒藥毒 黃金兩 寒水石 石膏 滑石 磁石 三觔水煮搗煎 升麻

元參 一兩 甘草 炙半 犀角 羚羊角 沉香 木香 兩五 丁香

一兩 並搗入前藥 朴硝 硝石 二觔 提淨入前藥汁中微

汁中煎去渣入後藥 朴硝 硝石 火煎不住手將柳木攪候

入後二味 辰砂 研細 麝香 常門子 一兩 二錢 研細 合成

成方切用 治營煎 紫雪 碧雪 退火氣冷水調服每一二錢 本事方無黃金

寒水石石膏滑石硝石以瀉諸經之火而兼利水為君磁石

元參以滋肺腎為臣犀角羚羊角以清心寧肝升麻甘草以升

陽解毒沉香丁香木香以溫門調氣麝香以透骨通竅丹砂

黃金以鎮驚安魂瀉心肝之熱為佐使諸藥用氣硝獨用質

者以其水鹵結成性峻而易消以瀉火而散結也

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嘔物妨悶致咽閉壅

塞及天行時熱發狂昏憤 芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝 青黛 石膏 寒水石 研

甘草 分 增甘草煎湯一升去渣入諸藥再煎用柳木棍

不住手攪令消溶得所入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝

成霜研為細末每用少許含化津嚥不拘時候如覺喉壅閉

塞不能吞物即以小竹筒吹藥入喉中即愈

按此方做紫雪之制而不用黃金犀角等貴重之藥亦為簡

便 人參清肌散

治午前潮熱氣虛無汗 熱發午前陽虛而陰火乘之也火燥

無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒按此有

餘乃病邪有餘陰陽和則無病過中則皆病也經云日陽盛

生外熱陰盛生內寒皆亢 則為害非真陰真陽盛也 成方切用 人參清肌散 天 瀉火門 卷十七

人參 白朮 茯苓 甘草 炙 半夏 麴 當歸 赤芍藥

柴胡 乾葛 加薑棗煎

四君以補陽虛歸芍以調陰血半夏和胃而行痰柴葛升陽

而退熱蓋以甘溫瀉火 甘溫能 辛溫活血 汗即 辛甘解肌 有

宜實表無 此之無汗與傷寒無汗不同故但解其肌熱而不

必發出其汗也

前藥各一兩加黃芩五錢每服三錢加薑棗煎名人參散 許

微 治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭痛目昏盜汗倦怠一切血

熱虛勞 喻嘉言曰此邪熱淺在經絡未深入臟腑雖用柴葛

苓半夏兼動其痰合之當歸赤芍黃芩併治其血中之 熱止用三錢為劑蓋方成知約庶敢用柴胡乾葛爾

白朮除溼湯 東垣

治午後發熱背惡風四肢沉困小便色黃又治汗後發熱午  
發熱熱在陰分陽陷陰中也背為陽腹為陰背惡寒者陽不  
得伸也脾主四肢四肢沉困溼勝而脾不運也小便黃溼兼  
熱也汗後而熱不退  
或陰虛或陽虛也

人參 赤茯苓 甘草 炙 柴胡 五錢 白朮 一兩 生地黃 地骨皮

知母 澤瀉 七錢 每服五錢如有刺痛加當歸七錢小便

利減苓瀉一半

陽陷陰中熱在血分故以生地滋其少陰而以知母地骨瀉

血中之伏火也柴胡升陽以解其肌 陽陷陰中故以 芍瀉利

溼兼清其熱參朮甘草益氣助脾氣足陽升虛熱自退脾運

成方切用

白朮除溼湯 石膏散

羌 瀉火門 卷十七

而溼亦除矣 方名除溼而治在退熱 欲熱從溼中而下降也

石膏散 外臺

治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脈長者 此指勞熱因陽邪入裏 傳為骨蒸令人先寒後

熱漸成羸瘦者有汗胃 實也脈長陽明證也

石膏研細每夕新汲水服方寸匕取熱退為度

石膏大寒質重能入裏降火味辛氣輕能透表解肌雖寒而

甘能緩脾火勞有實熱者非此不為功故外臺祕要名醫錄

皆載之 玄珠曰五行六氣水特其一爾一水既虧豈能勝五

絡至死不悟夫涼劑能清火養水熱劑能補火燥水理易明

也勞為熱證明矣尚可補乎唯無熱無積之人脈微無力方 可補之必察其胃中及右腎二火俱虧後用補劑可也證治 要訣云治虛勞獨用熱藥者謂釜中無水而進火也過用冷

藥有微益下焦火而添水 也非從無益而又害之

玉泉散 亦名六一甘露散

治陽明內熱煩渴頭痛二便祕結瘟疫斑黃及熱痰喘嗽等

證 石膏 六兩 粉甘草 一兩 為細末每服一二三錢新汲水或熱

湯或人參湯調下或加硃砂三錢此益元散之變方也其功

倍之

清骨散

治骨蒸勞熱 火炎水虧真陰消燬故肌骨之熱蒸而熱也 靜夜熱者是陽氣陷入陰中也名曰熱入血室晝夜俱熱者 是重陽無陰也當急瀉其陽峻補其陰晝病則在氣夜病則

成方切用

石膏散

玉泉散

清骨散

二母散

辛

瀉火門 卷十七

銀柴胡 半錢 胡黃連 秦艽 鱉甲 童便 地骨皮 青蒿 知

母 一錢 甘草 五分

地骨胡連知母之苦寒能除陰分之熱而平之於內柴胡秦

艽青蒿之辛寒能除肝膽之熱而散之於表鱉陰類而甲以

骨能引諸藥入骨而補陰甘草甘平能和諸藥而退虛熱也

二母散

治肺勞有熱不能服補氣之劑者 肺虛挾火或痰嗽發熱陰 虛已甚再服補陽之藥則 火益亢而陰愈虧故有雖 虛而勞不能服溫補藥者

知母 貝母 等分炒為末

火旺燉金肺虛勞熱能受溫補者易治不能受溫補者難治  
故又設此法以滋陰用貝母化痰瀉肺火知母滋腎清肺金  
取其苦寒勝熱潤能去燥也

元參升麻湯

治發斑咽痛 發斑者陽明胃熱也  
咽痛者太陰肺火也

元參 升麻 甘草 分

升麻能入陽明升陽解毒元參能入太陰清金制火甘草甘  
平能散能和故可利咽散斑也

除元參加犀角射干黃芩人參名陽毒升麻湯治陽毒發斑  
頭項背痛狂躁罵言咽腫吐血溫服取汗

成方切用

消斑青黛飲 節菴

二母散 元參升麻湯 消斑青黛飲

圭 瀉火門 卷十七

治傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽毒發斑 血熱不散蒸於皮膚  
則為斑形如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死此或因陽證誤投熱藥或因下早  
表熱乘虛入胃或因下遲熱陷胃中皆發斑○有陰證發斑  
者元氣大虛寒伏於下通其無根失守之火上獨薰肺傳  
於皮膚淡紅而稀少也宜大建中湯誤投寒劑則殆矣

青黛 黃連 犀角 石膏 知母 元參 梔子 生地

黃 柴胡 人參 甘草 如薑棗煎入苦酒 一匙和服

發斑雖由胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連以清肝火  
梔子元參以清心肺之火知母生地以清腎火犀角石膏以  
清胃火此皆大寒而能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表  
柴胡清少 使以薑棗以和營衛其用人參甘草者以和胃也

胃虛故熱毒乘虛入裏而發於肌肉也加苦酒者其酸收之  
義乎

替耳散 無擇

治鼻淵 鼻流濁涕不止名鼻淵乃風熱燥腦而液外溢也經  
根在頰痠痛也原病式曰如以火燉金熱極則反化為水肝  
熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱盛則出涎肺熱甚則出涕  
盛極消燥以致之也

白芷 薄荷 辛夷 替耳子 錢半 為末食前葱茶湯調

下二錢

凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白芷主手足陽  
明上行頭面通竅表汗除溼散風辛夷通九竅散風熱能助

成方切用

消斑青黛飲 替耳散 辛夷散

瀉火門 卷十七

胃中清陽上行頭腦替耳疏風散溼上通腦頂外達皮膚清  
荷泄肺疏肝清利頭目葱白升陽通氣茶清苦寒下行使清

升濁降風熱散而腦液自寧矣

治鼻生瘰肉氣息不通不聞香臭 鼻為肺竅氣清則鼻通氣  
熱則鼻塞氣熱甚盛蒸於

肺門則生瘰肉猶溼  
地得熱而生芝菌也

辛夷 白芷 升麻 藁本 防風 川芎 細辛 大通

甘草 等分為末每服三錢茶調下 外用燒礬為末加礬  
砂少許吹鼻中能消

之

經曰天氣通於鼻若胃中無痰火積熱則平時上升皆清氣

也由溼火內焚風寒外束氣血壅滯故鼻生瘰肉而窒塞不通也辛夷升麻白芷辛溫輕浮能升胃中清氣上行頭腦防風藥本辛溫雄壯亦能上入顛頂勝濕祛風細辛散熱破結通精氣而利九竅芎藭補肝潤燥散諸鬱而助清陽此皆利竅升清散熱除溼之藥木通通中茶清苦寒以下行瀉火甘草和中又以緩其辛散也時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈挾鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利玉屑無憂散陳無擇

治喉風喉痺咽喉腫痛咽物有礙或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癰小兒爛癖及骨屑硬塞

戊方切用

辛夷散

玉屑無憂散

腎熱湯

玉

瀉火門卷十七

元參 黃連 荊芥 貫衆

山豆根 茯苓 甘草 砂

仁 滑石

五錢 礪砂 寒水石

三錢 為末每一錢先抄入口徐

以清水嚥下

元參黃連寒水石清火貫衆山豆根解毒滑石茯苓利水砂

仁礪砂輭堅

並能消

荊芥散結甘草和中故能統治諸病也

丹溪曰咽喉痛必用荊芥虛火上炎必用玄參。又有氣血大虛虛火游行無制客於咽喉遂成咽痛脈必浮大重取必瀉宜濃煎人參湯細細呷之如用清降之藥立斃

腎熱湯千金

治腎熱耳流膿血不聞人聲

耳為腎竅舌為心竅以舌非孔竅故心亦竅於耳十二經中

除足太陽手厥陰其餘十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調

陰陽不和或煩勞陰虛或衛氣不下循經脈或得於風邪或經脈積熱或大怒氣逆或淫飲痞隔或熱聚不散流出膿血或風熱搏結成核塞耳皆令暴聾宜通耳調氣安腎之劑

慈石

煅紅淬

牡蠣

鹽水煮

白朮

炒五兩

麥冬

芍藥

四兩甘草一兩

生地黃汁

葱白

大棗

十五枚

分三服

慈石體重辛鹹色黑補腎祛熱通耳明目故以為君牡蠣鹹

寒輭痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘寒補肺清金肺為

又聲屬金王太僕曰肺白芍酸寒平肝和血經曰肝病氣逆

虛則不能報息而耳聾耳得血皆能生水而制火退熱而歛陰白朮甘草大棗補

脾之品益土氣正以制腎邪也土能防水經云頭痛耳鳴腸

間者陽數者皆固本之藥使精氣充足邪熱自退耳竅自通

戊方切用

腎熱湯

綠豆飲

香連丸

香

瀉火門卷十七

加葱白者以引腎氣上通於耳也

綠豆飲

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待水冷

或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非苦

寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小水乃淺易

中之最佳最捷者也若火盛口乾不宜厚但略煮半熟清湯

冷飲之尤善除煩清熱

香連丸 直指

治脾胃兩經中溼火傳變大腸下痢赤白膿血相雜裏急後

重溼熱之積干於血分則赤干於氣分則白赤白兼下者氣血俱病也後重裏急者氣滯不通也按裏急後重有因火熱者有因氣滯者有因積滯者有因

黃連二十兩吳茱萸十兩木香四兩八錢醋糊丸米飲下一

方等分蜜丸一方加甘草八兩黃連用蜜水拌蒸曬九次入木香為丸

痢為飲食不節寒暑所傷溼熱蒸鬱而成黃連苦燥溼寒勝熱直折心脾之火故以為君用吳茱萸同炒者取其能利大腸壅氣且以殺大寒之性也裏急由於氣滯木香辛行氣溫和脾能通利三焦泄肺以平肝使木邪不尅脾土氣行而滯亦去也一寒一熱一陰一陽有相濟之妙經所謂熱因寒用寒

成方切用 香連丸 雪梨漿 大清飲 薑 瀉火門 卷十七

因熱用也釋古云近日香連丸絕非舊法難用消熱瀉下之藥人自為政亦名香連殺入如麻真可痛恨

加石蓮肉治噤口痢石蓮清心火開胃口加大黃治熱痢積滯大黃瀉胃熱瀉

積加訶子龍骨名黃連丸宣明加吳茱萸肉豆蔻烏梅湯丸並

治痢疾斷下烏梅龍骨肉豆蔻訶子皆瀉大腸

### 雪梨漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙方也用清香甘美大梨削去皮用大碗盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其渣退陰火極速也

### 大清飲

治胃火煩熱狂躁嘔吐等證可與白虎湯出入酌用

知母 石斛 木通一錢五分石膏生用三錢或加麥門冬

按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發爾是則胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃為平人迨至積熱既久然後治之已為失算況於藥不對病乎所以肥人之病多因血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病多因津液素衰而生火炎之熱治肥人之熱慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可執方妄施矣茲所錄以上諸方各宜自為推廣也

成方切用 大清飲 瀉火門 卷十七

成方切用卷十八目錄

除痰門 正方三十一 附方二十一

苓桂朮甘湯

二陳湯

陳皮半夏湯

半夏茯苓湯

二陳加梔連生薑湯

導痰湯

加味二陳湯

三聖丸

成方切用

目錄

生薑半夏湯

潤下丸

二賢散

順氣消食化痰丸

金水六君煎

金沸草散

半夏白朮天麻湯

六安煎

和胃二陳煎

括痰丸

苓朮二陳煎

除痰門  
卷十八

礞石滾痰丸

竹瀝達痰丸

清膈煎

茯苓丸

控涎丹

辰砂散

寧志膏

三子養親湯

常山飲

截癰七寶飲

成方切用

目錄

滌痰湯

星香散

牛黃丸

貝母丸

清肺飲

清氣化痰丸

蘇子降氣湯

定喘湯

七氣湯

三因七氣湯

二  
除痰門  
卷十八





通水道桂枝通陽氣和營衛開經絡白朮治風眩燥痰水除

脹滿成者治痰之本由於脾氣不足不能致精於肺而痰以

甘草得茯苓則不資滿而反泄滿本亦曰甘草故用之也

金匱曰短氣有微飲當從小便去之能下氣除煩滿故用之也

之旨矣今短氣亦分呼吸各出一方呼氣之短用苓桂朮甘

湯以通其陽陽氣化則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸以

二陳湯局方陳皮半夏貴其陳久則少燥散之性故名二陳

治一切痰飲為病欬嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸稠者為痰

水溼其本也得火則結為痰隨氣升降在肺則欬在胃則嘔

寒壯熱頭痛類外感表證久則潮熱夜重又類陰火內傷

成方切用二陳湯

半夏薑製陳皮去茯苓錢甘草分加薑煎薑能製半夏之毒治痰

通用二陳風痰加南星白附皂角竹瀝寒痰加半夏薑汁火

痰加石膏青黛溼痰加蒼朮白朮燥痰加桔槩杏仁食痰加

山查麥芽神麴老痰加枳實海石芒硝氣痰加香附枳殼脇

痰及在皮裏膜外加白芥子四肢痰加竹瀝

半夏辛溫體滑性燥行水利痰為君痰因氣滯氣順則痰降

麗安常曰善治痰者不治痰而治氣故以橘紅利氣痰由溼

生溼去則痰消故以茯苓溼為臣中不和則痰涎聚又以

甘草和中補土為佐也或曰有痰而渴宜去半夏代以桔槩

渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏也此溼為本熱為標溼極

燥主脾家溼痰雖俱化痰而寒溼燥潤各異脫或悞施貽害

匪淺用者宜審之○有血不足陰火上逆肺受火傷肅清之

令不得下行由是津液渾濁生痰不生血者名燥痰當用潤

劑如地黃門冬枸杞之類滋陰降火而痰自清若投二陳立

見危殆有頭風眉脊骨痛投以風藥不效投以痰藥見功又

有眼赤羞明與之涼藥不廖異以痰劑獲愈有人坐處吐痰

滿地不其稠黏只是沫多此氣虛不能攝涎不

可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加桔梗名桔梗半夏湯去陳

皮甘草名半夏茯苓湯治水氣嘔惡加黃芩名茯苓半夏湯

宣明治熱痰加黃連梔子生薑名二陳加梔連生薑湯治膈上

熱痰令人嘔吐去生薑加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行痰利

氣加膽星枳實名導痰湯治頑痰膠固非二陳所能除者加

星以助半夏加枳實以成衝牆倒壁之功○有痰飲流入四

肢肩背痠痛手足罷軟誤以為風則非其治宜導痰湯加木

薑片子再加菖蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香

附名順氣導痰湯治痰結胸滿欬逆上氣加枳實桔槩龍子

山查神麴治食積痰嗽發熱加蒼朮枳殼片子薑黃名加味

二陳湯仁治痰攻眼腫併酒家手臂重痛麻木除甘草加乾

薑薑汁糊丸名溫中化痰丸寶鑑治胸膈寒痰不快除茯苓甘

草加黃連麴糊丸薑湯下名三聖丸治痰火嘈雜心懸如饑

單用陳皮生薑名橘皮湯金匱治乾嘔噦及手足厥者單用半

夏薑汁名生薑半夏湯金匱治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤憤然無奈者

潤下丸

治膈中痰飲

廣陳皮去白八兩甘草二兩蒸餅糊丸或將陳皮鹽水煮

爛曬乾同甘草為末名二賢散薑湯下溼勝加星夏火盛加

芩連

陳皮燥溼而利氣溼去則痰消氣順則痰下食鹽潤下而輒

堅潤下則痰降輒堅則痰化痰在膈中故用甘草引之入胃

甘草經蜜炙能健脾調胃脾胃健則痰自行矣

順氣消食化痰丸瑞竹堂

治酒食生痰胸膈膨悶五更欬嗽過飲則脾溼過食辛熱油

膈故滿悶五更欬嗽由胃有積熱至此時火氣流入肺中故嗽

成方切用

順氣消食化痰丸

四除痰門卷十八

半夏製薑膽星一青皮

陳皮去白萊菔子生蘇子沈水山查

麥芽神麴葛根

杏仁去皮尖香附製一兩薑汁和蒸餅

糊丸

一方半夏南星白礬皂角生薑等分同煮至南星無點為度去皂角薑切同曬乾用

痰由溼生半夏南星所以燥溼痰由氣升蘇子菔子杏仁所

以降氣痰由氣滯青皮陳皮香附所以導滯痰因於酒食葛

根神麴所以解酒山查麥芽所以化食溼去食消則痰不生

氣順則欬嗽止痰滯既去滿悶自除也

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬

嗽嘔惡多痰喘急等證神效妙劑此六君子湯之變方也

當歸錢二熟地錢三五陳皮半錢半夏錢二茯苓錢二炙甘草錢一加

生薑三五七片如大便不實而多溼者去當歸加山藥

如痰盛氣滯胸膈不快者加白芥子七分如陰寒盛而嗽

不愈者加細辛五七分如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

金沸草散活人

治肺經傷風頭目昏痛欬嗽多痰風盛則氣壅氣壅則痰升

方云欬嗽感風者鼻塞聲重傷冷者悽清怯寒挾熱為焦煩

受溼為纏滯瘀血則胸間脛間停水則心下怔忡三因方云

一婦牙疼治療不效口頰皆腫以金沸草散大劑煎湯熏漱而愈

旋覆花即金沸草前胡細辛一錢荆芥半錢赤茯苓六分半夏五分甘草一分

成方切用

金水六君煎金沸草散

五除痰門卷十八

枳殼桔梗有熱加柴胡黃芩頭痛加川芎

風熱上壅荆芥輕辛發汗而散風痰涎內結前胡旋覆消痰

而降氣半夏燥痰而散逆甘草發散而緩中茯苓行水細辛

溫經蓋痰必挾火而兼溼故下氣利溼而證自平茯苓用赤

者入血分而瀉丙丁也

半夏白朮天麻湯東垣

治脾胃內傷眼黑頭眩頭痛如裂身重如山惡心煩悶四肢

厥冷謂之足太陰痰厥頭痛痰厥者溼痰厥逆而生也痰逆

黑色也○東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭痛足寒而氣

逆也太陰少陰二經雖不上循頭然痰與氣逆壅於膈中噴

而為痛也

半夏製麥芽神麴錢白朮炒一錢蒼朮油人參黃耆陳

皮茯苓澤瀉天麻五分乾薑三黃蘗二每服五錢

痰厥頭痛非半夏不能除而能和胃頭眩眼黑虛風內作非

天麻不能定黃耆人參甘溫可以補中亦可以瀉火二朮甘

苦而溫可以除痰亦可以益氣去溼故除痰苓澤瀉熱導水

陳皮調氣升陽神麴消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊己運

行胃為戊土乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒以療少火在泉

發躁也東垣曰夫風從上受之風寒傷上邪從外入令人頭

胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者過在手太陽少陰乃

淫熱頭痛也如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也過在手

太陽少陰則入腎寒淫頭痛也如頭半寒痛者先取手少

陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也如頭逆頭痛者所犯

成方切用半夏白朮天麻湯六除痰門

大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛有真

頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治頭痛每以風藥治

之者以高巔之上唯風可到味之薄者陰中之陽乃自地升

為主少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩為主陽明頭痛

自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷石膏為主太

陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南

星為主少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥

其脈沉細麻黃附子細辛湯主之厥陰頭痛當歸川芎為主氣虛頭

冷脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭

痛人參黃耆為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓

荊子細辛清膏風溼頭痛藥也白朮半夏天麻湯痰厥頭

治風寒欬嗽痰滯氣逆

六安煎

痛去鼻中黃水亦治

陳皮一錢五分半夏二錢茯苓二錢甘草一錢杏仁一錢白芥子五七分

不用弱加生薑三五七片凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者

多不易散宜加北細辛七八分或一錢若冬月寒邪盛者

加麻黃桂枝亦可若風勝而邪不盛者加防風一錢或蘇

葉亦可若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可若兼

寒熱者加柴胡蘇葉若風邪欬嗽不止而兼肺胃之火者

加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生薑止宜一片

凡寒邪欬嗽痰不利者加當歸二三錢老年者尤宜若氣

血不足者當以金水六君煎與此參用凡時行初感痰勝

而氣不順者加藿香一錢五分兼脹滿者加厚朴一錢暫開

成方切用六安煎七除痰門

痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒及氣平無

痰者皆不可用此

去杏仁白芥子加炒乾薑一二錢砂仁四分名和胃二陳煎

治胃寒生痰惡心嘔吐滿悶噯氣去杏仁白芥子加豬苓澤

瀉茯苓一錢五分白朮一二錢乾薑炒黃二錢名苓朮二陳

煎治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證如肝腎兼寒者再

加肉桂一二錢去杏仁加乾薑豬苓為末湯浸蒸餅為丸綠

豆大白滾湯下名括痰丸治一切停痰積飲吞酸嘔酸脹悶

如胸脇疼痛者加天台烏藥

礞石滾痰丸王隱君

治實痰老痰怪證百病風木太過制脾土氣不運化積滯

之處謂之老痰變生諸證不可測識

青礞石一兩沉香五錢大黃酒蒸黃芩八兩將礞石打碎用焰硝一

兩同入瓦罐鹽泥固濟曬乾火煅石色如金為度礞石煅過

不堪用陳久者佳新研末和諸藥水丸量人虛實服之薑湯

送下服後仰臥令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜飲水

行動

礞石剽悍之性能攻陳積伏匿之痰吐痰水上以礞石摻之

藥大黃蕩熱去實以開下行之路黃芩瀉肺涼心以平上僭

之火沉香升降諸氣上至天而下至泉以導諸藥為使也然

成方切用

礞石滾痰丸

除痰門

乃峻劑非體質者不可輕投王隱君曰痰證古今未詳方書

為病之源或頭風作眩目運耳鳴或口眼喎斜動搖不寧耳輪痛

癢或四肢游風腫硬似疹非疹或為齒齦齦痛牙齦浮而痛

癢或喉氣吞酸心下嘈雜或胸膈或咽嗝不利咯之不出

痰之不下其痰如墨有如破絮挑膠肉之狀或心下如停

水鐵心氣冷痛或夢寐驚悸或足腕痠軟腰膝骨節痛

痛或四肢筋骨疼痛難治以名狀並無常處以致手臂麻痺

若風溼或脊上一條如錢之寒起者或渾身習習如臥草刺

者或眼黏滯癢口糜舌爛喉痺等證或繞項結核狀若瘰癧

或胃腹間如有二氣交紐噎息煩悶有如煙火上衝頭面烘

熱或為失志癲癩或中風癱瘓或勞瘵在背之疾或風毒脚

氣或心下怔忡或畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑汁

其為肺癰腸毒便膿膿破內外為病百端皆痰所致其狀不

加元明粉一兩硃砂為衣治同減大黃黃芩各六兩加橘紅

半夏各三兩甘草三兩竹瀝薑汁為丸名竹瀝痰丸治同

力稍和緩

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮一錢貝母二錢膽星一錢海石一錢木通二錢白芥子五

分如火盛痰不降者加童便一小鍾如渴甚者加天花

粉二錢如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石膏二

三錢如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢如痰

火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一二錢

酌宜用

成方切用

清膈煎

茯苓丸

九

除痰門

茯苓丸指迷方

治痰停中脘兩臂疼痛脾主四肢脾滯而氣不下故

半夏二兩茯苓一兩枳殼五錢風化硝二錢半如一時未易

中少時盛水置當風處即薑汁糊丸薑湯下

乾如芒硝刮取亦可用薑汁糊丸薑湯下

半夏燥溼茯苓滲水枳殼行氣化滯輕堅去堅生薑制半夏

之毒而除痰使痰行氣通臂痛自止矣嘉言曰痰藥雖多此

四散令人肩背痠痛兩手罷輒誤以為風則非其治宜導痰

湯加木香薑黃各五錢輕者指迷茯苓丸重者控涎丹若血

虛不能榮筋而致臂痛宜

蠲痺門物湯各半和服

控涎丹一名妙應丸

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛走易不定或手足

冷瘧氣脈不通此乃痰涎在胸膈上下 認癰瘰非也

甘遂去心大戟皮白芥子 等分爲末糊丸臨臥薑湯服五七

丸至十九痰猛加丸數腳氣加檳榔木瓜松枝卷柏驚痰加  
硃砂全蠍驚氣成塊加穿山甲鼈甲延胡索蓬朮熱痰加盆  
硝寒痰加胡椒丁香薑杜

李時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心則迷成癰癩  
入肺則塞竅爲喘欬背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經  
絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引釣痛入皮肉則癰癤腫陳  
無擇三因方竝以控涎丹主之殊有奇功此乃治痰之本痰  
之本水也淫也得氣與火則結爲痰大戟能泄臟腑水淫甘

成方切用

控涎丹

辰砂散

十

卷十八

遂能行經隧水淫直達水氣所結之處以攻決爲用白芥子能散皮裏膜外  
痰氣唯善用者能收奇功也虛弱人慎用○丹溪曰胃氣虛而愈

辰砂散 靈苑

治風痰諸癰癩狂心疾諸癰因驚恐火盛于心跳驚心

醒身熱脈浮在表者陽癰屬六腑易治身冷脈沉在裏者  
陰癰屬五臟難治其實痰火與驚而己癰狂亦由於此

辰砂光明者一兩乳香光瑩者一兩棗仁五錢溫酒調下恣飲沉醉聽  
睡一二日勿動若驚寤不可復治辰砂鎮心瀉心火乳香入

心散瘀血棗仁補肝膽而寧心

知人參一兩蜜丸彈丸大各服一丸每服一丸薄荷湯下

治同

三子養親湯 韓志

治老人氣實痰盛喘滿懶食痰不自動因火而動氣有餘便

食

紫蘇子沉水白芥子 萊菔子 各微炒研煎服或等分或

看病所主爲君

白芥子除痰紫蘇子降氣萊菔子消食然皆行氣豁痰之藥

氣行則火降而痰消矣吳鶴皋曰治痰先理氣此治標爾經

也李時珍曰治病先攻其甚若氣實而喘則氣反爲木  
痰反爲標矣是在智者神而明之若氣虛者非所宜矣

常山飲 局方

成方切用

三子養親湯 常山飲

土

卷十八

瘧久不已者用此截之瘧初起不宜截截則邪氣未盡變生他證發久則可截之

常山燒酒炒二錢草果煨二錢檳榔 知母 貝母一錢烏梅二錢薑三

片棗二枚半酒半水煎露一宿日未出時面東空心溫服渣

用酒浸煎待瘧將發時先服一方有良薑甘草無檳榔一方

加穿山甲甘草

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下氣破

積能消食行痰陰陽不和則瘧作陽勝則熱陰勝則寒知母滋陰能治

陽明獨勝之火草果辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散

結瀉熱除痰烏梅酸斂滯收生津退熱斂除故退熱合爲截瘧之

劑也趙以德曰嘗究本草知母草果常山烏梅檳榔穿山甲

皆云治瘧集以成方者爲知母性寒入足陽明治獨勝

之熱便退就太陰草果溫燥治足太陰獨勝之寒使退就陽  
明二經和則無陰陽交錯之變是為君藥常山主寒熱瘧吐  
胸中痰結是為臣藥烏梅湧痰瘧除痰瘧破滯氣是為佐  
藥穿山甲穴山而居遇水而入則是有陰陽貫穿經絡於  
營分以破暑結之邪為使藥也惟脾胃有鬱痰者用之收斂  
李士材曰常山生用多則吐與日草同用必吐若酒浸  
炒透但用錢許每見奇功未見其或吐也世人泥於老人久  
病忌服之說便良藥見疑沉痾難起抑何愚耶李時珍曰常  
山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之得  
宜得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥  
竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草  
果檳榔則入脾蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而  
已

截瘧七寶飲 易簡

治實瘧久發不止寸口脈弦滑浮大者 脈弦為肝風滑為痰浮為在表大為陽若  
脈沉細微 不問鬼瘧食瘧並皆治之

成方切用

截瘧七寶飲

主 除痰門 卷十八

常山 酒炒 草果 煨 檳榔 青皮 厚朴 陳皮 甘草 等分

用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿於當發之早而東溫  
服經已工不治其已發為其氣逆也○凡瘧將來可服藥阻其來將去可服藥追其去若勢正盛服藥與之混戰徒自苦爾但瘧之來大則速藥不損及五

常山能吐老痰積飲檳榔能下食積痰結草果能消太陰膏  
梁之痰陳皮利氣厚朴平胃青皮伐肝 肝為皆為溫散行痰

之品加甘草入胃佐常山以吐瘧痰也 王機微義曰此方乃

脾寒治也用之亦效者瘧病人陰陽相并脾氣鬱結濁液凝滯閉塞中脘因得燥熱以暫解其氣通而痰止若中氣虛弱內有鬱火之人復用燥熱愈燥愈熱將誰救楊仁齋曰瘧有水有血惟水飲所以作寒熱瘧血所以增寒熱瘧山能逐水故也若是血證當加桃仁五靈脂為佐入生薑蜜同煎苟無行血之品何以收十全之功耶保命集云瘧食發

者乃邪氣深遠而入血分為陰經有邪宜  
加桃仁於桂麻湯中發散血中之風寒  
瘧瘧湯 嚴氏

治中風痰迷心竅舌強不能言 心在竅為舌心別脈繫舌根脾脈連舌本散舌下腎脈痰

若三本二脈虛則痰涎乘虛閉其脈道故舌不能轉連言語也經絡舌強不能言其證為重若輕熱上攻舌腫不能轉者其證為輕

半夏 製 膽星 二錢 橘紅 枳實 茯苓 二錢 人參 黃蒲 竹

心脾不足風邪乘之而痰與火寒其經絡故舌本強而難語  
也人參茯苓甘草補心益脾而瀉火陳皮南星半夏利氣燥

成方切用

瘧瘧湯 星香散

主 除痰門 卷十八

痰火降則經通而舌柔矣 嘉言曰此證最急此藥最緩有調下牛黃丸審其屬虛用此湯調下二丹丸庶足開痰通

二丹丸見秋風門○有風中心脾者有痰塞心竅者有風塞人暴不能言者宜十全大補湯加葛蒲蒲遠志

星香散  
治中風痰盛體肥不渴者  
膽星 八錢 木香 二錢 為末服或加全蠍

南星燥痰之品製以牛膽以殺其毒且膽有益肝膽之功  
之經屬 佐以木香取其行氣以利痰也 木香能疏肝肥而不

渴宜燥可知加全蠍者以散肝風也 中風體虛有痰者宜六君子或四君子湯調下

牛黃丸

治風癇迷悶涎潮抽搐風癇或感風寒暑濕或飲食不節逆成或數日一發或一日數發發則眩仆倒地昏不知人癱瘓抽搐口目喎斜或隨風氣作六畜之聲

膽星 全蠍去足 蟬蛻五分 牛黃 白附子 礞石洗 防風

天麻半錢 麝香分五 煮棗肉和水銀五分細研入藥末為丸

荆芥薑湯下

牛黃清心解熱開竅利痰天麻防風南星全蠍辛散之味殭

蠶蟬蛻清化之品白附頭面之藥去頭面 皆能搜肝風而散

痰結麝香通竅水銀劫痰引以薑芥者亦以逐風而行痰也

按牛黃丸之方頗多互有異同然大要在於搜風化痰寧心

通竅多用冰麝牛雄金珠犀珀若中臟者宜之如中腑中血

成方切用 牛黃 貝母 清肺飲 杏 卷十八

脈者反能引風入骨此方藥味頗簡故姑錄之以舉其餘也

貝母丸 消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母兩 為末用砂糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天然黃各一

錢五分尤妙如無百藥煎即醋炒文蛤一錢亦可或栗殼亦

可酌用若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前法最妙

清肺飲 治痰淫氣逆而欬嗽受火傷則氣逆而為欬喉有停滯

要皆歸於肺以肺為五臟之蓋下通膀胱外達皮毛為氣之

主而出聲也大法新嗽脈浮為表邪宜發散脈實為內熱宜

清利脈濡散為肺虛宜溫肺久嗽曾經解利以致肺胃俱虛

也口五臟六腑俱令入氣非獨肺也素問曰肺之合也皮何

先受邪氣邪氣以從其合也五臟各以其時受病非其時各

傳以與之有自外得者肺上皮毛風寒暑溼之邪自皮毛入

內傳臟腑而為嗽也有自內發者七情饑飽內有所傷則邪

氣上逆肺為氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而為嗽也

然風寒暑溼有為嗽者蓋所感者重不謂於皮毛經傷臟

腑而成傷寒溫熱諸病七情亦有為嗽者蓋病尚淺只在

本臟未傳入肺所以傷寒以有嗽為輕而七情饑飽之嗽必

發也

杏仁去皮 貝母 茯苓 桔梗 甘草 五味子 橘紅分五

加薑煎火嗽加青黛枯蘘海石食積痰加香附山查枳實

溼痰除貝母加半夏南星燥痰加枯蘘知母天冬午煎嗽屬

胃火宜清胃加石膏黃連午後嗽屬陰虛宜滋陰降火加芍

成方切用 清肺飲 清氣化痰丸 杏 卷十八

歸芍地知槩二冬竹瀝薑汁傳送黃昏嗽為火浮於肺不可

用涼藥宜五倍五味訶子斂而降之勞嗽見血多是肺受熱

邪宜加歸芍阿膠天冬知母款冬紫苑之類久嗽肺虛加參

耆如肺熱用沙參

此治嗽之通劑也杏仁解肌散寒降氣潤燥貝母清火散結

潤肺化痰五味斂肺而寧嗽茯苓除溼而理脾橘紅行氣甘

草和中桔梗清肺利膈載藥上浮而又能開壅發表也

清氣化痰丸

治熱痰 氣有餘則為火痰有餘則為痰痰隨火而升

半夏 膽星 兩 橘紅 枳實 炒 杏仁 尖 桔蘘仁 油 黃芩 炒



茯苓一 薑汁糊丸淡薑湯下

此治痰火之通劑也半夏南星以燥溼氣黃芩栝蒌以平熱氣陳皮以順裏氣杏仁以降逆氣枳實以破積氣茯苓以行水氣水溼火熱皆生痰之本也氣之亢而為火猶民之反而為盜盜平則還為良民而復其業矣火退則還為正氣而安其位矣故化痰必以清氣為先也

蘇子降氣湯 局方

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便不利肺為氣主火升冠肺故氣高痰湧或喘或嗽其則皆便用通利而愈不通故暫通復礙因而下血

成方切用

蘇子降氣湯 定喘湯

除痰門 卷十八

蘇子 半夏 前胡 厚朴 炒橘紅 當歸 甘草 肉桂

五 加薑煎一方無桂有沉香

蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上之氣兼能除痰氣行

則痰行也數藥亦能發表既以疏內壅又以散外寒也

多扶 外感當歸潤以和血甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂

引火歸元也 玉機微義曰其散鬱和中之劑準氣口鼻出

順其氣氣降則血降血降則痰降痰降則氣降氣降則痰降

意來而成皆偶用治標之劑未可以為定制也

定喘湯

治肺虛感寒氣逆膈熱而作哮喘 膈有膠固之痰外有非時之感則令人哮喘由寒束

於表陽氣併於膈中不得泄越故膈熱氣逆喘粗為哮喘外感之有餘也

白果 三十枚 炒 麻黃 湯 欬 冬 花 三 桑 白 皮 炙 蘇 子 二 杏 仁 去

黃芩 錢 半 甘草 錢 半 夏 錢 一 加薑煎

表寒宜散麻黃杏仁桑皮甘草辛甘發散瀉肺而解表裏熱宜清欬冬溫潤白果收瀉定喘而清金蘇子降肺氣黃芩清肺熱半夏燥溼痰以其成散寒疏壅之功也

七氣湯 三因方亦名四七湯

治七情氣鬱痰涎結聚略不出嚥不下胸滿喘急或欬或喘或攻衝作痛 七情者喜怒憂思悲恐驚也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘欬等

成方切用

七氣湯 四七湯

除痰門 卷十八

半夏 薑汁炒 厚朴 薑汁炒 茯苓 錢 四 紫蘇 錢 二 加薑煎

氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰為先半夏辛溫除痰

鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓

甘淡滲溼益脾通心交腎痰去氣行則結散鬱解而諸證平矣

加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯 因治七情鬱結陰陽反

戾吐利交作寒熱眩運痞滿噎塞

四七湯 局方亦名七氣湯

治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨脹喘急

針經云胃絡不和喘出於陽明之上

逆真元耗散喘出於腎氣之上奔



人參 官桂 半夏 甘草 加薑煎心腹痛加延胡索

能行血中氣  
滯氣中血滯

李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠丸主之而此

獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖膨而

不用木香枳殼用人參以壯主氣之臟肺官桂以制謀慮之

官肝者將軍之官謀慮出焉桂能平肝鬱久生痰半夏為之驅逐鬱故不和國

老為之調停況桂性辛溫疏氣甚捷鬱結者還為和暢矣湯

名四七者以四味治七情也王儀微義曰經云寒則氣收宜  
辛散之甘緩之此治氣虛寒鬱

也藥

白金丸

成方切用

白金丸 百花膏

除痰門  
卷十八

治癲狂失心癲多喜笑尚知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫  
能制證屬有餘此病多因驚憂痰血寒於心  
所致難經云諸陽  
為狂諸陰為癲

白礬三兩 鬱金七兩

薄荷糊丸

白礬酸礬能輒頑痰鬱金苦辛能去惡血痰血去則心竅開

而疾已矣

百花膏

治喘嗽不已或痰中有血虛人尤宜

百合 款冬花 等分蜜丸龍眼大臨臥薑湯下或噙化加

紫苑百部烏梅名加味百花膏

款冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣最為理

嗽要藥

成方切用

百花膏

除痰門  
卷十八

成方切用卷十九目錄

殺蟲門 正方二十

烏梅丸

溫臟丸

集効丸

蠟蟲丸

使君子丸

獼肝丸

掃蟲煎

化蟲丸

成方切用

消渴殺蟲方

雄積丸

目錄

殺蟲門  
卷十九

成方切用卷十九

殺蟲門

風字從虫蟲風化也淫熱極久則生蟲腐草為榮陳麥為  
蠶之類果實外殼完整蟲生於內人之腸胃無物不受豈  
得無蟲三尸丸通理或有之其猖狂於腸胃為痛為嘔為  
噎為嗜種種煩苦須使醫藥自來殺蟲之方每多險峻令  
人腸胃脆薄須兼養胃益血理中乃安不刻蟲乃人身之  
常有者偶為食傷或吐或瀉用和中自安不致伐味者  
不知妄用雷太使君之類  
反致傷氣血而疾作矣

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰證厥吐蚘為寒厥厥者死證厥者脈微而蚘  
蚘厥者蚘上入膈則煩須臾復止得食則嘔而又煩蚘聞  
食臭復出也此為腸寒當自吐蚘與烏梅丸溫臟安蚘亦  
治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出亦主久痢

成方切用

烏梅丸

殺蟲門  
卷十九

烏梅

三百枝

細辛

桂枝

人參

附子

炮

黃蘗

六兩

黃連

一斤

蜜丸

蜜丸

薑

兩

川椒

當歸

兩

苦酒

也

浸烏梅

一宿

去核

蒸熟和藥

蚘得酸則伏故以烏梅之酸伏之蚘得苦則安故以連蘗之

苦安之蚘因寒而動故以桂附薑椒溫其中臟而以細辛當

歸潤其肝腎人參用以助脾脾中蚘為胃寒之故則成蚘厥宜

分吞烏梅丸程郊倩曰烏梅丸於辛酸入肝藥中微加苦寒

納上逆之陽邪而預之使下也雖曰安蚘實是安胃故謂之

久見陰陽不相順接而下利之證皆可以此方治之

經曰凡陰陽不相順接便為厥方時行曰經云手足之

厥走手足之三陽從手足是之陽從頭走足是之陰  
從足走腹是三陰三陽俱相接於手足者也陽氣內陷不與  
陰氣相順接  
故手足逆冷

溫臟丸

治諸蟲積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健脾胃以杜其源

人參隨宜 川椒去閉口者 白芍炒 茯苓 細樞肉 使君子  
肉 檳榔二兩 白朮炒 當歸四兩 炮薑 吳茱萸湯泡一兩 為  
木神麴糊丸桐子大每服五七十丸或百丸饑時白湯下  
如臟寒甚者加製附子一二兩

集効丸

治蟲嚙腹痛作止有時或耕起往來腹痛有作止者蟲嚙則來者蟲不安其位也

成方切用

溫臟丸 集効丸 蠱毒丸

二 殺蟲門 卷十九

大黃炒兩 鶴虱炒 檳榔 訶子皮 蕪荑炒 木香 乾薑炒

附子七錢 蜜丸食前烏梅湯下婦人醋湯下

蟲喜溫惡酸而畏苦故用薑附之熱以溫之烏梅訶皮之酸以伏之大黃檳榔蕪荑鶴虱之苦以殺之木香辛溫以順其氣也

蠱蟲丸

治諸蟲積脹痛黃瘦等病

蕪荑 雷丸 桃仁 乾茶炒煙 雄黃微 錫灰 阜角炒煙

檳榔 使君子等 輕粉減 細樞肉加倍 如蟲積堅固者加巴

豆霜與輕粉同湯浸蒸餅丸綠豆大每服五七分滾白湯下

陸續服之

使君子丸

治蠱脹腹痛及食勞發黃喜食茶米炭土等物飲食停滯諸蟲至脹滿喘病或發黃身腫喜食生米茶葉土炭者蟲之所嗜也

使君子去殼 南星製 檳榔兩 右藥合炒如喜食生米用麥

芽一筋炒喜食茶葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥為

末蜜丸每晨砂糖水下誘之以甘與炒以所嗜諸物同意

獼肝丸

肘後

治鬼疰傳尸勞瘵此五疰之一其證使人寒熱沉沉然不知所苦而無處不惡死後傳人乃至滅門

成方切用

獼肝一具須從獼身取下不留多偽 陰乾為末滾水服二錢日三

三 殺蟲門 卷十九

吳鶴舉曰獼肝治鬼疰此何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝為厥陰藏魂之臟也按物之惡人僻處晝伏夜出者狐鼠皆然不獨有退葉獨異於他獸此其所以能治鬼疰也與

掃蟲煎

治諸蟲上攻胸腹作痛

青皮 小茴香炒 吳茱萸錢 檳榔 烏藥錢 細樞肉三錢

烏梅二兩 甘草八分 硃砂 雄黃五分 細末 將前八味用水一

鍾半煎八分去渣隨入後二味末再煎三四沸攪勻徐徐服

之 如惡心作吐加炒乾薑一二錢或先啖牛肉脯少許俟

一茶頃頓服之更妙

化蟲丸

治腸胃諸蟲為患腸胃之中無物不容所以變生諸蟲者緣正氣虛衰或誤食生蟲之物或淫熱蒸鬱而成猶物必先腐而後蟲生之義也

鶴虱

胡粉

炒

苦楝根

東引未

出土者

檳榔

蕪荑

使君子

錢五

分

為末亦可麪糊作丸

量人

大小服之一

錢兒可五

錢

錢

錢

錢

錢

消渴殺蟲方

夷堅志

治消渴有蟲

苦楝根

取新白皮一握切焙入麝香少許煎空心服雖困

成方切用

化蟲丸

消渴殺蟲方

雄檳丸

四

殺蟲門

卷十九

頓不妨取下蟲三四條類虻而色紅其渴乃止

消渴一證有蟲耗其津液而成者蓋飲醇食炙積成胃熱溼

熱生蟲理固有之臨病宜諦審也

雄檳丸

治腹痛胃痛乾痛有時

乾痛者不吐不瀉而但痛也

有時者

淡食而饑則痛厚味而飽則否此為

蟲也

也

雄黃

檳榔

白礬

等分飯丸每服五分

雄黃之辛毒檳榔之苦降白礬之酸瀉皆殺蟲之品也故合

用以治之

吳鶴早曰古方殺蟲如雷丸貫衆乾漆蠅屋百部

鉛灰之類皆其所常用者也

有加附子乾薑者壯

正氣也加苦參黃連者蠱得苦而伏也

加烏梅河子者蠱得酸而輟也

加藜蘆瓜蒂者欲其帶蟲吐出也

加芫花黑豆者

欲其帶蟲瀉下也用雄黃川椒蛇牀樟腦水銀檳榔者治瘡

疥之蟲也用胡桐源黃若子韭子蟾酥者治蝨齒之蟲也用

川樟皮海桐皮者治風癰之蟲也用青柏子覆盆葉者治九

竅蠱蝕之蟲也用敗鼓心桃符板虎骨死人枕賴爪鵝骨

者驅勞瘵之蟲也

成方切用

雄檳丸

五

殺蟲門

卷十九

成方切用卷二十目錄

經帶門 正方二十一 附方七

溫經湯

膠艾湯 方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

成方切用 目錄

四物加芩朮湯

四物加芩連湯

熱六合湯

寒六合湯

氣六合湯

風六合湯

正氣天香散

調經飲

毓麟珠

啟宮丸

抑氣散

五物煎

牡丹皮散

芎歸六君子湯

逍遙飲

如聖散

人參荊芥散

固下丸

白芷散

當歸煎丸

婦寶丹 見理血門

成方切用 目錄

二 經帶門

成方切用卷二十

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異者則唯經帶胎產之屬不得不另詳方論此外雖證但與男子相同者自有各門方治故不以男女之分而資於此○

溫經湯 金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及

至期不來 發熱少腹與急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也曰

此病屬帶下何以故會經中產瘀血在少腹不去何以知之歷年血寒積結胞門而甚焉者也故就婦人年五十其天癸已絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血起見矣然而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱病屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而

成方切用

溫經湯

經帶門

腹滿是雖脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心火主血血鬱則煩熱也唇口必得脾家營氣而津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則為胸中熱胸無熱而但陰分有鬱火故不渴而乾燥也然皆非相因的對之證故疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其曾經半產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亡陰者有之腹滿脾虛者有之手掌煩熱陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之病不應見此然而有是證又合之少腹裏急手掌煩熱明是血瘀而火鬱故知以藥用溫經湯者因半產之虛而積冷氣結血乃瘀而不去故以歸芍芎調血吳茱萸桂枝以溫其血分之氣而行其瘀肺為氣主麥冬阿膠以補其本上以統血參甘以補其虛丹皮以去標熱然下利已久脾氣有傷故以薑半正脾氣名曰溫經湯治其本也唯溫經故凡血分虛寒而不調者皆主之

吳茱萸 當歸 芎藭 芍藥 人參 桂枝 阿膠 丹

皮 生薑 甘草 麥冬 半夏 右十二味以水一

斗煮取三升分溫三服

膠艾湯 金匱

治婦人陷經漏下黑不解或損傷衝任月水過多淋瀝不斷方見胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期今日

漏下是無期也所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經

陷者有降無升久則為黑色故以膠艾湯主之四物通調肝

血加甘膠峻補之病本於寒故以艾溫而行之也 丹溪謂婦

為有水紫為熱黑為熱極故兼水化假令其人素從熱病來者容有之然而仲景之言道其常也

栝子仁丸 良方

成方切用

膠艾湯 栝子仁丸 升陽舉經湯

經帶門

治經行復止血少神衰 女子善懷每多憂思憂多則傷心心

所藏而衝任之脈枯故經閉不行也○經曰月事不來者胞

脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上逼肺心氣不得下

降故月事不來

栝子仁 油牛膝 酒浸 卷栝 五錢 澤蘭 續斷 二兩 熟地黃 一兩 蜜丸

米飲下

栝子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任卷栝

澤蘭活血脈而通經閉

升陽舉經湯 東垣

治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶食 此由勞傷所致

補中益氣湯 見治 氣門 加白芍黑山梔薑棗煎

補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以斂陰黑梔以清熱

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當歸白朮錢各三羌活防

風藁本錢各二獨活附子炮甘草錢各半人參熟地川芎錢各一細

辛六分桃仁十箇紅花肉桂芍藥各五分每服三錢漸加五錢

治經水不止原文曰如右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒

證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先亡也

當溫之舉之升之燥之當大升浮氣血切補命門之下脫也

固經丸良方

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊衝任為經脈之海若無

調適矣若勞動過度損傷臟腑衝任之氣虛不能約制經血

故經多暴下或由陰虛陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則

妄行也脈數疾小為順大者為逆紫黑成塊者熱甚而反兼

水化非寒也玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非

成方切用固經丸 通瘀煎 三 經帶門 卷二十一

龜板炙四兩芍藥酒炒黃蘗酒炒黃芩二兩香附童便炒樗皮兩酒

經多不止者陰氣不足以制胞絡之火故越其常度也崩中

漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火極似水也黃芩清上焦

之火黃蘗瀉下焦之火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制

陽光也香附辛以散鬱樗皮瀉以止脫

通瘀煎

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後瘀血實痛并

男婦血逆血結等證

歸尾三五錢山查 香附 紅花新者炒木香七錢烏藥一二錢青

皮 澤瀉一錢水煎加酒一二小鍾 兼寒滯者加肉桂

一錢或吳茱萸五分 火盛內熱血燥不行者加炒梔子一

二錢 微熱血虛者加芍藥二錢 血虛滯滯加牛膝 血

瘀不行者加桃仁二十粒去皮或加蘇木延胡之類 瘀極

而大便結燥者加大黃一二三錢或朴硝蓬朮亦可

連附四物湯丹溪

治經水過期紫黑成塊紫血熱也黑熱甚也過期而成塊氣

或挾痰停水以混之也如煙塵豆

汁屋漏水混濁稠者淫痰也

四物湯理血加香附黃連四物以益陰養血加黃連

成方切用連附四物湯 調經飲 四 經帶門 卷二十一

四物加芩朮湯亦名溫治經水過多黃芩抑陽白朮四物加

芩連湯治經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁如豆汁

溼也芩連苦燥 四物加梔連為熱六合湯加薑附名寒六合

湯加陳朴名氣六合湯加羌朮為風六合湯皆經產通用之

藥也

調經飲

治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸錢三五牛膝 山查錢二香附 青皮 茯苓一錢如因

不忌生冷而寒滯於內加肉桂吳茱萸之類 如脹悶者加

厚朴一錢或砂仁亦可 氣滯者加烏藥一錢或痛在小腹

者加小茴香一錢五分

正氣天香散 紺珠

治一切諸氣氣上湊心心胸攻築脇肋刺痛月水不調 婦人憂鬱致氣病為多氣為血帥氣滯則血亦不能行故月候不調

香附 錢八 烏藥 錢二 陳皮 錢一 蘇葉 錢一 乾薑 錢五 每五六錢煎

烏藥陳皮專入氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛壅之患矣

毓麟珠

治婦人血氣俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠

成方切用

正氣天香散 毓麟珠

五 經帶門 卷二十

或飲食不甘瘦弱不孕服一二劑即可受胎凡種子諸方無以加此

甘草 川芎 兩一熟地 菟絲子 製當歸 杜仲 酒炒 人參 白

朮 土炒 茯苓 芍藥 酒炒 鹿角霜 川椒 兩二 為末蜜丸彈子大

空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或為小丸吞服亦可

如經遲腹痛宜加破故紙 酒炒 肉桂各一兩甚者再加吳茱萸

五錢或加龍骨一兩 醋炒 如子宮寒甚或泄或痛加製附子

或炮薑 隨宜 有鬱怒氣不順而為脹為滯者宜加香附 酒炒 二

兩或甚者再加沉香五錢 血熱多火經蚤內熱者加川斷

地骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此或以湯引

送下亦可 男子製服宜加枸杞胡桃肉鹿角膠山藥山茶

黃巴戟肉各二兩

啟宮丸

治子宮脂滿不能孕育 婦人肥盛不孕往往因此

芎藭 白朮 半夏 麴 香附 兩一 茯苓 神麴 錢五 橘紅 甘

草 錢二 粥丸

橘半白朮燥溼以除其痰 肥而不孕多由痰盛故以二陳為君而加氣血藥也 香附神

麴理氣以消其滯川芎散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣

茯苓甘草用以去溼和中也

抑氣散 嚴氏

成方切用

啟宮丸 抑氣散 五物煎

六 經帶門 卷二十

治婦人氣盛於血變生諸證頭運膈滿 凡人氣血和平則無諸疾苟血少氣多壅

於胸膈則滿上攻於頭則運

香附 兩四 陳皮 兩二 甘草 炙 茯苓 兩一 每服二錢

經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣茯苓神能安心

氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣 氣盛於血固當抑氣若過

用行氣之藥則真氣耗散陰火愈盛而氣血兩虛矣是方雖

和平祇可暫用須用滋血之藥使陰血充足則陽火自平乃

正治之法蓋補其不足即所以制其有餘也

五物煎

治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹急痛產難經滯等證此即

四物湯加肉桂也



當歸<sup>三五錢</sup>熟地<sup>三四錢</sup>白芍<sup>二錢</sup>川芎<sup>一錢</sup>肉桂<sup>一二錢</sup>如兼胃

寒或嘔惡者加乾薑 水道不利者加澤瀉或茯苓 氣滯

者加香附或丁香木香砂仁烏藥 陰虛痼痛者加小茴香

血瘀不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒紅花

牡丹皮散<sup>良方</sup>

治血痕<sup>瘀血凝聚而成伏於隱僻之處盤結膠固須破血活血之品治之</sup>

丹皮 桂心 歸尾 延胡索<sup>三分</sup>牛膝 赤芍藥 莪朮<sup>六分</sup>

三稜<sup>四分</sup>水酒各半煎

丹皮桂心赤芍牛膝以行其血三稜莪朮歸尾延胡以行其

血中氣滯氣中血滯氣血週流則結者散矣

成方切用<sup>牡丹皮散 芎歸六君子湯 逍遙飲 七 經帶門 卷二十一</sup>

芎歸六君子湯

治經水後期其來濇少形體肥盛<sup>體肥而經水後期濇少者氣虛而痰滯於經絡也</sup>

當歸 川芎 人參 白朮 茯苓 甘草 橘紅 半夏

加薑煎

二陳治其痰滯參朮補其氣虛<sup>氣行則痰行</sup>芎歸活其經血

逍遙飲

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經脈不調者

當歸<sup>錢</sup>熟地<sup>錢</sup>棗仁<sup>錢</sup>芍藥 茯苓<sup>錢</sup>甘草<sup>錢</sup>陳

皮<sup>八分</sup>遠志<sup>三五分</sup>如氣虛者加人參一二錢 經水過期兼

痛滯者加酒炒香附一二錢

如聖散

治崩漏不止<sup>凡非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏</sup>

櫻櫚<sup>燒</sup>烏梅<sup>一兩</sup>黑薑<sup>半兩</sup>每服二錢烏梅湯下瀉能止血故

用櫻櫚酸能收斂故用烏梅溫能守中故用乾薑黑能止血故並煨用

人參荊芥散<sup>婦寶</sup>

治血風勞<sup>血風勞者血脈空疎感受風邪寒熱盜汗展轉不已乃成勞也</sup>

人參 白朮 熟地 棗仁<sup>炒</sup>鱉甲<sup>炙</sup>羚羊角 枳殼

柴胡 荊芥<sup>五分</sup>防風 甘草<sup>炙</sup>芎藭 當歸 桂心<sup>三分</sup>加

成方切用<sup>如聖散 人參荊芥散 固下丸 八 經帶門 卷二十一</sup>

薑煎

陳來章曰血中之風荊芥防風散之木盛生風羚羊角柴胡平

之陰虛發熱地黃鱉甲滋之血氣痛滯月水不調芎藭當歸

桂心枳殼調之倦怠食少盜汗心忪人參白朮炙草棗仁補

而收之

固下丸<sup>子和</sup>

治赤白帶下<sup>帶下起於風寒淫熱所傷入於胞中或中經脈下焦奇經之分因帶脈而得故名故曰帶赤者屬血白者屬氣其狀如涕相連而下言帶者亦病形也有淫熱流滯下焦者有肝腎陰淫淫勝者有驚恐而木乘土位濁液下流者或思</sup>

想無窮而為白淫者或係經淫熱屈滯於小腹之下者病本營衛累滯而成也

梲皮兩半白芍五錢良薑三錢黃蘗三錢黑三錢粥丸米飲下

陳來章曰梲皮苦燥淫寒勝熱瀉固下故赤白帶因於淫熱者用之爲君古方有蒼朮梲皮側藥梲皮蒼朮梲皮等芍藥九錢證加香芍歸芍黃芷及星夏等藥

之酸斂陰氣收下瀉爲臣良薑之熱以散寒淫黃蘗之寒以祛熱淫並炒黑以止血收脫爲佐使也

白芷散良方

治赤白帶滑脫不禁良方曰帶下由於風寒淫熱所傷傷肝經者色白如涕傷脾經者黃如爛瓜傷腎經者黑如衃血

白芷一兩海螵蛸二兩胎髮五錢酒調二錢白芷辛溫燥

淫而祛風烏鰂鹹溫收淫而和血髮者血之餘補陰消痰煨

成方切用 白芷散 當歸煎丸 九經帶門 卷二十一

黑又能止血

當歸煎丸嚴氏

治赤白帶下腹中痛不飲食羸瘦此血虛有熱之證法當涼補脈訣云崩中日久爲白帶漏下多時骨髓枯言崩久則血少復亡其陽故白滑之物下漏不止

當歸熟地阿膠炒續斷白芍炒牡蠣煨粉地榆炒黑三錢

醋糊丸米飲下

歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎以治血虛牡蠣地榆清熱收脫以止帶下赤芍酸寒能散惡血去瘀所以生新散之亦以收之也

成方切用卷二十一目錄

胎產門 正方三十七 附方二十一

膠艾湯

又方

又膠艾湯

當歸芍藥散

桂枝茯苓丸

乾薑人參半夏丸

橘皮湯

半夏茯苓湯

釣藤湯

成方切用 目錄

當歸貝母苦參丸

羚羊角散

天仙藤散

紫蘇飲

白朮散

鯉魚湯

竹葉湯

紫苑湯

安榮散

胎元飲

固胎煎	
涼胎飲	
參朮飲	
表實六合湯	風溼六合湯
升麻六合湯	柴胡六合湯
大黃六合湯	人參六合湯
朴實六合湯	鍾子六合湯
石膏六合湯	茯苓六合湯
膠艾四物湯	附子六合湯
成方切用	
四物大黃湯	
當歸散	
達生散	
束胎丸	枳殼散
殿胞煎	
豬蹄湯	
當歸補血湯加慈白方	
參朮膏	
黑神散	
九蜜煎	古黑神散

二 胎產門  
卷二十一

清化飲	
失笑散	
通靈散	
清魂散	
當歸羊肉湯	
當歸生薑羊肉湯	
返魂丹	
免懷湯	
艾附暖宮丸	見理血門
佛手散	見理血門
成方切用	
歸芍湯	見理血門

三 胎產門  
卷二十一

成方切用卷二十一

胎產門

上節論曰調理妊婦在于清熱養血白朮補脾為安胎君藥條實黃芩安胎聖藥清熱故也朱丹溪曰產後當大補氣血雖有雜證從未治之此二說雖若近理而實未可奉為定訓也蓋人之氣未傷自不齊而胎前產後之虛實其然人人各殊是以用藥之難當如盤珠不可膠柱而鼓瑟今女科每執方以藥治諸病其受害不知若干人矣

膠艾湯 金匱

仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊

娠忽下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

血宜以膠艾湯溫補其血而妊婦亦其一但致病有不一無

端漏下者此平日血虛而加客邪半產後續下血不絕此因

成方切用

膠艾湯

當歸芍藥散

胎產門

卷二十一

害也故同以膠艾湯主之養陰補血莫如四物血妄行必挾風而為痰濁膠以驢皮為主能去風以清水煎成能滲濁艾性溫而善行能導血歸經甘草以和之使四物不偏于陰三味之力也而運用之巧實在膠艾

乾地黄

六兩

艾葉

當歸

兩

芍藥

阿膠

芍藥

甘草

水五升清酒三升合煮取二升去渣內膠令消盡溫服一升

日三服不瘥更服一方加乾薑二兩

經漏腰痛腹滿搶心短氣加黃耆千金翼治從高墜下損傷

五臟吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

又方阿膠一觔蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯方治胎動不

安腹腹痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽

當歸芍藥散

金匱

治婦人懷妊腹中疝痛

疝音鳩又音絞急痛也

芍藥

一兩

澤瀉

一兩

茯苓

白朮

當歸

芍藥

六味芍為

散取方寸七酒和日三服

疝痛者正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而

求伸土氣不調則急痛矣故以歸芍養血苓朮扶脾澤瀉瀉

其有餘之舊水芍藥暢其欲遂之血氣不用黃芩疝痛因虛

而稍挾寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自去爾

桂枝茯苓丸

金匱云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動

在臍上者此為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎

成方切用

桂枝茯苓丸

胎產門

卷二十一

動也下血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去故也

當下其癥桂枝茯苓丸主之

徐忠可曰婦人行經時遇冷則

微然癥病女人物有之或不在于子宮則仍行經而受孕經斷

即是孕矣未及三月而得漏下不止者其癥不去故也

下則真欲落矣今在臍上者每月月集之時血氣相滯

而為漏下實非胎病故曰癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時

之曰害至六月胎動此宜動之時矣但較前三月經水利時

胎動下血則已斷血三月不行乃復正不止是前之

漏下新血去而癥反堅牢不去故須下之為安耳

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁 芍藥 等分末之煉蜜

丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

桂枝芍藥一陽一陰茯苓丹皮一氣一血調其寒溫扶其正

氣桃仁以之破惡血消癥瘕而不嫌于傷胎血者所謂有病

則病當之也且病之初必因寒桂能化氣而消本寒癥之成必挾淫熱為窠囊苓滲淫氣丹清血熱芍藥斂肝血而扶脾使能統血則養正即所以去邪耳然消癥方甚多一舉而兩得莫有若此方之巧矣每服甚少而頻更巧要知癥不礙胎其結原微故以漸磨之

乾薑人參半夏丸 金匱

治妊娠嘔吐不止

乾薑 人參 半夏 末之以生薑汁糊為丸如梧子大

每服十丸日三服

諸嘔吐酸皆屬于火此言胃氣不清暫作嘔吐者也若妊娠

成方切用

乾薑人參半夏丸 橘皮湯 半夏茯苓湯

三 胎產門 卷二十一

嘔吐不止則因寒而吐上出為嘔不止則虛矣故以半夏治嘔人參補虛而以生薑汁協半夏以下其所逆之飲

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食 惡阻以間食而嘔貴之則虛嘔吐以食火也乃厥陰之血既養其胎少陽之火虛而上逆也

橘皮 竹筴 人參 白朮 生薑 厚朴

竹筴能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人參白

朮所以益脾開胃益脾欲其安穀云爾

半夏茯苓湯

治孕娠惡阻 惡阻者惡心而妨阻飲食也此是下部氣血不足復益脾胃之氣以固養胎元故脾胃自弱故

一聞穀氣便惡心而妨阻也

半夏 生薑 乾地黃 旋覆花 白芍藥 人參

芎藭 細辛 橘皮 甘草 桔梗

半夏生薑能開胃而醒脾地黃芎藭能養陰而益血人參甘

草能和中而益氣橘皮桔梗旋覆細辛皆辛甘調氣之品可

以平惡逆之氣而進飲食者也 半夏為妊娠所忌以其燥陰者故餘與人養胎之品用半夏者蓋五方焉

用半夏者蓋五方焉

釣藤湯 良方

治癰癥胎動不安 癰癥手足抽掣也熱為陽風主動肝風相火為病也

釣藤鈎 當歸 茯神 人參 桔梗 桑寄生 風熱

成方切用

釣藤湯 當歸貝母苦參丸

四 胎產門 卷二十一

加黃芩梔子柴胡白朮風痰加半夏南星竹瀝風勝加全蠍

釣藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩梔

子之苦寒以平少陽厥陰之風熱風熱去則癰癥止矣人參

茯神以益氣而寧神當歸寄生以養血而安胎也

當歸貝母苦參丸 金匱

治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參 等分煉蜜丸如小豆大每服三丸加

至十丸

從來小便難傷寒熱邪傳裏則有之必先見表證或化源鬱

熱者有之上必見渴中氣不化者有之飲食必不調中氣下陷者有之必先見脾胃證下焦鬱熱有之必不渴而飲食如故今妊娠飲食如故而小便難必因便溺時得風冷鬱於下焦而為熱致耗膀胱之水故以苦參能入陰治大風開結氣除伏熱為君當歸辛溫能入陰利氣善治衝帶之病為臣其證雖不由肺然膀胱者氣化之門下竅難則上必不利故以貝母開肺氣之鬱為佐全不用利水藥病不因水鬱也

羚羊角散 本事方

治妊娠中風涎潮忽仆目吊口噤角弓反張名子癇 陰主靜陽主動風陽邪也諸風眩掉皆屬肝木故有搐搦眩冒反張之證

成方切用

羚羊角散 紫蘇飲

五 胎產門卷二十一

羚羊角 錢一 獨活 防風 芍藥 當歸 棗仁 炒 茯神

杏仁 薏仁 五分 木香 甘草 二分 加薑煎一方有五加皮

羚羊角之辛涼以平肝火防風獨活之辛溫以散風邪茯神

酸棗以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草

以調脾也 扶土所以抑木故薏仁亦治筋急拘攣之證

紫蘇飲 嚴氏

治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心腹腰脇痛名子懸 由下焦氣實相火旺盛舉胎而上上逼心胸也

蘇葉 錢一 當歸 七分 芍藥 人參 陳皮 大腹皮 五分 甘草

草 二分 加薑煎空心服心腹疼痛甚者加木香延胡索

芎歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順血和則胎安矣既利其氣復以參甘養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其沖和之氣也

天仙藤散 陳景初

治子氣 婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶妨食甚則脚指出黃水病名子氣非水也

天仙藤 即青木香藤微炒 香附 炒 烏藥 陳皮 甘草 炙 等分加

紫蘇三葉木瓜生薑各三片空心煎服或為末鹽湯調下日

三服

天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮之辛溫以行鬱氣紫蘇生薑之辛溫以疏表氣甘草之甘緩

成方切用

天仙藤散 白朮散

太 胎產門卷二十一

以和正氣少加木瓜以除溼熱利筋骨調營衛也

白朮散 全生

治子腫面目肢體虛腫如水狀 胎中挾溼水與血搏溼氣流原因煩渴引飲過多或濕瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六箇月多有之

白朮 錢一 薑皮 陳皮 茯苓皮 大腹皮 五分 為末米飲下

指迷方有桑白皮無白朮 此即五皮飲 丹溪除薑皮腹皮加川芎

木通

水病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從毛竅出腹

皮苓皮淡而能泄使水從溺竅出水盛由于土衰故用白朮

之甘溫以扶脾土而隄防之不致汎溢也

鯉魚湯 千金

治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩 茯苓四兩 當歸 白芍三兩 右細剉片以鯉魚一尾修

事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一盞半生薑

七片橘皮少許煎至七分去滓空心服或服鯉魚

按此方用歸芍以養血苓朮以實脾薑橘以和胃止用鯉魚

汁以利水絕不雜用利水之藥走氣傷陰暗損胎元且制小

其服以緩治之深為有見

竹葉湯

治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用

成方切用

鯉魚湯 竹葉湯 紫苑湯 七

能乘肺以致煩躁胎動不安亦有停痰積飲滯於胸膈致令煩躁者

麥冬錢半 茯苓 黃芩錢一 人參錢五 淡竹葉十片 如有痰者加竹

瀝少許

竹葉清煩黃芩消熱麥冬涼肺心火乘肺故 茯苓寧心人參

補虛妊娠心煩固多虛也

紫苑湯 良方

治子嗽 天冬錢一 桔梗五錢 甘草錢一 桑白皮 杏仁三錢 竹節分一

入蜜溫服 子嗽由於火邪當以清火潤肺為務桔梗桑皮之涼以瀉之

天冬竹節之寒以清之紫苑炙草之溫杏仁白蜜之澤以潤之也

安榮散 本事

治子淋心煩悶亂子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱

則亦有因房勞內傷胞門衝任

人參 細辛兩一 當歸 甘草 燈草五錢 木通 滑石 麥冬

錢三 為末每二錢麥冬湯調下

陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘淋悶宜通故用木

通燈草之滲滑石之滑肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎

燥則地氣不升而細辛能潤之經口地氣上為雲天氣下為

成方切用 安榮散 胎元飲 人參胎元門

也 血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也

胎元飲 治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用之或間日

或二三日常服一二劑脾腎兩虧而胎不固者此方最宜蓋

多尤 人參隨宜 當歸 杜仲 芍藥錢二 熟地錢三 白朮錢一 炙甘草錢一

陳皮七分 無滯 如下元不固而多遺濁者加山藥五味子

補骨脂之屬 氣分虛甚者倍白朮加黃耆但者求氣浮能

滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之 倘虛而多寒兼

嘔者加炮薑七八分或一二錢 或虛而兼熱者加黃芩一

錢五分或加生地二錢去杜仲 陰虛小腹作痛加枸杞子

二錢 多怒氣逆者加香附無妨或砂仁亦妙 有所觸而

動血者加川斷阿膠各一二錢 嘔吐不止加震天麴二錢

煨薑二三片

固胎煎

治肝脾多火多滯而墮胎者

黃芩二錢 白朮一錢 當歸一錢 砂仁五分 陳皮一錢 芍藥一錢

涼胎飲

治胎氣內熱不安等證

生地 芍藥 黃芩 當歸 枳殼 石斛 茯苓 黃連 蘇合 香薷 薄荷 滑石 甘草 黃芩 白朮 當歸 砂仁 陳皮 芍藥

成方切用

甘草 七分 如熱甚者加黃芩一二錢

參朮飲

治妊娠轉胞 轉胞者胎逼及胞壓在一邊胞系轉戾臍下急

常歸 熟地黃 芍藥 芍藥 人參 白朮 陳皮 白朮

夏 甘草 加薑煎空心服 此即入珍湯去茯苓加

氣虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳使氣得升舉

而胞自通也 丹溪曰轉胞之病婦之稟受弱者憂悶多者性

因思胞不自轉為胎所壓胎若舉起胞系自疏水道自通矣

近吳宅寵人患此脈似清重則胎下此得之憂患過為血

少氣虛弦為有飲血少則胎弱不能舉氣虛有飲中焦不調

而臨則胎知所避而就下乃以上藥與服隨以指探喉中吐

出藥汁候氣定又與之八貼而安此恐偶中後治數人皆效

○仲景云婦人本肥盛今反羸瘦胞系了戾但利小便則愈

宜服腎氣丸以中有茯苓 又法將孕婦倒豎胎轉而小便

自通矣

表實六合湯

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病

四物湯 每味一兩 麻黃 細辛 錢五

凡婦人傷寒六經治例皆同有懷妊者則以安胎為主藥中

有犯胎者則不可用也海藏皆以四物為君養血安胎餘同

傷寒例分證而治麻黃細辛發汗解表故加用之治表實無

汗者

四物四兩加桂枝地骨皮各七錢名表虛六合湯治妊娠傷

成方切用

寒表虛白汗 地骨皮涼血故 身熱惡寒頭痛項強脈浮而弱

四物四兩加防風蒼朮各七錢名風溼六合湯治妊娠傷寒

中風溼氣肢節煩痛頭痛身熱脈浮四物四兩加升麻連翹

各七錢名升麻六合湯治妊娠傷寒下後過經不愈溼毒發

斑如錦紋者四物四兩加柴胡黃芩各七錢名柴胡六合湯

治妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽經證四物四兩加大黃

五錢桃仁十枚 妙名大黃六合湯治妊娠傷寒大便閉小便

赤氣滿而脈沉數太陽陽明本病也急下之 大黃桃仁

有用之者謂有病病當之也經曰婦人重身毒 所忌然傷寒間

之何如岐伯曰有故無損亦無損也此之謂與 四物四兩加

人參五味各五錢名人參六合湯治妊娠傷寒汗下後欬嗽



不止四物四兩加厚朴枳實各五錢名朴實六合湯治妊

娠傷寒虛痞脹滿陽明本虛者本胃四物四兩加梔子黃芩

各五錢名梔子六合湯治妊傷寒汗下後不得眠四物四

兩加石膏知母各五錢名石膏六合湯治妊傷寒大渴而

煩脈長而大四物四兩加茯苓澤瀉各五錢名茯苓六合湯

治妊傷寒小便不利太陽本病本勝脫四物四兩加阿膠

艾葉各五錢名膠艾四物湯加甘草黃芩乾薑治妊傷寒

汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附子肉桂各五

錢名附子六合湯治妊傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛

脈沉遲者少陰病也杜陽雖辛熱動胎之藥然四物四兩加

成方切用當歸散主胎產門

生地酒浸大黃各五錢名四物大黃湯治妊傷寒畜血證歌

婦人妊傷若畜血抵當桃仁莫妄施要教母子俱無損大黃四物對分之

當歸散金匱

妊娠有宜常服者婦人血少有熱胎動不安及數半產難產

當歸 芎藭 芍藥 黃芩 白朮為末酒調服日二

衝任血盛則能養胎而胎安歸芍藥能養血而益衝任又

懷妊宜清熱涼血血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃

熱白朮補脾燥溼亦除胃熱胎氣係於脾胃虛則脾胃健則

能運化精微取汁為血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣易簡

方加山茱萸治經三四月不行或一月再至數月不行者血

歸芍藥補之以白朮山茱萸一月再至者脾虛有

熱也白朮能補脾黃芩能涼血山茱萸能固經

達生散亦名東胎散丹溪

妊娠八九月服數十劑易生有力詩曰誕彌厥月先生如達

多因氣血虛弱營衛滯達服此則易生如達矣

當歸酒洗芍藥酒炒人參 白朮 紫蘇 甘草 大腹皮

陳皮 蘇五葉黃楊腦子七箇煎黃芩木或加枳殼砂仁

或春加川芎夏加黃芩冬如木方或有別證以意消息

當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣腹皮陳皮紫蘇葱

葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨產自無留難之患矣丹溪

成方切用達生散主胎產門

雖往往見於鬱悶安逸之人富貴奉養之家若貧賤者鮮有

之苦方有瘦胎飲為渴陽公主而作惡非至倒之害子族妹

苦於難產遇胎動而趨去之予甚憫焉視其形肥而動於女

氣則見其氣血久坐不運因母氣虛亦不能自運爾常補母

氣藥與之數十貼得男甚快因以其方隨母之性藥與時令

加減服無不應因名曰達生散云昔湖陽公主難產方士

道瘦胎飲用枳殼四兩甘草二兩炙五月後日服一錢潔古

改以枳朮名東胎丸寇宗奭明其不寒蓋孕婦全賴血氣以

養胎血氣充實胎乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可

服之若一藥濫施誤之甚矣按瘦胎飲又名散胎散治胎肥

難產臨月服之張氏如香附行氣散胎下之見諸產書

草產母用力須待兒下身身力足方安服催生藥多致

不救○生不送催也催之則用力之勞服人者之苗嗣非

唯無益而又害之矣古方有用免腦者有用豬腦者有用油

蜜者有用梓枝者有用葵子者有用牛乳輪皮滑石者有用金

理者有用其效也又有用萬年青者大都取其滑澤之義雖近

時安者有用百草者有用伏龍肝者有用蓬頭灰者有用

鹿麻子貼于足心者有手握石燕者雖曰各有深意但燒灰而服者徒劫燥其津液手握足貼者勿驗爾意平時失於將理至于臨產艱難頻以雜藥催之皆或也○又回生丹方書中大誇其催生之效并產後種種功能然不過破瘀之效爾今世執而用之者為害甚多所以不錄

敗胞煎

治產後兒枕疼痛等證如神

當歸五錢 川芎 炙甘草 茯苓 肉桂一二三錢 水煎服

煎熱服 如脈細而寒或嘔者加炒黃乾薑一二錢 如脈

弱陰虛者加熟地三五錢 如氣滯者加香附一二錢或烏

藥亦可 腰痛加杜仲二三錢 如血熱多火者去肉桂加

酒炒芍藥一二錢張景岳曰丹溪云芍藥性酸大伐發生之

成方切用 敗胞煎 治產後 當歸補血湯加上方 三 胎產門

寒不過于生血藥中稍覺其清兩非若苓連輩之大苦大寒者也使芍藥猶忌則他之更寒者尤為不可用矣余每見產家過慎者或因太暖或因年力方壯而飲食藥餌大補過度以致產後動火者病熱極多若盡以產後為虛必須皆補宜盡熱哉且芍藥性清味酸而收最宜于陰氣散失之證豈不為產後之要藥乎不可不辨也

豬蹄湯 靈苑

治乳少

豬蹄一隻 通草一兩

豬蹄能潤下通草淡能通竅

當歸補血湯加葱白方

治產後無乳 乳者血氣之所成也故氣血充盛之婦未嘗無乳凡見無乳者皆氣弱血虛之婦也○古方中用穿山甲王不留行及漏蘆等物唯氣血有餘而兼壅滯者宜之虛弱者當禁之矣

常歸錢黃耆兩慈白

當歸黃耆大補其氣血此養乳汁之源也慈白辛溫直走陽

明以達于乳房故用之為使此通乳汁之渠也

參朮膏 丹溪

治產後胞損成淋瀝證或遺尿

人參二錢 白朮二錢 黃耆半錢 茯苓 陳皮 桃仁錢 炙甘草五

用豬羊胞煮湯入藥煎服

產後胞損必令氣血驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功故

以參耆朮草以補之加陳皮以宣其滯桃仁以活其血茯苓

以助其下行用豬羊胞煮湯入藥煎服取其以胞補胞之義

成方切用 參朮膏 黑神散 胎產門

不特引經也 丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋瀝有餘長胞雖在內白亦可治胎其胞虛其因語曰難產之人多是氣虛難產之後氣血充虛因用峻補以參朮膏煎以豬羊胞極

黑神散 局方

治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中由血滯

熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃 桂心 乾薑炒 甘草兩 黑

豆半升 每服二錢酒童便各半煎便產須知有生地黃

前證皆因血瘀不行熟地歸芍之潤以濡血蒲黃黑豆之滑

以行血桂心乾薑之熱以破血乾薑辛熱能去惡生新 用甘

草者緩其正氣用童便者散其瘀逆加酒者引入血分以助

藥力也產後惡露不行坐蓐勞傷者以前四味從輕治之若寒多及秋冬宜之若性急形瘦有火之人及夏月均宜審用

去蒲黃黑豆加茯苓錢半吳萸五分當歸全熟地各三錢芍藥白芍酒炒炙甘草炒乾薑肉桂北細辛各一錢水煎名九

蜜煎治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四

肢厥冷古黑神散百草霜白芷等分每二錢煎入童便醋少

許和服治橫生逆產及胎前產後虛損崩漏等證

清化飲

治產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火不清等證

白芍 麥冬 丹皮 茯苓 生地 石斛 黃芩

成方切用

清化飲

失笑散

五 胎產門

骨蒸多汗者加地骨皮一錢半 熱甚而渴或頭痛者加石

膏一二三錢 內熱便瀉者加木通一二錢或黃蘗梔子皆

可隨證用之 如兼外邪發熱加柴胡一二錢

失笑散 局方

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛惡血阻而不行上胸片

痛而作

蒲黃 五靈脂 等分爲末煎膏醋調服

生蒲黃性滑而行血五靈脂氣燥而散血氣脈入肝皆能入厥陰

而活血止痛故治血痛如神

本方各一兩加木通赤芍各五錢每四錢入鹽少許服名通

靈散治九種心痛

清魂散 羅氏

治產後惡露已盡忽昏迷不知人產後氣血虛弱又感風寒也

澤蘭葉 炙甘草 人參 川芎 荆芥

下更宜燒漆器焙醋炭于牀前使聞其氣

氣血虛弱故以人參甘草補其氣外感風邪故以荆芥疏其

風荆芥最散血中之風故以爲澤蘭川芎以去其天下之瘀血風邪去餘

血下氣血生則神清矣肝藏魂故曰清魂

當歸羊肉湯

治產後發熱自汗肢體疼痛名曰羣勞

成方切用

清魂散

當歸羊肉湯

夫 胎產門

黃耆 人參 當歸 生薑 用羊肉一觔煮汁去肉入

前藥煎服如惡露未盡加桂枝行血有寒加吳茱萸有熱加生

地汁有氣加細辛

參者補氣而固衛當歸養血而調營生薑辛溫引氣藥入氣

分而生新血羊肉甘熱用氣血之屬以補虛勞熱退而汗收

矣吳萸口產後不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱有去血

動飲食停滯亦皆發熱熱發熱有三日乳蒸發熱或早起勞

虛虛若汗之則變筋傷肉或昏迷不醒或抽搐不定或大

便閉清其熱則輕凡有發熱且與四物湯爲君白芍須

妙選清熱藥地黃佐之如較前藥胡乾薑人參主之蓋乾薑

辛熱能引血藥入血分氣藥入氣分且能去惡生新有陽生

陰長之道以熱治熱深合內經之旨如惡露不盡者益母丸

夏其餘六經治例皆同必以四物湯爲主乃養血務本之要

也劉河間曰大抵產病天行從增損柴胡雖證從增損四物宜詳脈證而治之

除人參黃耆用羊肉一觔生薑五兩當歸三兩名當歸生薑羊肉湯

金匱治產後腹中疝痛及寒疝腹痛虛勞不足

返魂丹 四益母草膏丸產寶

治胎前產後一切諸病及月經不調赤白帶下

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時連根採收

陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸或搗汁于砂鍋內文武火

熬成膏服忌鐵如胎動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產

胎衣不下炒鹽湯下產後血運口渴狂言產後中風失音口

噤及血結奔痛時發寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑口乾並童

成方切用 返魂丹

七 胎產門 卷二十一

便和酒下產後喘嗽惡心吐酸脇痛無力酒下產後瀉血

湯下產後痢疾米湯下產後崩漏糯米湯下產後帶下膠艾

湯下產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下凡產後以童便化

服一丸能調經絡破血痛

益母草功擅消水行血去瘀生新利大小便故為經產所需

然其性辛散寒滑唯血滯血熱者宜之稍挾虛寒者服之為

害不淺今人以其有益母之名而濫用之誤矣觀其能消疔

腫散乳癰可知其性之全無補益矣時珍曰益母草根莖花

風熱明目調經用子為良若胎產腫消水行血

免懷湯

欲摘乳者此方主之婦人之血上則為乳下則為經欲摘乳者通其月事則乳汁下行免乳脹之苦矣

當歸尾 赤芍藥 酒紅花 酒牛膝 各五錢

四味皆下行導血之品故以用之名曰免懷者子生三年然後免于父母之懷也

免懷湯

胎產門

成方切用卷二十二目錄

嬰孩門 正方四十九 附方五

初生拭口法

甘草下胎毒法

豬乳法

襁褓法

乳哺法

乳兒法

哺兒法

雜將護法

成方切用

目錄

柴歸飲

升麻葛根湯

方見表散門

疏邪飲

柴葛煎

參蘇飲

方見表裏門

惺惺散

透邪煎

麻黃湯

方見表散門

加味葛根湯

紅花湯

桔梗湯

一 嬰孩門  
卷二十二

五味異功湯

羌活透肌湯

透肌散

紫草化毒湯

雙毒煎

涼血養營煎

甘桔湯

方見瀉火門

消毒飲

加味如聖散

前胡化斑湯

成方切用

目錄

活血散

犀角地黃湯

方見理血門

四順清涼飲

黃連解毒湯

方見瀉火門

八參白虎湯

方見瀉火門

七正散

加味導赤散

辰砂益元散

方見消暑門

退火回生散

當歸黃連湯

二 嬰孩門  
卷二十二

保元湯

十二味異功散

九味異功煎

六物煎

六氣煎

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯 方見治氣門

四物湯 方見理血門

當歸活血湯

內托散

戒方切用 目錄

八珍湯 方見治氣門

附子理中湯 方見祛寒門

十全大補湯 方見治氣門

止痛活血散

治痘瘡溼爛方

痧證初起方

三 嬰孩門

成方切用卷二十二

嬰孩門

小兒之病與大人無異惟初生保護及痘疹等證不得不另集方法以便施用。世俗所謂驚風即四時感證也。方中行痘書喻嘉言寓意草中論之最詳當從傷寒門循經治切不可用抱龍丸鎮驚丸等金石藥鎮壓外邪深入臟腑為害不淺。

初生拭口法

嬰兒初生急以綿裹指拭兒口中舌上惡血穢露謂之玉銜若啼聲一發即入腹成百病。薛氏曰嬰兒初生口含血塊啼門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒發熱等因發為瘡疹急須於未啼時用軟帛裹指揩去其血雖出痘亦輕矣。又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速

成方切用 初生拭口法 甘草下胎毒法

一 嬰孩門

以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活。若舌下血出多者以亂髮燒灰同豬脂少許和塗之。聖惠云看齒根草刀割斷點豬乳佳如兒口難開先點豬乳。

甘草下胎毒法

用粉甘草中指一節拍碎以水二蜺殼煎一蜺殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁為佳若服一蜺殼不吐即不須更服。不問嬰兒虛實寒熱皆須服之。心鑑曰古方書言嬰兒始生牛黃欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之物若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五日其毒自下又能助養脾氣消化乳食。薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯煮內覆草汁拭其口次用下胎毒諸法。

豬乳法

嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口中佳豬兒候哺將之即得

強保法

千金論云小兒用父故衣女用母故衣勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癰皆自此始巢氏云兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨發弱宜時見風日若不見風日則令肌膚脆軟便易損傷嬰兒常藏於襁褓之內重衣溫暖譬如陰地草木不見風日輒脆不任風寒○嬰兒皆當以故絮著衣莫用新綿也天氣和暖無風之時令母常抱日中嬉戲數見風日則令血和氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病○又當習薄衣之法當從秋習之不可於春夏減其衣令兒受風寒○冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以為害也○又當消息無令汗出乃成方切勿用乳法 襁褓法 乳哺法 二 卷二十一 嬰孩門

乳哺法

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者奶也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以消化周歲以上必成乳癖于腹中作疼作熱疳病從此起也丹溪曰小兒腸胃尚脆而窄若稠黏乾硬酸鹹甜辣一切魚肉水果淫醃炙煨炙炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非唯無病且不論口可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可為長陰之助然栗大補肺大潤俱為難化亦宜少與婦人無知唯務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不飽忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎與至于乳母尤宜謹節飲食下咽乳汁便通情慾中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾痛立至不吐則瀉不瘡則熱或為口瘡或為驚搐或為夜啼或為腹痛病

乳兒法

之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也

凡乳母氣血為乳汁也五情善惡悉氣血所生宜戒喜怒一切禁忌不用狐臭癰瘻氣嗽病者及身體疥癬頭瘡髮少唇緊音啞耳聾鼻癰病等方可乳兒 夏天盛熱時乳母浴後或兒啼不可與奶使兒胃有熱毒秋成赤白痢浴後可令定息良久乳之可無患也 聶氏曰盛啼不可食乳恐氣逆不順聚而為噎亦能成疾 千金論曰凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多猛取出投後再乳切須於乳時令先捏去宿熱乳然後乳之如乳母欲臥寐當以臂枕之令乳成方切勿用乳兒法 哺兒法 三 卷二十一 嬰孩門

哺兒法

與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒臥于側或驚起不可乳兒蓋氣亂未必定能殺兒也 聖惠方云醉淫喘乳能殺小兒聖濟總論乳者夏欲怒怒則令上氣顛狂母不欲醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變黃不能食新房而乳則瘦悴交不能行

錢乙云兒多因愛惜過當兩三歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年後宜煎陳米稀粥時時與之十月後漸與稠粥調飲以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等寶鑑云兒五十日可哺如素核百日彈丸早晚二哺三歲未滿勿食雞肉及子恐腹內生蟲

雜將護法

嬰兒百日任脈生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫 嬰兒半晬尻骨已成乳母當教兒學坐 嬰兒二百日外掌骨成乳母教兒地上匍匐 嬰兒三百日臍骨成乳母教兒獨立 嬰兒周晬膝骨已成乳母教兒行步

上件並是定法世人不能如法往往抱兒過時損傷筋骨切宜戒之

柴歸飲

治痘疹初起發熱未退無論是痘是邪疑似之間均宜用此

平和養營之劑以為先著有毒者可托有邪者可散實者不

成方切用

雜將護法 柴歸飲 升麻葛根湯

日 嬰孩門 卷十二

致助邪虛者不致損氣 凡陽明實熱邪盛者宜升麻葛根湯壯熱呵欠煩悶時發驚悸或吐或瀉手足時冷面頰赤嗽嚏者為痘證也呵欠煩悶肝之證也時發驚悸心之證也或吐或瀉手足時冷者脾之證也頰赤嗽嚏肺之證也腰痛喜寐腎之證也五臟之證盡顯者其痘必多但顯一二證者其痘必少其本總由

于淫火之毒也 當歸二錢 芍藥一錢半 荆芥一錢 炙甘草一錢 柴胡一錢

加薑煎服 血熱者加生地 陰虛者加熟地 氣虛脈

弱者加人參 虛寒者加炮薑肉桂 腹痛者加木香砂仁

嘔惡者加乾薑陳皮 若治麻疹以乾葛易荆芥

升麻葛根湯

小兒初間發熱壯盛為風寒為痘疹莫能辨的此方穩當

方見表散門

表熱壯盛此邪實于表也經曰輕可去實故用升麻葛根以疏表甘草佐之可以在表之氣芍藥佐之可以在表之營去其實邪和其營衛風寒則解痘疹則出誠初間之良劑也如至四五日痘中夾疹者亦此方主之疹散只依常法治痘

疎邪飲

治痘疹初起發熱凡氣血強壯無藉滋補者單宜解邪此方為主以代升麻葛根湯及蘇葛等方最為穩當

芍藥酒炒 柴胡用甘草 蘇葉 荆芥穗 水煎熱服 無

成方切用

疎邪飲 參蘇飲

五 嬰孩門 卷十二

火者加生薑三片 火盛內熱者加黃芩 渴者加乾葛

去蘇葉荆芥加乾葛黃芩連翹名柴葛煎治痘疹表熱及痘

疫等證

參蘇飲

治痘證初起風寒壯熱體重頭痛痰嗽壅盛

方見表裏門

風寒客于外故用紫蘇乾葛以發表痰嗽壅于內故用半夏

前胡桔梗陳皮茯苓以安裏邪去之後中外必虛人參甘草

急固其虛此則表和而痘易出裏和而氣不虛表裏無失斯

良劑矣



惺惺散

發熱之初未明是痘形體怯弱者宜之

人參 白朮 甘草 細辛 白茯苓 天花粉 白芍藥

桔梗 各七分

參苓朮草防其虛也細辛桔梗所以疏其陽花粉白芍所以和其陰

透邪煎

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之先不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減欲求妥當當先用此方為主

成方切用

惺惺散 透邪煎 麻黃湯

太 嬰孩門 卷二十七

當歸二錢 芍藥二錢 酒炒一錢 防風八分 荆芥穗一錢 升麻三分 甘草七分

水煎服 如熱甚脈洪滑者加柴胡一錢此外凡有雜證俱可隨宜加減

麻黃湯

治痘疹天寒腠密表熱壯盛

方見表散門

解表之藥有三品辛涼辛溫辛熱也夏月表氣易泄宜用辛涼春秋表氣平調宜用辛溫若天寒之時表氣閉密辛涼辛溫不能解散故以麻黃桂枝之辛熱者以主之亦各當其可而已佐以杏仁利其氣也佐以甘草和其氣也

加味葛根湯

凡小兒發熱看有痘情耳冷指冷脚冷眼如含水懶于言笑是也宜用此服至見點

升麻 葛根 前胡 桔梗 山查 青皮 木通 荆芥

撫芎 甘草 加燈心

高鼓峰曰如服此湯而不見點是毒盛也其證必重若熱甚氣悶譫語腰無力冬月可加麻黃一錢夏月加石膏一錢甚者加至二錢如冬月熱甚過四五日重證已見而舌灰白色者亦須以石膏合麻黃用之夏月蘇葉薄荷俱用之如見點如糠糲齊布熱甚口臭此脾經痘也死不治矣去葛根青皮加紅花蟬脫名紅花湯三日後如見點三日

成方切用

加味葛根湯

七 嬰孩門 卷二十七

痘已齊而大熱不退此是毒盛危候見矣須以涼藥涼血紅花湯去升麻撫芎山查加生地丹皮與之然此是乾紅候百不一活如熱微者不妨紅花湯去升麻撫芎山查木通加殭蠶大力子名桔梗湯六日已過痘腳已齊又三日發熱起頂濃漿至矣當用木通殭蠶荆芥連翹花粉丹皮丹參等以和其毒其有變白色而發癢者氣血虧也五味異功散見治氣門四君子湯附方加白芍以救其元氣虛甚者參朮加至五六錢大劑用之自然有救或泥于庸醫發未盡而禁補或反咎發表欠透以致令其內陷者此殺人之論不可信也信手大補不一二劑必然窠下漿來生氣勃然矣即有掃掃破者亦自循皮爛臭而回

生

羌活透肌湯

治痘出見點未盡

羌活 陳皮 柴胡 前胡 半夏 茯苓 甘草 桔梗

川芎 當歸 山查

表氣未疏則出有不盡故用羌芎柴前以疏表裏氣未利則出有不速故用二陳桔梗以調裏當歸活表裏之血山查消裏之滯血活滯消則痘之出也易易耳

透肌散

治氣弱痘出不盡

成方切用

羌活透肌湯 透肌散 紫草化毒湯 搜毒煎

八 嬰孩門 卷二十二

紫草 錢二 木通 錢一 白芍藥 酒炒 人參 蟬脫 升麻 甘草 錢五分

人參甘草能益氣而補中紫草木通能透肌而起痘升麻蟬脫能退熱而消風用芍藥所以調陰氣而和營衛也

紫草化毒湯

治痘已出未出熱壅不使

紫草 錢二 陳皮 錢一 升麻 甘草 錢五分 如小便赤加木通

紫草活竅利血化毒陳皮快膈消痰利氣升麻消風發散瘡痂甘草補虛和中解熱木通加之為導熱邪由溺而泄爾

搜毒煎

解痘疹熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結純陽等證

紫草 地骨皮 牛蒡子 黃芩 木通 連翹 蟬退

芍藥 水煎 渴者加花粉麥冬 陽明熱甚頭面牙齦腫

痛者加石膏知母 小腸乾結臍腹實脹者加大黃芒硝

血熱妄行者加犀角童便 小水熱閉者加山梔車前子兼

表熱者加柴胡

涼血養營煎

治痘瘡血虛血熱色紅熱渴或色燥不起及便結溺赤凡陽盛陰虛等證

生地 當歸 白芍 甘草 地骨皮 紫草 黃芩 紅

花 水煎服量兒大小加減 渴者加天粉 肌熱無汗加

成方切用

涼血養營湯 甘桔湯 消毒飲

九 嬰孩門 卷二十二

柴胡 血熱毒不透者加犀角 毒熱甚者加牛蒡子木通

連翹之屬

甘桔湯

治痘疹咽喉腫痛

方見瀉火門

消毒飲

治痘疹咽喉腫痛膈上熱盛

牛蒡子 錢二 荊芥穗 錢一 防風 生甘草 錢五分

牛蒡子疏喉中風壅之痰荊芥穗清膈間風壅之熱生甘草

緩喉中風壅之氣防風散諸風不去之邪

如味如聖散

治痘疹痰嗽風熱聲啞喉痛

桔梗 牛蒡子 麥門冬 甘草 元參 荆芥 防風

生犀角 黃芩

牛蒡子 麥門冬 療風痰而清肺熱荆芥防風散風邪而升鬱

熱甘草桔梗黃芩利咽喉而清氣熱犀角元參涼心膈而療

結熱熱去則金清金清則聲啞瘥矣

前胡化斑湯

治痘疹中夾斑淡紅色 淡紅色斑之輕者也其原由初間不

傷寒雜證不同傷寒之斑宜主寒涼痘中之斑寒之則血凝

成方切用

如味如聖散 前胡化斑湯 治痘疹 十卷二

酒紅花 當歸 前胡 荆芥 白芷 甘草 赤芍

陳皮 鬱金 胡荽子

紅花當歸赤芍所以活斑中之血前胡白芷陳皮荆芥所以

利表裏之氣胡荽甘草鬱金所以散滯氣爾

活血散

治痘證氣血凝滯

木香 當歸尾 赤芍 川芎 紫草 酒紅花

每服三錢

氣貴利而不貴滯血貴活而不貴凝木香川芎調其氣滯赤

芍歸尾紫草紅花血竭理其血凝

犀角地黃湯

治痘疹血熱及諸失血證

方見理血門

心生血生地黃所以涼心血肝藏血白芍藥所以和肝血火

能載血牡丹皮所以去血中之火熱能動血生犀角所以解

諸經之熱

四順清涼飲

治實熱內壅腹脹秘結痘不能出

大黃 當歸 芍藥 甘草

成方切用

犀角地黃湯 四順清涼飲 黃連解毒湯

十卷二

痘以熱而出固不能以無熱若實熱內壅腹脹便秘則三焦

之氣不化而痘不能以出矣故用大黃通其滯當歸活其血

芍藥養其陰甘草調其胃通利之後表裏氣血皆承順矣故

曰四順 如形質虛弱而大便秘結不堪攻下者用蜜導

黃連解毒湯

治痘疹裏熱壅盛

方見瀉火門

無熱固不化毒熱壅則毒亦不化故用黃連瀉心火黃芩瀉

肺肝之火黃柏瀉腎火梔子瀉上下之火無他證而惟熱壅

故用藥亦精專焉

人參白虎湯

治痘證裏熱渴甚

方見瀉火門白虎湯附方

石膏清胃熱胃清則不渴人參知母甘草化氣而生津液液

生則熱自除

七正散

治痘證小便秘澀

車前子 赤茯苓 山梔仁 生甘草梢 木通 扁蓄

龍膽草

治痘必欲利小便者水循其道而後地平天成故也是方也

成方切用

人參白虎湯 七正散 加味導赤散

三 嬰孩門 卷二十二

車前能滑竅赤苓能滲溼木通能通滯山梔能瀉火草梢能

通莖扁蓄能利水膽草能利熱七物者導其熱邪正其中氣

故曰七正

加味導赤散

治痘疹小便黃赤口乾煩渴

生地黃 人參 麥門冬 木通 甘草 竹葉 燈心

內熱故用生地黃小便黃赤故導以木通竹葉燈心口乾煩

渴故潤以麥冬人參甘草乃氣化而津液自生也

辰砂益元散

治痘疹裏熱小便黃赤神氣不清

方見消暑門六一散附方

滑石清利六腑甘草解熱調中辰砂安神去怯去甘草滑石

辰砂各一錢水飛過加冰片三厘每用冷水調服一錢名退

火回生散治痘證血滯枯澀火炎則水乾是故枯澀用滑石

意入冰片者欲其

速達而無壅滯也

當歸黃連湯

治痘瘡毒盛灰白色不癢

當歸 黃連 丹皮 殭蠶 荆芥 牛蒡子 花粉 銀

花 生地 加燈心

保元湯

辰砂益元散 當歸黃連湯 保元湯

三 嬰孩門 卷二十二

自行起發至頂已起矣而因氣虛有險證者宜此

人參 黃耆 甘草 加生薑

氣虛頂陷者此方主之汪機曰蕭山魏直著博愛心鑑三卷

為古不用藥逆者為內不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥

轉危為安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治機驚上

衰木旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰

陽作為膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名保

元湯灸黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服

之險證者初出圖暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也

出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿足光潤不消也漿

老淫潤不斂也膿腫潰而微遲也凡有諸證宜此湯或加

後生癰毒也癰腫潰而微遲也凡有諸證宜此湯或加

胃發熱惡寒吐泄忘臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參為

君黃耆為臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘證陰瘡者當以黃耆

為君人參為臣

不可執一也

十二味異功散

治痘出不光澤不起張根窠不紅表虛癢塌

人參 豆蔻 白朮 當歸 丁香 肉桂 厚朴 陳皮

半夏 茯苓 附子 木香

中氣有餘氣血充滿則痘光澤起發根窠紅活表無癢塌之

患中氣不足則表亦虛而諸證作矣是方也人參白朮茯苓

當歸所以補胃附子肉桂丁香豆蔻所以溫胃半夏木香陳

皮厚朴所以調胃胃陽明也陳氏云陽明主肌肉胃氣充足

則肌肉溫暖光澤起脹而無癢塌之患亦見道之言也

起頂不充滿而發癢窠脫落如梅花片下發瀉者虛甚也

成方切用

五味異功散加黃耆木香其者附子肉桂吳茱萸俱常用

九味異功煎

治痘瘡寒戰齧牙并治男婦陽氣虛寒等證可代陳氏十二

味異功散等方

人參 當歸 熟地 黃耆 乾薑 炮製附子 肉桂

錢一甘草 或一錢 丁香 或一錢 右量兒大小加減用水一鍾

半煎七分徐徐與服如泄瀉腹痛加肉豆蔻麩炒一錢或白

朮一二錢

六物煎

治痘疹氣血不足隨證加減用之神效不可盡述并治男婦

氣血俱虛等證

熟地 或用甘草 當歸 芍藥 俱隨宜 川芎 三四分 人參 或

或無不虛者不宜用 水煎服

如發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以疎利或加防風佐

之 見點後痘不起發或起而不貫或貫而漿薄均宜單用

此湯或加糯米人乳好酒肉桂以助營氣 紅紫血熱不退

宜加紫草或犀角 脾氣稍滯者宜加陳皮山查 胃氣虛

寒多嘔者加乾薑 或用或加丁香 腹痛兼氣滯者加陳皮木

香 表虛氣陷不起或多汗者加黃耆 氣血俱虛未起未

貫而先癢者加肉桂白芷 元氣大虛寒戰齧牙泄瀉宜去

芍藥加黃耆附子乾薑肉桂

成方切用

六氣煎 白朮茯苓澤瀉湯 圭 嬰孩門 卷二十二

六氣煎

治痘瘡氣虛癢塌倒陷寒戰齧牙并治男婦陽氣虛寒等證

黃耆 肉桂 人參 白朮 當歸 甘草 右咬咀水

煎服 加減法照前六物煎

白朮茯苓澤瀉湯

治痘證水泡 中有實熱腸有停水溼熱外行初則痘色晶亮

釜中發 頃則痘皆水泡矣此乃水不能潤下竈底燃薪

白朮 茯苓 澤瀉

白朮甘而燥能益土以防水茯苓甘而淡能益土以決防澤

瀉鹹而潤能潤下而利水水利溼消泡自瘳矣

補中益氣湯

治中氣虛弱痘不起脹難經曰氣主噓之故氣者虛長為物者也痘不起脹氣之弱也

方見治氣門

參耆朮草以補氣升柴以升陽當歸以活其營陳皮以利其

氣

四物湯

治痘證根淡血弱痘至五六日氣蒸血附之時根腳淡為血弱故用當歸活血川芎行血熟地補血芍

藥斂

方見理血門

當歸活血湯

成方切用

補中益氣湯 四物湯 當歸活血湯 內托散

嬰孩門 卷二十一

治痘瘡色紫色枯用此涼血活血

生地 當歸 川芎 赤芍 紅花 紫草

色紫為血熱色枯為血滯熱者涼之枯者澤之調血之道也

生地涼血之品餘藥皆活血之品血涼而活壅熱可除矣

內托散

治表虛裏實氣血皆弱在表者痘頂灰陷為氣虛痘根色淡為血虛若息重氣粗則為裏實

人參 黃耆 甘草 當歸 川芎 白芍 厚朴 防風

白芷 肉桂 木香 桔梗

紅深黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩 淡白灰陷屬

虛寒者加丁香溫裏肉桂溫表 當貫膿而不貫膿者倍參

當歸加糯米煎熟入人乳好酒

氣虛故用參耆甘草血虛故用歸芍川芎然防風白芷肉桂能引諸藥自內而托之于外木香桔梗厚朴能調壅實以歸

于和

八珍湯

治氣血兩虛醫貴未然之防痘證雖順若氣體虛弱不補恐有後失故用四君以補氣四物以養血

方見治氣門四君子湯附方

附子理中湯

治胃中虛寒或又誤服涼藥瀉而手足厥冷者

方見祛寒門理中湯附方

成方切用

八珍湯 附子理中湯 十全大補湯 止痛活血散

嬰孩門 卷二十一

十全大補湯

治痘證十日以上血氣虛弱者

方見治氣門四君子湯附方

止痛活血散

治痘漿已滿血滯瘀痛不可忍者

白芍藥酒炒二錢為細末酒調下

諸病瘕者為虛痛者為實瘕宜補而痛宜瀉此痛為血實而

滯故用芍藥以平血酒調以行滯

治痘瘡溼爛方

或以敗草灰敷之或以蠶繭灰入枯礬少許敷之或以牆土

白螺蛸殼燒灰敷之或以蛤粉敷之四法者皆是溼者燥之之意

痧證初起方

升麻 葛根 芍藥 甘草 桑皮 地骨皮 桔梗 牛蒡 荆芥 連翹

痧證即疹子又名瘡子不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明兩經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣 若服前藥次日標形顯鼻見點多者最吉以其清陽喜上升也第二日葛根可去惡其開肌腠而乾津液也若熱甚勢重前湯加白虎苓粉之類斷不可少若服藥後而熱愈甚者正毒達

成方切用

治痘瘡瀉痢方 痧證初起方

太 嬰門 卷十二

之故也得大汗而毒自解矣若略見標而不見形者此為痧毒不透後必防疳宜從養陰治甘露飲主之見潤必多服乃效亦從汗解乃屢驗者有一等小兒乳疳一日可解不必盡也緣小兒稟質尙弱神氣有限如遇粗工不審虛實發散過多必致正氣虛脫而不可救者多矣○有痧毒痰喘甚者雖用石膏黃連如水淋石要知其毒痰火壅結上焦之故宜用瓜蘆霜枳殼花粉金沸草清火如被氣虛者加入人參立應○痧證多泄瀉慎勿止瀉惟用升麻葛根黃連甘草則瀉自止○痧家不忌泄瀉瀉則陽明邪熱得解是亦表裏分消之義○痧後泄瀉及便膿血皆由邪熱內陷故也大便忌止瀉惟宜升散仍用升麻葛根湯加黃連扁豆若便膿血加滑石末必愈

成方切用卷二十三目錄

癰瘍門 正方二十六 附方七

皂莢丸

皂蛤丸

桔梗杏仁煎

腸癰秘方

金銀花酒

回毒金銀花酒

長春藥酒

四仙飲  
金銀花膏

真人活命飲

成方切用

目錄

癰瘍門 卷二十三

托裏散

芍藥蒺藜煎

當歸蒺藜煎

灸法

芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

百草煎

蠟礬丸

雄礬丸

托裏十補散

托裏散

托裏溫中散

托裏溫中湯

螺蛸散

槐花蕊

棉花瘡點藥

又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方

十全大補湯 方見治氣門

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

成方切用

降瀉散

後方

止痛當歸湯

目錄

上 癰瘍門 卷二十三

成方切用卷二十三

癰瘍門

外科方證至為繁多不能盡錄茲量採數方以備擇用若夫瀉熱解毒活血托裏之劑多散見於諸門唯在用者之國神而己○內經曰營氣不從逆於肉理乃生癰腫又曰諸痛癢瘡皆屬心火丹溪曰癰疽皆因陰陽相滯而生蓋營行脈中衛行脈外相竝周流寒與濕搏之則凝滯而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣滯而鬱津液稠結為痰為飲積久滲入脈中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而壅滯道阻滯或溢或結積久滲出脈外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由於此不止癰疽為然

皂莢丸 金匱

治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不眠肺者五臟之華蓋處於胸中主氣候在皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺汗出惡風欬嗽短氣鼻塞項強胸膈脹滿久久不瘥則成肺痿風寒皮毛熱

成方切用

皂莢丸 桔梗杏仁煎

一 癰瘍門 卷二十三

傷血脈風熱相搏氣血稽留結於肺則成肺癰多吐涎沫而無膿者肺痿也口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢微腫欬吐膿血胸中隱痛者肺癰也痰為正氣虛癰為邪氣實

皂莢刮去皮 為末蜜丸以棗膏和湯服三丸

喻嘉言曰火熱之毒結聚於肺表之裏之溫之清之曾不少

應堅而不可攻者令服此丸庶幾無堅不入聿成洗滌之功

不可以藥之微賤而少之也

加蛤粉等分為末名皂蛤丸每服二錢酒下治婦人風邪客

於乳房而成癰癰此藥能導其乳汁散其風邪出而自愈矣

桔梗杏仁煎

治欬嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第



一此桔梗湯之變方也

桔梗 杏仁 甘草 阿膠 麥冬 百合 金銀花 夏

枯草 連翹 貝母 紅藤 枳殼 水煎食遠服 火

盛兼渴者加天花粉

### 腸癰秘方

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止者若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先以紅藤一兩許以好酒二碗煎一碗午前一服醉臥一時午後用紫花地丁一兩許亦如前煎服服後痛必漸止為效然後服末藥除根

### 成方切用

腸癰秘方 金銀花酒

二 癰瘍門 卷二十三

蟬脫 殭蠶 當歸 天龍 大黃 石蠟 蛇草 老蜘蛛

二箇挺放新瓦上以酒 爲末每空心用酒調送一錢日逐

漸服自消

### 金銀花酒

治一切癰疽惡瘡不問發在何處或肺癰腸癰初起便服奇

效 癰疽之生始於喜怒憂思之下時飲食居處之不節或金

石草藥之發動寒暑濕熱之不時致陰陽不平而結營

衛而腐潰輕者起於六腑而重者爲癰深則爲疔矣○發于

小者爲癰疽而大者爲癰疽○癰疽之發于內者爲肺癰腸癰

出督脈經虛從腦而出 太陽經虛從背而出少陽經虛從

金銀花 五兩乾者不甘草一 水二碗煎一碗再入酒一碗

略煎分三服一日一夜服盡重者日二劑服至大小腸通利

則藥力到外以生者爛擣酒調敷毒四圍

金銀花寒能清熱解毒甘能養血補虛爲癰瘡聖藥甘草亦

扶胃解毒之上劑也

金銀花 甘草 黃耆 酒一升重湯煮服名曰毒金銀花

湯治痛瘍色變紫黑者又黃耆當歸金銀花甘草大劑煎服

名四仙飲治氣血俱虛服之未成即消已成即潰已潰即愈

附長春藥酒黃耆 大生地 刀切片 金銀花當歸 各

甘草 去皮蜜 地骨皮 甘草水 廣陳皮 去白 用白糯米二斗

做酒釀一垵將前藥後六味用綿包好入垵內隔湯煮三炷

### 成方切用

真人活命飲

三 癰瘍門 卷二十三

香將黃耆膏傾入再煮三炷香將埋埋地下三尺餘深七日

七夜取起濾清聽用 此酒不特外科虛證極妙凡勞傷虛損

此酒馳名 於天下也 附金銀花膏 一名忍 四月採鮮花擣汁熬膏茶酒任點服養

陰退陽補虛療風尤宜於火熱熾盛之人永無疔疽之患

酒亦佳 花葉同功而 花香尤勝

### 真人活命飲

治一切癰疽腫毒初起未潰者

金銀花 陳皮 當歸 防風 白芷 甘草 節 貝母

天花粉 乳香 沒藥 皂角刺 五川山甲 三片

粉炒 好酒煎善飲者多飲酒以行藥勢忌酸物鐵器收斂性

凡藥皆忌

金銀花散熱解毒癰瘡聖藥故以為君花粉清痰降火白芷除溼祛風竝能排膿消腫當歸和陰而活血陳皮燥溼而行氣防風瀉肺疏肝貝母利痰散結甘草化毒和中故以為臣凡毒氣托裏護心能發毒氣外出不致內攻沒藥散瘀消腫定痛故以為佐穿山甲善走能散皂角刺辛散剽銳皆厥陰陽明正藥能貫穿經絡直達病所而潰壅破堅故以為使加酒者欲其通行週身使無邪不散也此藥當服于未潰之先未成者散已成者潰若已潰後不可服

托裏散

成方切用

癰瘍門

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪實數腫甚欲作膿者脈弦洪實數乃實熱堅滿之證故宜下之

金銀花 當歸 大黃 朴硝 花粉 連翹 牡蠣 皂角刺 黃芩 赤芍 每五錢半酒半水煎

金銀花清熱解毒癰瘡主藥當歸赤芍調營血大黃芒硝瀉胃熱黃芩清肺火牡蠣軟堅癰瘡連翹花粉散結排膿角刺鋒銳直達病所而潰散之也

東垣曰瘡瘍及諸病而赤雖伏火熱毒禁不得攻裏為陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少即濡燥藥以潤之如見風脈風瀉以宜發表風藥便可以通利大便若止乾燥秘瀉尤宜潤之慎不可下九竅不利者導滯宜日皆不可下汗之則愈瀉目熱大便秘實不知其氣不降也便以爲實而行大黃此少寒熱不知其氣血不和也

東垣曰瘡瘍及諸病而赤雖伏火熱毒禁不得攻裏為陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少即濡燥藥以潤之如見風脈風瀉以宜發表風藥便可以通利大便若止乾燥秘瀉尤宜潤之慎不可下九竅不利者導滯宜日皆不可下汗之則愈瀉目熱大便秘實不知其氣不降也便以爲實而行大黃此少寒熱不知其氣血不和也

最速

芍藥蒺藜煎

治通身溼熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神效外以螻蛄粉敷之

龍膽草 梔子 黃芩 木通 澤瀉 芍藥 生地 白蒺藜 連刺搗碎五錢 如火不甚者宜去龍膽草梔子加當歸茯苓米仁之屬 如溼毒盛者加土茯苓五錢或一二兩

當歸蒺藜煎 治癰疽瘡疹血氣不行邪毒不化內無實熱而痛腫淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相為奇正也當酌其詳

成方切用 芍藥蒺藜煎 當歸蒺藜煎 灸法 五 癰瘍門

當歸 熟地 芍藥 何首烏 甘草 防風 川芎 白芷 荆芥穗 白蒺藜 炒搗碎三錢 或水或酒煎然水不如酒或以水煎服後飲酒數盞以行藥力亦可 陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加乾薑附子 氣虛不化者加人參黃耆 毒陷不能外達者加穿山甲或皂刺

灸法 治一切癰疽惡瘡 凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以溼紙覆其上先乾處即癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最要早覺早灸

灸法 治一切癰疽惡瘡 凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以溼紙覆其上先乾處即癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最要早覺早灸

灸法 治一切癰疽惡瘡 凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以溼紙覆其上先乾處即癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最要早覺早灸

爲上若有十數頭者卽用蒜研作餅鋪頭上聚艾平餅上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子便用獨蒜片安于頭上若艾灸十四或四十九壯使毒氣外出則易愈李迅曰灸勝于用藥三壯一易百壯爲率但頭頂已上切不可用恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一篩初瘡肉不痛直灸至好肉方痛至夜火城滿背高阜頭孔百數則毒外出否則內通五臟而危矣綱目曰精要謂頭上發毒不得灸此言過矣頭爲諸陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如取較少者三五壯而已按東垣灸元好問腦疽以大艾炷加兩枚許者灸至百壯始覺痛而痊由是推之則頭上發毒灸之痛者艾炷宜小壯數宜少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也

### 芙蓉外敷法

見本草從新木芙蓉條

### 成方切用

芙蓉外敷法 百草煎

太 癰瘍門 卷二十三

### 百草煎

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒溼氣留聚走注疼痛等證無不奇效

百草 凡田野山間者無論諸品皆可取用然以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者不及鮮者力速須預爲採取之 右不論多少取以多煎濃湯乘熱熏洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以頻敷爲善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不到湯得藥氣則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎膏者其義亦以此

此誠外科中最高最佳之法亦傳之方外人須用二三十斤煎濃湯二三鍋用大盆盛貯以煎藥洗其風濕洗其久每日一二三次內服廊清飲分利等劑妙甚

### 蠟藥丸

治一切瘡癰惡毒先服此丸護膜托裏使毒不攻心或爲毒蟲蛇犬所傷並宜服之

黃蠟二白礬一兩 先將蠟溶化候少冷入礬和勻爲丸酒下每服十丸二十丸漸加至百丸則有力瘡愈後服之亦佳加雄黃名雄礬丸治蠱毒蛇犬蟲咬毒

心爲君主不易受邪凡患癰疽及蛇犬所傷毒上攻心則命立傾矣黃蠟甘溫白礬酸澀並能固膜護心解毒定痛托裏

### 成方切用

蠟藥丸 托裏十補散

七 癰瘍門 卷二十三

排膿使毒氣不致內攻故爲諸證所必用酒頓黃明膠亦妙方見本草從新黃明膠

托裏十補散 局方卽外科精要十宣散

治癰瘡初發或已發邪高痛下瘡盛形羸脈無力者癰疽不丹毒火熱因虛勞氣鬱者止宜補形氣調經服自當消散不待汗之下之也

當歸 黃耆 人參 二川芎 桂心 白芷 防風 厚朴

桔梗 甘草 錢一 每服二錢加至六錢熱酒調下千金加

芍藥連翹木香乳香沒藥亦名托裏散治發背疔瘡

參耆補氣芍歸活血甘草解毒桂心白芷桔梗排膿厚朴瀉實滿防風散風邪爲表裏氣血之藥共成助陽內托之功也

丹溪曰冬月腫瘍用之可轉重為輕若夏月腫瘍用之以桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參耆難為收斂久不收斂則和營衛三法內之外者其脈洪實發熱煩躁外無脈脈浮數微腫在外形證外顯恐邪氣極而內行當先托裏內外之中者外無微惡之氣內亦臟腑宣通知其托裏當和營衛用此三者雖未即瘥必無變證

### 托裏溫中湯

治瘡瘍為寒變而內陷膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便秘澀食則嘔逆氣短呃逆不得安臥時發昏憤

此孫和治上焦濕臂傷方也六脈沈微色變膚涼加以呃逆胃中虛寒神氣遂于盛夏用此大辛熱之劑蓋捨時從證之變法也

附子錢一 乾薑錢一 羌活錢一 茴香錢一 丁香錢一 沉香錢一 益智仁錢一

甘草錢一 陳皮錢一 木香錢一 生薑錢一

### 成方切用

托裏溫中湯 托裏黃耆湯

八 癰瘍門 卷二十三

衛生寶鑑曰經云寒淫于內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐不下食益智沈香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻聚而為滿木香茴香陳皮辛苦溫治痞散滿為使

### 托裏黃耆湯

總錄

治諸瘡潰後膿多內虛潰後膿血出多陰陽兩竭宜大補氣血

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 遠志 麥冬 五味子 等分為末每服五錢食遠服

人參黃耆補氣固衛當歸桂心活血生肌茯苓滲淫健脾麥

冬清熱補肺遠志辛散專理癰疽五味酸溫善收腫大丹溪道遺後補氣血理脾胃實為至要否則數月半年之後虛證仍見轉成他病矣

### 蟬蛻散

治淫熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股腫痛下部諸瘡無不神效

海螵蛸不必浸淡人 人中白或人中黃礞砂亦可等分 為細末先以百草濃煎

湯乘熱熏洗後以此藥滲之如乾者以麻油或熬熱豬油或

蜜水調塗之 若腫而痛甚者加冰片少許更妙 若瘡

膿水甚者加蜜陀僧等分或煨過官粉亦可

### 槐花蕊

### 成方切用

蟬蛻散 槐花蕊 棉花瘡點藥 又武定侯方

九 癰瘍門 卷二十三

治楊梅下疳神方

凡棉花毒或下疳初感或毒盛經久難愈用新槐蕊揀淨不必炒每食前用清酒送下三錢許早午晚每日三服之服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也

如不能飲即用滾水鹽湯俱可送之但不及酒送之快捷也

### 棉花瘡點藥

杏仁取霜 真輕粉等分 敷瘡上二三日即痂落

### 又武定侯方

雄黃錢一 杏仁三十粒 輕粉錢一 為末以雄豬膽汁調敷之

三日即愈天下第一方

當歸補血湯加防風連翹方

治瘡瘍有血無膿搔癢不止有血無膿表氣不足也

當歸 防風 黃耆 連翹

達于表二物得之而效愈速也此藥服之數劑諸瘡化毒生膿膿滿毒盡則去病根而無濕癢之患○若膿日久不乾者去黃耆加白朮茯苓以燥之如治爛痘之法則善矣

十全大補湯

治氣血虛弱頸面腹背皆瘡者瘡疥生于手足者為輕生于頸面腹背者乃氣血虛弱之甚小人道長之象故宜大補

方見治氣門四君子湯附方

成方切用

當歸補血湯加防風連翹方

十 瘡瘍門

四君同黃耆以大補其氣四物同桂心以大補其血氣血得其補則腹背之瘡先愈而君子道長小人道消矣 參苓白朮散亦可酌用見補養門

連翹金貝煎

治陽分癰毒或在臟腑胸乳肺膈之間者此方最佳甚者連用數服無有不愈

金銀花 土貝母 蒲公英 夏枯草 紅藤 連翹 好酒二碗煎一碗服服後暖臥片時 火盛煩渴氣腫者加天花粉 若陽毒內熱或在頭項之間者宜用水煎

連翹歸尾煎

治一切無名腫毒流注等最宜用之

連翹 歸尾 甘草 金銀花 紅藤 好酒煎服

如前 如邪熱火盛者加槐蕊二三錢

降癰散

治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即消已成者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛勢凶者先宜用此方其解毒散邪之功神效 若堅頑深固者用後方

薄荷葉 野菊花 土貝母 右薄荷野菊花乾者可為末鮮者可搗爛同貝母研勻外將茅根煎濃湯去渣用調前藥末乘熱敷患處仍留前剩湯頓暖不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能為痛約敷半日即宜換之真妙方也

成方切用

連翹歸尾煎 降癰散 後方

十二 瘡瘍門

後方

凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

生南星 土貝母 朴硝 薄荷 石灰 右

同為末用鹽酒杵稠黏敷患處經宿乾則易之不必留頭若膿成者留頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或冰片少許更妙

止痛當歸湯

治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸 生地黃 芍藥 黃耆 人參 甘草 多官桂

當歸生地活血涼血人參黃耆益氣補中官桂解毒化膿

成膿則芍藥和脾酸以斂之甘草扶胃甘以緩之則痛自減

矣制宜殊非一端熱痛涼之寒痛溫之風痛除其風溼痛導

其溼燥痛潤之塞痛通之虛痛補之實痛瀉之膿鬱而閉者

開之惡肉敗潰者引之陰陽不和者調之經絡閉澀者利之

而無權也

成方切用

止痛當歸湯

三 卷二十四

成方切用卷二十四目錄

眼目門 正方一十九 附方六

人參益胃湯

雞子黃連膏

羊肝丸

濟生羊肝丸

本事方

圓明膏

兔矢湯

滋陰地黃丸

消風養血湯

成方切用

目錄

一 卷二十四

金露散

補陽湯

益陰腎氣丸 方見補養門

駐景丸

加味駐景丸

定志丸

張子和定志丸

地芝丸

真人明目丸

防風飲子

神效明目丸

二百味草花膏

飛絲芒塵入目方

明目六事方

目疾者戒沐頭宜濯足

益氣聰明湯 見補養門

又法

成方切用

目錄

二

眼門  
卷二十四

成方切用卷二十四

眼目門

成方切用

人參益胃湯

人參益胃湯

治勞役飲食不節內障目病

內障者睛裏昏暗與不病之眼

○東垣曰五臟六腑之精氣皆稟受於脾胃而上貫于目脾者諸陰之首也目者氣血之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明于目矣心者君火也主神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮于目既勞役運動勢乃妄行及因邪氣所并而損其血脈故諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神治標不治本不明正理也

黃耆 人參 甘草 白芍藥 黃蘗 蔓荊子 每四錢日二服

參耆甘草大補中氣以強脾胃蔓荊升清陽而通九竅白芍

入厥陰而和營血 黃蘗除溼熱而瀉相火 治目不明

目雖為肝竅而五臟六腑之精氣皆上注于目而為之精  
精之氣為肝竅而五臟六腑之精氣皆上注于目而為之精  
氣之精為肝竅而五臟六腑之精氣皆上注于目而為之精  
脈并為系上屬于腦後出于項中此則眼具五臟之精而與  
故其證多而方亦廣茲僅錄數方以備採用其五臟之精而與  
瀉火養血之劑散見于各門可以通用○目有五輪白睛  
為氣輪屬肺金故獨堅青睛為風輪屬肝木內包膏汁滴  
養瞳神目角大小皆為血輪大皆屬心君火大皆赤者為  
實火小皆屬心包相火小皆為赤者為虛火兩脾為肉輪屬  
脾土土藏萬物故包四輪開動為陽為應閉靜為陰則  
瞳神有神小先天真氣所化潤澤精汁積而成者能滋養  
門通於膽發于心是真氣之經絡中往來生用之腎施于膽而  
陽也血有真精先後天元氣所化精汁起于腎施于膽而  
瞳神也目有堅殼數重真血滋神水神水包神膏膏中一

卷二十四  
眼門

雞子黃連膏

治火眼暴赤疼痛熱在膚腠洩而易解者用此點之卽可愈  
若熱由內發火在陰分者不宜外用詩  
藥非橙不能去內熱且以閉火邪也

用雞子一枚開一小孔單取其清盛以磁碗用黃連一錢研爲末摻於雞子清上以筯徹底連打沫得數百使成浮沫約得半盞許卽其度矣安頓少頃用筯撥開浮沫傾出清汁用點眼皆勿得緊閉眼胞擠出其藥必熱淚擁出數次卽愈

內加冰片少許尤妙 若雞子小而清少者加水二三匙同

成方切用

雞子黃連膏 羊肝丸

二  
卷二十四  
眼目門

打亦可

羊肝丸

治目疾內障倪仲賢曰經曰心者五臟之專精目者其竅也又爲肝竅腎主骨骨之精爲神水故肝木不平

內挾心火爲勢妄行火炎不制神水受傷上爲內障此五臟病也諸脈皆屬于目相火者心包絡也主百脈上榮于目火盛則百脈沸騰上爲內障此虛陽病也膀胱小腸三焦膽肝俱循于目其精氣亦上注爲目之精四府病也神水黑眼皆注於陰白眼郭火乘之上爲內障此六府病也神水黑眼皆注於陰白眼赤脈皆注於陽陰齊陽併故能爲視陰微不立陽盛則淫經曰壯火食氣壯火散氣上爲內障此弱陰病也四者皆爲陰弱不能配陽也

夜明砂海蟾蛏 木賊去節 當歸一兩 以羊肝四兩水煮攪

燭和太

蚊食血之蟲夜明砂皆蚊眼也故能散目中惡血而明目

食蚊而眼不化 木賊輕揚而善磨木故能平肝散熱而去障  
其矢爲夜明砂 蟬性善蛻故能退翳當歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者  
羊性屬火取其氣血之屬能補氣血引諸藥入肝以成功也

羊肝丸之方頗多  
茲錄其一二

濟生羊肝丸黃連一兩羯羊肝一具去筋膜生用搗爛和丸

咸方切用

圓明膏  
兔矢湯

三  
卷  
十四

于東垣丹溪用參者補氣血亦能明者蓋目主氣血盛則  
府得利出入升降而明虛則玄府無以出入升降而昏此則  
必用參者四物等劑助氣血運行而明也

明堂

治內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食失節

麻黃  
 黃連  
 生地  
錢五  
 訶子  
裏煨  
 粉甘草  
錢二  
 歸身

以水二碗先煮麻葉至一碗去沫入後藥同熬至滴水

散去渣入蜜少許再熬點之

柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝養血黃連清肝火甘草

中州童子散大故加詞以收之也

龜矢湯



治瘡疹入眼及昏暗障翳

免矢錢 茶清調或吞服須待瘡疹瘥後服之免者明月之精得金之氣其矢名明月砂能解毒殺蟲故專能明日又可兼治勞瘡也

滋陰地黃丸 一名熟地黃丸東垣

治血弱氣虛不能養心心火旺盛肝木自實瞳子散大視物不清肝為心母子能令母實故心火旺則肝木作實肝主風和之氣乖亂而精液隨之走散矣精液走則光華失故視物不清也網目日心脈挾口系肝脈連目系手足少陽之脈結于目外小背風熱從此道上交頭目致偏頭痛腫瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也宜涼血養血收火散火而除風熱

成方切用

滋陰地黃丸 消風養血湯

四 眼目門 卷二十四

熟地兩一生地方一

兩半一 柴胡八錢黃芩酒炒當歸酒洗黃連酒炒

五味子 地骨皮 天門冬 枳殼炒甘草炙人參錢二蜜

丸茶清下日二服忌食辛熱之物助火寒冷之物損胃使藥不上行

熱地當歸養血生地地骨涼血黃芩瀉肺火黃連瀉肝火天冬清肺而滋腎柴胡散肝而升陽五味收耗而斂散人參甘草以益氣補中枳殼以利氣行滯也

消風養血湯

治目赤腫痛 風熱傷血則赤風熱作實則腫風熱攻注則痛為外皆下為內皆目痛赤腫從上下者為太陽證宜溫之散之從下上者為陽明證宜寒之下之從外走內者為少陽證

宜和解之

荆芥 蔓荊子 菊花 白芷 麻黃 防風 桃仁去尖 紅花酒炒川芎五錢當歸酒洗白芍酒炒草決明 石決明 甘草錢一 荆芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮上升並能消風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養血去瘀兩決明皆除肝經風熱專治目疾瘀去血活則腫消風散熱除則痛止又曰為肝竅搜風養血皆以和肝加甘草者亦以緩肝而止痛也保命集云日病在府則為表當除風散熱在藏則為裏當養血安神暴發者為表易療久病者在裏難治金露散

治目赤腫痛翳障諸疾

成方切用

金露散 補陽湯

五 眼目門 卷二十四

天竺黃新香海螵蛸浸洗月石二兩硃砂飛蘆甘石片子各佳

淨入錢 為極細末磁瓶收貯每用時旋取數分研入冰片

少許諸目疾皆妙 若治外內皆障取一錢許加珍珠八釐

須放豆腐膽礬三釐 若爛弦風眼每一錢加銅綠飛丹各中藥熟用 八釐 如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥各五釐

補陽湯

治青白目翳 陽不勝其陰則生目翳所謂陰盛陽虛則九竅不通乃陰埃障日之象也

人參 黃耆 白朮 茯苓 甘草 陳皮 柴胡 羌活

獨活 防風 知母 當歸酒洗生地酒洗熟地 白芍酒炒

瀉 肉桂去皮

參朮苓草黃耆陳皮甘溫益氣之品也固所製補陽羌獨柴防辛溫散翳之品也亦所以升陽二地歸切知母澤瀉乃陰分之藥亦所以濟夫羌防柴獨使不散其真陽兩川肉桂者取其辛熱熱者火之象可以散陰翳辛者金之味可以平肝木蓋眼者肝木之竅也

益陰腎氣丸 東垣

治腎虛目暗不明

方見補養門六味地黃丸附方

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明壯水之主以制陽光故用生

成方切用

益陰腎氣丸 駐景丸

六 眼目門 卷二十四

熟地黃歸稍五味山黃澤瀉丹皮味厚之屬以滋陰養腎

則火自降養山藥所以益脾而增萬物之母茯神所以養神

腎則精自生而生明照之精柴胡所以升陽而致神明之氣于睛目之窠

也 孫思邈云中年之後有目疾者宜補不宜瀉可謂開萬世之蒙矣東垣此方其近之

駐景丸

治肝腎陰虛兩目昏暗 目為肝竅瞳子神光屬腎故肝腎陰虛則目昏暗也

枸杞子 車前子 兩 熟地黃 兩 菟絲子 兩 酒浸 蜜丸酒下

熟地枸杞補肝滋腎菟絲益精強陰車前利水而瀉肝腎邪

熱也 車前子清肝明目利小便而不走氣以此瀉邪則補藥更為得力張子和曰目赤腫是厥陰肝經風熱利小便

能去肝經風熱

加當歸五兩和氣血以益肝脾 肝藏血脾統血目得血而能視五味二兩斂耗散而助金水 能斂肺金滋腎水收瞳神散大 川椒一兩補火以逐下焦寒滯名加味駐景丸

定志丸 局方

治目不能遠視能近視者 海藏曰目能近視責其有水不常能遠視責其無火法當補心

服益心強志能療健忘

遠志 菖蒲 二兩 人參 茯苓 一兩 蜜丸硃砂為衣張子和方

無菖蒲加茯神柏子仁酸棗仁亦名定志丸酒糊丸薑湯下

安魂定驚

人參補心氣菖蒲開心竅茯苓能交心氣于腎遠志能通腎

成方切用

定志丸 地芝丸 真人明目丸

七 眼目門 卷二十四

氣于心硃砂色赤清肝鎮心心屬離火火旺則光能及遠也

地芝丸 東垣

治目能遠視不能近視 海藏曰目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

生地黃 天冬 四兩 枳殼 甘菊花 二兩 蜜丸茶清或酒下 茶者欲藥力之上行

生地涼血生血天冬潤肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降火除

風

真人明目丸

治腎水虛竭肝有風熱目昏多淚 腎主目之瞳子腎水虛竭則目昏肝之液為淚肝有

風熱則

熟地黃 龜地黃 用椒去目及爛 蜜丸每服五

十丸空心鹽飲吞下

熟地所以補腎生地所以涼肝川椒味辛而熱可以療肝腎之痺氣澤熱著而又于空心以鹽飲吞之宜其直達肝腎矣

病在標而治其本可謂神于病情者所以為真人之方與傳氏目昏多淚家貧醫紙為業性喜雲水見必邀迎一日有客方巾布袍過之授以此方服之不一月目明夜能視物

防風飲子

治倒睫拳毛倒睫拳毛由目急皮縮之故也蓋伏熱內攻陰氣外行當去其內熱併火邪使眼皮緩則眼毛

黃連 甘草 人參 當歸 葛根 防風 細辛 蔓

成方切用

防風飲子 二百味草花膏

八 眼目門 卷二十四

荆子分三 服後避風寒溼熱

參甘以補其氣當歸以濡其血黃連以清其火防葛以散其風熱細辛入少陰而潤腎蔓荆走頭面而升陽

除人參當歸黃連加黃耆名神效明目湯東垣治前證兼赤爛

昏痛冷淚多眵眵音賜

又法摘去拳毛以蠶血點數次即愈

二百味草花膏

治目赤流淚或痛或癢晝不能視夜惡燈光血熱則目赤肝熱則多淚熱微

則不能視陽勝故夜惡燈光

錫羊膽 蜂蜜 入蜜膽中蒸熟候乾細研為膏每含少許

或點目中又法臘月入蜜膽中紙籠套住懸屋簷下待霜出掃取點眼

羊膽苦寒益膽瀉熱蜂蜜甘潤補中緩肝曰二百味草花膏

者以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝開竅于目肝汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸眼皆治目疾然眼病有內外治各不同內疾既發非服不除外疾既發非點不退內疾始盛瘡流不如寒濕伐株不如去根不點而除者未之見也外障既成如物汚須濯鏡垢須磨不點而去者未之有也若內障不點而外點反激其火動其血氣無益反損若外障已成雖服藥不發不長而所結不除當內外夾攻方盡其妙

飛絲芒塵入目方

陳墨 濃磨點之

明日六事方

成方切用

飛絲芒塵入目方 明日六事方

九 眼目門 卷二十四

損讀書 減思慮 專內觀 簡外事 早起晚 夜眠早

晉范甯常苦目疾就張湛求方湛書此六事仍尾之曰右方

宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左邱明遂世世相傳

以及卜子夏晉左太沖凡此諸賢並有目疾得此方之用然

以視火下以氣篩蘊於胸中七日然後納諸方寸修之一時

近可數其目睫遠可察夫簾垂長服不已洞見牆壁之外非

但明目乃亦延年許學士評之曰審如是而行之非可謂之

嘲諷真明目之奇方也

疾者戒沐頭宜濯足

此二句者先賢之格言也太極之道動而生陽靜而生陰沐

頭則上動矣必坐陽而損目况夫溼氣難乾而風而梳拂不  
已則風溼襲于首而併於目甚者至於喪明此沐頭之宜戒  
也然何以宜濯足也足太陽之經根于足之小指端上貫于  
睛明足少陽之經根于足大指岐骨間上貫于瞳子竅足陽  
明之經根于足中指內間上貫于承泣易曰水流溼火就燥  
若以溫水濯其兩足則頭目間之熱邪亦能引之而下況夫  
溫濯之餘腠理疏泄又足以瀉經中之邪是亦去病之一助  
也故曰宜濯足

成方切用

目疾者戒沐頭宜濯足

十

眼目門  
卷二十四

成方切用卷二十五目錄

救急門 正方三十 附方二十三

六君子加天麻方

四君子加薑汁竹瀝方

獨參湯

五磨飲 方見治氣門

火醋熏鼻法

禮拜法

附子理中湯 方見祛寒門

生脈散加香薷方

成方切用 目錄

脫陽脫陰

瘧死

溺死

瘞死

中惡

蠱毒

鹽滴毒

服鉛粉

蛇蟲犬咬傷

蛇傷三方

礮毒

諸菌草毒及蟻蟻入腹

蜈蚣傷二方

一

救急門  
卷二十五

壁虎咬

瘋狗咬

湯泡傷

又法

刀斧傷

骨哽

魚骨哽

諸骨哽

誤吞銅鐵金銀

吞髮繞喉不出

成方切用

頓開不能合

呃逆不止

舌脹滿口

乳蛾喉痹

又法

霍亂攪腸痧

鼻衄不止

又方

蟲入耳中

跌打損傷

蝎子螫

常犬咬

雞骨哽

目錄

二

急救門  
卷三十五

產婦血暈

產後子腸不收

成方切用

目錄

三

急救門  
卷三十五

成方切用卷二十五

救急門

凡人以疾病死而得終其天年者雖曰不幸猶正命也若  
卒暴之疾暴橫之過人如給溺砒蠱蛇犬之傷小如骨哽  
刀斧湯火之害此等死者則非正命矣君子順受其正胡  
然而以非命歸耶茲採數方以備急用而臨用之際其要  
在隨證制宜以施活人  
手眼方為應變之才爾

六君子方見治氣門四加天麻方

治暴死幸然而倒口噤吐沫風燥則筋急故令口噤吐沫者  
不省人事風盛氣湧使然乃風來潮海之  
身體溫暖令身體溫暖脈來虛大邪氣盛而  
正氣虛也

脈虛而以辛散之劑驅風則懨懨之氣必絕非其治也故用

參朮苓草之甘溫者急固其氣復用半夏陳皮之辛利者以

成方切用

《參子加天麻方》四君子加薑汁竹瀝方獨參湯

平其沫天麻之加定風邪爾

四君子方見治氣門加薑汁竹瀝方

治暴死有痰聲者名曰痰厥若痰聲澆澆隨息漸至而  
其者是氣已脫也不治

痰厥者頑痰塞其清陽呼吸之道也痰既塞之氣欲通之故

令喉中有聲經曰壯者氣行則愈怯者著而成病故用參朮

苓草之溫補者以壯氣佐之竹瀝薑汁以行痰

獨參湯

行立之間暴眩仆絕喉無痰聲身無邪熱者陰虛陽暴絕也

此方主之

人參二兩去煎

陰陽之有人身互為其根而不可離者也陰陽道虧之則孤

陽無所依附亦自飛越故令人暴仆眩絕過不在痰故無痰

聲病不引感故無體熱斯時也有形之陰血不能急生無形

之呼吸所宜急固況夫陰生於陽又太極之妙乎故以獨參

主之取其為固元益氣之聖品爾

五磨飲子

治暴怒暴死名曰氣厥宜扶正生使氣順即稍安  
再用皂角末吹鼻令嚏

方見治氣門四磨飲附方

怒則氣上氣上則上焦氣實而不行下焦氣逆而不吸故令

暴死氣上宜降之故用沉香檳榔氣逆宜順之故用木香烏

成方切用

五磨飲子火醋熏鼻法禮拜法

二救急門

藥佐以枳實破其滯也磨以白酒和其陰也若挾虛者用四

磨飲

火醋熏鼻法

凡感臭穢瘴毒暴絕者名曰中惡不治即死宜燒炭火一杓

以醋沃之令患人鼻受醋氣則可復甦既甦以霍香正氣散

主之方見和

禮拜法

凡遇屍喪觀古廟入無人所居之室及造天地鬼神壇場歸

來暴絕面赤無語者名曰尸疰亦曰鬼疰即中祟之謂也進

藥便死宜移患人東首使主人焚香北面禮拜之更行火醋

重鼻法則可復甦否者七竅逆血而死

子理中湯

腹痛額頭黎黑手足收引脈來沉下無氣以息者中寒暴死也  
腹痛病因固有數種但額頭黎黑手足收引脈來沉下則中寒之驗也所以無氣以息者呼出主陽吸入主陰三陰受其真寒則病不能吸吸亡則此方主之  
呼不能存矣故令人鼻死此方主之  
社寒門葛附白通湯薑附湯等方俱

方見社寒門理中湯附方

寒者溫之故用附子乾薑及人參白朮甘草所以生其呼吸之氣也進藥後更著艾灸其關元此內外交治之法是證也有死一日夜而治之復甦者幸勿因其危而輕棄之  
凡冬月

厥方切用

附子理中湯 生脈散加香薷方 脫陽脫陰

三 救急門

氣者以火炒熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遠以火烘冷與火爭必死浴以熱湯亦死或用薑汁熱酒各半溫服  
服散暑門 加香薷方

人本陰虛復暑途饑困勞倦暴仆昏絕者此方主之  
人本陰虛復暑途則陽易亢加之候困勞倦則陰益虧所以暴仆昏絕者一則陰虛而孤陽欲脫一則暑邪乘虛而犯神明也

用人參益元而固脫香薷辟邪而卻暑麥冬之清所以扶其

不勝之肺五味之酸所以斂其欲脫之真  
凡人平素體氣不

幸死以路上熱上頭昏令人累其中即活薑湯童便皆可灌之或用熱土大蒜等分持水灌之或置日中或令近火以熱湯灌之即活切勿飲以冷水及臥  
冷地正如凍死人若遠近火即死

凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰男子雖

死陽事猶然不委女子雖死陰戶猶然不閉俱不治  
若男女能緊緊抱佳以口接氣暖氣呼通間有得生者但臨時慌忙焉知料理所以多死  
亦有夢中脫死者其陽必舉其陰必泄尸容有喜色為可辨也皆在不救

縊死

切不可割斷繩索急用手裏衣物緊塞穀道抱起解繩安放平正揪髮向上揉其項痕捻圓喉管腳踹兩肩以兩管吹氣入耳內或刺雞冠熱血滴口中男用雌女用雄鼻即氣轉再屈伸其手足將手摩之若氣不接將腰打三四拳或以皂角末搐鼻  
鼻至鼻身  
未搐鼻  
鼻至鼻身  
未搐鼻

溺死

成方切用

縊死 溺死 驚死 中毒

四 救急門

急倒提出水用牛一頭令橫臥以腹合牛背上牽牛徐行令吐出腹中之水以老薑擦牙即活口噤者撬開橫一筋于牙間使水得出如無牛以鍋覆地將溺人臍對鍋臍俯臥以手托其頭水出即活或俯臥橫上腳後稍高鹽擦臍中待其水自流出或用皂角末綿裹納下部出水即活切忌火烘逼寒入內以致不救

墮死

如原有燈勿動切忌火照但痛蔽其腳跟或敲大拇指而唾其面或以皂角末吹入鼻中得嚏即醒

凡中蠱毒令營白礬不瀉食黑豆不腥即是中毒可濃煎石  
橘皮汁飲之或熱茶化胆礬五分探吐出惡毒或米飲調真  
金末三錢令下 凡中砒霜毒急飲以人溺及人糞汁或  
詩烏柏樹根葉汁或藍汁令服或刺羊血熱服 中鹽鹵毒  
縱飲生豆腐漿解之 中諸菌蕈毒及蠱蟻入腹黃土和水  
飲下之 綠豆湯甘草湯能解百毒

服鉛粉  
以麻油調蜂蜜加飴糖與服

蛇蟲犬咬傷

凡惡蛇傷急于傷處上下紮縛使毒不散走隨浸糞缸內食  
成方切用 服鉛粉 蛇蟲犬咬傷 五 救急門

蒜飲酒令飽使毒不攻心或礬石甘草等分冷水服二三錢  
更搗蒜敷患處加艾圓灸之 此法兼治 又方五靈脂一兩雄  
黃五錢為末酒調服洋敷患處又方貝母為末酒調盡醉飲  
之頃久酒自傷處為水流出血水盡以藥渣敷唐上重先可  
活 凡蜈蚣傷取大蜘蛛放傷處吸去其毒 急投蜘蛛于水  
中其吐毒以全  
其又方鹽水洗淨雞糞塗之 壁虎咬用桑柴灰水煎數沸  
濾濃汁調白礬末塗之 蝎子螫用白礬半夏等分醋調塗  
之 外臺白凡遇一切毒螫之物切不可起惡念 凡瘋狗咬  
傷用番木鱉半個碎切斑蝥七個去頭翅足若過一日加一  
個糯米一撮慢火炒脆去斑蝥取米研末好酒調服取下惡

物多日凶者頭上有紅髮三根拔去之若仍凶腹內有狗聲  
者再加木鱉一箇斑蝥廿一枚如前製法與服 服後以黃連  
三月不可聽鑼鼓聲再發則難治終身不得食羊犬肉稍輕  
者急于無風處捏去惡血孔乾者針刺出血用小便或鹽湯  
洗淨持葱貼上若常犬咬者淨洗血水用虎骨煨研敷患處  
或爛嚼杏仁敷之

湯泡傷

雞子清調大黃末塗之炒黃檗末亦可一法以冷燒酒澆淋  
其妙

刀傷

成方切用 湯泡傷 刀斧傷 骨哽 誤吞銅鐵金銀

六 救急門

卷二十五

海螵蛸末敷之血立止古壙石灰為末亦可金瘡血出不止  
用原蠶蛾炒為末敷之

骨哽

凡魚骨硬食橄欖即下如無鮮者用橄欖核磨水飲之 橄欖  
核與魚骨同即死物 又貓涎亦能下魚骨哽 凡雞骨哽用  
野苧根搗爛如龍眼大雞湯化下如魚骨哽魚湯化下 諸

骨哽用犬弔一足取其涎徐徐嚥下或用礬砂井花水洗化  
下或醋煎威靈仙嚥下 或加砂餅凡治哽之法可以類推如  
治髮哽虎犬治骨  
哽亦各從其類也

誤吞銅鐵金銀



但多食肥肉自隨大便而出吞針者煮蠶豆同韭菜食針菜

自從大便下而出誤吞銅者食葶藶菰即化

吞髮繞喉不出

取白亂髮燒灰白湯調下一錢

頰車開不能合

醉之睡中用皂角末吹其鼻嚏透自合

呃逆不止

用紙撚刺鼻中得嚏自止

舌脹滿口

以生蒲黃末塗之或加乾薑末

成方切用

霍亂攪腸沙 鼻衄不止

七 救急門 卷二十五

乳蛾喉痹

凡乳蛾水漿不入先用皂角末點破再取杜牛膝汁和醋含

嚙又法艾葉擣汁口含良久腫自消冬月無葉掘根用之又喉閉者取

山豆根汁含嚙即開有藥不能進者急取病人兩臂撻數十

次使血聚大指上以髮繩扎住拇指針刺指甲縫邊出血指

縫邊乃少如放痧一般左右手皆然其喉即寬

霍亂攪腸沙

以針刺手指近甲處一分半許出血即安仍先自兩臂撻下

令惡血聚于指頭後刺之

鼻衄不止

亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又方白芨末新汲水

調下又法紙數十層水浸溼安頂中以火熨之紙乾立止又

法用線扎中指中節左孔出血扎左指右孔出血扎右指兩

孔出血則俱扎之又法以大蒜擣餅貼足心

蟲入耳中

以貓尿滴耳中蟲即出以生薑擦貓鼻貓即尿

跌打損傷

非汁和童便飲散其瘀血骨折者蜜和葱白擣勻厚封酒調

白芨末二錢服

產婦血運

成方切用

蟲入耳中 跌打損傷 產婦血運 產後子腸不收

八 救急門 卷二十五

猝時昏運藥有未及牀前燒炭沃醋或以醋塗口鼻令酸氣

入神收即醒或用破舊漆器或乾漆燒煙熏之使鼻受其氣

產後血既大行氣隨脫去察其面白眼閉口開手冷脈微氣

脫證也速用人參一二兩急煎濃湯灌之○凡產後血運本

屬氣虛而血壅痰盛亦有之如果形氣脈氣俱有餘胸腹脹

痛上衝血逆證也宜用失笑散若痰盛氣粗宜二陳湯知無

劑芎歸湯入珍湯之類主之

產後子腸不收

醋三分冷水七分和嚙其面一嚙一縮三嚙即收又法草麻

仁一兩擣膏塗頂心收即去之又法皂角末吹鼻中嚏作立

成方切用卷二十六目錄

勿藥元詮 正論二十六 附論四十八

上古天真論

老子論

廣成子論

又老子論

又上古天真論

譚景昇論

又上古天真論

白樂天論

方揚論

曹真人論

張虛靜論

成方切用

目錄

勿藥元詮  
卷二十六

淮南子論

金丹大要論

契祕圖論

呂純陽論

胎息經

胎息銘

張紫陽論

李東垣省言箴

疏五過論

龍虎經

經脈篇

陰陽應象大論

釋氏戒慾論

又上古天真論

又上古天真論

四氣調神論

又四氣調神論

又四氣調神論

陰陽應象大論

吳氏論

又四氣調神論

藏器法時論

又藏器法時論

又藏器法時論

又藏器法時論

老子論

又四氣調神論

扁鵲論齊侯疾

刺法論

成方切用

目錄

勿藥元詮  
卷二十六

悟真篇

古歌

晉道成長生養性論

蔣氏調氣篇

蘇氏養生訣

李氏十六字訣

彭祖論

調息

莊子南華經

王龍溪論

李東垣論

調息之法

勞心勞力人須調息以保元氣

讀書家宜習養生法

醫家尤須愛養精力

小過天

道經六字訣

一秤金訣

金丹秘訣

按摩導引諸法

羅先生論

養生宜節飲食

宜節飲食

脾胃為養生之本

草頭藥汁不可服

成方切用

目錄

三勿藥元詮  
卷二十六

痰飲痞積等證宜灼艾

素有淫熱飲食宜清勝

蟲疳酒癰諸病初愈時不可驟服滋補藥

臥病常存退步心

眞空寺老僧論鄺子元心疾

病中不可偏信師巫

問疾來者勿得與之相接

病加於小愈

素不服藥不為無見

成方切用卷二十六

勿藥元詮

攝生尚元非崇異也。生身以養壽為先。養身以御病為急。經曰：我命在我，不在於天。味用者，天善用者，延故人。之所生，神依於形，形依於氣，氣存則榮，氣敗則滅。形氣相須，全在攝養。設早使氣衰而形無所依，神無所主，致殞謝為命。盡覺知命者，故夫胎息為大道根源，導引乃宣暢要術。人能養氣以保神，氣清則神爽，運體以御病，體活則病離。現三元養壽之方，絕三尸九蟲之害，內究中黃妙旨，外契大道元言，則陰陽運用皆在人之掌握，豈特還齡可保，即元妙上乘，固不由茲始矣。噫，顧人之精進，何如爾。

素問上古天真論曰：上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，上古太古也。道造化之名也。老子曰：有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道。道者是也。法取法也，和調也，術數修身養性之法也。言既法陰陽而又濟之以術數，蓋陰陽之道逆之則災，害生從之則成方切用。上古天真論。一勿藥元詮。卷二十六。

苛疾不起，故知道者必法。飲食有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡其天年。度百歲乃去，節飲食以養內，慎起居以養外，不妄作勞以保其天。真則形神俱全，故得盡其天年。天年者，天界之全百歲。今者天年之樂去者，五臟俱虛，神氣皆去，形骸獨居而終矣。今時之人，不然也。以酒為漿，以妄為常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真。多欲不節，則精竭神傷，則真氣隨之而散。蓋精能生其精，精盈則氣盛，氣盛則神全，神全氣堅，強老而益壯。若生者，本乎精也。廣成子曰：必靜必清，無勞女形，無搖女精，乃可以長生。正此謂不知持滿，不時御神，保精如持盈，滿恐其傾覆，四時務快其心，逆於生樂，起居無節，故半百而衰也。快心事過，終必為殃。是半百而衰，皆以斷喪精神，事事違道，故不能如上古之盡其天年也。老子曰：生之徒十有三，死之徒十有三，民之生動之死地，亦十有三。其今人。之謂歟。樂音洛。○又曰：夫上古之教下也，皆謂之虛邪賊風。

避之有時止下節上古聖人教人以保真之道此治外之  
道也○一切四時乘辰不正之恬憺虛無真氣從之精神內守  
氣是謂賊風邪氣○夫音扶恬憺虛無真氣從之精神內守  
病安從來恬憺者泊然不泊其外虛無者漠然無所動於中  
也所以真氣無不從精神無不守又何病之足慮哉此治內之  
道也○按效法聖賢則在明哲之所必不容已者欲得其門當  
自養心保身始故但能於動中藏靜忙裏偷閒致遠鉤深度乎  
近矣譚景昇曰明鏡無心無物不照吳大無心萬象自馳行師  
無狀敵不敢欺至人無心元精是以志閒而少欲心安而不懼  
形勞而不倦兩亡起居皆適雖形勞而神自逸也氣從以順各  
從其欲皆得所願氣得所養則必從順唯其少欲故美其食精  
皆甘任其服美惡隨樂其俗與天和者樂天之俗也高下不相  
慕其民故曰朴高忘其貴下忘其分兩無所慕是以嗜欲不能  
成方切用上古天真論

勞其目淫邪不能惑其心嗜欲人欲也目者精神之所注也目  
與元同則淫邪不能惑其心嗜欲人欲也目者精神之所注也目  
邪不能惑其心愚智賢不肖不懼於物故合於道無論愚智賢不  
合養生之道矣所以能年皆度百歲而動作不衰者以其德  
全不危也○執道者德全德全者形全形全者神全神全者氣  
真真者提挈天地把握陰陽不假修為天眞俱全天地陰陽惟  
其闔闢握持言呼吸精氣獨立守神肌肉若一呼吸接於地  
故通乎精有道獨存故能獨立神不外馳故曰守神神守於中  
形全於外身心皆合於道故曰肌肉若一即首篇形與神俱之  
義言不壞也○按精氣神乃人身之三寶也今將先賢及道家  
得理諸論採附於左以助參悟○白樂天曰黃喬赤松吸陰陽  
之氣食天地之精呼而出故吸而入新方揚曰凡亡於中者未  
有不取足於外者也故善養生者守根善養生者守息此言養  
氣當從呼吸也○曹真曰神是性兮是命神不外馳此言養  
氣當從靜也○神若出便散矣神守身中無自回此言守神以養

氣也○淮南子曰其神者神去之休矣神者神居之也言精  
可養神也○金丹大要曰五聚則精盈精盈則氣足氣足則  
正陽之氣矣○其秘圖曰坎為水為月在人為腎腎精中有  
一之液流降於下此言坎離之交媾也○呂純陽曰精養靈根  
氣養神此真之外更無真此言修真之要在於精氣神也○胎  
息經曰胎息從伏氣中結氣從胎中息氣人身來為之生神去  
離形為之死知神氣可以長生固守虛無以養神氣神行自氣  
行神住即氣住若欲長生神氣須注心不動念無來無去不出  
不入自然長住勤而行之是眞道路胎息銘曰三十六咽一咽  
為先吐唯細細納唯綿綿坐臥亦兩行立坦然戒於喧雜忌以  
醒壇假名胎息實曰內丹非只治病決定延年久行之心名列  
神亦役心養生之道在乎存神養氣也○張紫陽曰心能役神  
神能役心之於眼使歸於心則心神遊於眼而役於心欲求神心  
而靜心在目也又曰神有元神氣有元氣精有元精神見則  
依氣生精實而氣融元精此則元氣不生元陽不見元精不  
元氣生元氣生則元精產此則元氣不生元陽不見元精不  
化生之初也○李東垣省言箴曰氣乃神之祖精乃氣之子氣  
者精神之根蒂也大矣哉精氣以成精積精以全神必清必靜  
成方切用上古天真論

御之以道可以為天人矣有道者能之余何人哉切宜省言而  
已此言養身之道以養氣為本也○按諸論無非精氣神之理  
夫生化之道以氣為本故疏五過論曰氣內為實此誠最重之  
辭醫家最切之旨也唯是氣義有二曰先天氣後天氣先天氣  
者真一之氣氣化於穀因形化氣此氣自虛無中來後天氣者  
血氣之氣氣化於穀因形化氣此氣自虛無中來後天氣者  
字也蓋精為天一所生有形之祖龍虎經曰水能生萬物聖人  
獨知之經脈篇曰人始生先成精精成而腦髓生陰陽應象大  
論曰精化為氣故先天之氣氣化為精後天之氣精化為氣精  
之與氣本自互生精氣既足神自王矣雖神由精氣而生然所  
以統馭精氣而為運用之主者則又在吾心之神三者合一可  
言道矣今之徒知禁慾即為養生殊不知心有不妄動氣隨心  
散散不聚精遂氣亡釋氏有戒慾者曰斷陰不如斷心心為  
功曹若止功曹從者都息邪心不止斷陰何益此言深得制慾  
之要亦足為入故能壽傲天地而無有終時此其道生微盡也  
門之一助也○故能壽傲天地而無有終時此其道生微盡也  
合於道故後天地而生原天地之始先天地而化要天地之中  
終形去而心在氣散而神存故能壽傲天地而俱與道俱生也  
古之時有至人者淳德全道人淳德全道和於陰陽





咸方切用

四氣調神論  
刺法論

八  
卷二

兵不亦

渴而穿井無及於飲則  
晚矣而病不早爲之計

無濟於戰誠哉

素問遺篇

論曰所有自來腎有久

以寅時面向南

淨神不亂

氣不息七徧以引頸

如嚙甚硬物如

此七遍後

下、津令無數

氣令腹中鳴至

也善攝生

明調氣

暖席偃臥暝

不細吐出

呼卽盡

息或二十息

不可忍過氣漸多但能閉至七八十息以上則臟腑胸膈之間  
悉皆清氣之布渡矣至於純熟潤肺宮一縱則身中惟有短息  
一寸餘所閉之氣在中如火蒸潤肺宮一縱則身中惟有短息  
身外其快其美有不可言之狀蓋一氣流通表裏上下徹澤故  
也其所聞之氣漸消則恍然復舊此道以多爲貴以久爲功但  
能於日夜間行得一二度久久耳目聰明精神完固體健身輕  
百病消滅矣凡調氣之初務要體安氣和無與意氣爭若不安  
而且止俟和乃爲之久而弗倦則善矣聞氣如降龍伏虎須要  
達其神理胸膈常宜虛空不宜飽滿若氣結滯不得宣流覺之  
便常用吐法以除之如咽呵呼吸嚙吹六字訣之類是也不然  
則泉源壅遏恐致逆流痞癰中滿之患作矣又如蘇氏養生  
訣曰每夜於子時之後寅時之前披衣擁被面東或南盤足而  
坐叩齒三十六通兩手握固拄腰腹間先須閉目靜心掃除妄  
念即閉口并鼻不令出氣謂之閉息最是道家要妙然後內觀  
五臟存想心爲炎火光明洞徹降下丹田中待腹滿氣極則徐  
徐出氣不得令耳聞聲候出息勻調卽以舌攪唇齒內外漱煉  
津液津液滿口卽低頭嚙下令津與氣谷谷然有聲須用意精



成方切用

刺法論

十卷二六

猛以氣送入丹田中氣定又依前法為之凡九開氣三嚙津而止然後以兩手擦摩兩腳心使湧泉之氣上徹頂門及膝下腰脊間皆令熱微次以兩手摩腰角耳項皆令極熱仍按腰脊間左右五七次梳頭百餘梳而臥熟臥至明。又如李氏十六字訣云一吸便提氣氣歸臍一提便嚙水火相見注日右十六字仙家名為十六錠金丹乃至簡至易之妙訣也無分在官不妨政事在俗不妨家務在士不妨事業只於六時中略得空閒及行住坐臥意一到處便可行之口中先須漱及三五次舌攪中吸清氣一口以意會及心口寂地直送至腹臍下一寸三分以意力提起使氣歸臍達及夾脊雙關腎門一路輕輕如忍便狀頂上梳關透入泥丸頂內其升而上之亦不覺氣之上出謂之下吸清氣送入丹田稍存一息既而上升隨又似前輕輕提上與臍相接而所謂氣氣歸臍壽與天齊矣凡嚙時口中有液愈妙無液亦要汨然有聲嚙之如一嚙一提或三五口或七或九或十二或二十四口要行即行要止即止只要不作為正事不使間斷方為精進如有痼疾見効尤速久行之卻延年形體不變百疾不作自然不餓不渴安健勝常行之卻延年

感冒痞積逆滯不生癰疽瘡毒等疾耳聰目明心力強記宿疾俱瘳長生可望所謂造化吾手宇宙吾心功莫能述也按此三家之法若依蔣氏則臥亦可書亦可依蘇氏則坐亦可夜亦可依李氏則閒亦可忙亦可此三說者推李氏稍煩難為力然其中亦有可用者但不可拘泥耳故或用此或用彼取長舍短任意為之貴得自然第無勉強則一身皆道何滯之有久而精之誠不止於病已也又觀之彭祖曰和氣導氣之道密室閉戶安牀暖席枕高二寸半正身臥眼目閉氣以鴻毛著鼻上不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽百六十歲雖於真人夫豈虛語哉然總之金丹之術百數其要在神水華池玉女之術百數其要在還精採氣斯言得之矣此外有云轉轆轤運河車到玉關上泥丸者皆言提氣也有云進用武火出神水火者謂進欲其壯出欲其徐皆言呼吸也有云赤龍攪水混神水滿口勻者皆言津液也有想火入臍輪放火燒偏身者皆言陽氣欲其自下而升以溫元海三焦也再如或曰龍虎或曰鉛汞或曰坎離或曰夫婦或云導引或云栽接其宗旨無非此耳雖其名目極多而可以一言蔽之者則曰出入多而已醫道通仙術斯其為最矣。此還精之法也

調息

調息 調息一法貫徹三教大之可以入道小用亦可養生故

成方切用

調息 調息之法

十卷二六

迎文垂教以目視鼻端自數出入息為止觀初門莊子南華經曰至人之息以踵王龍溪曰古之至人有息無睡故大易隨卦曰君子以嚮晦入晏息晏息之法當向晦時耳無聞目無見四體無動心無思慮如種火相似先天元氣元神停育相抱真意綿綿老子曰綿綿若存開闔自然與虛空同體故能與虛空同壽也。世人之用一點靈光盡為後天濁氣所掩是謂陽陷於陰也。李東垣曰夜半收心靜坐片時此生發過身元氣大要也。凡勞心勞力之人須隨時偷閒調息以保既耗之元氣蓋氣根於息息調則氣調氣調則身中無不流通四達而百脈安和神情清泰雖勞不苦人矣調息之法端靜坐謝境澄心口目俱閉止於鼻中徐徐吸吸任其自然勿得作意思為著力太重反使本來不息之真室而不和。讀書作意思為著力太重反使本來不息之真室而不和。讀書

者必習養生法能習養生法不唯於身利更於心利其要莫先於少睡少睡則神靈神靈則氣爽氣爽則神靈身心自然安和矣然少睡之工有六靜而勿躁一也疎遠房室二也常收此心於腔子中三也深夜勿寒勿暖四也行住坐臥不忘調息五也每當日晡時神氣昏倦輒偷閑一憩六也。醫者尤須加意調攝愛養自家精力精力不足則倦倦生厭厭生躁躁厭相乘則審脈辨證處方皆苟率而無誠意矣思欲救死全生庸可期乎今之醫者鮮克不以奔競為務務徒勞苦而不自知

調息之法不拘時候隨便而坐平直其身縱任其體不倚不曲解衣緩帶腰帶不寬則上務令周適口中舌攪數徧微微呵出濁氣不得鼻中微微納之或三五徧或一二徧有津嚙下叩齒數通舌抵上腭唇齒相着兩目垂簾令龐龐然漸次調息不喘不粗或數息出或數息入從一至十從十至百數至



數千攝心在數勿令散亂如心息相依雜念不生則止勿數任其自然名曰隨息與息俱出復與俱入隨之不已一旦自住不出不入忽覺此身從毛竅中八萬四千雲蒸雨散諸病自除諸障自滅坐久愈妙若欲起身須徐徐放手足勿得遽起能勤行之靜中光景種種奇特直可明心悟道靜能生慧不但卻病延年而已也息有四相呼吸有聲者風也守風則散不聲不滯而往來無形者氣也守氣則勞不聲不滯出入綿綿若存若亡神氣相依是息相也息調則心定真氣往來自能奪天地之造化息歸根命之蒂也

小週天 先要止念身心澄定面東腳坐平坐亦可前膝不呼吸和平用三昧印招無名指右掌加左掌上按於臍下叩齒三十六遍

成方切用

小週天

三勿藥元詮卷二十六

以集身神赤龍攪海內外三十六遍赤龍舌也內雙目隨舌轉運舌抵上腭靜心數息三百六十週天畢待神水滿漱津

數遍用四字訣撮抵閉吸也撮提穀道舌抵上腭目閉上視鼻吸莫呼從任脈撮過穀道到尾閭以意運送徐徐上夾脊中關漸漸速些閉目上視

鼻吸莫呼撞過玉枕頭後將目往前一忍直轉崑崙頂頭倒下鵲橋也古分津送下重樓入離宮也心坎至氣海丹田略定一定復

用前法連行三次口中之津分三次嚥下所謂天河水逆流也靜坐片時將手左右擦丹田一百八下連臍抱住放手時

將衣被圍住臍輪勿令風入古云養得丹田暖暖熱此是神仙真妙訣次將大指背擦熱拭目十四遍去心肝火擦鼻三十六遍潤肺擦耳十四遍補腎

擦面十四遍脾健雙手掩耳鳴天鼓徐徐將手往上即朝天揖如是者三徐徐呵出濁氣四口收清氣雙手抱肩移筋換骨數遍擦玉枕關二十四下擦眼一百八下擦足心各一百八下

道經六字訣呵呼咽音戲噓吹音脆嘻 每日自子至巳為六陽時

而東靜坐叩齒三十六通舌攪口中候水滿時漱鍊數遍分三口咽一人一身之水皆賴下華池之水甘淡以

意送至丹田微微撮口念呵字呵出心中濁氣念時不得有聲反損心氣即閉口鼻吸清氣以補心吸時亦不得聞吸聲

但呼出令短吸入令長如此六次再念呼字六遍以治脾再

成方切用

道經六字訣

金丹秘訣

三勿藥元詮卷二十六

念咽字六遍以治肺再念噓字六遍以治肝再念吹字六遍

以治腎再念嘻字六遍以治三焦客熱並如前法謂之三十六小週天也詩曰春噓明目木扶肝至夏呼心火自閑秋咽

熱四季長呼脾化食切忌出聲聞兩耳其功尤勝保神丹

金丹秘訣曰一擦一兜左右換手九九之功真陽不走戌亥二

時陰旺陽衰之候一手兜外腎一手擦臍下丹田左右換手各八十一半月精固久而彌佳 凡大小便之時咬緊牙齒解

單方開亦最能固精

髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常彈將兩手心按兩耳以指彈腦名鳴天鼓

舌宜抵腭齒宜數叩津宜數嚥濁宜常呵清宜常吸背宜常

摩也

大損元氣尤宜戒之

此下數條無非教人勿藥之意

養生者固宜節食尤宜節飲傷人所易知飲傷人都不覺不

按摩導引諸法 脾胃爲養生之本

養生宜節飲食

齒  
卷勿藥元詮  
二十六

謂之傷飲其見證也輕則腹滿腸鳴爲嘔爲吐重則腹急如

類

謂病瘧之人忌茶忌藥否則令人中滿深味之亦甚有理特  
謂人之達耳所謂忌茶者非忌茶也忌茶湯也忌藥者非忌  
藥也忌湯藥也蓋病瘧之人中宮多滯若更過飲茶湯必致  
滯則以溼助汗齕有不敗脾元而成中滿之候者歟謂恒

於世無載

凡草頭藥汁最能傷脾胃不可謾服胃氣虛者服之必死或不能胃氣終難完復且更有草類相似收採不真誤

中救人之毒於頃刻間而草  
救者矣歷有明驗言之慘人

日別病相加掣肘莫措然治之之法則灼艾先而藥石次蓋

之法則灼艾先而藥石次蓋

灼艾之功遠踰草根

飲食爲首務不可饕餮厚味致傷脾胃

有溼熱之人飲食之

之痰火癰疽卒中之

數劑以淨熱爲原  
湯熱之尤者驟爾服

必不致過戀于心可計日而起矣不則今日當歸芍藥明日

痰飲宿積等證宜

素有溼熱飲食宜清勝

圭  
卷二十一  
六

病時常於胸前多書死字每書數過頓覺此心寂然不動萬

念俱灰四大幾非我有又何病之足慮哉雖然此唯可與達

者言也

鄧子元由翰林補外十餘年矣不得賜還嘗侏僚無  
聊遂成心疾每疾作輒昏憤如夢或發譫語有時不

無異平日或曰真空寺老僧不用符藥能治心疾往叩之

第幾數十年前榮辱恩讐悲歡離合及種種閒情此是過去思想也或事到跟前可以順應若乃畏首畏尾三番四復猶

豫不決此是現在妄想也或期日後富貴榮華皆如所願或期功成名遂告老歸田或期子孫登榮以繼書香與夫不可

忽然而滅禪家謂之幻心能照見其妄而斬斷念頭禪家謂

之賢心故曰不患念起  
患覺此心若同太虛  
煩惱何處安聯又曰  
貴恙亦原於心小不  
交是溺愛冶容而作  
色荒禍

二者之欲稠繆染者言謂其元精若能離之則腎水滋生可

患若能遠之則心火不炎上炎可以下交於腎故曰虛不相  
絳振無所偶返流全一六慾不行又曰苦海無邊回頭是岸  
子元如其言乃獨處一室掃  
空萬緣靜坐月餘其病如失

病中但可安分調攝不可偏信師巫殺害生命不惟損貲造業  
更使心志狐疑溺情鬼窟而切身珍愛之圖反置勿問愚孰  
甚焉

凡有問疾來者勿得與之相接一人相接勢必人人相接多費  
語言以耗神氣心所契者又因契而忘倦心所憎者又以憎  
而生嗔甚或坐盈一室聲起談風縱不耐煩又不敢直辭以  
去嗔嗔病人力克幾何而堪若此恐不終朝而病已增劇矣  
智者於此休將性命徇人情

成方切用

病中不可偏信師巫問疾來者勿得與之相接  
病加於小愈素不服藥不為無見

大勿藥元詮  
卷一十一十六

病加於小愈者因小愈而放其心也天下事處逆者恒多易處  
順者反多難病當未愈而求愈欲不得逞志不得肆凡語言  
動止饑飽寒溫以及情性喜怒無不小心翼翼自然逆可為  
順而愈矣愈則此心不覺自慰保護漸疎恣口吻也爽寒溫  
也多語言也費營慮也近房室也任情性而煩惱也廣應酬  
而不自知勞且傷也其病豈有不加者乎因憶孟夫子生於  
憂患死於安樂之說信不可不書紳而銘座右也

有人素不服藥者不為無見但須知得病從何來當從何去便  
是藥爾如饑則食食即藥也不饑則不食不食即藥也渴則  
飲飲即藥也不渴則不飲不飲即藥也惡風知傷風避風便

是藥惡酒知傷酒戒酒便是藥逸可治勞靜可治躁處陰以  
卻暑就燠以勝寒衰於精者寡以慾耗於氣者守以默怯於  
神者絕以思無非對病藥也人惟不自知爾

長子月

素不服藥不為無見

大勿藥元詮

2034448

8  
Z121.5  
I.C

成方切用十四卷

浙江巡撫  
採進本

國朝吳儀洛撰儀洛字遵程海鹽人此書爲其醫學  
述之第四種取古今成方一千三百餘首本經按  
證加以論斷卷首載內經一十二方第一卷至第  
十二卷每卷各有上下分治氣理血補養瀉固表  
散漏吐攻下消導和解表裏祛風祛寒消暑燥濕  
潤燥瀉火除痰殺蟲經帶胎產嬰孩癰瘍眼目救  
急凡二十四門卷末載勿藥元詮七十四條大旨  
謂古方不宜今用故所錄皆切於時用之方凡例  
於汪桓醫方集解頗有微詞然桓書淺畧亦可無  
庸掊擊也



21181888442219